



# TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF

**CÓDIGO: TEN91, TE107, TEN05 e TEN51**

**CADERNO: 1**

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o **seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito**, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em <http://www.spdmpais.org.br> na data prevista no cronograma.

## INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **50 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados pessoais**, o emprego escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego e o número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - Os candidatos aos **empregos de nível superior** exceto os candidatos ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua prova objetiva.

## AGENDA

- **03/08/2014**, PROVAS OBJETIVAS/ RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
- **04/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **06/08/2014**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **07/08 e 08/08/2014**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **15/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **18/08/2014**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **19/08/2014**, Divulgação dos Candidatos de Empregos de Nível Superior que terão os títulos analisados.
- **19/08/2014**, Relação dos Candidatos Convocados para a etapa de Avaliação Psicológica.
- **23/08 e/ou 24/08/2014**, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
- **25/08/2014**, Divulgação da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra o Resultado da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **29/08/2014**, Resultado Final da Nota Final da Avaliação de Títulos.
- **28/08 a 29/08/2014**, Solicitação de VISTAS DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra Avaliação de Psicológica.
- **08/09/2014**, Divulgação do Resultado Final.



Concursos

## INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** [www.spdmpais.org.br](http://www.spdmpais.org.br)
- **E-mail:** [spdm2014@biorio.org.br](mailto:spdm2014@biorio.org.br)

## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO

## O DESASTRE DO BRASIL

Carlos Nejar, *O Globo*, 10/7/2014

Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão propositada em Neymar, veio bem antes de quando Felipão mostrou-se desatualizado, soberbo, ditador; veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo. Não foi apenas a seleção alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro curto. O preço foi muito caro.

## QUESTÃO 1

Em relação à afirmação de que o desastre começou bem antes da lesão de Neymar, o texto:

- (A) não esclarece onde está o começo do desastre;
- (B) diz que o desastre começou com a desatualização do Felipão;
- (C) informa que o desastre teve início com a arrogância do treinador;
- (D) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado com os jogadores;
- (E) justifica que o desastre era inevitável em função da falta de inteligência.

## QUESTÃO 2

“Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha”; a expressão “diante da” pode ser substituída adequadamente por:

- (A) contra a;
- (B) para a;
- (C) frente à;
- (D) em relação à;
- (E) de encontro à.

## QUESTÃO 3

A frase que não mostra um exemplo de grau superlativo é:

- (A) “Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão propositada em Neymar...”;
- (B) “... veio bem antes de quando Felipão mostrou-se desatualizado, soberbo, ditador...”;
- (C) “... veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores...”;
- (D) “... como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo”;
- (E) “O preço foi muito caro”.

## QUESTÃO 4

Ao dizer que a lesão em Neymar foi “propositada”, o autor do texto participa da opinião de que essa lesão foi:

- (A) intencionalmente praticada pelo adversário;
- (B) casualmente feita no calor do jogo;
- (C) prontamente punida pelo juiz da partida;
- (D) inevitavelmente ocorrida em atletas de ponta;
- (E) repetidamente praticada em jogos da Copa.

## QUESTÃO 5

“*veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo. Não foi apenas a seleção alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro curto. O preço foi muito caro.*”

Considerando as três ocorrências do vocábulo “como”, sublinhadas no texto, pode-se afirmar que:

- (A) apresentam valores semânticos diferentes;
- (B) só as duas primeiras ocorrências mostram o mesmo valor semântico;
- (C) a última ocorrência tem valor semântico de tempo;
- (D) as três ocorrências mostram valor de comparação;
- (E) só as duas últimas ocorrências mostram o mesmo valor semântico.

**QUESTÃO 6**

Ao dizer que “como de início se viu um time de sopro curto”, no termo sublinhado o autor empregou uma figura de linguagem denominada:

- (A) metonímia;
- (B) metáfora;
- (C) pleonasma;
- (D) eufemismo;
- (E) hipérbole.

**QUESTÃO 7**

A palavra “goleada” apresenta um sufixo (-ada), com valor de coletivo, como ocorre em:

- (A) jogada;
- (B) bananada;
- (C) laranjada;
- (D) trombada;
- (E) poeirada.

**QUESTÃO 8**

O par abaixo que é formado por classes de palavras diferentes das demais é:

- (A) futebol brasileiro;
- (B) excessiva propaganda;
- (C) mínimos gestos;
- (D) atletas nacionais;
- (E) muito caro.

**QUESTÃO 9**

O texto desta prova tem a finalidade de:

- (A) elogiar o futebol brasileiro;
- (B) lamentar a violência nos campos de futebol;
- (C) criticar alguns aspectos de nossa seleção;
- (D) apontar medidas que possam melhorar o nosso futebol;
- (E) mostrar a tristeza do povo brasileiro pela derrota.

**QUESTÃO 10**

“com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo”; nessa frase do texto há uma relação de sentido implícita entre dois elementos, que só NÃO pode ser expressa por:

- (A) corpo e mente;
- (B) prática e teoria;
- (C) pés e cabeça;
- (D) trabalho e comodismo;
- (E) atividade e pensamento.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS****QUESTÃO 11**

“Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” conceitua:

- (A) vigilância epidemiológica;
- (B) vigilância nutricional;
- (C) vigilância sanitária;
- (D) sistema de vigilância nutricional;
- (E) segurança alimentar e nutricional (SAN).

**QUESTÃO 12**

A Tuberculose é considerada um problema de saúde pública porque:

- (A) ainda é frequente no Brasil, e sua ocorrência está diretamente associada ao modo de viver e trabalhar do indivíduo;
- (B) apresenta distribuição uniforme pelo Brasil, acometendo, predominantemente, a raça negra;
- (C) tem alta incidência nas camadas mais pobres e no gênero feminino;
- (D) a transmissão é direta de pessoa a pessoa e vem apresentando diminuição da incidência;
- (E) apresenta declínio na taxa de prevalência, estando praticamente erradicada na região Sudeste.

**QUESTÃO 13**

Por universalização da saúde, expressão corrente no movimento sanitário início da chamada Nova República, entende-se a:

- (A) unificação das medidas preventivas e curativas;
- (B) abordagem compreensiva dos problemas de saúde;
- (C) aplicação das medicinas alternativas no atendimento médico;
- (D) extensão do direito à assistência médica gratuita para toda a população;
- (E) cobertura do atendimento exclusivamente aos grupos de riscos biológicos.

**QUESTÃO 14**

A atenção primária de saúde compõe-se de algumas atividades ou ações básicas de saúde, dentre as quais encontramos as seguintes, EXCETO:

- (A) educação para a saúde e sobre métodos de prevenção de doenças;
- (B) atendimento dos problemas de alimentação e abastecimento de água;
- (C) tratamento de doenças independente da complexidade;
- (D) imunização;
- (E) combate às enfermidades endêmicas locais.

**QUESTÃO 15**

Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e utilizado, e que está associado diretamente às condições econômicas, sociais e ambientais é:

- (A) a taxa de mortalidade proporcional por idade;
- (B) o coeficiente de mortalidade infantil;
- (C) a taxa de esperança de vida;
- (D) o coeficiente de morbidade;
- (E) a taxa de letalidade.

**QUESTÃO 16**

No início da década de 1990 ocorreu, no Rio de Janeiro, uma epidemia cuja principal causa de sua disseminação era a falta de saneamento básico. A epidemia retratada foi de:

- (A) meningite;
- (B) sarampo;
- (C) dengue;
- (D) tétano;
- (E) cólera.

**QUESTÃO 17**

O Sistema Único de Saúde - SUS possui, em cada esfera de governo, as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) Fundo Nacional de Saúde e associação de moradores;
- (B) Programa de Saúde da Família e Comissão Intergestora Tripartite;
- (C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde;
- (D) Comissão Intersectorial e Conselho Tutelar;
- (E) Ministério da Saúde e Distrito Federal.

**QUESTÃO 18**

Avalie se, de acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS, são fatores determinantes e condicionantes da saúde:

- I. Lazer e trabalho.
- II. Alimentação, saneamento básico, educação e acesso a serviços.
- III. Transporte, moradia, renda e meio ambiente.
- IV. Meio ambiente e moradia, exclusivamente.
- V. Renda, lazer e trabalho, exclusivamente.

É correto APENAS o que consta em:

- (A) IV e V;
- (B) II e V;
- (C) II;
- (D) III;
- (E) I, II e III.

**QUESTÃO 19**

A inalação da fumaça de derivados do tabaco por indivíduos não fumantes que convivem com fumantes em ambientes fechados é denominada:

- (A) tabagismo ativo;
- (B) antitabagismo;
- (C) fator de risco;
- (D) fator de proteção;
- (E) tabagismo passivo.

**QUESTÃO 20**

Em relação às doenças de notificação compulsória, pode-se afirmar que:

- (A) somente os casos suspeitos devem ser notificados;
- (B) apenas os casos confirmados devem ser notificados;
- (C) o caso suspeito não deve ser notificado antes da confirmação clínica;
- (D) a notificação de casos suspeitos é fundamental para o controle de determinadas doenças;
- (E) a notificação da doença deve ser feita após a confirmação laboratorial.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

Segundo o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, ofender a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições se constitui em:

- (A) infração grave;
- (B) infração leve;
- (C) infração gravíssima;
- (D) infração média;
- (E) iatrogenia.

### QUESTÃO 22

No que se refere à biossegurança, as medidas chamadas de “Precaução Padrão” devem ser seguidas para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções. São exemplos de medidas de “Precaução padrão”.

- (A) lavar as mãos com água e sabonete ou friccionar as mãos com álcool a 70% (se as mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qualquer paciente; descartar, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem reencapá-las;
- (B) friccionar as mãos com álcool a 70%; colocar avental imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retirá-lo logo após o uso;
- (C) lavar as mãos com água e sabonete; manter termômetro para uso exclusivo do paciente quando estiver fazendo curva térmica;
- (D) lavar as mãos com água e sabonete; manter termômetro para uso exclusivo do paciente quando estiver fazendo curva térmica e colocar avental imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retirá-los logo após o uso;
- (E) friccionar as mãos com álcool a 70%; descartar, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem reencapá-las; manter termômetro para uso exclusivo do paciente, quando estiver fazendo curva térmica.

### QUESTÃO 23

Para os pacientes com coqueluche, difteria, caxumba, influenza ou rubéola, é correto afirmar que:

- (A) o paciente deve ser internado em quarto privativo, mas se não houver esta disponibilidade, o paciente pode ser internado junto a outros pacientes com doenças infectocontagiosas;
- (B) Não há necessidade de que o estetoscópio seja de exclusivo deste paciente, desde que a cada uso este aparelho sofra desinfecção;
- (C) o uso de máscara, óculos e avental é obrigatório toda vez que o profissional realizar cuidados de enfermagem com estes pacientes;

- (D) o uso de quarto privativo, máscara cirúrgica e luvas de procedimento é obrigatório toda vez que o profissional realizar cuidados de enfermagem com estes pacientes;
- (E) o transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

### QUESTÃO 24

A aplicação de bolsa de água morna é um cuidado de enfermagem eficaz para facilitar a circulação, diminuir a dor e edemas locais. Sobre este procedimento técnico, é correto afirmar que a bolsa deve estar limpa, seca e receber água morna até:

- (A) a metade de sua capacidade total.
- (B) estar com sua capacidade total preenchida.
- (C) um terço de sua capacidade total.
- (D) um quarto de sua capacidade total.
- (E) dois terços de sua capacidade total.

### QUESTÃO 25

Administrar medicamentos é uma das atribuições do técnico de enfermagem. Para exercer este cuidado de forma segura, é preciso saber o volume adequado suportado por cada grupo muscular. Em uma administração no músculo deltóide, o volume máximo a ser administrado é de:

- (A) dois mililitros (2 ml)
- (B) três mililitros (3 ml)
- (C) cinco mililitros (5 ml)
- (D) quatro mililitros (4 ml)
- (E) dois mililitros e meio (2,5 ml)

### QUESTÃO 26

Na coleta de urina para exames de cultura (urocultura), nos casos em que o paciente não tenha controle do ato miccional, o procedimento técnico correto a ser feito é:

- (A) realizar a higiene íntima do paciente com gaze estéril, fixar o saco coletor à região genital, aguardar no máximo 15 minutos e, caso não haja micção, repetir o processo;
- (B) realizar a higiene íntima do paciente com gaze estéril, fixar o saco coletor à região genital, aguardar no máximo 30 minutos e, caso não haja micção, repetir o processo;
- (C) realizar a higiene íntima do paciente com gaze estéril, fixar o saco coletor à região genital, aguardar no máximo 60 minutos e, caso não haja micção, repetir o processo;
- (D) realizar a higiene íntima do paciente com gaze estéril, fixar o saco coletor à região genital, aguardar no máximo 90 minutos e, caso não haja micção, repetir o processo;
- (E) realizar a higiene íntima do paciente com gaze estéril, fixar o saco coletor à região genital, aguardar até que o paciente urine.

**QUESTÃO 27**

A aplicação de insulina deve seguir rigorosa padronização, para se evitar erros que possam prejudicar o tratamento do paciente. Analise as afirmativas a seguir:

- I – Considera-se adequada a reutilização do conjunto seringa/agulha por até 08 aplicações, sempre pela mesma pessoa, desde que seja feita correta higiene das mãos e dos locais de aplicação.
- II – Para misturar a insulina dentro do frasco (homogeneizá-la), pode-se rolar o frasco entre as mãos ou agitar o frasco na vertical.
- III – Ao iniciar a aplicação da insulina, se for encontrada a presença de sangue na seringa, em pequena quantidade, pode-se continuar com a aplicação.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

**QUESTÃO 28**

Analise as afirmativas a seguir, em relação à contenção do paciente:

- I - Nas situações de urgência e emergência, os profissionais da equipe de enfermagem podem empregar a contenção mecânica do paciente.
- II - Salvo as situações de urgência e emergência, a contenção mecânica somente poderá ser empregada pelos profissionais de enfermagem sob supervisão direta de um enfermeiro.
- III - A contenção mecânica do paciente é empregada quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa III está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 29**

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a frequência respiratória normal de uma criança de 12 meses a 5 anos é de até:

- (A) 60mrn (movimentos respiratórios por minuto)
- (B) 50mrn

- (C) 40mrn
- (D) 30mrn
- (E) 20mrn

**QUESTÃO 30**

Considera-se situação de risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido quando:

- (A) a mãe do bebê reside com a família sem a presença do pai da criança;
- (B) a mãe do bebê tem baixa escolaridade (menos de oito anos de estudo);
- (C) o peso do bebê ao nascer é igual ou abaixo de 2.800g;
- (D) o bebê nasceu por meio de parto cirúrgico (cesariana);
- (E) a mãe do bebê tem história de doenças respiratórias.

**QUESTÃO 31**

Em relação à verificação de pressão arterial em crianças, as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- (A) a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço;
- (B) o comprimento da bolsa de borracha do manguito deve envolver 80% a 100% da circunferência do braço;
- (C) recomenda-se que a medida da pressão arterial em crianças seja feita preferencialmente na posição sentada;
- (D) a pressão diastólica deve ser determinada na fase V de Korotkoff;
- (E) explicar para a criança e para seu responsável o procedimento que será executado.

**QUESTÃO 32**

Como medida de prevenção de infecção viral respiratória, em todas as visitas de puericultura, os pais do bebê devem ser orientados para:

- (A) lavagem das mãos por todas as pessoas que têm contato com o bebê com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias;
- (B) o uso de máscaras pelas pessoas que lidam com o bebê em casa, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias;
- (C) a lavagem diária de todas as roupas do bebê com água morna e sabão neutro e secagem ao sol, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias;
- (D) o uso de máscaras somente por pessoas que levam o bebê ao colo, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias;
- (E) restrição de entrada de ar por meio de janelas ou outras aberturas da casa, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias.

**QUESTÃO 33**

Contribui para o maior risco de morte súbita em bebês:

- (A) colocar o bebê para dormir na posição supina (de “barriga para cima”);
- (B) a prática do coleito quando os pais estão muito cansados;
- (C) dormir no colo;
- (D) choro noturno;
- (E) uso de chupetas.

**QUESTÃO 34**

De acordo com o esquema de vacinação do Programa Nacional de Imunização, a Tetravalente (DTP+Hib) protege a criança das seguintes doenças:

- (A) difteria, tétano, coqueluche, pneumonia e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b;
- (B) difteria, tétano, coqueluche, *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b;
- (C) difteria, tétano, coqueluche, parotidite e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b;
- (D) difteria, tétano, coqueluche e infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b;
- (E) difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b.

**QUESTÃO 35**

Na atenção integral à saúde da mulher, as orientações de enfermagem para a detecção precoce do câncer de mama são de muita importância nas unidades de atenção básica. Para tanto, o técnico de enfermagem deve conhecer as alterações da mama conhecidas como sinais de alerta. Avalie se esses sinais incluem:

- I - Nódulo ou espessamento que pareçam diferentes do tecido das mamas.
- II - Abaulamento no contorno das mamas.
- III - Retração no contorno das mamas.
- IV - Sensação de mamas cheias, acompanhada de desconforto.
- V - Secreção espontânea pelo mamilo, principalmente se for unilateral.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I, II e V estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 36**

A organização da linha de cuidado nos cânceres do colo do útero e da mama envolve intervenções nas seguintes situações:

- (A) promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, na internação e na reabilitação;
- (B) promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, na reabilitação e nos cuidados paliativos;
- (C) promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, nos cuidados domiciliares e nos cuidados paliativos;
- (D) promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, na internação e nos cuidados domiciliares;
- (E) promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, na atenção básica e na internação.

**QUESTÃO 37**

Como membro da equipe de saúde da atenção básica, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir sobre as atribuições do técnico de enfermagem no controle dos cânceres do colo do útero e da mama:

- I - Prestar atenção integral e contínua às necessidades de saúde da mulher, articulada com os demais níveis de atenção, com vistas ao cuidado longitudinal.
- II - Examinar e avaliar pacientes com sinais e sintomas relacionados aos cânceres do colo do útero e da mama.
- III - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para a adequada realização do exame citopatológico.
- IV - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais da equipe.
- V - Avaliar periodicamente, e sempre que ocorrer alguma intercorrência, as pacientes acompanhadas em AD1 (Atenção Domiciliar 1) e, se necessário, realizar o encaminhamento para unidades de internação ou Emad (Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar).

As afirmativas I, II, III e IV são respectivamente:

- (A) V, F, F, V, F
- (B) V, F, V, F, F
- (C) V, F, V, V, F
- (D) F, F, V, V, F
- (E) V, V, V, V, F

**QUESTÃO 38**

Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir sobre as orientações educativas básicas para cuidados dos pés das pessoas diabéticas.

- I - Vestir sempre meias limpas, preferencialmente de lã ou algodão, sem elástico.
- II - Após lavar os pés, usar creme hidratante em todo o dorso, planta e entre os arcos.
- III - Cortar as unhas de forma reta, horizontalmente.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- (A) V, V, V
- (B) V, F, F
- (C) F, F, V
- (D) F, V, V
- (E) V, F, V

**QUESTÃO 39**

Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir sobre a atenção integral no uso abusivo de álcool e de outras drogas em pessoas jovens.

- I - o uso de álcool é um dos maiores fatores de adoecimento, contribuindo para situações de risco da população jovem.
- II - deve-se capacitar adolescentes e jovens para atuarem como promotores de saúde junto aos seus pares, favorecendo novas estratégias de abordagem, comunicação e linguagem.
- III - recomenda-se que haja ampliação da rede de CAPS-ad para álcool e outras drogas; de CAPSi, infanto-juvenil, ambulatoriais e CAPS-III, de 24 horas.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- (A) F, V, V
- (B) V, F, V
- (C) V, V, V
- (D) F, V, F
- (E) V, V, F

**QUESTÃO 40**

Uma das funções do técnico de enfermagem no controle da tuberculose na Atenção Básica é identificar pessoas classificadas como “sintomáticos respiratórios”. Tais sintomas são:

- (A) tosse com expectoração há pelo menos três semanas ou que apresentem, além da tosse, febre vespertina, suores noturnos, perda de peso, escarro sanguíneo e/ou dor torácica;
- (B) tosse seca, febre alta pela manhã e escarro sanguíneo;

- (C) tosse com expectoração clara, que se acentua à noite e perda de apetite;
- (D) tosse discreta com constipação nasal, escarro sanguíneo, febre alta e dor torácica;
- (E) tosse com expectoração há pelo menos três semanas ou que apresentem, além da tosse, febre vespertina, perda de peso, escarro sanguíneo e/ou dor torácica e manchas avermelhadas pelo corpo.

**QUESTÃO 41**

Sobre a coleta do escarro para exame bacteriológico para detecção da tuberculose, analise as afirmativas a seguir:

- I - Recomenda-se, para o diagnóstico, a coleta de duas amostras de escarro.
- II - O material deve ser coletado em potes plásticos descartáveis, com boca larga (50 mm de diâmetro), transparente, com tampa de rosca e capacidade entre 35 e 50 ml.
- III - As amostras devem ser coletadas em local aberto, de preferência ao ar livre ou em sala bem arejada.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 42**

Sobre a hanseníase, é correto afirmar que:

- (A) a principal via de eliminação do bacilo da hanseníase pelo doente é a pele e é também por esta via que as pessoas que convivem com o doente podem se contaminar;
- (B) a principal via de eliminação do bacilo da hanseníase pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe);
- (C) o contato com a pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais pode levar em média 2 a 5 meses;
- (D) a excessiva oleosidade da pele é uma das manifestações clínicas da hanseníase;
- (E) é uma doença infecciosa e contagiosa causada pelo bacilo Koch.



**QUESTÃO 43**

Na Estratégia de Saúde da Família, para o atendimento da enfermagem na sala de vacinas, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde recomenda vacinar a criança com 3 meses de idade com a vacina:

- (A) BCG;
- (B) meningocócica C;
- (C) tetravalente;
- (D) poliomielite;
- (E) hepatite B.

**QUESTÃO 44**

Na Atenção Básica, a vacinação do BCG em prematuros com menos de 36 semanas deve ocorrer depois que eles atingem 2 Kg e completarem:

- (A) 10 dias de vida;
- (B) 15 dias de vida;
- (C) 20 dias de vida;
- (D) 25 dias de vida;
- (E) 30 dias de vida.

**QUESTÃO 45**

A principal contribuição da epidemiologia nas doenças transmissíveis é esclarecer o processo de infecção a fim de desenvolver, implementar e avaliar as medidas de:

- (A) investigação;
- (B) identificação;
- (C) controle;
- (D) notificação;
- (E) divulgação.

**QUESTÃO 46**

Uma atenção pré-natal, puerperal humanizada se dá com ações que integram todos os níveis da atenção. Deve-se implementar a promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e ao recém-nascido por meio da incorporação de conduta:

- (A) interventiva;
- (B) acolhedora;
- (C) complementar;
- (D) especializada;
- (E) paliativa.

**QUESTÃO 47**

Na prevenção do câncer de colo de útero, o método de rastreamento de lesões precursoras é o exame citopatológico. Para mulheres que já tiveram atividade sexual, o início da coleta deve ser realizada com a idade de:

- (A) 15 anos;
- (B) 18 anos;
- (C) 20 anos;
- (D) 22 anos;
- (E) 25 anos.

**QUESTÃO 48**

Na avaliação da vigilância epidemiológica, o atributo que verifica a reação dos participantes frente às questões relativas ao sistema e ao percentual de participação dos indivíduos envolvidos denomina-se:

- (A) sensibilidade;
- (B) aceitabilidade;
- (C) oportunidade;
- (D) representatividade;
- (E) flexibilidade.

**QUESTÃO 49**

Na Atenção Básica, para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na atenção à saúde da criança, cabe ao técnico de enfermagem realizar:

- (A) puericultura;
- (B) acuidade auditiva;
- (C) aferição de pressão arterial;
- (D) censo escolar;
- (E) mobilização social.

**QUESTÃO 50**

Na Atenção Básica, no trabalho em saúde, qualquer dispositivo como máscara, luva, óculos usado pelo técnico de enfermagem para se proteger contra riscos ambientais denomina-se:

- (A) CAT;
- (B) EPC;
- (C) EPA;
- (D) EPI;
- (E) SAT.

