



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE**

CONCURSO PÚBLICO

**CARGO 36: MÉDICO**

Aplicação: 10/8/2008

**CADERNO DE PROVAS – PARTE II**  
**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**ESPECIALIDADE:**  
**PSIQUIATRIA**

**ATENÇÃO!**

- » Leia atentamente as instruções constantes na capa da Parte I do seu caderno de provas.
- » Nesta parte do seu caderno de provas, que contém os itens relativos à prova objetiva de Conhecimentos Específicos, confira os seus dados pessoais e a sua opção de especialidade médica transcritos acima bem como o seu nome e a sua especialidade médica no rodapé de cada página numerada desta parte do caderno de provas.

**AGENDA (datas prováveis)**

- I **12/8/2008**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- II **13 e 14/8/2008** – Recurso (provas objetivas): no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **3/9/2008** – Resultado final das provas objetivas, convocação para a entrega dos documentos para a avaliação de títulos e convocação para a perícia médica: Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e Internet.

**OBSERVAÇÕES**

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 12 do Edital SESAn.º 1/2008.
- Informações adicionais: telefone 0(XX)61 3448-0100; Internet — [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- É permitida a reprodução do caderno de provas (partes I e II) apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

## CADERNO DE PROVAS – PARTE II

De acordo com o comando a que cada um dos itens de **86 a 120** se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção da sua prova.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O diagnóstico em psiquiatria está pautado no exame clínico do paciente, em especial na entrevista psiquiátrica, na qual os conhecimentos de psicopatologia são essenciais. Com relação a esses aspectos, julgue os itens a seguir.

- 86** A função psíquica definida como consciência, em termos neuropsicológicos, corresponde ao estado vígil. O rebaixamento do estado de consciência origina os estados de delírio.
- 87** A alucinação é a percepção deformada de um objeto real e presente.
- 88** Na amnésia retrógrada, o indivíduo perde a memória para fatos ocorridos após o início da doença ou trauma.
- 89** Anedonia é a incapacidade de obter e sentir prazer com determinadas atividades ou experiências de vida.
- 90** Na fuga de idéias, existe uma alteração da estrutura do pensamento secundária a uma acentuada aceleração.

Segundo o consenso da Associação Médica Brasileira, a depressão é uma condição médica comum, crônica e recorrente. Está freqüentemente associada à incapacitação funcional e ao comprometimento da saúde física. Os pacientes deprimidos apresentam limitação da sua atividade e do seu bem-estar, além de demandarem maior utilização de serviços de saúde. Acerca do transtorno depressivo, julgue os seguintes itens.

- 91** Em torno de 50% a 60% dos casos de depressão não são detectados pelo médico clínico não-especialista.
- 92** O número de mulheres com depressão é duas a três vezes maior do que o de homens.
- 93** Sintomas como alterações de humor ou na capacidade de vivenciar prazer são fundamentais e devem ser considerados no diagnóstico de transtorno depressivo. Sem esses sintomas, mesmo que o paciente apresente pensamentos negativos, insônia e alteração do apetite, não se pode diagnosticar esse transtorno.

- 94** Os antidepressivos são efetivos no tratamento agudo das depressões moderadas e graves, porém, não diferem de placebo em depressões leves.
- 95** A indicação de psicoterapia cognitiva, de psicoterapia interpessoal e de psicoterapia de solução de problema está respaldada por estudos científicos que mostram sua eficácia no tratamento da depressão moderada a grave.
- 96** Um terço dos pacientes com episódio depressivo com remissão inicial recai no primeiro ano, no entanto, com o tratamento antidepressivo continuado por seis meses, reduz-se em 50% o risco de recaída.

Com referência ao uso de medicamentos no tratamento psiquiátrico de quadros de transtorno depressivo, julgue os próximos itens.

- 97** Com a prescrição de fluoxetina, a dose inicial para resposta efetiva é, no mínimo, de 20 mg ao dia.
- 98** A resposta ao tratamento significa redução em, pelo menos, 50% dos sintomas depressivos, enquanto a remissão é o completo desaparecimento dos sintomas.
- 99** Um dos sintomas comuns durante o uso de inibidores seletivos de recaptção de serotonina, como a fluoxetina e a paroxetina, são as náuseas, resultado da estimulação aguda de receptores centrais de serotonina do tipo 5HT<sub>3</sub>.
- 100** A prescrição de cimetidina 300 mg, a cada 8 horas, para alívio de sintomas estomacais, pode ser efetiva por reduzir os níveis plasmáticos de fluoxetina, devido à indução do sistema oxidativo hepático 2D<sub>6</sub>.
- 101** Mesmo com o tratamento adequado, estudos mostram que apenas um terço dos pacientes remite ao usar o primeiro antidepressivo. No entanto, estudos comprovaram que o uso sequencial de diversas drogas leva à remissão em mais de 95% dos casos.

Um dia, sem qualquer motivo ou razão, eu me senti aterrorizado, com um medo enorme, pensei que iria morrer. Meu coração acelerou e minha cabeça começou a girar. Passei a sentir estas coisas pelo menos uma vez por semana. Comecei a achar que iria enlouquecer.

Tendo o relato acima como referência inicial, julgue os itens que se seguem, relativos ao transtorno do pânico.

102 Um dos critérios de diagnóstico do transtorno de pânico, segundo a CID10, é a imprevisibilidade das crises de ansiedade.

103 Uma das complicações do transtorno de pânico é a evolução para agorafobia, caracterizada por medo de deixar seu domicílio, medo de frequentar lojas, locais de multidões e ambientes públicos ou medo de viajar sozinho em trem, ônibus ou avião.

104 O transtorno de pânico é duas vezes mais comum em homens do que em mulheres.

105 Medicamentos benzodiazepínicos são eficientes e indicados no controle de longo prazo do transtorno de pânico.

As últimas décadas têm sido marcadas pela crescente atenção dada ao abuso de álcool e drogas, envolvendo esferas políticas, de segurança e de saúde. Com respeito aos transtornos relacionados ao uso dessas substâncias, julgue os itens a seguir.

106 Um dos critérios para o diagnóstico de dependência ao álcool é o *craving*, caracterizado por uma necessidade forte e compulsiva pelo uso da bebida.

107 MDMA é uma droga psicoativa sintética conhecida nas ruas como *ecstasy*. Seus efeitos incluem sensação de energia, bem-estar, distorção na percepção do tempo e aumento da sensação de prazer ao toque.

108 Os efeitos do uso de heroína incluem euforia, aumento de energia, aceleração psicomotora, taquicardia, podendo levar a infarto do miocárdio.

109 O tratamento do tabagismo inclui a terapia de reposição nicotínica e medicamentos inibidores de recaptção de serotonina.

110 Apesar de a maconha ser considerada uma droga ilegal, a Classificação Internacional de Doenças não a lista nas síndromes de dependência.

111 Medicamentos estimulantes utilizados para o tratamento do transtorno de *deficit* de atenção e hiperatividade (TDAH) não apresentam potencial de abuso ou dependência.

112 Com o advento de drogas sintéticas, como *ecstasy* e LSD, o uso de solventes tornou-se escasso, a ponto de não ser mais uma preocupação entre os jovens.

Demência é uma doença neuropsiquiátrica que afeta seriamente as habilidades do indivíduo de conduzir suas atividades diárias. A forma mais comum de demência é a doença de Alzheimer. Acerca dos transtornos demenciais, julgue os itens subseqüentes.

113 A constatação de prejuízos graves de memória, mesmo sem a presença de outras alterações cognitivas, como linguagem e praxia, é suficiente para se diagnosticar a demência.

114 Os medicamentos disponíveis para o tratamento da demência de Alzheimer não interrompem o avanço da doença, mas atuam retardando o processo.

115 A memantina é uma droga que atua como antagonista dos efeitos do glutamato nos receptores NMDA e possui indicações em fases graves de demência.

116 Os inibidores da acetilcolinesterase, incluindo a donepezila, a rivastigmina e a galantamina, são indicados para tratamento de pacientes portadores de demência na fase moderada.

117 O uso de *Ginkgo biloba* no tratamento de pacientes portadores de demência não apresentou nenhum resultado, segundo os estudos científicos até hoje conduzidos.

A CPI da pedofilia, em curso no Senado Federal, criou um projeto de lei que vai tipificar, com pena de 15 anos, quem fotografa, vende, produz, ajuda, compra ou facilita a vida de pedófilos. A respeito da pedofilia e de crimes sexuais, julgue os itens que se seguem.

118 Pedofilia é um tipo de parafilia, antigamente denominada perversão sexual, em que existe preferência sexual de um indivíduo adulto por crianças pré-púberes ou no início da puberdade.

119 A pedofilia, que é uma condição psiquiátrica prevista na Classificação Internacional de Doenças, por provocar turvação da consciência, acarreta atenuação da pena imposta ao indivíduo que pratica esse tipo de delito, de acordo com a psiquiatria forense.

120 Crimes sexuais por si sós não implicam diagnóstico psiquiátrico.

