

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os próximos itens, com relação a aspectos gerais da medicina.

- 51 O exame de *holter* permite aferir a pressão arterial contínua dos pacientes por vinte e quatro horas ou mais.
- 52 A manobra de Valsalva representa um tipo de estimulação vagal.
- 53 Na população em geral, é mais prevalente a ocorrência de diabetes melito tipo 1 que de diabetes melito tipo 2.
- 54 Em paciente com ansiedade aguda, é comum o desenvolvimento de quadro de acidose respiratória.
- 55 Em pacientes com cirrose descompensada, a perda de peso e a ocorrência de icterícia e ascite são comuns.

Em relação a situações de urgência clínica, julgue os itens a seguir.

- 56 A insuficiência obstrutiva ou pós-renal é a principal causa de insuficiência renal aguda.
- 57 A ocorrência de espondilite, eritema nodoso e esteatose hepática é comum em pacientes portadores de retocolite ulcerativa.
- 58 O objetivo inicial do tratamento do choque é a recuperação do débito cardíaco.
- 59 A infestação por *Ascaris lumbricoides* pode determinar um quadro de urgência cirúrgica nos pacientes.
- 60 A infecção por *Pseudomonas aeruginosa* causa mais pneumonia comunitária que pneumonia em pacientes hospitalizados.

Acerca dos princípios de epidemiologia, julgue o item subsecutivo.

- 61 Em um estudo epidemiológico transversal, o número de casos de uma doença existente em determinada população indica a medida de incidência dessa doença.

Julgue os itens de 62 a 67, relativos a diversos tipos de condições clínicas.

- 62 A *Malassezia furfur*, quando presente na pele em grande quantidade, pode causar pitíriase versicolor.
- 63 A capacidade de memória e a especificidade dos linfócitos T e B são fundamentais para o estabelecimento da imunidade adquirida.
- 64 Por meio da tonometria, é possível diagnosticar lesões de fundo de olho que fundamentam o diagnóstico de hipertensão arterial e de diabetes melito.

- 65 O hipotireoidismo representa uma causa importante para a ocorrência de exoftalmia.
- 66 A convulsão é o sintoma mais comum em pacientes com hipertensão intracraniana.
- 67 Nos casos de febre reumática, a artrite migratória não deixa comumente sequelas nas articulações.

No que se refere a situações clínicas que ocorrem em ambulatórios de saúde do trabalhador, julgue os itens subsequentes.

- 68 Em caso de paciente que apresente dor intensa, edema e cianose em membro inferior acometido de varizes, deve-se suspeitar de trombose venosa profunda.
- 69 A tromboangeíte obliterante acomete principalmente os vasos arteriais calibrosos, como, por exemplo, a aorta.
- 70 Em pacientes portadores de anemia falciforme, é comum a ocorrência de hemólise.
- 71 O hiperaldosteronismo primário é uma causa comum para a ocorrência de edema com retenção de sódio.
- 72 A hemoptise é um fenômeno raro nos pacientes portadores de bronquiectasia.
- 73 Os pacientes portadores de pneumotórax apresentam expansibilidade torácica e frêmito toracovocal aumentados à palpação.
- 74 Há correlação entre o tabagismo e o desenvolvimento de úlcera péptica.

Julgue os seguintes itens, referentes ao estresse térmico a que estão expostos os trabalhadores rurais.

- 75 A ergonomia de concepção, ao projetar novas tecnologias para minimizar a exposição do trabalhador rural ao risco térmico, promove melhoramentos nos equipamentos de proteção individuais (EPIs), sendo considerada a melhor forma de prevenção a esse risco.
- 76 O estresse térmico é considerado um agente ergonômico.
- 77 A catarata que acomete o trabalhador rural é causada pela exposição deste aos raios ultravioletas (UVE).
- 78 A síncope que acomete o trabalhador rural em função de sua exposição ao calor é considerada uma doença ocupacional.
- 79 A limitação do tempo de trabalho, com a implementação do tempo de repouso, é uma das principais medidas preconizadas para a diminuição do risco do estresse térmico.

Problemas na organização do trabalho podem gerar sofrimento mental. A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 80** O alcoolismo crônico, que acomete profissionais nas mais diversas áreas de atuação, pode ser considerado uma doença ocupacional.
- 81** O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) caracteriza-se por sentimentos de desgaste emocional, esvaziamento afetivo e sentimento de diminuição da competência no trabalho.
- 82** Quanto aonexo causal, a síndrome de Bournout pode ser corretamente identificada no grupo II da classificação de Schilling.
- 83** Alterações emocionais decorrentes de assédio moral têmnexo causal presumido.

A LER/DORT, uma síndrome relacionada ao trabalho, é caracterizada pelo aparecimento de vários sintomas, concomitantes ou não, como dor, parestesia, sensação de peso e fadiga. Com relação a essa síndrome, julgue os próximos itens.

- 84** A suspeita de LER/DORT devidamente embasada na avaliação clínico-ocupacional é suficiente para solicitar à empresa a emissão da comunicação de acidente do trabalho (CAT).
- 85** A alta repetitividade, um dos fatores de risco para os casos de LER/DORT, corresponde a atividades que são cumpridas em, no máximo, noventa segundos.
- 86** A síndrome do dedo branco (*white finger*) está relacionada à exposição ao frio.
- 87** A bursite pré-patelar bilateral, que frequentemente acomete o ladrilheiro, é considerada uma LER/DORT.
- 88** Os quadros de LER/DORT são considerados ergopatias.
- 89** A manobra de Filkenstein positiva é patognomônica para o diagnóstico da síndrome de De Quervain.

Em 2005, foi publicada, no Diário Oficial da União, a portaria n.º 485/2005, do Ministério do Trabalho e Emprego, referente à norma regulamentadora n.º 32, que estabelece ações de segurança e saúde no trabalho realizado em serviços de saúde. Entre as disposições dessa norma estão os agentes biológicos aos quais o profissional de saúde pode estar exposto em suas atividades laborais. A propósito desse assunto, julgue os itens de **90** a **94**.

- 90** Os príons são partículas proteicas infecciosas com potencial para causar doenças ocupacionais ou do trabalho.
- 91** Uma das principais medidas de prevenção contra a hepatite B é a vacinação pré-exposição, indicada para todos os profissionais da área de saúde, mas contraindicada para a gestante e para a lactante.

**92** Em casos de acidentes de trabalho com material perfurocortante durante o atendimento a indivíduo soropositivo para HIV, há indicação de início da quimioprofilaxia com retrovirais, de uma a duas horas após o acidente, durante seis meses.

**93** Considere que um profissional de saúde de estabelecimento particular em área rural, três semanas após sofrer acidente perfurocortante no trabalho, tenha desenvolvido infecção tetânica, vindo a falecer por esse motivo. Nesse caso, existe umnexo concausal superveniente e, após a CAT inicial, deve-se comunicar o óbito com a CAT de comunicação de óbito.

**94** Considere que um agente de saúde, que trabalhe na prevenção contra a dengue em área endêmica, tenha apresentado febre alta e dores articulares, com diagnóstico de febre *chikungunya*. Nesse caso, como se trata de doença ocupacional, deverá ser emitida a CAT.

Julgue os itens subsequentes, acerca de acidentes de trabalho e da avaliação donexo causal entre doença e trabalho.

**95** A abordagem ergonômica na análise de acidentes enfatiza a importância de se levar em consideração a distinção entre trabalho prescrito e trabalho real, podendo o descumprimento dessa diferença gerar equívocos nessas análises.

**96** Conforme o método de árvore de causas, que analisa os motivos dos acidentes do trabalho com base em questionários pré-elaborados, o acidente é fenômeno decorrente de um fator principal, que geralmente é ato inseguro do trabalhador, isto é, falha humana.

Julgue os itens a seguir, relativamente a competências dos profissionais que atuam na área de saúde e segurança do trabalho. Nesse sentido, considere que a sigla SESMT, sempre que utilizada, refere-se a Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho.

**97** Caso, na localidade, não exista médico com especialização em medicina do trabalho, o empregador poderá indicar outro profissional do SESMT para coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

**98** Tanto para a composição do SESMT quanto para a da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) devem ser considerados a quantidade de trabalhadores e o grau de risco da empresa.

**99** Considere que, em uma empresa, haja risco de agressão à saúde do trabalhador. Nesse caso, dos médicos que prestam assistência ao trabalhador, somente o especializado em medicina do trabalho poderá atuar junto à empresa para eliminar ou atenuar a nocividade dos processos de produção e organização do trabalho.

**100** O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) pode ser elaborado por qualquer profissional do SESMT, ao passo que o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deve ser elaborado por médico do trabalho.

A Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), publicada pela Organização Mundial da Saúde, vem despertando grande interesse em profissionais da área de saúde do trabalhador. A respeito desse assunto, julgue os itens subsecutivos.

- 101** A Classificação Internacional de Doenças–10 (CID–10) é um modelo dinâmico e, juntamente com as divisões da CIF — funcionalidade e fatores contextuais —, pode descrever qualquer estado de saúde ou de funcionalidade.
- 102** A CIF apresenta uma concepção biomédica essencialmente centrada no indivíduo portador de deficiência.
- 103** No contexto da CIF, observa-se uma lacuna entre capacidade e desempenho, a qual reflete a diferença entre os impactos do ambiente uniforme e os do ambiente habitual, fornecendo orientação útil acerca do que pode ser modificado no ambiente do indivíduo para melhorar seu desempenho.

Acerca da epidemiologia dos acidentes de trabalho, julgue os itens que se seguem.

- 104** A comunicação de acidentes do trabalho (CAT), apesar de ser um instrumento com finalidade securitária, oferece dados importantes para notificação de agravos à saúde dos trabalhadores, decorrentes de sinistros classificados com base na classificação de Schilling: acidente típico, acidente de trajeto, doença ocupacional e doença profissional.
- 105** Para determinada empresa, no cálculo dos indicadores epidemiológicos a taxa de gravidade e taxa de mortalidade e o coeficiente de letalidade, o denominador comum é o número de trabalhadores da empresa, em um período delimitado.
- 106** Teoricamente, os sistemas de informações sobre acidentes do trabalho no Brasil deveriam gerar dados suficientes para estudos epidemiológicos, mas, na prática, esses sistemas mostram-se parciais, não se relacionam entre si e não cobrem a totalidade de trabalhadores.

A nanotecnologia, que trará impacto em todas as esferas de produção, também poderá repercutir na saúde do trabalhador. Em relação a essa nova tecnologia, julgue os itens de **107** a **110**.

- 107** É um fator preocupante o fato de serem as partículas geradas pela nanotecnologia inéditas na história da humanidade, sendo totalmente desconhecido seu potencial na saúde do trabalhador.
- 108** Um fato a ser considerado, no que diz respeito à saúde do trabalhador, é que as propriedades das partículas nanométricas são regidas pelas leis da física quântica, e não pela física clássica, e sua produção está sujeita à geração de outras partículas residuais que podem ser tóxicas.

- 109** Enquanto os materiais químicos clássicos levam à produção de radicais livres, que geram estresse oxidativo, os nanocompostos e as nanopartículas atuam de maneira distinta: alcançam estruturas intracelulares, como as mitocôndrias, e até mesmo o núcleo, causando a morte celular.
- 110** O sistema respiratório é, na esfera ocupacional, a principal via de absorção de substâncias químicas tóxicas. A toxicidade dessas substâncias dependerá do tamanho e do formato das partículas, bem como de sua interação com o processo de fagocitose pulmonar.

O Congresso Nacional, após longa discussão, elaborou projeto de lei que regulamenta a jornada de trabalho dos caminhoneiros. Estudos com motoristas de caminhão mostram que cerca de um terço deles já cochilou no volante, número que aumenta para 80% quando se refere a motoristas que trabalham em horários não usuais. Para esses trabalhadores, pode-se dizer que a sonolência e os baixos níveis de alerta estão entre as principais causas de acidentes.

Tendo como referência inicial o texto acima, julgue os itens a seguir.

- 111** A duração da jornada de trabalho é uma variável ergonômica da organização do trabalho. No caso dos motoristas de caminhão que fazem longas viagens, a sonolência excessiva diurna é uma forte evidência do reflexo na saúde de prolongada jornada de trabalho.
- 112** A obesidade, fator de risco tanto para a síndrome da apneia obstrutiva do sono quanto para doenças cardiovasculares, é predominante entre os motoristas de caminhão com regime de trabalho por turno, devido à privação do sono.
- 113** Em face da possibilidade de extensão da nocividade do trabalho para além do posto de trabalho, caso um motorista de caminhão que transporte carga perigosa cochile ao volante e provoque acidente com grandes repercussões, as vítimas terão direito ao benefício acidentário do INSS, decorrente de um acidente de trabalho.
- 114** Medidas como terapia de luz intensa, administração de melatonina e reorganização das escalas de trabalho são importantes para minimizar os efeitos nocivos do trabalho noturno; entretanto, a implantação formal de horários de cochilos noturnos está contraindicada, dada a comprovação de que essa medida aumenta o risco de acidentes após o despertar do cochilo.
- 115** Caso um motorista de caminhão, em serviço durante o transporte de uma carga, sofra acidente devido a um cochilo, o acidente será considerado acidente de trajeto, de acordo com a legislação pertinente.

De acordo com o Caderno de Atenção Básica n.º 5 – Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde (2002), trabalhador é toda pessoa que exerce atividade de trabalho, independentemente de estar inserido no mercado formal de trabalho, inclusive na forma de trabalho familiar e(ou) doméstico. A partir dessas informações, julgue os itens de **116** a **118**, acerca da Previdência Social: funcionamento, legislação e conduta médico-pericial.

- 116** Com a recente emenda constitucional que igualou o direito das empregadas domésticas aos direitos dos demais trabalhadores, o benefício previdenciário denominado auxílio-acidente foi estendido a todos os trabalhadores.
- 117** Na avaliação médico-pericial, devem ser considerados o objetivo da perícia e as características médicas e legais do trabalhador. Assim, é possível que o benefício previdenciário auxílio-doença seja concedido a um trabalhador portador de determinada patologia, e não a outro com a mesma patologia, ocupante do mesmo cargo, sem que o médico-perito incorra em discriminação profissional.

- 118** Considere que, devido a complicações, determinado trabalhador necessite prorrogar sua licença para tratamento de saúde de três para seis dias. Nesse caso, o médico-perito poderá conceder a prorrogação mesmo sem novo atestado emitido pelo médico assistente.

---

Julgue os itens seguintes, acerca de carga de trabalho, organização do trabalho e trabalho sob pressão temporal.

- 119** Os limites de tolerância contribuíram para evitar doenças provocadas por fatores com riscos estabelecidos por avaliação quantitativa. A tendência atual é também estabelecer limites de exposição para riscos com avaliação qualitativa.
- 120** Se o trabalhador, em ciclo de trabalho diário normal, apresentar quadro de fadiga, os processos de trabalho, do ponto de vista ergonômico, deverão ser revistos.
-

## PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também desconsiderado o texto que não for escrito no local especificamente determinado.
- Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **20,00 pontos**, dos quais até **1,00 ponto** será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Dos 3.209 brasileiros presos no exterior em 2013, 963 (30% do total) eram suspeitos de traficar drogas. Em números absolutos, 1.108 brasileiros presos se concentram na Europa. Desses, 496 estão atrás das grades por tráfico. Além dos dois brasileiros na Indonésia — Marco Archer, que já foi executado, e Rodrigo Gularte, que aguarda execução no corredor da morte —, não há outros condenados à pena de morte no exterior. Ao todo, há brasileiros presos em trinta e nove países. O levantamento também revela que o tipo de crime cometido por brasileiros muda conforme o continente. Em todos eles, há a incidência do tráfico de drogas e do homicídio.

O Globo. 20/1/2015. p.5 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

### AS DROGAS ILÍCITAS E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- ▶ as drogas na sociedade contemporânea; [valor: 6,50 pontos]
- ▶ o negócio lucrativo das drogas; [valor: 6,50 pontos]
- ▶ o narcotráfico e o crime organizado global. [valor: 6,00 pontos]

**RASCUNHO**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	





**cespe**

 **Cebraspe**

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação  
e Seleção e de Promoção de Eventos