

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Na quebra da homeostase da composição microbiana da cavidade oral, os *Streptococcus mutans* são capazes de desenvolver uma resposta adaptativa às condições ácidas. Essa resposta inclui


- A interrupção do metabolismo predominantemente homofermentativo.
- B elevação da atividade do sistema fosfoenolpiruvato-fosfotransferase (PTS).
- C diminuição da impermeabilidade protônica em baixo pH.
- D aumento da atividade glicolítica e do sistema de exclusão de prótons/ATPase (H^+ /ATPase).

QUESTÃO 32

Os microrganismos da cárie não se prendem diretamente à superfície mineralizada do dente, pois os dentes são sempre revestidos por uma película adquirida que tem a função de

- A selecionar o transporte de íons dos tecidos dentais.
- B lubrificar e proteger a superfície do dente.
- C adsorver microrganismos seletivamente.
- D gerar o atrito necessário à mastigação.

QUESTÃO 33



Internet: <www.orthoblanc.com.br>.

A figura precedente mostra uma fratura de esmalte/dentina sem exposição pulpar e sem invasão de espaços biológicos. Devido à ausência do fragmento dental, o profissional responsável pelo atendimento do paciente optou pela realização, no dente fraturado, de uma restauração direta de resina composta.

Nessa situação, durante o preparo cavitário, para garantir à restauração melhor mimetização e disfarçar a interface dente/restauração, deve-se fazer

- A a regularização horizontal incisal.
- B o bisel do ângulo incisal.
- C um contra-bisel incisal.
- D uma canaleta interna na face palatina.

QUESTÃO 34

A terapia fotodinâmica pode ser utilizada, como uma medida alternativa, contra os fatores etiológicos da cárie dentária. Os elementos envolvidos nessa técnica terapêutica incluem

- A fotoiluminador, emissão de *laser* e gás carbônico.
- B fotossensor, propagação de ondas e oxigênio.
- C fotopolimerizador, dispersão de fótons e dióxido de carbono.
- D fotossensibilizador, ativação da luz e oxigênio molecular.

QUESTÃO 35

Na terapia fotodinâmica para tratamento contra a cárie dentária, a combinação de fatores como fotossensibilizador (PS), ativação da luz e oxigênio molecular promove a

- A destruição das células alvo.
- B produção de anticorpos.
- C ativação de células imunológicas.
- D manutenção da homeostasia.

QUESTÃO 36

Os fluoretos têm papel no controle compensatório dos ciclos de desremineralização porque

- A reduzem a velocidade da perda mineral líquida.
- B estimulam os fenômenos de redeposição mineral.
- C reduzem a solubilidade aos ácidos da placa dental.
- D diminuem a resistência do esmalte ao desafio cariogênico.

QUESTÃO 37

De modo geral, em doses inibitórias, os fluoretos, no biofilme, podem

- A diminuir o número de bactérias ácido-sensíveis.
- B elevar o acúmulo de ácidos.
- C aumentar a produção ácida.
- D reduzir a glicólise.

QUESTÃO 38

Durante o exame da cavidade oral, a retirada de um tecido, ou de parte dele, para exame de diagnóstico deve ser realizada somente se não for possível obter o diagnóstico definitivo da lesão utilizando-se outras modalidades de avaliação. Considerando essa informação, ao se deparar com uma ulceração bucal, medindo 0,8 mm, em paciente com histórico de câncer bucal submetido a cirurgias extensas e à radioterapia, o cirurgião-dentista, ao fazer o controle, realiza a retirada dessa ulceração por

- A citologia esfoliativa.
- B raspagem incisal.
- C biópsia esfoliativa.
- D punção aspirativa.

QUESTÃO 39

A lâmina aponeurótica, uma das estruturas a serem inspecionadas durante o exame da cavidade oral, situa-se no(a)

- A mucosa.
- B vestibulo.
- C palato mole.
- D palato duro.

QUESTÃO 40

Um sorriso simétrico revela a função normal do nervo facial, ao passo que um sorriso assimétrico (sorriso caído) pode indicar a paralisia do nervo facial. Essa situação pode ser observada durante a avaliação do paciente por meio do(a)

- A teste funcional.
- B anamnese.
- C palpação.
- D inspeção.

QUESTÃO 41

Um paciente com cinquenta e sete anos de idade procurou uma clínica odontológica para a restauração do dente 36. Após exame clínico, considerando o grau de destruição do dente, o cirurgião-dentista indicou uma prótese de porcelana com alta resistência à mastigação.

Nesse caso clínico, o material mais adequado para a confecção da prótese é a cerâmica

- A infiltrada por vidro.
- B com alto teor de zircônia.
- C com alto teor de alumina.
- D feldspática.

QUESTÃO 42

Para a polimerização do primeiro incremento de uma restauração tipo classe I que cobre a parede lingual e parcialmente a parede pulpar de um pré-molar inferior, o melhor posicionamento e o tempo satisfatório são, respectivamente

- A vestibular, 30 segundos.
- B vestibular, 60 segundos.
- C lingual, 30 segundos.
- D lingual, 60 segundos.

QUESTÃO 43

O ângulo entre o plano de aplicação da fonte luminosa e a superfície a ser polimerizada para se obter a máxima eficácia de polimerização mede

- A 30°.
- B 45°.
- C 60°.
- D 90°.

QUESTÃO 44

Considere que uma mulher de trinta anos de idade, grávida, procure o serviço odontológico para tratamento de uma gengivite. Nessa situação, a condição sistêmica da paciente somada à sua condição periodontal está mais associada à espécie bacteriana

- A *Porphyromonas gingivalis*.
- B *Treponema denticola*.
- C *Fusobacterium nucleatum*.
- D *Prevotella intermedia*.

QUESTÃO 45

Um adolescente de dezesseis anos de idade que será submetido a tratamento ortodôntico foi encaminhado a um clínico geral para a prevenção de doença periodontal. O exame laboratorial de saliva desse adolescente revelou altos níveis de *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*.

Nessa situação, o parecer do clínico-geral deverá alertar o paciente e o ortodontista quanto ao risco de desenvolvimento de

- A gengivite supurativa.
- B periodontite agressiva.
- C periodontite de progressão lenta.
- D gengivite úlcero-necrosante.

QUESTÃO 46

Em se tratando de paciente submetido a cirurgia periodontal, a técnica mais adequada para a limpeza nos sítios de cicatrização é a de

- A Fones.
- B Stillman.
- C Chaters.
- D Leonard.

QUESTÃO 47

A quantidade de osso remanescente e sua angulação na área edêntula são parâmetros fundamentais para o correto planejamento da reabilitação por implantes dentários. A dimensão óssea no comprimento MD para colocação de implante é de

- A 3,5 mm.
- B 5,0 mm.
- C 7,0 mm.
- D 9,0 mm.

QUESTÃO 48

Considerando que interpretação radiográfica é uma ferramenta importante para a definição das estruturas mineralizadas normais ou anômalas, assinale a opção que apresenta a sequência correta das estruturas mais radiotransparentes para as mais radiopacas.

- A fluido, gordura, medula óssea, tecido mole
- B fluido, gordura, tecido mole, medula óssea
- C gordura, fluido, medula óssea, tecido mole
- D gordura, fluido, tecido mole, medula óssea

QUESTÃO 49

Um homem, com sessenta e quatro anos de idade, em avaliação de rotina da condição periodontal, foi submetido a exame radiográfico periapical completo. O laudo radiográfico indicou a existência de aumento de radiolucidez da raiz do dente próximo à crista alveolar, caracterizando uma sombra semicircular com ápice da radiolucência posicionado em direção à região apical do dente.

Nessa situação, a característica radiográfica citada relaciona-se à existência de

- A cratera interproximal.
- B perda de tábuas ósseas lingual ou vestibular.
- C defeito infra-ósseo de duas paredes.
- D defeito infra-ósseo de três paredes.

QUESTÃO 50

Uma mulher com vinte e sete anos de idade é portadora de lesão na região do canino e do incisivo lateral superior esquerdo. Ao exame radiográfico, foi identificada uma lesão radiolúcida com borda corticalizada, além de calcificações no interior da massa tumoral, o que promovia o deslocamento das raízes do canino e do incisivo lateral.

Nesse caso clínico, o diagnóstico mais provável é de

- A mixoma odontogênico.
- B tumor odontogênico adenomatoide.
- C granuloma central de células gigantes.
- D neurilemoma.

QUESTÃO 51

Em relação aos princípios de anti-inflamatórios esteroides e de anti-inflamatórios não esteroides (AINE) em odontologia, assinale a opção correta.

- A Os AINE potentes inibem o crescimento bacteriano, por isso eles são importantes como agentes antimicrobianos.
- B Na ausência de sinais clínicos inflamatórios, deve-se prescrever o uso dos AINE em situações de predomínio da dor, por suplantarem os efeitos de analgésicos.
- C Diferentemente dos AINE, que são apenas sintomáticos, os anti-inflamatórios esteroides alteram a evolução da doença.
- D Quanto à eficácia, os anti-inflamatórios esteroides suplantam os AINE e são recomendados em casos não responsivos com AINE.

QUESTÃO 52

Assinale a opção correta, acerca de fármacos e sua relação com prescrições e procedimentos odontológicos.

- A Os fármacos bloqueadores adrenérgicos reproduzem os efeitos da estimulação simpática, causando vasoconstrição local.
- B Os fármacos parassimpaticolíticos inibem a ação dos fármacos adrenérgicos, são agonistas da acetilcolina e podem interagir com os anti-histamínicos, o que promove melhora da xerostomia.
- C Os fármacos simpaticomiméticos são antagonistas da acetilcolina, sendo muito empregados como antisialogógos.
- D Os fármacos parassimpaticomiméticos ou colinérgicos geram efeitos similares aos efeitos da acetilcolina, podendo a produção de saliva ser induzida por medicamentos como a pilocarpina.

QUESTÃO 53

No que se refere aos procedimentos do cirurgião-dentista no manejo de pacientes com risco de endocardite infecciosa, assinale a opção correta.

- A Recomenda-se que o esquema profilático seja o de maior duração possível, devendo a dose terapêutica ser duas vezes maior que a profilática.
- B O risco real de ocorrer bacteremia durante procedimentos dentários é muito alto, mesmo se realizada a profilaxia.
- C É de extrema importância a indicação da quimioprofilaxia a pacientes imunodeprimidos que realizarão exodontias.
- D A profilaxia deve ser indicada a pacientes com prótese articular apenas em casos de realização de exodontias e de curetagem supragengival.

QUESTÃO 54

Assinale a opção que apresenta o esquema antimicrobiano profilático mais indicado como primeira escolha para adultos.

- A amoxicilina 100 mg/kg via oral, 30 minutos antes do procedimento
- B clindamicina 100 mg/kg endovenosa, 30 minutos antes do procedimento
- C amoxicilina 2 g via oral, 1 hora antes do procedimento
- D ampicilina 2 g endovenosa, 2 horas antes do procedimento

QUESTÃO 55

Com relação a complicações clínicas decorrentes de erros em procedimentos de anestesia local, assinale a opção correta.

- A A parestesia pode ser ocasionada por hematoma local decorrente de procedimento anestésico.
- B Há risco de paralisia facial em caso de lesão no nervo facial, que é um nervo misto com porção facial sensitiva para os músculos da mímica.
- C O nervo trigêmeo possui inervação motora para os músculos da mastigação, por isso lesioná-lo implica paralisia do músculo bucinador.
- D A ptose decorre de lesão no nervo lingual, que possui inervação sensitiva para o 1/3 posterior da língua.

QUESTÃO 56

O fórceps a ser utilizado em exodontia de dentes anteriores superiores com coroa é o

- A 53.
- B 150.
- C 151.
- D 18.

QUESTÃO 57

Com relação aos retalhos de tecido mole para exodontias, assinale a opção correta.

- A A incisão relaxante, quando necessária, deve se estender ao menos na distância de um dente anterior e de um posterior do sítio cirúrgico.
- B O retalho não deve ser de espessura total nem o periósteo deve ser lesionado.
- C A margem livre deve ser mais ampla que a base, para garantir aporte sanguíneo.
- D O tecido mole cicatriza-se ao longo do comprimento da incisão.

QUESTÃO 58

Um terceiro molar impactado que se apresente com o diâmetro méso distal da coroa coberto pelo ramo mandibular e com sua superfície oclusal entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar pode ser classificado como

- A classe 1A.
- B classe 2A.
- C classe 3B.
- D classe 2B.

QUESTÃO 59

A respeito da classificação das reações adversas a drogas em anesthesiologia, é correto afirmar que

- A idiosincrasia é considerada uma resposta que não possa ser associada nem a superdosagem nem a alergia.
- B alergia depende da quantidade de drogas utilizada.
- C angioedema é característico das reações de superdosagem.
- D superdosagem está relacionada à exposição a determinado alérgeno.

QUESTÃO 60

A respeito de procedimentos relativos à plastia de irregularidades da crista alveolar, assinale a opção correta.

- A Nas alveoloplastias intraseptais, pode ser utilizada a técnica de Dean com remoção do septo.
- B O retalho mucoperiostal, para regularização do rebordo alveolar, impede a realização de incisões relaxantes.
- C Em geral, são necessárias incisões profundas para a regularização do contorno ósseo vestibular das alveoloplastias.
- D Incisões relaxantes para regularização alveolar devem ser evitadas.

QUESTÃO 61

Um homem de vinte e três anos de idade fraturou o dente 21 em um jogo de polo aquático. O fragmento dentário não foi recuperado. O dente, tratado endodonticamente havia dois anos, em decorrência de outro episódio de trauma dentário, apresentava falha de condensação lateral e lesão apical. A fratura aconteceu a 1 mm da crista óssea com perda total da coroa dentária. A linha de sorriso é alta e a gengiva delgada, com 2 mm de gengiva inserida e profundidade de sondagem de 1 mm nos dentes vizinhos.

Assinale a opção que apresenta a sequência do plano de tratamento mais adequada para esse caso clínico.

- A cirurgia para a recuperação do espaço biológico, com gengivectomia de bisel interno e ostectomia, retratamento endodôntico, colocação de prótese fixa unitária provisória, confecção da coroa unitária definitiva
- B colocação de uma prótese fixa unitária provisória, extrusão ortodôntica lenta, cirurgia periodontal para o aumento de coroa clínica e a recuperação do espaço biológico, retratamento endodôntico e confecção da coroa unitária definitiva
- C retratamento endodôntico, colocação de uma prótese fixa unitária provisória, cirurgia para a recuperação do espaço biológico, com reposicionamento apical do retalho e ostectomia, confecção da coroa unitária definitiva
- D extrusão ortodôntica rápida com fibrotomia, retratamento endodôntico, confecção de prótese fixa unitária provisória, confecção da coroa unitária definitiva

QUESTÃO 62

Em se tratando de um dente anterior, se houver necessidade de colocação do limite cervical da prótese fixa unitária subgengival por razões estéticas, com gengiva delgada e profundidade de sondagem de 2 mm pela face vestibular, o preparo subgengival deverá ser colocado a

- A 0,5 mm.
- B 1 mm.
- C 1,5 mm.
- D 2 mm.

QUESTÃO 63

O Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde da ANVISA classifica os resíduos de serviços de saúde em cinco grupos, de A a E. Invólucros utilizados para a esterilização dos instrumentais, gaze usada em procedimento cirúrgico, lâmina de bisturi e fixador radiográfico são classificados nos seguintes grupos, respectivamente,

- A E, B, A, D.
- B C, A, E, B.
- C A, B, C, D.
- D D, A, E, B.

QUESTÃO 64

As vacinas mais importantes para os profissionais da odontologia são

- A hepatite B, febre amarela, *influenza* e dupla tipo adulto.
- B *influenza*, tríplice viral, BCG e dupla tipo adulto.
- C *influenza*, BCG, febre amarela e hepatite B.
- D hepatite B, *influenza*, tríplice viral e dupla tipo adulto.

QUESTÃO 65

O risco de transmissão ocupacional do HIV e do desenvolvimento de hepatite B (paciente fonte HBsAg e HBeAg positivos) para o trabalhador de saúde após exposição percutânea é estimado, respectivamente, em

- A 0,3% e 1% a 6%.
- B 0,09% e 22% a 31%.
- C 0,3% e 22% a 31%.
- D 0,09% e 1% a 6%.

QUESTÃO 66

Adolescente de quinze anos de idade compareceu à clínica odontológica após levar uma cotovelada na boca em um jogo de basquete queixando-se de que o dente da frente estava mole. No exame clínico, constatou-se que o dente apresentava sensibilidade ao toque, mobilidade aumentada, sem deslocamento e resposta negativa ao teste de vitalidade pulpar. Observou-se um pequeno sangramento no sulco gengival. No exame radiográfico não foi encontrada nenhuma alteração.

Nesse caso clínico, os sinais e sintomas descritos caracterizam

- A concussão.
- B subluxação.
- C luxação intrusiva.
- D fratura alveolar.

Caso clínico 5A4AAA

Uma criança de oito anos de idade foi levada pela mãe à clínica odontológica. A mãe, que levou o dente 11 inteiro da criança dentro de um copo com leite, relatou que o dente havia caído quando a criança estava na escola e que o dente foi, então, lavado em água corrente para retirar a sujeira, tendo sido esfregado com os dedos e colocado no copo com leite. A mãe relatou que o acidente ocorreu havia aproximadamente duas horas. Adotou-se, então, o seguinte procedimento clínico: tratamento da superfície radicular com fluoreto de sódio a 2%, reimplantação do dente em infraoclusão, estabilização com esplintagem flexível (por quatro semanas), administração de tetraciclina e indicação de tratamento endodôntico após trinta dias.

QUESTÃO 67

No caso clínico 5A4AAA, o prognóstico do dente reimplantado é

- A** desfavorável, com grande risco de reabsorção óssea e perda do dente, pois o tratamento endodôntico foi feito tardiamente e os produtos da necrose pulpar poderem causar inflamação periapical e(ou) óssea.
- B** favorável, com reinserção do ligamento periodontal, pois o dente foi armazenado em meio considerado fisiológico, o que manteve a viabilidade das células do ligamento.
- C** duvidoso, com pequeno risco de anquilose, diminuído com a reimplantação em infraoclusão e o tratamento com fluoreto de sódio.
- D** desfavorável, com grande risco de anquilose ou reabsorção radicular, pois o processo de limpeza e o tempo entre o acidente e a reimplantação indicam que as células do ligamento não estão mais viáveis.

QUESTÃO 68

Assinale a opção correta acerca da indicação de antibiótico no caso clínico 5A4AAA.

- A** A tetraciclina é o antibiótico de primeira escolha, mas deve-se considerar o risco de descoloração dos dentes permanentes, por tratar-se de paciente jovem.
- B** Fenoximetilpenicilina (penicilina V) ou amoxicilina são os antibióticos de primeira escolha.
- C** Não se recomenda o uso de antibiótico sistêmico, sendo a melhor opção o uso de um antibiótico tópico sobre a superfície radicular.
- D** A administração sistêmica de antibióticos após o reimplante é considerado de grande valor e importante para o sucesso do procedimento.

Caso clínico 5A4BBB

Uma mãe procurou serviço odontológico para o filho de nove anos de idade que estava com o elemento 84 muito destruído por cárie, com indicação de extração. Radiograficamente, observou-se ter havido perda óssea na região periapical e que o elemento dentário 44 estava com um terço da raiz formada, compatível com estágio 7 de Nolla.

QUESTÃO 69

Considerando o caso clínico 5A4BBB, assinale a opção correta acerca da cronologia e dos fatores que influenciam a erupção dental.

- A** As lesões periapicais, pulpites e pulpotomias de molares decíduos aceleram a erupção dos dentes permanentes sucessores.
- B** A erupção do dente permanente será, em geral, retardada se o osso que o recobre apresentar-se destruído por infecção na época da perda do dente decíduo correspondente.
- C** A extração dental precoce de um dente decíduo, no caso de o movimento de erupção do sucessor permanente já se ter iniciado, retarda a erupção.
- D** A extração precoce de um dente decíduo, no caso de o movimento de erupção do permanente não ter-se iniciado, acelera a erupção.

QUESTÃO 70

Com relação ao caso clínico 5A4BBB, julgue os itens seguintes.

- I** Pode ser indicada a colocação de um mantenedor de espaço tipo banda-alça, visando-se à preservação da integridade da evolução normal da oclusão, mesmo considerando-se o estágio 7 de Nolla.
- II** A banda-alça constitui um aparelho fixo indicado para a manutenção de espaço de um ou mais dentes decíduos até a erupção do dente permanente, podendo ser usado uni ou bilateralmente.
- III** Uma alternativa para a confecção da banda-alça, que deve ser confeccionada em modelo e soldada, seria a colocação de uma alça feita de fio de aço inoxidável 0,3 mm fixado ao 46 com resina composta.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item II está certo.
- C** Apenas o item III está certo.
- D** Apenas os itens I e II estão certos.

QUESTÃO 71

Um paciente do sexo masculino, com oito anos de idade, apresentava o seguinte quadro clínico no atendimento odontológico: gengivite marginal, principalmente nos dentes em processo de erupção; dentes 16 e 26, na arcada superior, com erupção parcial e lesão de mancha branca opaca nas vertentes das cúspides próximas às cicatrículas; dentes 55, 54, 53 e 63 sem sinais clínicos de lesão de cárie dentária; dentes 12, 11, 21 e 22 com erupção parcial; dentes 36 e 46, na arcada inferior, com lesão de cárie oclusal cavitada; dentes 75 e 74 com lesão interproximal ativa ultrapassando o limite amelodentinário; dentes 73, 83, 84 e 85 sem sinais clínicos de lesão de cárie dentária; dentes 31, 32, 41, 42 hígidos e em processo final de erupção.

Com base nesse caso clínico, assinale a opção correta.

- A** Os dentes 16 e 26 devem ser submetidos a uma ulectomia, para facilitar sua higienização.
- B** Os dentes 16, 26, 36 e 46 devem ser restaurados com resina composta.
- C** Os dentes 74 e 75 não precisam de terapia restauradora, pois estão em período próximo ao da sua esfoliação.
- D** O paciente apresenta atividade de doença cárie.

QUESTÃO 72

A respeito da odontologia estética, assinale a opção correta.

- A** A arquitetura do sorriso pode ser modificada por meio de desgaste remodelador, que permite desgastar a espessura total do esmalte sem prejuízo da estética.
- B** O uso de artificios que criam uma ilusão de ótica favorece a harmonia do sorriso.
- C** O aumento da bossa cervical propicia o aumento virtual do comprimento do dente.
- D** Uma superfície vestibular mais plana dá a sensação de um dente mais estreito visualmente, mesmo que o espaço disponível seja maior que a largura do dente homólogo.

QUESTÃO 73

Em termos populacionais, as estratégias de controle da cárie variam de acordo com o CPOD local e a tendência à cárie dentária. Em se tratando de um grupo populacional com baixa incidência de lesão de cárie, é correto afirmar que

- A** o uso de selantes de fôssulas e fissuras para a dentição permanente é necessário.
- B** o fornecimento de flúor em veículos especiais (géis e vernizes) é justificável, haja vista seu baixo custo.
- C** mudanças de hábitos dietéticos não surtem efeito protetivo.
- D** programas de controle de higiene bucal que visem à formação de hábitos adequados de higiene bucal são importantes.

QUESTÃO 74

A respeito da polpa dental, seus componentes e suas funções, assinale a opção correta.

- A** As células inflamatórias e imunocompetentes estão presentes na polpa e são denominadas odontoblastos, fibroblastos e células endoteliais.
- B** Células-tronco oriundas da polpa de dentes permanentes e decíduos, da papila apical e do folículo dentário não contribuem para a cura nem para a regeneração da polpa.
- C** A matriz extracelular é composta por colágeno dos tipos II e IV e por outras proteínas não colagênicas que incluem uma série de proteoglicanos.
- D** Derivada da crista neural, a polpa madura resulta da proliferação e da condensação de células apicais implicadas no alongamento da raiz. As células adultas estão ligadas entre si por junções intercelulares, formando-se uma rede.

QUESTÃO 75

Com relação ao tratamento de lesões cariosas pela técnica de ART, assinale a opção correta.

- A** O uso de instrumentos rotatórios de baixa rotação é necessário no preparo da cavidade dentária.
- B** É imprescindível que a aplicação da técnica de ART seja feita em consultório convencional.
- C** A utilização de cimentos ionoméricos mais resistentes ao desgaste favorece o uso da ART para restauração permanente de molares decíduos.
- D** É necessário remover toda a dentina cariada para que a técnica de ART funcione adequadamente.

Caso clínico 5A7AAA

Uma criança, de três anos de idade, deu entrada no pronto atendimento com quadro clínico de febre alta, irritabilidade, dor na boca e dor de cabeça, sintomas iniciados havia mais de quarenta e oito horas. No exame físico, observou-se que a mucosa oral da criança estava vermelha e edematosa, com numerosas úlceras cobertas com pseudomembranas amarelo-acinzentadas e circundadas por um halo eritematoso.

QUESTÃO 76

Considerando o caso clínico 5A7AAA, o provável diagnóstico é de

- A** úlceras aftosas.
- B** gengivoestomatite herpética primária.
- C** doença de mãos, pés e boca.
- D** eritema multiforme.

QUESTÃO 77


Ainda com relação ao caso clínico 5A7AAA, caberá ao dentista responsável pelo atendimento da criança

- A** iniciar o tratamento com a indicação de bochechos diários com dexametasona.
- B** prescrever a administração de amoxicilina, durante sete dias, e bochechos diários com dexametasona.
- C** tratar os sintomas clínicos e prescrever aciclovir via oral, para o caso de agravamento do quadro da criança.
- D** aguardar a evolução do quadro, pois, nesse caso, não é necessário iniciar um tratamento.

QUESTÃO 78

A linha do sorriso alta, ou o sorriso gengivoso, compromete a estética facial. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- Ⓐ O tratamento ortodôntico para a intrusão dos incisivos anteriores superiores é a terapia mais indicada para o sorriso gengivoso.
- Ⓑ Técnicas de treinamento muscular utilizadas para reduzir a força de contração da musculatura infraorbitária são adequadas para o tratamento do sorriso gengivoso.
- Ⓒ O sorriso gengivoso tende a diminuir com o avanço da idade.
- Ⓓ A linha do sorriso alta é uma característica predominantemente masculina.

QUESTÃO 79

Considerando-se as estruturas dos componentes da polpa dental mostradas na ilustração precedente, é correto afirmar que a

- Ⓐ letra E ilustra os macrófagos presentes na polpa dentária.
- Ⓑ letra B ilustra os feixes de fibras reticulares.
- Ⓒ letra G ilustra as fibras colágenas distribuídas na polpa dental.
- Ⓓ zona 2 representa a camada odontoblástica.

QUESTÃO 80

Uma família composta de dois adultos e três crianças, com idade entre três e oito anos de idade, procurou orientação profissional a respeito de cuidados preventivos, devido ao fato de eles estarem prestes a se mudar para uma região onde, de acordo com informações, não existe fluoretação das águas de abastecimento. As crianças não apresentam lesões de cárie, e os adultos estão sob controle, já que não apresentam novas lesões de cárie há mais de cinco anos.

Considerando esse caso clínico, o profissional deve

- Ⓐ recomendar que seja providenciada a aplicação tópica de flúor, nas crianças, a cada seis meses.
- Ⓑ orientar sobre importância da manutenção de hábitos adequados de higiene bucal e dieta.
- Ⓒ recomendar suplementação de flúor via oral para que a família mantenha a doença cárie sob controle.
- Ⓓ indicar a aplicação de selantes nos molares permanentes que já estiverem erupcionados.

QUESTÃO 81

Após um desentendimento de ordem pessoal com o responsável legal de um paciente com quinze anos de idade, o cirurgião-dentista decidiu renunciar ao atendimento do paciente.

Para que a sua decisão não configure uma infração ética, é necessário que o cirurgião-dentista

- Ⓐ comunique a renúncia, verbalmente, ao paciente e ao seu responsável legal, esclarecendo a impossibilidade de restituir eventuais honorários pagos adiantadamente.
- Ⓑ comunique a renúncia, verbalmente, ao paciente e ao seu responsável legal, informando ao responsável do paciente a necessidade da continuidade do tratamento.
- Ⓒ comunique a renúncia, por escrito, ao paciente e ao seu responsável legal, retendo toda a documentação odontológica do paciente, recusando-se a fornecer cópias caso o responsável solicite.
- Ⓓ comunique a renúncia, por escrito, ao paciente e ao seu responsável legal, fornecendo ao cirurgião-dentista que lhe suceder todas as informações necessárias para a continuidade do tratamento.

QUESTÃO 82

Um paciente solicitou ao cirurgião-dentista um laudo ou parecer por escrito acerca de tratamento odontológico que havia sido realizado por outro profissional.

Considerando essa situação hipotética, julgue as asserções a seguir.

- I O cirurgião-dentista não deve elaborar laudo ou parecer para julgar o tratamento realizado por outro profissional. Ele deve esclarecer o paciente quanto às técnicas existentes e encaminhá-lo ao profissional que realizou o tratamento, para que este possa responder-lhe os questionamentos existentes e sanar qualquer tipo de dúvida.
- II Constitui direito fundamental dos profissionais odontologistas, conforme suas atribuições específicas, diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado atual da ciência e sua dignidade profissional.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- A** As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B** As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C** A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D** A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

QUESTÃO 83

A oferta de serviços odontológicos em sítios de compras coletivas é completamente vedada ao cirurgião-dentista, e o Código de Ética Odontológica considera tal oferta como manifesta gravidade. A respeito da imposição de penas no caso de oferta de serviços odontológicos em sítios de compras coletivas, assinale a opção correta.

- A** A comprovação de ignorância ou a má compreensão dos preceitos do Código de Ética Odontológica servem de atenuante e podem reduzir ou eximir o infrator de penalidades.
- B** Se for aplicada pena disciplinar de maior gravidade, não poderá ser aplicada pena pecuniária.
- C** Nos casos de manifesta gravidade, a imposição das penas obedecerá à gradação prevista no Código de Ética, que varia desde advertência confidencial até a cassação do exercício profissional.
- D** É prevista a aplicação imediata de penalidade mais grave, como suspensão ou cassação.

QUESTÃO 84

As clínicas odontológicas e demais pessoas jurídicas que prestam serviços relacionados à odontologia podem ser responsabilizadas judicialmente se forem demonstrados danos por defeitos relativos à prestação dos serviços e nexo de causalidade. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A** Independentemente da existência de culpa, o fornecedor do serviço responde pela reparação dos danos causados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
- B** O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança esperada pelo consumidor e quando novas técnicas são incorporadas durante o tratamento.
- C** No caso de existência do dano e do nexo de causalidade, o paciente/usuário poderá cobrar reparação da clínica ou da pessoa jurídica fornecedora do serviço, mas não do cirurgião-dentista que realizou o tratamento.
- D** A responsabilidade do fornecedor do serviço será apurada mediante a verificação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

QUESTÃO 85

De acordo com a Resolução n.º 20/2001 do Conselho Federal de Odontologia, é permitido ao cirurgião-dentista na função de auditor

- A** comunicar, por escrito, ao cirurgião-dentista assistente qualquer impropriedade ou irregularidade verificada no serviço prestado, solicitando esclarecimentos para fundamentar suas recomendações.
- B** determinar, em seu relatório, as medidas punitivas a serem aplicadas ao cirurgião-dentista, se constatadas impropriedades ou irregularidades no serviço prestado.
- C** acompanhar procedimentos em pacientes, independentemente de autorização deste ou de seu responsável legal.
- D** receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa.

QUESTÃO 86

Um paciente idoso, em atendimento em consultório odontológico, apresentava-se febril, com pré-insuficiência renal (*clearance* de creatinina entre 60-89 mL/min.), pressão arterial de 140 mmHg × 90 mmHg e com enfartamento ganglionar na região submandibular. Clinicamente, o dente 36 apresentava abscesso periapical e sem possibilidade de reabilitação, o que indicava a necessidade de exodontia.

Considerando-se que o paciente desse caso clínico não apresentava histórico de alergias, o anestésico local e a prescrição medicamentosa (analgésica e antimicrobiana) devem incluir, preferencialmente,

- A** lidocaína a 2% com norepinefrina 1:50.000, nimesulida 100 mg e doxiciclina 100 mg.
- B** mepivacaína a 2% com epinefrina a 1:100.000, ibuprofeno 600 mg e amoxicilina 500 mg.
- C** mepivacaína a 3% sem vasoconstritor, paracetamol 750 mg e doxiciclina 100 mg.
- D** lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000, dipirona sódica 500 mg e amoxicilina 500 mg.

QUESTÃO 87

Com relação aos cuidados caseiros de higiene bucal de idosos, é recomendável

- A** prescrever o uso de bochechos diários com soluções alcoólicas de óleos essenciais como adjunto à remoção mecânica de biofilme.
- B** impedir que o idoso demenciado execute sozinho os cuidados de higiene bucal; o cuidador ou os familiares do idoso devem assumir essa responsabilidade assim que confirmado o diagnóstico.
- C** evitar o uso de escovas elétricas, pois são pesadas e requerem técnicas específicas de escovação para a remoção do biofilme.
- D** procurar, sempre que necessário, alternativas para o uso do fio dental (que exige muita coordenação motora fina e habilidade manual), como, por exemplo, escovas interdentais e palitos de madeira.

QUESTÃO 88

Um paciente do sexo masculino, com oitenta e dois anos de idade, portador de mal de Alzheimer em estágio intermediário para avançado, pouco colaborador, compareceu ao atendimento odontológico apresentando o seguinte quadro: gengivite; quase todos os dentes presentes na boca; recessões gengivais generalizadas; cáries radiculares extensas; e grande acúmulo de placa. O paciente tinha uma dieta essencialmente pastosa e rica em carboidratos fermentáveis, e a higiene bucal era realizada por ele próprio.

No tratamento desse paciente, além de orientações para a família ou ao cuidador acerca da dieta e de cuidados diários de higiene bucal, deve-se indicar fluoroterapia aplicada em consultório e o tratamento das cavidades cariosas utilizando

- A** técnica de restauração atraumática (ART) com compósito fotopolimerizável nanoparticulado.
- B** preparo cavitário com instrumentos rotatórios e restauração com amálgama dentário.
- C** técnica de restauração atraumática (ART) com ionômero de vidro de alta viscosidade.
- D** preparo cavitário com instrumentos rotatórios e restauração com ionômero de vidro convencional.

QUESTÃO 89

Acerca da reabilitação protética maxilofacial intraoral e extraoral, assinale a opção que corresponde à principal vantagem do silicone vulcanizado em temperatura ambiente (RTV) em comparação ao vulcanizado por calor (HTV).

- A** excelente estabilidade térmica e química que o torna biologicamente mais inerte
- B** elevado módulo dinâmico em MPa
- C** fácil manipulação e estabilidade da coloração que promovem um aspecto mais natural
- D** excelente resistência à ruptura e maior resistência à tração em MPa

QUESTÃO 90

Assinale a opção que apresenta os indicadores de risco considerados mais expressivos para cárie radicular e fatores de risco para periodontite em idosos, respectivamente.

- A** experiência pregressa de cárie e ausência de consumo de água fluoretada; tabagismo e obesidade
- B** superfícies radiculares expostas e dieta pastosa; diabetes e uso de medicamentos xerostomizantes
- C** experiência pregressa de cárie e superfícies radiculares expostas; diabetes e tabagismo
- D** dieta pastosa e ausência de consumo de água fluoretada; obesidade e uso de medicamentos xerostomizantes

Espaço livre