

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- 41 Por ser bipartido entre a União e os estados, o financiamento do SUS contribui para o fortalecimento da atenção básica em saúde.
- 42 Aos municípios são disponibilizados instrumentos técnicos e pedagógicos facilitadores do processo de formação e educação permanente dos membros das equipes de gestão e de atenção em saúde.
- 43 É denominado unidade básica de saúde (UBS) todo estabelecimento de saúde que preste ações e serviços de atenção básica no âmbito do SUS.
- 44 Apoiar e estimular a adoção da estratégia saúde da família como forma prioritária de expansão, consolidação e qualificação da atenção básica consistem em responsabilidades restritas às esferas de governo estadual e municipal.
- 45 A PNAB resultou da experiência acumulada por um conjunto de atores — como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo — envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do SUS.

Julgue os próximos itens, a respeito de especificidades e indicações relativas a vacinas.

- 46 No caso de vacinas inativadas — como a vacina contra hepatite B, tétano e difteria —, é necessária a aplicação de mais de uma dose para a adequada proteção; no caso das vacinas virais atenuadas, geralmente, basta aplicar dose única para a adequada proteção.
- 47 Alguns indivíduos apresentam reação anafilática aos componentes dos imunobiológicos, em cujo mecanismo estão envolvidos os mastócitos. Essa reação, que ocorre nas primeiras duas horas após a aplicação, é caracterizada pela presença de urticária, sibilos, laringoespasma e edema de lábios, podendo evoluir para hipotensão e choque anafilático.
- 48 O desenvolvimento das atividades da sala de vacinação é responsabilidade da equipe de enfermagem, após treinamento e capacitação para os procedimentos de manuseio, conservação, preparo e administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação.
- 49 A sala de vacinação é classificada como área crítica, devendo ser destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos, mas, excepcionalmente, considerando-se os diversos calendários de vacinação existentes, ela pode ser compartilhada com a administração dos imunobiológicos.
- 50 Após a administração de uma vacina, a ocorrência, no vacinado, de temperatura acima de 38,5 °C constitui contraindicação à aplicação de dose subsequente.
- 51 No caso de idoso que nunca tenha sido vacinado contra febre amarela ou não tenha comprovante de vacinação, caberá ao médico avaliar a relação custo-benefício da vacinação, além da necessidade de administrar uma dose, considerando o risco da doença e de eventos adversos nessa faixa etária e(ou) decorrentes de comorbidades, bem como o histórico vacinal.
- 52 A vacina contra hepatite B está indicada para indivíduos integrantes dos grupos vulneráveis, independentemente da faixa etária ou da comprovação da condição de vulnerabilidade.

No que se refere ao SUS, julgue os itens subsequentes.

- 53 Um acontecimento determinante que influenciou a criação do SUS foi a Conferência Nacional de Reforma da Psiquiatria, realizada em 1986, em Brasília.
- 54 A Lei n.º 8.142/1990 dispõe sobre a participação popular no SUS e estabelece que o conselho de saúde tenha caráter permanente e deliberativo.
- 55 No período anterior à criação do SUS, o sistema público de saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores vinculados à previdência social, cabendo às entidades filantrópicas o atendimento aos demais cidadãos.
- 56 O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, entidade representativa dos entes municipais na Comissão Intergestora Tripartite, trata de matérias referentes à saúde.
- 57 A fim de propiciar e melhorar o controle social do SUS, está prevista, para a administração sistema, a participação da sociedade nos conselhos de saúde; nestes, a representação total deve ser de 75% de trabalhadores de saúde e 25% de prestadores de serviços (públicos e privados).

Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, julgue os itens que se seguem.

- 58 O enfermeiro deverá suspender as atividades, individuais ou coletivas, informando imediatamente sua decisão, por escrito ou por meio eletrônico, ao conselho regional de enfermagem, caso o local de trabalho não ofereça condições seguras para o exercício profissional ou desrespeite a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência.
- 59 O enfermeiro poderá recusar a comunicação formal ao conselho regional de enfermagem de fatos que envolvam sua recusa ou demissão de cargo, função ou emprego.
- 60 O enfermeiro deverá denunciar aos órgãos competentes e posicionar-se contra ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, se houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente.

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, Portaria n.º 1.820/2009, julgue os próximos itens.

- 61 Conforme protocolos e normas do Ministério da Saúde, o recebimento dos medicamentos que compõem a farmácia básica — e dos de alto custo, quando prescritos —, deve ser garantido aos pacientes.
- 62 Não é permitido ao paciente internado o recebimento de visita de outros profissionais de saúde que não pertençam à unidade hospitalar da internação.
- 63 Toda pessoa tem direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de risco à saúde pública.

No que concerne a diabetes melito, julgue os itens seguintes.

- 64 O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.
- 65 O diabetes gestacional pode ocorrer durante as últimas fases da gravidez, embora geralmente desapareça com o nascimento do bebê. As mulheres com esse tipo de diabetes têm maior propensão a desenvolver diabetes do tipo II em uma fase mais tardia da vida.
- 66 Os sinais e sintomas característicos que levam à suspeita de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicável de peso.
- 67 A glicemia pós-prandial é o teste recomendado para o diagnóstico de diabetes melito gestacional, por apresentar a melhor relação sensibilidade-especificidade.
- 68 Recomenda-se a pessoas portadoras de diabetes melito do tipo II e usuárias de antidiabéticos orais a monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia.

A respeito do SUS e do papel do enfermeiro na vigilância em saúde, julgue os itens seguintes.

- 69 As doenças crônicas não transmissíveis, às quais são atribuídas mais de 70% das mortes ocorridas nos últimos anos, tornaram-se a principal prioridade na área de saúde no Brasil.
- 70 A morbimortalidade causada pelas doenças crônicas não transmissíveis é maior na população mais rica, o que exige uma atenção especial da enfermagem para esse grupo, buscando, por exemplo, realizar intervenções para o tratamento das disfunções metabólicas e cardiovasculares.
- 71 A prevalência de diabetes e hipertensão arterial está aumentando paralelamente ao aumento do excesso de peso da população; por isso, a assistência de enfermagem deve ter como objetivo a intervenção sobre as mudanças desfavoráveis na dieta e na atividade física das pessoas.
- 72 Embora as taxas de mortalidade por diabetes e certos tipos de câncer estejam subindo, nota-se uma queda na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, o que representa uma grande conquista para a saúde no Brasil.
- 73 Ainda persistem no cenário de saúde brasileiro grandes desafios, como a redução da alta frequência de cesarianas, de nascimentos pré-termo e de abortos ilegais.
- 74 As doenças crônicas não transmissíveis são a principal fonte de carga de doença, detendo os transtornos neuropsiquiátricos a maior parcela de contribuição, o que indica que o enfermeiro necessita de preparo clínico adequado para intervenção nos problemas de saúde dessa natureza.

Acerca da assistência de enfermagem na vigilância em saúde e da saúde da criança e da mulher, julgue os itens subsequentes.

- 75 O programa Rede Cegonha, vinculado ao Ministério da Saúde, reforça a rede hospitalar por meio da oferta de vagas para gestantes e recém-nascidos nas unidades de saúde e da criação de novas estruturas de assistência e acompanhamento, como são exemplos a Casa da gestante, do bebê e puérpera, e os centros de parto normal.
- 76 A assistência de enfermagem ao recém-nascido e à criança direcionada à promoção do aleitamento materno, da hidratação oral e das imunizações contribui diretamente para a redução da mortalidade infantil.
- 77 Mesmo com o avanço do trabalho de enfermagem na atenção primária em saúde no Brasil, ainda devem ser superados alguns desafios, como a sobrecarga de trabalho em razão do acúmulo de atividades gerenciais e de assistência com enfoque no indivíduo em detrimento da coletividade.
- 78 No sistema de saúde brasileiro, as intervenções de enfermagem dirigidas às mães e às crianças têm sido ampliadas, quase atingindo a cobertura universal; porém, persiste o crescimento das desigualdades regionais de acesso a tais intervenções.
- 79 O trabalho do enfermeiro no programa de humanização no pré-natal e nascimento, considerando a autonomia do indivíduo como uma diretriz do SUS, deve contribuir para garantir que a decisão da mulher sobre o tipo de parto de sua preferência, incluída a cesariana sem indicação clínica, seja respeitada pelo serviço de saúde.
- 80 O índice de cesarianas da rede pública é menor que o da rede privada de saúde, o que aponta para a necessidade de ampliação do acesso das mulheres a esse tipo de procedimento cirúrgico na rede pública.

Julgue os seguintes itens, a respeito do processo de trabalho do enfermeiro na assistência à saúde.

- 81 Um dos objetivos da assistência de enfermagem perioperatória é a orientação ao cliente e aos membros de sua família para que eles compreendam o problema de saúde, preparem-se para o tratamento e aprendam a utilizar seus próprios mecanismos fisiológicos e psicológicos, de modo a contribuir para o aumento do potencial da intervenção de enfermagem.
- 82 As três classificações de enfermagem — NANDA, NIC e NOC — foram planejadas para serem utilizadas apenas individualmente, a fim de colaborar nas etapas do processo de enfermagem, que são o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação.
- 83 Os erros mais comuns no raciocínio diagnóstico do enfermeiro são: definição do problema a partir de dados insuficientes, ideia preconcebida quanto à resposta da pessoa examinada, omissão de pista significativa e identificação de apenas um sintoma ou uma pista como diagnóstico.
- 84 Uma das linguagens padronizadas para a classificação dos diagnósticos de enfermagem é aquela proposta pela NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association International), que possui, em sua estrutura taxonômica, domínios, classes e diagnósticos de enfermagem.

Embora a higienização das mãos seja, comprovadamente, a medida mais importante em prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde, a adesão dos profissionais a essa medida ainda é insuficiente. A respeito desse tema e de aspectos diversos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

- 85** A finalidade da higienização das mãos é a remoção da sujidade e da microbiota da pele, o que interrompe a transmissão por contato, contribuindo para prevenção das infecções veiculadas por contato.
- 86** A higienização das mãos com preparação alcoólica é indicada antes e após o contato com o paciente.
- 87** De acordo com o código de ética dos profissionais de saúde, quando colocam em risco a saúde dos pacientes, esses profissionais podem ser responsabilizados por imperícia, negligência ou imprudência.
- 88** Dos antissépticos utilizados para a higienização das mãos, o álcool 70% é o que apresenta mais rápida velocidade de ação, mas ele é pouco eficaz contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, micobactérias, vírus e fungos.

Acerca das práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar, julgue os próximos itens.

- 89** As precauções universais, atualmente denominadas precauções básicas, são medidas de prevenção que devem ser utilizadas na assistência a todos os pacientes, independentemente do diagnóstico definido ou presumido de doença infecciosa.
- 90** As precauções básicas compreendem equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual — apetrechos que têm o objetivo de proteger a integridade física dos trabalhadores e pacientes.
- 91** A recusa ao uso do equipamento de proteção individual é considerada infração que, na forma da legislação, pode ser punida até mesmo com a dispensa, por justa causa, do trabalhador faltoso.

Julgue os itens seguintes, relacionados a distúrbios hidreletrolíticos frequentemente presentes em pacientes críticos e que requerem cuidados e conhecimentos especiais de enfermagem.

- 92** Na hipernatremia, mais frequente que a hiponatremia, o quadro clínico é inespecífico, principalmente no que se refere a disfunções do sistema nervoso central, náuseas, vômitos e sede intensa.
- 93** O potássio é um cátion predominantemente intracelular, e sua maior concentração encontra-se no músculo esquelético.
- 94** O magnésio, que é o segundo cátion intracelular mais comum, apresenta efeito antagonista ao cálcio e está envolvido na contratilidade muscular e na transmissão neuronal.

A respeito da assistência à criança sadia, julgue os itens que se seguem.

- 95** A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que o aleitamento materno seja exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê e complementado até os dois anos de vida ou mais.
- 96** A proteção do leite materno contra infecção respiratória, assim como ocorre contra a diarreia, é maior quando a amamentação é exclusiva nos primeiros seis meses de vida.
- 97** A amamentação é um excelente método anticoncepcional nos primeiros doze meses após o parto, desde que a mãe ainda não tenha menstruado e a criança esteja sendo alimentada exclusiva ou predominantemente com leite materno.

No que se refere a tipos de processos de esterilização de produtos médico-hospitalares, julgue os itens subsequentes.

- 98** A limpeza prévia dos produtos médico-hospitalares deve ser rigorosa para garantir a eficácia da esterilização, independentemente do material e do método de esterilização.
- 99** O processo de esterilização por vapor saturado sob pressão é o mais utilizado em hospitais e o mais econômico para a esterilização de artigos termorresistentes.
- 100** A esterilização de pós e pomadas deve ser feita em estufas e em vapor saturado sob pressão (autoclaves).

Espaço livre