

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens subsequentes, referentes à administração em enfermagem.

- 51 As auditorias servem de instrumento de controle da qualidade dos serviços de enfermagem e podem ser feitas de forma retrospectiva, simultânea ou prospectiva.
- 52 A estrutura organizacional *ad hoc* — exemplo inovador na administração — utiliza simultaneamente dois ou mais tipos de departamentalização sobre determinados membros da organização, com dois fluxos de autoridade: o fluxo vertical, que se refere aos administradores funcionais, e o fluxo da autoridade do projeto.
- 53 O estilo de liderança de abordagem conhecida por grade gerencial ou rede administrativa leva em consideração a produção e o interesse por pessoas.
- 54 No desenvolvimento da função de supervisão, devem ser consideradas as diferenças comportamentais dos funcionários e os fatores extra e intraorganizacionais geradores dessas diferenças.

Uma adolescente de dezessete anos de idade foi levada pelo avô a um serviço hospitalar após ele tê-la encontrado caída no quarto da residência onde moram. Segundo o avô, sua neta respondia minimamente aos comandos (não abria os olhos, não respondia a comandos verbais; apenas gemia após muita insistência). Constatou-se que ela estava gravemente sintomática, com alterações significativas nos sinais vitais e oximetria de pulso de 88% ao ar ambiente. Os exames do sistema nervoso e do abdome estavam alterados, com responsividade apenas aos estímulos dolorosos, além de alteração pupilar e de ruídos hidroaéreos. Constatou-se overdose com medicação opiácea (morfina).

Considerando o caso clínico apresentado, julgue os itens seguintes.

- 55 Pacientes com quadro clínico semelhante ao da paciente do caso em tela comumente apresentam os seguintes sinais vitais: 120 bpm, frequência respiratória de 20 incursões por minuto, temperatura de 38,3 °C e pressão arterial de 180 mmHg × 120 mmHg.
- 56 Dado o quadro clínico da paciente, pupilas midriáticas e ruídos hidroaéreos aumentados são alterações esperadas nos exames realizados.
- 57 A oximetria de pulso é um importante método invasivo para a avaliação da hipoxemia, contudo, no caso em questão, a saturação de oxigênio da paciente encontra-se dentro da faixa de normalidade.
- 58 A abordagem clínica inicial recomendada à paciente desse caso inclui descontaminação com uso de carvão ativado.
- 59 Controlar as vias aéreas e os sinais vitais, garantir boa oxigenação, manter acesso venoso e prevenir aspirações são medidas a serem adotadas para essa paciente, além da indicação de terapêutica com naloxona.

Julgue os itens a seguir, quanto ao socorro de pessoas adultas em situações especiais por acidentes com múltiplas vítimas.

- 60 **Situação hipotética:** Três trabalhadores vítimas de um desabamento de objetos da construção de um edifício estão presos sob alguns destroços. Segundo especialistas, a construção encontra-se estável, sem risco de novo desabamento. **Assertiva:** Nessa situação, é necessário remover os destroços que estejam sobre os corpos das vítimas e puxá-las o mais rápido possível do local, a fim de dar início aos primeiros socorros e a medidas de ressuscitação, caso sejam necessárias.
- 61 **Situação hipotética:** Um veículo com trabalhadores envolveu-se em um acidente de trânsito e ficou tombado de lado na pista. **Assertiva:** Nessa situação, deve-se, primeiramente, quebrar os vidros do veículo e retirar as vítimas o mais rápido possível, devido ao risco de incêndio.
- 62 Em um sistema de triagem que prioriza a cena segura, é feito primeiramente o direcionamento de todas as vítimas que estejam em condições de andar, para que estas saiam da cena, e, em seguida, procede-se a uma avaliação rápida, a fim de se identificar aqueles que necessitam de atendimento urgente/imediato, os que podem aguardar, os de prioridade leve e as vítimas inviáveis/mortas.

A respeito de aspectos relacionados à anafilaxia, julgue os itens que se seguem.

- 63 Nos casos em que o paciente apresentar indicativos de insuficiência respiratória iminente como cianose perioral, sibilos difusos, estridor e hipóxia, pode-se realizar uma cricotireoidostomia com a finalidade de garantir as vias aéreas pérvias.
- 64 Na fisiopatologia da anafilaxia imediata, há liberação de prostaglandinas, leucotrienos e histamina por via não imunomediada.
- 65 A terapia medicamentosa primária em casos de anafilaxia inclui a administração de adrenalina, que pode ser realizada por via intramuscular ou por via intravenosa.
- 66 A reanimação cardiopulmonar deve ser iniciada tão logo sejam detectadas parada cardíaca e(ou) respiratória, além de ser inseridos acessos intravenosos para facilitar a administração de líquidos e medicamentos.

Julgue os itens a seguir, a respeito das técnicas fundamentais de enfermagem.

- 67 O funcionamento da máscara de Venturi obedece ao princípio de Bernoulli, na medida em que possibilita que uma concentração de oxigênio constante seja oferecida ao paciente independentemente da profundidade ou da frequência respiratória dele.
- 68 A pacientes com úlceras arteriais com tecido necrótico de coloração preta, é indicado o desbridamento mecânico.
- 69 Na inserção de um cateter urinário de longa permanência, deve-se garantir a lubrificação do cateter durante a inserção e inflar o balão de retenção do cateter apenas quando se certificar da adequada posição, a fim de evitar o traumatismo nos tecidos uretrais.
- 70 Em se tratando de pacientes com tubo endotraqueal ou submetidos a traqueostomia, o acúmulo de secreções pode ser evitado pela realização de aspiração em sistema fechado, de maneira vigorosa e contínua, técnica que exige do profissional o uso constante de equipamento de proteção individual.

Com relação ao preparo, à desinfecção e à esterilização de materiais e equipamentos para uso na área da saúde, julgue os itens subsequentes.

- 71 Pinças com bordas lisas e materiais cirúrgicos de pequena complexidade podem ser esterilizados em estufas, desde que se realizem testes periódicos para o controle de qualidade.
- 72 A desinfecção de alto nível promove a destruição de microrganismos presentes em artigos semicríticos, com exceção de micobactérias e alguns fungos.
- 73 A limpeza automatizada em lavadora ultrassônica deve ser feita em produtos com conformações complexas, como, por exemplo, materiais com lúmens de diâmetro interno inferior a cinco milímetros.

Com relação às intervenções preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, julgue os itens subsequentes.

- 74 É aceitável que as gorduras saturadas representem mais da metade das gorduras totais consumidas por uma pessoa, desde que as gorduras totais representem menos de 20% do valor energético total de sua alimentação.
- 75 Recomenda-se o consumo de 200 g a 300 g de frutas, legumes e verduras por dia.
- 76 O uso de aspirina profilática é recomendado em caso de paciente jovem e com baixo risco cardiovascular.
- 77 Terapia hormonal com estrógenos e progesterona é uma medida de prevenção cardiovascular recomendada a mulheres.
- 78 Ingestão excessiva de álcool é considerada fator de risco para fibrilação atrial.

A respeito de noções básicas de epidemiologia e vigilância à saúde do trabalhador, bem como acerca de registros em bases de dados, documentos e legislações nacionais relativos a esse tema, julgue os itens a seguir.

- 79 Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) assumem funções ou atribuições correspondentes às dos Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) de órgãos da administração pública.
- 80 Casos de pneumoconioses relacionadas ao trabalho devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- 81 Cada um dos municípios do estado do Maranhão é coberto por algum CEREST regional.
- 82 Entre 2010 e 2015, foram registrados, em média, mil casos de câncer ocupacional no SINAN, o que reflete a deficiência das ações dos órgãos na notificação obrigatória de doenças monitoradas por meio da estratégia de vigilância.
- 83 Entre as seis doenças ou agravos à saúde do trabalhador de notificação compulsória e monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas, os transtornos mentais relacionados ao trabalho foram os mais registrados entre 2010 e 2015.

Considerando a legislação nacional sobre doença e acidente de trabalho no contexto da seguridade social, julgue os itens subsequentes.

- 84 Litígios relativos a acidentes de trabalho serão apreciados em âmbito judicial segundo o rito sumaríssimo.
- 85 O contrato de trabalho do segurado social que recebe auxílio-doença em razão de acidente de trabalho fica garantido por, pelo menos, doze meses a partir do término do auxílio.
- 86 O trabalhador que sofrer perda de audição fará jus ao auxílio-acidente, bastando, para isso, o reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença.
- 87 Trabalhador que perceba auxílio-doença em razão de acidente de trabalho que lhe tenha causado perda da capacidade de exercer sua atividade habitual, mas que não seja considerado inválido, deverá se submeter a processo de reabilitação profissional para exercer outra atividade.
- 88 **Situação hipotética:** Para esclarecer dúvidas sobre plano de saúde, um cliente compareceu ao setor de atendimento ao público de uma instituição que oferece esse tipo de serviço. Insatisfeito com as informações que havia recebido, o cliente começou a proferir ofensas contra o atendente e, por fim, o agrediu fisicamente. Devido à agressão, o atendente caiu no chão, bateu a cabeça e sofreu traumatismo craniano. **Assertiva:** De acordo com a legislação vigente, essa situação é considerada acidente de trabalho.

A respeito das doenças relacionadas ao trabalho reconhecidas pelo Ministério da Saúde, julgue os próximos itens.

- 89 Em comparação com mulheres, homens tendem a apresentar quadros de dermatoses ocupacionais menos graves e de remissão mais rápida.
- 90 O padrão de fala do portador de perda auditiva induzida por ruído pode sofrer alterações.
- 91 A exposição a ruído elevado é fator de risco para perda auditiva induzida por ruído, mas não é fator de risco para lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT).
- 92 Pessoas que trabalham no transporte de carvão mineral estão sob risco de desenvolver uma doença conhecida como pneumoconiose dos trabalhadores de carvão.
- 93 Caso haja indicação de profilaxia pós-exposição no caso de acidente de trabalho que envolva exposição a materiais biológicos, é recomendado que a quimioprofilaxia seja iniciada nas primeiras duas horas após o acidente.

Tendo como referência a legislação que trata da saúde no Brasil, julgue os seguintes itens.

- 94 Ao solicitar ao órgão competente a interdição de ambiente de trabalho que apresente risco à vida do trabalhador, o sindicato exerce atividade pertinente à saúde do trabalhador.
- 95 As empresas devem prover aos seus empregados as condições indispensáveis ao exercício da saúde como direito somente se o Estado, por omissão, não o fizer.
- 96 Cabe à direção nacional do Sistema Único de Saúde definir as normas relativas a ambientes de trabalho.

A respeito das atribuições do enfermeiro do trabalho, julgue os itens que se seguem.

- 97** As atividades exercidas pelo enfermeiro estão relacionadas ao serviço de higiene, medicina e segurança do trabalho.
- 98** O enfermeiro pode realizar atendimento de primeiros socorros no ambiente de conveses e em porões de embarcações.
- 99** É permitido ao enfermeiro do trabalho inscrito em Conselho Regional de Enfermagem preencher, emitir e assinar o laudo de monitorização biológica previsto no perfil profissiográfico previdenciário.
- 100** A Norma Regulamentadora 29 do Ministério do Trabalho e Emprego determina que haja quatro enfermeiros do trabalho em cada grupo de três mil trabalhadores do serviço especializado em segurança e saúde do trabalhador portuário.

Acerca dos benefícios da previdência social, julgue os itens a seguir.

- 101** A cota do salário-família devida a empregado que possua filhos com idade igual ou inferior a quinze anos será proporcional aos dias por ele trabalhados nos meses de sua admissão e demissão.
- 102** A perda da qualidade de segurado não impede a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e de aposentadoria especial.
- 103** O beneficiário de auxílio-doença ou auxílio-acidente do Instituto Nacional do Seguro Social perde a condição de segurado após seis meses do término do recebimento do benefício previdenciário.
- 104** O salário-maternidade deve ser requerido pela empregada gestante diretamente ao Instituto Nacional do Seguro Social no prazo de vinte e oito dias antes da data provável do parto.
- 105** Independentemente de carência, a concessão das prestações de auxílio-doença é garantida ao segurado acometido por tuberculose ativa, hanseníase ou hepatopatia grave.

Com base na norma OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessments Series), julgue os itens subsequentes, referentes a serviços de avaliação de segurança e saúde ocupacional.

- 106** Essa norma considera incidente qualquer evento que tenha gerado lesão, doença grave ou fatalidade.
- 107** Identificados perigos novos ou modificados em uma ação corretiva ou preventiva, é necessário requerer que eventuais ações propostas sejam submetidas a uma avaliação de riscos antes de serem implementadas.
- 108** A referida norma baseia-se na metodologia PDCA (*plan-do-check-act*), que corresponde a planejar-fazer-verificar-agir; nessa metodologia, agir significa implementar processos envolvidos com segurança e saúde no trabalho.

Com referência a ergonomia e à legislação brasileira que trata desse assunto, julgue os itens subsequentes.

- 109** Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam esforço intelectual e atenção constantes, o índice de temperatura efetiva deve permanecer entre 18 °C e 23 °C.
- 110** O peso máximo de cargas para transporte manual por empregadas mulheres deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para empregados homens.
- 111** A análise ergonômica do trabalho deve considerar as condições de trabalho, que incluem aspectos relacionados a equipamentos e a condições ambientais do posto de trabalho.
- 112** A ergonomia cognitiva corresponde ao estudo da postura no trabalho, do manuseio de materiais, de movimentos repetitivos e do projeto de posto de trabalho.

Julgue os próximos itens, relativos ao gerenciamento de riscos.

- 113** As doenças do trabalho portuário estão relacionadas a riscos químicos pela exposição a gases e poeiras.
- 114** A elaboração do plano de controle de emergência e do plano de ajuda mútua tem a finalidade de minimizar, entre outras situações, casos de queda de pessoa ao mar e riscos à segurança das operações portuárias em razão de condições adversas de tempo.
- 115** Na limpeza de tanques de carga que contenham ou que tenham contido produtos tóxicos, corrosivos e(ou) inflamáveis, é obrigatório o uso de exaustores, cujos dutos devem prolongar-se até o convés da embarcação.
- 116** Qualquer substância ou produto que apresente risco de explosão de toda a sua massa é considerado substância perigosa da classe 3 — líquidos inflamáveis.
- 117** Na análise de riscos do trabalho em altura, o tempo de suspensão inerte deve ser o menor possível, por oferecer risco de diminuição da frequência respiratória devido a compressão torácica.

No que se refere à promoção da saúde do trabalhador e à prevenção de doenças no trabalho, julgue os itens subsequentes.

- 118** Casos identificados de cólera e de doença meningocócica nos setores portuários são considerados eventos de emergência de saúde pública de importância internacional.
- 119** O objeto de avaliação de programas de prevenção de acidentes e de doenças do trabalho restringe-se a doenças ocupacionais.
- 120** As instalações sanitárias para uso dos trabalhadores devem estar situadas em distância máxima de quinhentos metros dos locais de operações portuárias.