

PROVA TÉCNICA

A respeito de vacinas que constituem o Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil, julgue os itens a seguir.

- 31 A vacina quadrivalente papilomavírus humano (HPV recombinante) deve ser administrada exclusivamente por via subcutânea, no esquema estendido zero, seis e sessenta meses, podendo o paciente que a tome apresentar reações como dor no local da aplicação, edema e eritema de intensidade moderada.
- 32 Uma única dose da vacina contra a febre amarela, produzida com vírus vivo atenuado, pode conferir eficácia entre 90% a 98% e proteção por toda a vida.

Acerca das modalidades assistenciais, julgue os itens subsequentes.

- 33 A modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares inclui procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, para o cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- 34 Define-se regime de hospital-dia como assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requeiram a permanência do paciente na unidade por um período máximo de vinte e quatro horas.

Com relação às unidades de atenção à saúde mental, julgue os itens seguintes.

- 35 O centro de atenção psicossocial (CAPS) na modalidade II é o que atende crianças e adolescentes somente entre dez e dezessete anos de idade, portadores de transtornos mentais graves e persistentes, inclusive decorrentes do uso de substâncias psicoativas, em cidades e(ou) regiões com pelo menos cem mil habitantes.
- 36 Uma das diretrizes de serviço hospitalar de referência para a atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas é a integração à rede de atenção psicossocial, para garantia da continuidade do cuidado.

Sabendo que a presença de incapacidades é o principal preditor de mortalidade, hospitalização e institucionalização em idosos, julgue os itens a seguir, a respeito da assistência de enfermagem em gerontologia.

- 37 No planejamento de enfermagem, devem-se determinar os resultados que se desejam alcançar e as ações ou intervenções que deverão ser realizadas face às respostas da assistência prestada ao idoso, identificadas na etapa do diagnóstico de enfermagem.
- 38 A avaliação das atividades da vida diária é a primeira fase da avaliação cognitiva do idoso.

A respeito da assistência de enfermagem ao paciente oncológico, julgue os itens subsequentes.

- 39 Flebite e urticária são efeitos colaterais comuns da quimioterapia sistêmica.
- 40 Na terapia nutricional enteral em pacientes oncológicos, cabe ao profissional enfermeiro orientar os familiares e(ou) cuidadores quanto aos procedimentos relativos à higiene da ponta da sonda — com algodão embebido em álcool — a ser adotados antes de cada administração de dieta.
- 41 Não há contraindicação de contato entre pacientes oncológicos em processo de quimioterapia e pessoas portadoras de doenças transmissíveis.

Acerca de procedimentos de enfermagem relacionados aos sinais vitais, julgue os itens a seguir.

- 42 Com relação à frequência cardíaca, a ausência de pulso pode indicar uma oclusão arterial.
- 43 A verificação da temperatura corpórea superficial/periférica por via oral é contraindicada em pacientes que tenham realizado cirurgias na região ou que apresentem dificuldade de respirar.

Com relação às recomendações de práticas seguras em cirurgia, julgue os itens que se seguem.

- 44 Uma mensuração inicial da concentração de gás carbônico expirado (capnografia) deve ser usada para confirmar o posicionamento correto de tubo oral e também a adequação dos agentes voláteis inspirados.
- 45 A demarcação da lateralidade deve ser feita no sítio operatório ou próximo a ele — sítios não operatórios não devem ser demarcados.

Hipertensão arterial (HA) é uma condição multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 mmHg e(ou) 90 mmHg. No Brasil, a HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular (DCV). Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

- 46 O mecanismo mais comum da HA no idoso é o enrijecimento da parede arterial dos grandes vasos, que pode levar ao aumento predominante da pressão arterial sistólica, com manutenção ou queda da pressão arterial diastólica.
- 47 A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) consiste no registro direto da pressão arterial durante doze horas, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais durante os períodos de vigília e sono.

Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes em recém-nascidos e crianças, julgue os itens a seguir.

- 48 Doenças diarreicas no primeiro ano de vida são comumente associadas a mamadeiras mal higienizadas e à ocorrência de contaminações de alimentos complementares.
- 49 A frequência respiratória considerada normal para crianças de doze meses a cinco anos de idade é entre trinta e sessenta movimentos por minuto.
- 50 A diarreia por rotavírus é prevenida por vacina aplicada aos doze meses de idade e aos quinze meses de idade.
- 51 O consumo excessivo de sucos por crianças com faixa etária entre dois anos de idade e seis anos de idade se correlaciona com diarreia crônica e baixo crescimento.
- 52 A deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar é a principal causa da síndrome do desconforto respiratório.
- 53 Enquanto a proteção oferecida pelo leite materno contra mortes por infecções respiratórias diminui com a idade, a proteção desse alimento contra mortes por diarreia se mantém constante nos primeiros dois anos de vida.

Considerando as orientações nacionais para atenção à mulher no climatério e menopausa, julgue os itens que se seguem.

- 54 Recomenda-se a realização de mamografia bianualmente para mulheres a partir dos quarenta anos de idade.
- 55 Os sintomas de menopausa costumam ser mais severos em fumantes.
- 56 Entre os maiores fatores de risco para osteoporose está a menopausa tardia.

Considerando-se as orientações nacionais de suporte básico de vida, julgue os próximos itens.

- 57 Quando o paciente com trauma cranioencefálico apresenta oito pontos ou menos na escala de Glasgow, considera-se grave o trauma.
- 58 Situações pré-hospitalares envolvendo violência, abuso de drogas ou intoxicações devem ser avaliadas pelo método ACENA.
- 59 É obrigatória a aplicação da escala de Cincinnati após manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Julgue os itens subsequentes, considerando as normas brasileiras de acreditação de serviços de saúde.

- 60 Um fundamento atual da gestão em saúde é a gestão por processos, definida como forma de entender a organização como um sistema integrado, de áreas interdependentes.
- 61 A avaliação de uma organização prestadora de serviços de saúde pode levar a um dos seguintes resultados: acreditado com excelência; acreditado pleno; acreditado; não acreditado.

Com relação às orientações nacionais para gestações de alto risco, julgue os itens subsequentes.

- 62 O descolamento prematuro de placenta em grau I compromete a vitalidade do feto.
- 63 Casos de abortamento infectado são mais associados a ocorrências espontâneas, decorrentes da falta de higienização regular.
- 64 Casos de crescimento intrauterino restrito grave, diagnosticado no segundo trimestre de gravidez, sugerem possibilidades de cromossomopatia ou de infecção congênita.

A respeito de doenças relacionadas às atividades laborais, julgue os itens a seguir.

- 65 Em se tratando de funcionários que exercem atividades de limpeza, lavanderia e cozinha, considera-se a candidíase uma doença laboral se caracterizada, por meio da história ocupacional dessas pessoas e da inspeção no ambiente de trabalho, a exposição laboral.
- 66 Dada a natureza de indústrias de laticínios, abatedouros, açougues, frigoríficos, laboratórios e clínicas veterinárias, os trabalhadores que exercem suas funções nesses locais estão expostos ao risco de contrair brucelose.
- 67 A neoplasia maligna de bexiga, de etiologia multicausal, com alta malignidade e, em geral, com prognóstico de letalidade de três meses a seis meses, pode estar relacionada às atividades laborais.

Com relação ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, julgue os itens subsequentes.

- 68 A responsabilidade dos estabelecimentos de saúde que geram resíduos encerra-se assim que são contratadas empresas terceirizadas para realizar os serviços de limpeza, coleta, tratamento, disposição final e comercialização de materiais reciclados.
- 69 Os resíduos sólidos dos serviços de saúde são classificados e separados em cinco grupos de acordo com suas características e tipo de risco, o que determina as formas como serão armazenados, coletados, transportados e entregues ao destino final.
- 70 A autoclave e o incinerador são equipamentos utilizados para a desinfecção de resíduos sólidos dos serviços de saúde do grupo B, de modo que eles possam ser posteriormente encaminhados ao circuito normal de coleta dos resíduos sólidos urbanos.

Quanto à metodologia científica empregada nas pesquisas em saúde e enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- 71 A média é uma medida da tendência central afetada pela presença de valores discrepantes (*outliers*) e afasta-se do centro de uma distribuição distorcida, enquanto a mediana é a pontuação do meio da sequência estudada.
- 72 Os estudos transversais são utilizados na pesquisa de doenças estáveis e terapias que demonstrem efeitos em curto prazo.
- 73 O pouco tempo gasto com o trabalho de campo e a descontração no ambiente onde são realizadas as coletas de dados, frequentemente sem estresse, são vantagens da observação participante em uma pesquisa com seres humanos.

Com relação à esterilização, desinfecção e aos materiais utilizados em estabelecimentos de saúde, julgue os itens a seguir.

- 74** A desinfecção inicial de instrumentos cirúrgicos metálicos deve ser feita com solução de hipoclorito de sódio, betadine ou álcool.
- 75** Inaladores, máscaras de nebulização, ambu e cânulas de Guedel são artigos classificados como críticos do ponto de vista de contaminação, pois apresentam alto risco de infecção.
- 76** Antes da esterilização ou desinfecção de materiais de elevado grau de contaminação para a saúde, deve-se colocar luvas, enxaguar os materiais com água corrente fria, depois lavá-los com água morna e sabão, utilizando-se escova de cerdas apropriadas, e, em seguida, enxaguá-los e secá-los.

Considerando que determinado paciente de dezoito anos de idade tenha sido internado em uma unidade oncológica com diagnóstico de leucemia e esteja sendo submetido à quimioterapia antineoplásica (QA), o que deixa seu sistema imunológico frágil, julgue os itens subsequentes acerca das práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar e das medidas de precaução para a segurança individual e coletiva.

- 77** É facultativo ao profissional que estiver preparando a QA dentro da área restrita o uso de equipamentos de proteção individual como máscara e óculos.
- 78** Os familiares poderão visitar esse paciente se estiverem portando luvas cirúrgicas e poderão levar-lhe alimentos se estes estiverem devidamente higienizados.
- 79** A preparação da QA deve ser feita em sala restrita, em cabine de segurança biológica classe II, tipo B2, com exaustão externa, para garantir a proteção pessoal e ambiental.
- 80** Durante a administração da QA, é obrigatório o uso, pelos profissionais de saúde, de óculos e de equipamento para proteção das vias respiratórias, para a segurança tanto do profissional quanto do paciente.

Espaço livre