

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens seguintes, relativos aos agravos à saúde do trabalhador.

- 61 O trabalho é considerado um dos fatores psicossociais de risco para o alcoolismo crônico, seja como meio de garantir a inclusão no grupo, seja como forma de viabilizar o próprio trabalho, em decorrência dos efeitos farmacológicos próprios do álcool: calmante, euforizante, estimulante, relaxante, indutor do sono, anestésico e antisséptico.
- 62 Considerando-se os fatores de risco ocupacional, lesões cutâneas em trabalhadores da área de higienização de material cirúrgico hospitalar podem decorrer de candidíase ou dermatite de contato alérgica a látex mediada por mecanismo imunológico de hipersensibilidade do tipo retardada IV.
- 63 Recomenda-se a aplicação da vacina BCG em todos os trabalhadores não reatores ao PPD (teste de tuberculina) com risco de exposição biológico em hospitais, bem como a realização do teste PPD periodicamente visando-se detectar os trabalhadores susceptíveis e, em caso de viragem, recomenda-se a administração de isoniazida durante seis meses.
- 64 A psicose profissional ocorre em trabalhadores que investem intensamente seus esforços e ideais em determinada atividade, mas estão expostos a situações organizacionais que conduzem a processos de esgotamento profissional, como a síndrome de *Burnout*.
- 65 **Situação hipotética:** Médico residente, ao fazer estágio na UTI, desenvolveu quadro de transtorno mental. Posteriormente, verificou-se que, durante sua infância, um dos seus genitores permaneceu muito tempo internado em uma UTI. **Assertiva:** Trata-se de uma neurose de excelência.

Considerando o disposto nas normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, julgue os itens subsequentes.

- 66 Para efeitos da NR 32 e da NR 9, consideram-se agentes biológicos as bactérias, os fungos, os bacilos, os parasitas, os protozoários e os vírus.
- 67 Trabalhador que realize atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes, com exposição ocupacional, deve submeter-se à realização do hemograma anualmente, além de ser mantido sob monitoração individual de dose de radiação ionizante.
- 68 Trabalhador do setor de tecnologia da informação de um hospital que trabalhe sob risco ergonômico deve ser submetido a exame periódico em intervalos máximos de um ano, independentemente da idade.
- 69 As cores utilizadas nos locais de trabalho de um hospital para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos devem atender ao disposto previamente no Programa de Prevenção de Risco no Ambiente de Trabalho — PPRA.
- 70 **Situação hipotética:** Técnica de enfermagem de determinado hospital foi readaptada da UTI, onde trabalhava, para a enfermagem, onde passou a executar atividades como levar prontuários, transportar roupa limpa da lavanderia para o ambulatório e gerenciar escalas de serviço de outros trabalhadores. **Assertiva:** O adicional de insalubridade dessa técnica de enfermagem deverá ser reduzido de grau máximo para médio.

- 71 Considerando-se o dimensionamento do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho — SESMT de uma maternidade com 550 trabalhadores, não há previsão da obrigatoriedade de um técnico de enfermagem do trabalho, mas é obrigatória a contratação de um enfermeiro do trabalho em tempo integral.

Julgue os itens seguintes, no que concerne à saúde ocupacional como um direito humano, em especial da trabalhadora gestante.

- 72 Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação.
- 73 Enfermeira gestante deverá ser afastada de áreas onde esteja sujeita à exposição a gases ou vapores anestésicos, e somente poderá trabalhar com quimioterápicos e antineoplásicos após autorização por escrito do médico responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO considerando-se as informações contidas no PPRA.
- 74 Técnica de enfermagem gestante selecionada em processo seletivo para trabalhar em serviço de hemodiálise de hospital deverá ser considerada inapta para o trabalho no exame admissional, considerando-se a proteção do binômio (gestante e feto), sendo-lhe, entretanto, assegurado o direito à admissão no trabalho após o término da gestação.
- 75 O médico de qualquer especialidade deve avaliar a possibilidade de que a causa de determinada doença, alteração clínica ou laboratorial possa estar relacionada com as atividades profissionais do paciente, cabendo-lhe investigá-la da forma adequada e, caso necessário, verificar o ambiente de trabalho.

Acerca dos aspectos legais da medicina do trabalho, julgue os itens subsequentes.

- 76 Quando da vistoria ao local de trabalho, o perito-médico judicial e os assistentes técnicos devem fazer-se acompanhar, obrigatoriamente, do trabalhador objeto da perícia, para melhor conhecimento do seu ambiente de trabalho e função.
- 77 É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos de idade, salvo em caso de autorização expressa do médico do trabalho.
- 78 O exame periódico de saúde é um procedimento de prevenção secundária, consistindo a prevenção primária na eliminação ou no controle de fatores de risco.
- 79 A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) apresenta limitada aplicação na área da saúde do trabalhador, por abranger apenas as pessoas com deficiência física e mental.
- 80 A perícia médica do perito do INSS tem caráter judicial e é obrigatória para a concessão dos benefícios previdenciários.

Considerando o disposto na NR7 (PCMSO) sobre a periodicidade dos exames periódicos para trabalhadores expostos aos riscos, julgue os itens a seguir.

- 81 Os exames devem ser realizados a cada dois anos se o trabalhador for menor de 18 anos de idade ou maior de 45 anos de idade.
- 82 O exame médico de mudança de função deve ser realizado depois que o trabalhador entrar em atividade na nova função.
- 83 Trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade devem realizar o exame periódico anualmente.
- 84 No atestado de saúde ocupacional (ASO), que deve ser emitido em uma única via, devem constar os riscos ocupacionais específicos existentes nas atividades que serão desenvolvidas pelo empregado.
- 85 Se a empresa for enquadrada como risco 3 e 4, os trabalhadores que tenham realizado seus exames médicos periódicos mais de 90 dias antes da demissão ficam obrigadas a realizar o exame médico demissional até a data da homologação do empregado.

Considerando os parâmetros para o controle biológico da exposição de alguns agentes químicos, bem como para monitorização da exposição ocupacional a alguns riscos, estabelecidos na NR7 (PCMSO), julgue os próximos itens.

- 86 Define-se índice biológico máximo permitido (IBMP) como o valor do indicador biológico suficiente para causar dano à saúde da maioria das pessoas expostas ocupacionalmente.
- 87 O indicador biológico para a monitorização de intoxicação por inseticidas organofosforados e carbanatos que melhor mensura a exposição crônica é a acetilcolinesterase eritrocitária.
- 88 O saturnismo, ou plumbismo, é uma doença ocupacional decorrente da exposição ao chumbo e seus compostos e tem como indicador biológico o ácido mandélico.
- 89 As Pneumoconioses, doenças crônicas incuráveis e evolutivas que produzem alterações nos tecidos pulmonares pela inalação a poeiras fibrosantes, devem ser monitoradas obrigatoriamente pela telerradiografia do tórax.
- 90 Antes da realização da audiometria tonal, parâmetro de avaliação para o risco ruído, deve-se respeitar um tempo de repouso auditivo por um período mínimo de 8 horas.

As LER/DORT são conceituadas como síndromes relacionadas ao trabalho caracterizadas pela ocorrência de vários sintomas concomitantes, ou não, tais como: dor, parestesias, fadiga e sensação de peso, de aparecimento insidioso, geralmente nos membros superiores. No que se refere ao exame físico dos membros superiores para diagnóstico das DORT, julgue os itens que se seguem.

- 91 O teste de Jobe é uma manobra manipulativa para se avaliar a síndrome do desfiladeiro torácico.
- 92 O teste de Cozen é uma manobra provocativa para o diagnóstico da epicondilite medial.
- 93 Na tenossinovite estilo radial, a manobra de Finkelstein é positiva.
- 94 A presença de costela cervical é patognomônico para o diagnóstico da síndrome do desfiladeiro torácico.

A respeito da dengue, doença infecciosa que acomete muitos trabalhadores, principalmente em áreas endêmicas, e que pode estar relacionada à exposição laboral em trabalhos específicos, julgue os itens a seguir.

- 95 A dengue é causada por um arbovírus com quatro grupos diferentes: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.
- 96 A dengue pode ser considerada uma doença relacionada ao trabalho do grupo II da classificação de Schilling.
- 97 A vacina recombinante tetravalente contra o dengue produzida com vírus vivo atenuado é contraindicada no primeiro trimestre da gestação.
- 98 A principal complicação da dengue é a poliartralgia prolongada.
- 99 O período de transmissibilidade ocorre durante o período de viremia, que começa um dia antes da febre e estende-se até o sexto dia da doença.
- 100 Alterações clínicas como vômitos, dores abdominais, hipotensão, mal-estar importante e eventuais sangramentos são sinais de alerta para a dengue hemorrágica.

Espaço livre