

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- No(s) item(ns) eventualmente constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunhos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- 1 O atendimento integral, uma das diretrizes do SUS, refere-se à atenção integral a todos, com prioridade para as atividades preventivas e sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- 2 Ao SUS compete ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da criação e execução de política de saneamento básico, bem como colaborar com a proteção do meio ambiente, neste incluído o meio ambiente de trabalho.
- 3 As instituições privadas só podem participar do SUS se forem entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

A transição demográfica e epidemiológica vivida pelo Brasil nas últimas décadas demonstra um envelhecimento populacional rápido e intenso, com consequências importantes para o país. Na saúde, especialmente, a consequência é a necessidade de políticas específicas que considerem as peculiaridades da pessoa idosa. Dado esse contexto, em 2006, foi aprovada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 4 As metas da diretriz Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável da PNSPI incluem preparar o indivíduo para o envelhecimento com a manutenção da sua capacidade funcional e da sua autonomia, incentivando a responsabilidade pessoal.
- 5 A diretriz Atenção Integral e Integrada à Saúde da Pessoa Idosa da PNSPI estabelece dois grandes e importantes eixos norteadores para a integralidade de ações: o enfrentamento de fragilidades da pessoa idosa, da família e do sistema de saúde; e a promoção da saúde e da integração social em todos os níveis de atenção.
- 6 Com referência à educação, a PNSPI propõe a articulação entre diferentes setores para proporcionar a inclusão nos currículos escolares de disciplinas que abordem o processo de envelhecimento, que valorizem a pessoa idosa e que promovam o conhecimento de profissionais sobre as especificidades da pessoa idosa.

Acerca da Política Nacional de Humanização (PNH), política pública implementada no SUS que tem como finalidade transformar as relações de trabalho, melhorando o grau de contato e a comunicação entre pessoas e grupos, julgue os itens subsequentes.

- 7 A transversalidade incentiva que as diferentes especialidades e práticas de saúde desconsiderem a experiência daquele que recebe a assistência.
- 8 O fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, de modo a estimular a transdisciplinaridade e a grupalidade, é um dos princípios norteadores da PNH.
- 9 Ambiência é um programa criado no âmbito da PNH para dar visibilidade à experiência dos trabalhadores, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho.
- 10 A PNH deve fazer parte do conteúdo profissionalizante na graduação, na pós-graduação e na extensão acadêmica em saúde, devendo estar vinculada aos polos de educação permanente e às instituições formadoras.

Julgue os itens seguintes, relativos ao Pacto pela Saúde.

- 11 Denomina-se Pacto pela Saúde um conjunto de reformas relacionadas ao fortalecimento das relações institucionais e da gestão do SUS.
- 12 Quando foi estabelecido, o Pacto pela Saúde integrou cinco componentes prioritários: o Pacto pela Vida, o Pacto de Direitos e Deveres do SUS, o Pacto em Defesa do SUS, o Pacto de Humanização e o Pacto de Gestão do SUS.
- 13 O Pacto pela Saúde contribuiu para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama, medidas afirmadas no âmbito do Pacto em Defesa do SUS.
- 14 Embora proponha alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade do sistema de saúde considerando as necessidades da população, o Pacto pela Saúde desconsidera as diferenças regionais do Brasil.
- 15 O Pacto pela Saúde requer monitoramento permanente dos estados com relação aos municípios do seu território, dos municípios com relação ao estado, dos municípios e dos estados com relação à União e da União com relação aos estados, municípios e ao Distrito Federal.

Acerca da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), julgue os próximos itens.

- 16 Entre os valores e princípios do PNPS inclui-se o reconhecimento da subjetividade das pessoas e da coletividade no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida.
- 17 A PNPS é uma política de atenção à saúde das pessoas com agravos específicos.
- 18 A valorização dos saberes populares e tradicionais e das práticas integrativas e complementares é um dos objetivos da PNPS.
- 19 A PNPS tem como uma de suas principais diretrizes a promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência.
- 20 A solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça social e a inclusão social são valores importantes na efetivação da PNPS.

Julgue os itens seguintes, referentes à Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).

- 21 A PNAN visa melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis.
- 22 Componente da PNAN, a diretriz Promoção da Alimentação Adequada e Saudável consiste na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e de seus fatores determinantes.
- 23 A PNAN, cuja finalidade é a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de medidas coletivas, garante a redução do sobrepeso, da obesidade e de doenças crônicas associadas à alimentação e nutrição.

A Política Nacional de Vigilância em Saúde

- 24 contempla toda a população no território nacional, sem priorizar territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade.
- 25 abrange somente os serviços de saúde pública.

Julgue os próximos itens, relativos a planejamento, organização e gestão dos serviços de saúde.

- 26 O Pacto de Gestão apresenta diretrizes e define responsabilidade sanitária para cada um dos entes da Federação.
- 27 O projeto terapêutico singular é um protocolo criado especificamente para o planejamento e a intervenção na saúde do indivíduo.
- 28 Na abordagem do planejamento estratégico-situacional em saúde, são fundamentais quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional.
- 29 O plano municipal de saúde deve seguir a legislação do SUS, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano diretor de desenvolvimento urbano, a programação pactuada integrada, as resoluções dos conselhos de saúde e das comissões intergestores tripartite e bipartite.
- 30 As redes de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) podem ser organizadas por especialidade, nível de atenção, ciclo de vida ou outros critérios, desde que mantida a finalidade de melhorar a racionalidade e a eficiência dos serviços.

Acerca do Sistema de Informação em Saúde, julgue os itens subsequentes.

- 31 O acesso ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) é restrito aos gestores municipais e estaduais e sua equipe autorizada.
- 32 O processamento e o controle dos pagamentos realizados diretamente aos prestadores de serviços do SUS são disponibilizados ao público pelo Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS (SGIF/SUS).
- 33 As informações sobre quimioterapia, radioterapia e hemodiálise realizadas no país são encontradas em subsistema do Sistema de Informações Ambulatoriais (SAI/SUS) de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Alto Custo (APAC).
- 34 Os eventos adversos pós-vacinação deverão ser notificados e registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Julgue os seguintes itens, acerca de indicadores e tipos de estudos epidemiológicos.

- 35 O ensaio clínico randomizado é uma pesquisa de natureza retrospectiva que parte do efeito (doença) para elucidar suas causas (exposição) nos indivíduos e na coletividade.
- 36 O indicador epidemiológico adequado para a morbidade por exposição acidental à radiação nuclear é a incidência acumulativa ou cumulativa ou cumulada.
- 37 Os inquéritos de morbidade por doença mental podem ser realizados em duas etapas: rastreamento e confirmação diagnóstica.
- 38 No Brasil, a queda nas taxas de prevalências e proporção de deformidades entre os casos diagnosticados de hanseníase são indicadores satisfatórios do Programa Nacional de Controle da Hanseníase.
- 39 O coeficiente de prevalência de doenças congênitas contém informações dos casos de natimortos que realizam autópsia.
- 40 O estudo caso-controle compara um grupo de indivíduos expostos ao risco de contrair a doença com outro grupo de indivíduos não expostos ao risco.

Acerca da vigilância em saúde, julgue os itens que se seguem.

- 41 O monitoramento dos níveis sanguíneos de chumbo em crianças de determinada comunidade é considerado um marcador biológico da exposição ambiental.
- 42 Para realizar-se o diagnóstico laboratorial da síndrome gripal em unidade sentinela, coletam-se duas amostras da secreção da nasofaringe, preferencialmente entre o oitavo e décimo dia após o início dos primeiros sintomas.
- 43 A erradicação de uma doença infecciosa pode ser impedida se a população deixar de atuar na mudança de comportamento para romper a cadeia de transmissão.
- 44 Os reservatórios naturais do vírus da leptospirose são os roedores silvestres, que contaminam o ambiente com suas excretas e secreções, as quais, inaladas pelo homem, podem infectá-lo.
- 45 A investigação epidemiológica do tracoma tem como objetivo a busca ativa no domicílio e a realização de campanhas educativas em saúde durante os meses sazonais da doença, envolvendo a participação dos moradores do território.
- 46 A vigilância epidemiológica da esquistossomose compreende a busca ativa dos portadores do *Schistosoma mansoni* por meio de inquéritos colproscópicos periódicos, da demanda espontânea à rede básica e do tratamento dos infectados.

Julgue os itens subsequentes relativos à segurança da pessoa idosa no âmbito da atenção à saúde.

- 47 Constitui medida de segurança importante a utilização de sinalização visual para a identificação de risco de queda do paciente internado, a fim de alertar toda a equipe hospitalar.
 - 48 Episódios de calafrio e febre durante a sessão são frequentes em idosos que realizam hemodiálise pela primeira vez.
 - 49 Por ser previsto pela equipe de saúde durante a internação, o risco de ocorrência de úlcera por pressão em idosos não é passível de ser notificado como evento adverso.
 - 50 A notificação de eventos adversos que acontecem com o paciente durante e após seu atendimento em serviços de saúde pode ser feita pelo paciente, por familiares, cuidadores e acompanhantes.
-

Espaço livre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os próximos itens, relativos ao Sistema Único de Saúde (SUS).

- 51 O SUS engloba a atenção de complexidade básica, média e alta, os serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e os serviços de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, e a assistência farmacêutica.
- 52 As secretarias municipais de saúde participam da aprovação e implementação dos respectivos planos estaduais de saúde, atuando na formulação de políticas e ações de saúde e compoem a Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- 53 A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é um foro de negociação e pactuação entre gestores estaduais e municipais.
- 54 Um dos princípios do SUS é o princípio da equidade, que preconiza que as pessoas sejam consideradas como um todo, devendo todas as suas necessidades ser atendidas, incluindo-se a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
- 55 A gestão participativa no SUS refere-se à atuação efetiva de cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na formulação de políticas de saúde, bem como na avaliação e na fiscalização de ações de saúde.

Acerca do controle dos processos de esterilização em um centro de material e esterilização (CME), julgue os itens seguintes.

- 56 Todos os pacotes ou a caixa de instrumental esterilizados devem ser externamente identificados com um indicador químico do tipo I, que deverá ser examinado após a esterilização e antes da abertura do invólucro para uso.
- 57 É obrigatório realizar, uma vez por semana, o teste de Bowie-Dick para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da estufa, que deverá estar vazia e pré-aquecida.
- 58 O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito a cada dez dias e em pacote-desafio.

Com relação aos cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato, julgue os itens subsequentes.

- 59 O uso da oximetria de pulso é indicado para identificação de hipoxemia e avaliação da necessidade de oxigenoterapia.
- 60 Na recuperação pós-anestésica, paciente geriátrico pode não apresentar sinais clássicos de hipotermia, como tremores e calafrios.
- 61 Pacientes com débito urinário inferior a 30 mL por hora e em uso de sonda vesical de demora devem receber alta e ser transferidos da sala de recuperação pós-anestésica para a unidade de destino.

No que se refere a protocolos básicos de segurança do paciente, julgue os itens que se seguem.

- 62 Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, basta o uso de um identificador em pulseira branca padronizada, que deve ser colocada no tornozelo ou no braço.
- 63 O estágio III da lesão por pressão é caracterizado por perda total da espessura dos tecidos, com exposição de ossos, tendões ou músculos, e presença de lesão brilhante ou seca, sem crosta ou equimose.
- 64 Paciente que aguarda, acomodado em maca, para realização de exames ou para transferência é considerado como de baixo risco de queda.
- 65 Para garantir que um medicamento seja administrado pela via certa, deve-se confirmar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada para a administração do fármaco indicado na prescrição médica.

Com relação aos direitos, aos deveres e às penalidades cabíveis aos profissionais de enfermagem, julgue os itens subsequentes, com base nas disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- 66 É direito desses profissionais aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, à família e à coletividade.
- 67 Um profissional de enfermagem pode recusar-se a executar prescrição médica em que não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, mesmo em situação de urgência e emergência.
- 68 As penalidades de multa e suspensão do exercício profissional devem ser aplicadas pelo Conselho Regional de Enfermagem e registradas no prontuário do profissional de enfermagem que responderá pelas referidas penalidades.

Em relação aos cuidados a indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis, julgue os próximos itens.

- 69 A diálise peritoneal é absolutamente contraindicada para pacientes com doença renal crônica e intolerância a infusão de volume necessário para adequação dialítica.
- 70 Em pacientes com diabetes melito tipo I, a insulina regular deve ser administrada por via subcutânea, uma hora antes das principais refeições e em até duas aplicações diárias.
- 71 A aferição da pressão arterial de consultório pelo método auscultatório deve ser realizada com esfigmomanômetro validado, calibrado e acurado, adequando-se o manguito à circunferência do braço do paciente.
- 72 Os sinais mais comuns apresentados por indivíduo com doença pulmonar obstrutiva crônica são diminuição do murmúrio vesicular à ausculta, prolongamento da expiração, timpanismo à percussão e hiperinsuflação torácica.
- 73 O teste do perfil lipídico para determinar riscos para doenças cardiovasculares inclui exames laboratoriais dos níveis de colesterol total (CT), colesterol de baixa densidade (LDL-C), triglicérides (TG) e colesterol de alta densidade (HDL-C).
- 74 O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (2011–2022) indica como fatores de risco para doenças do aparelho circulatório, respiratórias crônicas, câncer e diabetes: o tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada e obesidade.

Considerando os dispositivos legais que regem o exercício da atividade profissional de enfermeiro, sua conduta ética e o processo ético-disciplinar, julgue os itens subsecutivos.

- 75 Enfermeiro submetido a processo ético-disciplinar junto ao Conselho Federal de Enfermagem deve, obrigatoriamente, constituir advogado para representá-lo.
- 76 Enfermeiro que tiver presenciado o cometimento de conduta antiética por outro enfermeiro será obrigado a depor como testemunha em eventual processo ético-disciplinar instaurado para apuração do fato, caso o denunciado não seja seu parente.
- 77 É privativa do enfermeiro a atribuição de prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves e em risco de vida.
- 78 A realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão é um direito profissional assegurado apenas aos enfermeiros que atuam em instituições de ensino superior ou em hospitais universitários.
- 79 O enfermeiro que atender mulher adulta e capaz vítima de violência doméstica deverá, sob o conhecimento prévio dela, comunicar o fato aos órgãos de responsabilização criminal.
- 80 O enfermeiro que sobrepujar o interesse da família ao interesse da ciência estará sujeito à pena de suspensão do exercício profissional.

Julgue os itens a seguir, com base nas normativas nacionais acerca do gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde e nos centros de material e esterilização.

- 81 O enfermeiro que atua temporariamente em um hospital tem a obrigação de conhecer o sistema adotado pela instituição quanto ao gerenciamento de resíduos.
- 82 Um hospital deve ter um plano de medidas preventivas e corretivas de controle de insetos e de roedores, ainda que tais medidas não façam parte de seu plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- 83 Centros de material e esterilização de hospitais militares têm regras próprias, estando desobrigados do cumprimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- 84 Nos serviços de saúde que devem constituir comitê de processamento de produtos para saúde, a legislação exige que no mínimo um representante do serviço de enfermagem acompanhe tal comitê.

À luz da legislação nacional pertinente à segurança e à saúde do trabalhador em serviços de saúde, julgue os itens seguintes.

- 85 Em caso de exposição incidental a risco biológico por parte de trabalhador em serviços de saúde, eventuais medidas de proteção adicionais só poderão ser implementadas se estiverem previstas no programa de prevenção de riscos ambientais.
- 86 Trabalhadores da saúde que estejam com feridas nos membros superiores só podem iniciar suas atividades em serviços de saúde se autorizados por avaliação médica obrigatória.
- 87 O trabalhador em serviços de saúde deve receber orientações quanto às medidas que deve adotar no atendimento a pacientes com distúrbios comportamentais.

Julgue os itens a seguir, relativos a eletrocardiogramas.

- 88 A inversão da onda T ocorre apenas em condição de isquemia.
- 89 Complexos atriais prematuros são comuns em corações saudáveis.

Julgue os itens que se seguem, tendo como referência as diretrizes e normas nacionais para prevenção e controle das infecções hospitalares.

- 90 Na ausência de um núcleo de epidemiologia no hospital, cabe à comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) fazer a notificação compulsória de casos diagnosticados ou suspeitos de doenças cuja comunicação seja obrigatória.
- 91 Infecções em recém-nascidos adquiridas por via transplacentária e evidenciadas após o nascimento são consideradas hospitalares.

A respeito da atuação do enfermeiro em ações relacionadas ao campo da oncologia, conforme a legislação vigente, julgue os itens subsequentes.

- 92 Um enfermeiro especialista em oncologia deverá compor, como membro obrigatório, a equipe mínima de serviço de radioterapia.
- 93 São exigidos do enfermeiro que atua em serviço de radioterapia formação e treinamento específicos para conduzir os procedimentos de radioterapia.
- 94 Ao enfermeiro é vedado o preparo de drogas quimioterápicas antineoplásicas.

No que se refere à atenção cardiopulmonar, bem como aos protocolos nacionais de atendimento em serviços de urgência, julgue os próximos itens.

- 95 Os esforços de ressuscitação cardiopulmonar em paciente que apresenta hipotermia devem ser prolongados.
- 96 A manobra de Heimlich em criança com obstrução grave deve ser interrompida caso ela se torne irresponsiva, passando-se imediatamente para as manobras de ressuscitação cardiopulmonar.
- 97 Crianças vítimas de submersão, independentemente de apresentarem parada cardiorrespiratória, devem ser transportadas para o hospital, pois sintomas respiratórios tardios poderão aparecer.

A mucosite pós-quimioterapia é um processo doloroso que constantemente requer hospitalização para intervenção medicamentosa sistêmica, para controle da dor e tratamento da infecção por meio de antimicrobianos e antifúngicos de amplo espectro. É papel do enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, prescrever e prestar os cuidados de enfermagem a pacientes com mucosite pós-quimioterapia. Com relação a essas informações e aos múltiplos aspectos a elas relacionados, julgue os itens a seguir.

- 98 Cabe ao enfermeiro estimular ou realizar a higiene oral no paciente após as refeições, utilizando escovas de cerdas macias, creme dental não abrasivo, fio dental ultrafino, com técnica adequada, e fornecendo soluções para enxague ou bochecho.
- 99 O enfermeiro deve inspecionar a cavidade oral do paciente diariamente para avaliar a higiene oral, identificar sinais e sintomas de mucosite, sangramento ativo ou má conservação dos dentes, e solicitar avaliação médica/odontológica quando necessário.
- 100 Uma das funções do enfermeiro é classificar a mucosite de acordo com a escala de Morse e implementar as intervenções de acordo com o grau determinado.

- 101 Situação hipotética:** Ao checar a ficha de dieta de um paciente com mucosite, o enfermeiro constatou que os alimentos na lista eram de consistência normal, com sabor suave, e livres de temperos apimentados e ácidos. **Assertiva:** O enfermeiro deve oferecer os alimentos ao paciente e depois questionar a prescrição da dieta com a equipe de nutrição.
- 102** Entre as atribuições do enfermeiro, incluem-se a aplicação da escala visual e analógica de dor e a administração de analgésicos, conforme prescrição médica.

Acerca das medicações antineoplásicas e das reações dermatológicas locais que decorrem de medicações quimioterápicas, julgue os itens que se seguem.

- 103** Quimioterápicos vesicantes provocam irritação severa com formação de vesículas e destruição tecidual quando extravasados.
- 104** A queimação, o desconforto local e a ulceração são reações imediatas que ocorrem quando há extravasamento de quimioterápicos fora do vaso sanguíneo.
- 105** A fossa antecubital deve ser puncionada sempre que possível para administração de quimioterápicos, pois as veias nesses locais são mais calibrosas e acessíveis.
- 106** Antes de administrar o quimioterápico no paciente, o enfermeiro deve verificar o posicionamento correto da agulha e adotar as seguintes manobras: administrar inicialmente o veículo, ou seja, soro ou água destilada (“lavagem” da veia); testar o retorno venoso; e observar a área da punção, pois edema e hiperemia podem ser sinais de extravasamento.
- 107** Se houver extravasamento de quimioterápicos, os antídotos devem ser imediatamente administrados, utilizando-se a mesma agulha, após aspiração da maior quantidade possível de droga infiltrada.

A saúde da família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

- 108** Essas equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes e de manutenção da saúde da comunidade.
- 109** A delimitação da atuação das equipes dá-se pelo nível social da população atendida.
- 110** Por meio de clínicas ampliadas, capazes de construir vínculos positivos e intervenções clinicamente efetivas, a estratégia saúde da família pode atuar de maneira resolutiva, identificando riscos, necessidades e demandas de saúde, e utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo.

Com relação a procedimentos para colocação de cateter central de inserção periférica (sigla em inglês: PICC), julgue os próximos itens.

- 111** O dilatador deverá ser introduzido um minuto após a realização da anestesia local, que, em geral, tem efeito anestésico com duração de cerca de 30 minutos.
- 112** A ponta do PICC deverá ser introduzida no átrio, mais especificamente dentro da câmara cardíaca.
- 113** O tempo de permanência do PICC no paciente é de 15 dias, e, após esse período, ele pode ser trocado periodicamente.
- 114** A colocação do PICC deve ser realizada por médico ou enfermeiro habilitado e treinado, capaz de conduzir e resolver eventuais complicações relacionadas à inserção e utilização do cateter.
- 115** Após a troca do primeiro curativo, os curativos subsequentes deverão ser trocados a cada 48 horas (ou antes, se estiverem sujos ou se soltando), da seguinte forma: realizar antisepsia com clorexidina (aquosa ou alcoólica); e ocluir apenas com filme transparente.
- 116** O PICC deve ser lavado sob baixa pressão antes e após cada administração de medicamento ou solução intravenosa, utilizando solução fisiológica 0,9% em uma seringa de 10 mL.

Um paciente de 78 anos de idade deu entrada na emergência do HUB-DF com quadro de febre, náuseas, vômitos, fezes pastosas, noctúria, poliúria e tremores. O paciente negou dispnéia, dor torácica e tosse.

Os sinais vitais apresentados foram: PA máx.: 151 mmHg / PA min.: 60 mmHg / FC: 102 bpm / FR: 19 irpm / Temp.: 39 °C / SatO₂: 95%.

No exame físico geral, foram constatados: paciente desidratado 2+ / 4+, perfusão periférica < 4 segundos.

Os dados laboratoriais foram: UR:61 / CR:1,54 / lactato: 13 / Na:133 / K: 4,4 / Mg:2 / Cálcio: 8,8 / hb: 13,9 / ht: 40,2 / leucócitos: 16.120 com 3 % de bastões / plaq: 159.000 / pcr: 0,47 / vhs: 2 / glicose: 145.

EAS com proteínas 1,5 g/L / glicose > 10 / nitrito positivo / 385000 leucócitos / ácido láctico: 13 / sem outras alterações.

Diagnóstico: infecção de trato urinário.

O paciente foi internado na unidade de internação aberta às 00 h e teve rebaixamento do nível de consciência, com alterações de sinais vitais. Foi aberto protocolo de SEPSE, e o paciente foi encaminhado para a UTI às 6 h.

Considerando o caso clínico precedente e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

- 117** Houve falha de alocação do paciente, pois, pela avaliação apresentada no caso, o paciente já apresentava suspeita de sepse no pronto-socorro e deveria ter sido encaminhado à UTI, visto que pacientes com disfunção orgânica grave e(ou) choque devem ser alocados em leitos de terapia intensiva assim que possível, a fim de ser garantido o suporte clínico necessário.
- 118** Para evitar um resultado falso positivo, a coleta de lactato arterial deve ser realizada o mais rapidamente possível, em seguida armazenada a uma temperatura de -20 °C, para processamento e análise posteriores.
- 119** Após a identificação da suspeita de sepse, deve-se proceder à coleta de duas hemoculturas em sítios distintos, em até duas horas no máximo, e de culturas de todos os outros sítios pertinentes (aspirado traqueal, liquor, urocultura), antes da administração do antimicrobiano.

120 É recomendada a hidrocortisona na dose de 100 mg, a cada 4 horas, para pacientes com choque séptico refratário e pressão arterial instável, como alternativa para ressuscitação volêmica adequada.

Espaço livre
