

NOME DO CANDIDATO

Nº DE INSCRIÇÃO

ESCOLA

SALA

ORDEM

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo **50 (cinquenta) questões** objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade da Prova terá a duração de **3h30 (três horas e trinta minutos)**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
 - Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas **2h30 (duas horas e trinta minutos)** de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva. A Folha de Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção.
 - Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
 - Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta preta.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.

Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência.

NOME DO CANDIDATO

Nº DE INSCRIÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões de 1 a 3.

Todos os países que reduziram a maioria penal não diminuíram a violência

Por Frei Betto

Voltou à pauta do Congresso, por insistência do PSDB, a proposta de criminalizar menores de 18 anos via redução da maioria penal.

De que adianta? Nossa legislação já responsabiliza toda pessoa acima de 12 anos por atos ilegais. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor infrator deve merecer medidas socioeducativas, como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. A medida é aplicada segundo a gravidade da infração.

Nos 54 países que reduziram a maioria penal, não se registrou redução da violência. A Espanha e a Alemanha voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos. Hoje, 70% dos países estabelecem 18 anos como idade penal mínima.

O índice de reincidência em nossas prisões é de 70%. Não existe, no Brasil, política penitenciária, nem intenção do Estado de recuperar os detentos. Uma reforma prisional seria tão necessária e urgente quanto a reforma política. As delegacias funcionam como escola de ensino fundamental para o crime; os cadeiões, como ensino médio; as penitenciárias, como universidades.

O ingresso precoce de adolescentes em nosso sistema carcerário só faria aumentar o número de bandidos, pois tornaria muitos deles distantes de qualquer medida socioeducativa. Ficariam trancafiados como mortos-vivos, sujeitos à violência, inclusive sexual, das facções que reinam em nossas prisões.

Já no sistema socioeducativo, o índice de reincidência é de 20%, o que indica que 80% dos menores infratores são recuperados.

Nosso sistema prisional já não comporta mais presos. No Brasil, eles são, hoje, 500 mil, a quarta maior população carcerária do mundo. Perdemos apenas para os EUA (2,2 milhões), China (1,6 milhão) e Rússia (740 mil).

Reduzir a maioria penal é tratar o efeito, e não a causa. Ninguém nasce delinquente ou criminoso. Um jovem ingressa no crime devido à falta de escolaridade, de afeto

familiar, e por pressão consumista que o convence de que só terá seu valor reconhecido socialmente se portar determinados produtos de grife.

Enfim, o menor infrator é resultado do descaso do Estado, que não garante a tantas crianças creches e educação de qualidade; áreas de esporte, arte e lazer; e a seus pais trabalho decente ou uma renda mínima para que possam subsistir com dignidade em caso de desemprego.

Portanto, não basta reduzir a maioria penal e instalar UPPs em áreas consideradas violentas. O traficante não espera que seu filho seja bandido, e sim doutor. Por que, junto com a polícia pacificadora, não ingressam, nas áreas dominadas por bandidos, escolas, oficinas de música, teatro, literatura e praças de esportes?

Punidos deveriam ser aqueles que utilizam menores na prática de crimes. E eles costumam ser hóspedes do Estado que, cego, permite que dentro das cadeias as facções criminosas monitorem, por celulares, todo tipo de violência contra os cidadãos.

Que tal criminalizar o poder público por conivência com o crime organizado? Bem dizia o filósofo Carlito Maia: "O problema do menor é o maior."

1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.
 - I. O autor do texto defende que não adianta reduzir a maioria penal, pois, no Brasil, não há intenção quanto à recuperação dos presos nem há política penitenciária, fazendo com que os adolescentes se distanciem de medidas socioeducativas e fiquem sujeitos à violência.
 - II. Defende-se, no texto, que devem ser garantidos creches e educação de qualidade, por exemplo, às crianças e trabalho digno ou uma renda mínima para os pais como forma de tratar a causa e não o efeito.
 - III. Defende-se, no texto, que os adultos devem ser punidos em vez de punir os menores de idade, uma vez que os pais devem se responsabilizar totalmente pelos atos praticados por seus filhos.

É correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

2. Observe o trecho transcrito do texto e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra destacada de acordo com o contexto.

“(...) a seus pais trabalho decente ou uma renda mínima para que possam **subsistir** com dignidade em caso de desemprego.”

- (A) Trabalhar.
- (B) Progredir.
- (C) Aprimorar-se.
- (D) Sobreviver.
- (E) Encher-se.

3. Observe a oração abaixo e, em seguida, assinale a alternativa em que a conjunção destacada estabeleça o **mesmo** sentido e tenha a **mesma** classificação que a conjunção destacada na oração abaixo.

“**Portanto**, não basta reduzir a maioria penal e instalar UPPs em áreas consideradas violentas.”

- (A) **Ainda que** medidas socioeducativas sejam implantadas, decisões mais rígidas devem ser tomadas.
- (B) **Desde que** a polícia começou a agir naquela região, o índice de criminalidade diminuiu.
- (C) O índice de roubo seguido de morte aumentou naquele bairro. **Logo**, medidas devem ser tomadas para garantir a segurança dos moradores.
- (D) É preciso garantir educação de qualidade **a fim de que** o índice de criminalidade diminua.
- (E) **Conforme** veiculado na mídia, houve rebelião.

4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fomos nós quem flagrou o ladrão no momento do roubo.
- (B) Perto de 50 detentos fugiu de um presídio do interior de São Paulo.
- (C) Não se poupou esforços para prender aquela quadrilha.
- (D) Construiu-se novos postos policiais na região metropolitana.
- (E) Parecem haver graves problemas com a segurança pública.

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Aquele policial lidou com muitos casos de fraticídio.
- (B) Eles estavam tentando compreender o esteriótipo do assassino.
- (C) A polícia detectou que o assassino era misantropo.
- (D) Prostou o ladrão de um só golpe.
- (E) O caso do assassinato daquela criança repercutiu em toda a imprensa.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

6. Considerando o disposto no artigo 142, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Os menores de _____ anos serão _____ e os maiores de _____ e menores de _____ anos _____ por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.

- (A) dezoito/ assistidos/ dezoito/ vinte e um/ representados
- (B) dezesseis/ assistidos/ dezesseis/ vinte e um/ representados
- (C) dezesseis/ representados/ dezesseis/ vinte e um/ assistidos
- (D) dezoito/ representados/ dezoito/ vinte e um/ assistidos
- (E) dezesseis/ representados/ dezesseis/ dezoito/ assistidos

7. O artigo 145, do ECA, dispõe que os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao(à)

- (A) Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.
- (B) Ministério Público estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.
- (C) Fundação Casa estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.
- (D) Poder Executivo Federal estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.
- (E) Poder Executivo Estadual estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

8. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

- (A) preservação das florestas, da fauna e da flora.
- (B) proteção ao meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas.
- (C) promoção de programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
- (D) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.
- (E) registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.

9. Conforme o disposto no artigo 26, da Constituição Federal de 1988, incluem-se entre os bens dos Estados as

- I. águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.
- II. áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros.
- III. ilhas fluviais e lacustres não pertencentes aos Municípios de outros Estados.
- IV. terras devolutas não compreendidas entre as da União.

É correto o que está contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

10. Segundo a Constituição Federal de 1988, constitui(em) crime(s) de responsabilidade do Prefeito Municipal:

- I. efetuar repasse que supere os limites definidos na Constituição Federal de 1988.
- II. não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês.
- III. enviar o repasse a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

É correto o que está contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.
- (E) III, apenas.

11. Considerando o disposto no artigo 131, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

O Conselho Tutelar é órgão _____ e _____, _____, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei nº 8.069/1990.

- (A) provisório/ autônomo/ não jurisdicional
- (B) permanente/ independente/ jurisdicional
- (C) provisório/ independente/ não jurisdicional
- (D) permanente/ autônomo/ não jurisdicional
- (E) permanente/ autônomo/ jurisdicional

12. Conforme o disposto no artigo 133, do ECA, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, será(ão) exigido(s) o(s) seguinte(s) requisito(s):

- I. residir no país ou países vizinhos que façam fronteira com o Brasil.
- II. idade superior a 18 anos e inferior a 60 anos.
- III. reconhecida idoneidade moral.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

13. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, expressos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

- (A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, mesmo em caso de flagrante delito ou desastre.
- (B) É plena a liberdade de associação de caráter paramilitar, para fins lícitos.
- (C) A propriedade poderá ou não atender a sua função social.
- (D) É garantido o direito de herança.
- (E) A lei penal não retroagirá para beneficiar o réu.

14. De acordo com a Lei nº 12.594/2012, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando que tenha praticado a falta por coação irresistível.
- (B) A decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa será proferida após manifestação do defensor e do Ministério Público.
- (C) A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos Planos de Atendimento Socioeducativo em intervalos não superiores a 3 (três) anos.
- (D) É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais.
- (E) Compete aos Estados elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional.

15. De acordo com a Lei nº 12.594/2012, compete à direção do programa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida, entre outras atribuições:

- I. selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida.
- II. supervisionar o desenvolvimento da medida.
- III. receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa.

É correto o que está contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

MÉDICO (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)

16. Paciente relata dor em região dorsal do polegar com irradiação para o antebraço há 6 meses. Relata piora ao desvio ulnar do carpo. A ultrassonografia evidencia inflamação da bainha comum dos tendões do abductor longo e extensor curto do polegar no punho, recebendo o diagnóstico de tenossinovite de De Quervain. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A patologia está associada à gota úrica.
- (B) Não há relação com o hipotireoidismo.
- (C) A patologia está associada ao desvio ulnar do carpo.
- (D) Existe forte associação com trabalhos forçados com desvio radial do carpo.
- (E) Não existe associação com a artrite reumatoide.

17. Assinale a alternativa correta sobre a epifisiólise de quadril.

- (A) A prevalência é maior no sexo feminino.
- (B) É comum a criança com epifisiólise queixar-se de dor nos joelhos.
- (C) Não está associada à obesidade.
- (D) Não existe relação entre a patologia e alterações endócrinas.
- (E) O tratamento mais utilizado é a artroplastia do quadril.

18. Paciente de 72 anos chega ao ambulatório com queixa de apraxia de marcha, quadro demencial e incontinência urinária. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável.

- (A) Alzheimer.
- (B) Demência vascular.
- (C) Hidrocefalia por pressão normal.
- (D) Incontinência urinária.
- (E) Parkinson.

19. Assinale a alternativa correta sobre a síndrome de Sturge-Weber.

- (A) É uma patologia de origem hereditária.
- (B) O angioma ocular aparece em 50% dos casos.
- (C) Está associada à Síndrome Beckwith-Wiedemann.
- (D) A mancha em vinho do Porto, apesar de não ser a condição essencial da síndrome, é o achado mais frequente da moléstia.
- (E) Existe associação com a Síndrome ângio-ósseo-hipertrófica.

20. Assinale a alternativa correta sobre a esclerodermia.

- (A) Existe maior prevalência em adultos do sexo masculino.
- (B) A forma localizada é mais comum em adultos.
- (C) A forma sistêmica é comum em crianças.
- (D) A região mais acometida é o tronco.
- (E) Existe comprometimento do esôfago.

21. Paciente do sexo feminino, de 12 anos, admitida referindo que há 2 meses tem lesões vesico-bolhosas tensas, isoladas e agrupadas, na face, no pescoço, no tronco, nas mucosas oral e genital sobre placas eritemato-edematosas circinadas. A paciente apresentava, ainda, astenia, febre ocasional e queda do estado geral, além de adenomegalias axilares e cervicais volumosas de 5 meses de evolução. Os exames laboratoriais mostraram anemia (Hb: 8,7), leucocitúria estéril (66.000), VHS: 98mm, Anti-Sm reagente, Anti-RNP reagente, C3 e C4 normais. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável.

- (A) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (B) Pênfigo bolhoso.
- (C) Dermatite herpetiforme.
- (D) Dermatite atópica
- (E) Dermatite por contato.

22. Assinale a alternativa correta sobre o pênfigo vulgar.

- (A) O pênfigo vulgar ocorre geralmente antes da terceira década de vida.
- (B) O elemento semiotécnico para um diagnóstico mais simples do pênfigo vulgar é a verificação do sinal de Nikolsky.
- (C) As primeiras manifestações clínicas do pênfigo vulgar desenvolvem-se na pele.
- (D) O pênfigo vulgar é caracterizado por exuberância de infiltrado inflamatório.
- (E) As manifestações sistêmicas são precedidas pelas orais.

23. As porfirias agudas constituem um complexo grupo de doenças hereditárias metabólicas de caráter autossômico dominante. Assinale a alternativa **incorreta** a respeito da patologia.

- (A) As manifestações clínicas das porfirias agudas decorrem dos distúrbios na via biossintética do heme, causados por deficiência de enzimas que deveriam funcionar na rota metabólica dessa substância.
- (B) O aumento das porfirinas, embora usual na descompensação do paciente com porfiria, pode ou não ser constatado em uma crise aguda.
- (C) O exame mais importante para confirmar-se o "estado de crise" é a quantificação das porfirinas plasmáticas ou urinárias.
- (D) Há vários sinais clínicos que devem levar o médico a pensar em crise de porfiria: dor abdominal, alteração da cor da urina, mudança no ritmo intestinal, déficit motor ou sensitivo-motor, vômitos, alteração do nível de consciência ou confusão mental.
- (E) O quadro algíco é efetivamente combatido com o uso de narcóticos como codeína, meperidina ou morfina.

24. Assinale a alternativa correta sobre a Síndrome de Wolf-Parkinson-White.

- (A) No ECG, é possível observar intervalo PR longo, normalmente sendo maior que 0,12 segundos em adultos, e maior que 0,09 em crianças.
- (B) No ECG, é possível observar QRS curto e espessado, geralmente com a duração inferior a 0,12 segundos.
- (C) O tratamento de escolha é o farmacológico.
- (D) Sua patogenia está relacionada ao fato de os portadores dessa síndrome apresentarem duas vias alternativas de condução para chegar ao ventrículo durante o ritmo sinusal: a via normal, que passa pelo NAV (nó atrioventricular), e a via anômala, conhecida como feixe de Kent.
- (E) É a mais frequente das síndromes de pós-excitação caracterizadas por despolarização ventricular precoce.

25. Assinale a alternativa que apresenta a alteração esperada (mais comum) no eletrocardiograma de um paciente chagásico crônico.

- (A) O intervalo PR é curto com presença de um empastamento no início do complexo QRS, denominado onda delta.
- (B) O intervalo QRS é curto (0,13s), rS em V1, QS em V5 e V6.
- (C) Bloqueio de ramo esquerdo típico.
- (D) Taquicardia sinusal.
- (E) Associação de bloqueio de ramo direito com bloqueio divisional ântero-superior esquerdo.

26. Assinale a alternativa correta sobre a fibrose cística.

- (A) O Teste do Suor é utilizado para o diagnóstico da patologia, que mede a concentração de sódio e cloro no suor do indivíduo, sendo a dosagem de cloro a mais precisa.
- (B) O Teste do Suor é utilizado para o diagnóstico da patologia, que mede a concentração de sódio e cloro no suor do indivíduo, sendo a dosagem de sódio a mais precisa.
- (C) O Teste do Pezinho faz o diagnóstico definitivo.
- (D) É uma doença genética de herança autossômica dominante.
- (E) Em países de primeiro mundo, a sobrevida média é de 20 anos.

27. Assinale a alternativa que apresenta a patologia que pode ser confundida com os achados radiológicos da beriliose.

- (A) Carcinoma de células gigantes.
- (B) Sarcoidose.
- (C) Asbestose.
- (D) Silicose.
- (E) Carcinoma broncogênico.

28. Sobre a Doença Inflamatória Pélvica (DIP), assinale a alternativa correta.

- (A) É caracterizada pela presença de glândulas endometriais e estroma fora da musculatura da cavidade uterina.
- (B) Está relacionada ao ciclo gravídico-puerperal ou com cirurgias nos órgãos pélvicos.
- (C) As mulheres com DIP não apresentam risco de gestação ectópica e infertilidade tubária.
- (D) É uma patologia frequente nas mulheres que não menstruam.
- (E) É uma infecção do trato genital superior, causada pela ascensão intracanalicular de microrganismos da endocérvice para a mucosa endometrial e da tuba uterina.

29. As vulvovaginites constituem uma das principais causas de consulta ginecológica. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta:

- (A) A tricomoníase é a principal causa de vulvovaginite. Os principais sintomas da tricomoníase são fluxo vaginal aumentado, que se torna abundante e bolhoso, com coloração marrom, hiperemia e edema da vulva.
- (B) A disúria, a polaciúria e a dor suprapúbica são os sintomas menos comuns da tricomoníase.
- (C) A maioria das pacientes com tricomoníase apresentam sintomas. Porém, são menos intensos logo após o período menstrual ou durante a gravidez.
- (D) A vulvovaginite fúngica frequentemente ocorre antes da menarca e diminui sua incidência após esta.
- (E) A vaginose bacteriana não está associada a salpingites, peritonites, endometrioses pós-parto ou cesariana.

30. A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico crônico e, em muitos casos, incapacitante. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A esquizofrenia se inicia geralmente em jovens e mesmo em crianças, e caracteriza-se pela presença de sintomas psicóticos, depressivos, de desorganização, negativos e perdas cognitivas.
- (B) A característica clássica da esquizofrenia tipo paranoide é uma perturbação acentuada da função motora, que pode envolver estupor, negativismo, rigidez, excitação ou posturas bizarras.
- (C) O tipo desorganizado de esquizofrenia caracteriza-se pela preocupação com um ou mais delírios ou alucinações auditivas frequentes, classicamente delírios de perseguição ou grandeza.
- (D) O tipo catatônico de esquizofrenia (anteriormente denominado hebefrênico), caracteriza-se por pacientes tensos, desconfiados, resguardados, reservados e, às vezes, hostis ou agressivos.
- (E) Os sintomas positivos incluem embotamento afetivo e pobreza da fala ou de seu conteúdo, bloqueio, auto-higiene pobre, falta de motivação, anedonia e retraimento social. Os sintomas negativos incluem delírios e alucinações.

31. Sobre os transtornos de ansiedade, assinale a alternativa correta.

- (A) O transtorno de pânico costuma ocorrer no final da vida adulta e os pacientes geralmente podem designar a fonte de seu medo. O ataque geralmente dura mais de uma hora.
- (B) Os pacientes com agorafobia preferem sair sozinhos de casa, não gostam de ser acompanhados por amigos ou membros da família.
- (C) No Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), entre os adultos, as mulheres têm maior probabilidade de serem afetadas do que os homens, mas, entre adolescentes, meninos e meninas têm probabilidade igual de serem afetados.
- (D) O transtorno de Tourette e o TOC têm idade de início e sintomas semelhantes. O transtorno de Tourette apresenta como sintomas característicos tiques motores e vocais que ocorrem com frequência e quase todos os dias.
- (E) A fobia social é mais comum que a fobia específica. A idade de pico para o início da fobia social é após os 40 anos.

32. Sobre a anemia ferropênica, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Nas mulheres em idade reprodutiva, a principal causa da anemia é a perda menstrual excessiva.
- (B) A dieta deficiente isolada não é causa frequente de carência de ferro, mas a sua associação com perdas excessivas ou com aumento da demanda aumenta o risco de instalação da anemia.
- (C) Os sintomas mais comuns são: fadiga, perda da capacidade de exercer as atividades habituais, irritabilidade, cefaleia, palpitações e dispneia aos esforços.
- (D) A causa menos comum de diminuição de absorção do ferro é acloridria.
- (E) Os pacientes com insuficiência renal em tratamento com hemodiálise podem tornar-se deficientes em ferro devido às restrições da dieta, às perdas na diálise e à estimulação exógena da eritropoiese pela eritropoietina.

33. Assinale a alternativa correta sobre a hemocromatose.

- (A) A Hemocromatose Hereditária (HH) é uma doença genética caracterizada pela absorção diminuída do ferro dietético, resultando em uma diminuição patológica dos estoques de ferro no organismo.
- (B) O fígado é o único órgão que não é afetado na hemocromatose.
- (C) São raros os casos que ocorrem hipogonadismo, disfunção erétil e alteração na distribuição de pelos.
- (D) Os sintomas iniciais da doença podem ser inespecíficos, caracterizados por fadiga, artralgias e mal-estar.
- (E) O termo hemocromatose tem sido aplicado também para indicar pacientes com sobrecarga de ferro. Estes pacientes apresentam lesão no fígado, sendo que o único órgão não afetado é o coração.

34. Sobre hipertireoidismo e tireotoxicose, assinale a alternativa correta.

- (A) Hipertireoidismo refere-se à síndrome causada por excesso de hormônio tireoidiano.
- (B) A tireotoxicose refere-se à hiperatividade tireoidiana.
- (C) A doença de Graves é uma síndrome caracterizada por hipertireoidismo, oftalmopatia, dermopatia localizada (mixedema pré-fibular) e, frequentemente, acropaquia.
- (D) A doença de Graves é mais recorrente em homens do que em mulheres.
- (E) No idoso, a inapetência, a perda de peso, a depressão e o isolamento social acompanhados de aumento da frequência cardíaca são referidos como síndrome do hipertireoidismo apático.

35. Sobre o tratamento da Diabetes, assinale a alternativa correta.

- (A) As glitazonas elevam a insulinemia, não promovem a adipogênese e aumentam a produção hepática de glicose.
- (B) As sulfonilureias diminuem a secreção de insulina.
- (C) As meglitinidas estimulam a secreção lenta de insulina e melhoram o pico de insulinemia pré-prandial. Tem grande efeito na glicemia de jejum.
- (D) A metformina eleva os níveis plasmáticos de insulina e diminui a fosforilação do receptor de insulina.
- (E) Os inibidores da alfa-glicosidase melhoram a função das células-beta e a resistência à insulina e reduzem a progressão de intolerantes à glicose para *Diabetes mellitus* tipo 2.

36. Sobre as doenças pancreáticas, assinale a alternativa correta.

- (A) O pâncreas divisum resulta da ausência da fusão entre os ductos pancreáticos das porções ventral e dorsal do pâncreas durante o quinto mês de gestação. Trata-se da anomalia pancreática menos comum.
- (B) A pancreatite hereditária acomete mais frequentemente homens e os sintomas surgem entre os 5 e 10 anos de idade.
- (C) A hipertrigliceridemia é uma importante causa de pancreatite aguda não traumática em pacientes sem litíase biliar ou antecedentes de uso de álcool.
- (D) A dor abdominal é a principal queixa da maioria dos pacientes com pancreatite aguda. A dor piora na posição genupeitoral, e há melhora na posição supina.
- (E) Os pacientes com pancreatite aguda leve não devem ser mantidos em jejum oral, já que o jejum aumenta a secreção de enzimas pancreáticas.

37. Sobre a pancreatite crônica, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As pancreatites crônicas se caracterizam pela substituição irreversível do parênquima pancreático normal por áreas de fibrose e pelo surgimento de estenose e irregularidades dos ductos pancreáticos.
- (B) Portadores de desnutrição proteica grave podem evoluir com lesões compatíveis com diagnóstico de pancreatite crônica.
- (C) Qualquer situação que resulte em dificuldade de drenagem da secreção pancreática para o duodeno pode provocar pancreatite crônica.
- (D) A *Diabetes mellitus* é uma das manifestações iniciais da pancreatite crônica.
- (E) Durante a evolução da pancreatite crônica, os doentes podem desenvolver hemorragias digestivas exteriorizadas sob forma de hematêmese ou melena.

38. Sobre a nutrição enteral, assinale a alternativa correta.

- (A) Sempre que o trato gastrointestinal estiver estrutural e com funcionamento íntegro, é preferível usar a Terapia de Nutrição Parenteral.
- (B) São indicações para o uso de Terapia de Nutrição Enteral: doença terminal e sangramento gastrointestinal.
- (C) São contraindicações para o uso de Terapia de Nutrição Enteral: queimaduras e anorexia.
- (D) O conceito de nutrição enteral precoce, estabelecido nos últimos anos, consiste na oferta de nutrição enteral nas primeiras 12 horas após a ocorrência de um evento traumático ou infeccioso.
- (E) A pneumonia aspirativa é considerada a complicação de maior gravidade na Terapia de Nutrição Enteral.

39. Sobre a desnutrição, assinale a alternativa correta.

- (A) O Marasmo é considerado como estágio inicial da caquexia.
- (B) O Marasmo não responde ao tratamento nutricional.
- (C) A desnutrição proteico-calórica mista é uma condição leve, que não exige tratamento imediato.
- (D) Um sinal de Marasmo é a queda de cabelo, fato que não ocorre no Kwashiorkor.
- (E) O Marasmo é de fácil diagnóstico clínico do paciente, que se encontra emagrecido e sem massa gordurosa e muscular, mostrando peso inferior a 80% do ideal.

40. Sobre triagem e avaliação nutricional, assinale a alternativa correta.

- (A) A circunferência da medida da panturrilha é a medida mais sensível de massa muscular para pessoas idosas.
- (B) A relação da cintura para o quadril não permite diferenciar a obesidade ginoide da androide.
- (C) A espirometria não é um método auxiliar na avaliação nutricional.
- (D) O uso do dinamômetro ou força de aperto de mão não dominante não é indicado em pacientes cirróticos.
- (E) A fórmula de Chumlea não pode ser aplicada em pacientes acamados, já que esta fórmula necessita da verificação do peso corporal na posição supina.

41. Sobre a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), assinale a alternativa correta.

- (A) Entre os mecanismos facilitadores do refluxo, o relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago é o menos relevante.
- (B) A DRGE pode apresentar-se na forma não erosiva. Nesse caso, a presença de pirose/ regurgitação com frequência mínima de 3 vezes/ semana, por período igual ou superior a 8 semanas, sugere o diagnóstico de DRGE.
- (C) O sintoma mais característico da DRGE é a pirose, tipicamente referida de 10 minutos a 3 horas após a refeição.
- (D) A ausência de pirose exclui a possibilidade da DRGE.
- (E) Os achados de erosões esofágicas ao exame endoscópico são menos comuns nas manifestações atípicas da doença.

42. Sobre a dor abdominal, assinale a alternativa correta.

- (A) A dor visceral resulta da irritação do peritônio parietal.
- (B) A dor somática resulta do estímulo de nociceptores viscerais, presentes nas paredes dos órgãos intra-abdominais.
- (C) A dor visceral geralmente é mais intensa e bem localizada do que a dor somática.
- (D) Um exemplo de dor referida é a dor no ombro secundária à irritação diafragmática por abscesso subfrênico ou hepático.
- (E) Dor que piora com o paciente deitado, com flexão da perna direita sobre o quadril: irritação do músculo psoas, exemplo: abscesso secundário à doença de Crohn.

43. Sobre as doenças do estômago e do duodeno, assinale a alternativa correta.

- (A) A gastrite autoimune acomete principalmente o antro e raramente o corpo e fundo gástricos.
- (B) Indivíduos com gastrite crônica, associada ao *Helicobacter pylori*, predominantemente antral, perdem a capacidade de secretar ácido e não têm risco para o desenvolvimento de úlcera duodenal.
- (C) Indivíduos com gastrite crônica, associada ao *Helicobacter pylori*, mais intensa no corpo, terão uma secreção ácida aumentada, em consequência da renovação progressiva da mucosa oxíntica.
- (D) O comprometimento do estômago pela doença de Crohn é frequente, sendo sempre sintomática.
- (E) Muitos pacientes com úlcera duodenal podem referir hiperfagia e ganho ponderal.

44. Sobre as hepatites crônicas, assinale a alternativa correta.

- (A) Define-se como hepatite crônica a persistência de reação inflamatória que se mantém sem melhora pelo prazo mínimo de um ano.
- (B) Na hepatite C, pacientes com genótipo tipo 2 e 3 têm piores chances de apresentar respostas sustentadas ao tratamento antiviral, enquanto os pacientes com tipo 1 têm excelente prognóstico.
- (C) O vírus das hepatites delta, genótipo 1, que é encontrado mundialmente, geralmente causa hepatite na forma leve, pouco frequentemente associada à cirrose hepática e carcinoma hepatocelular.
- (D) A hepatite autoimune é caracterizada por predomínio em homens e não possui boa resposta ao tratamento com imunossuppressores.
- (E) Exceto por acetaminofeno, que induz uma hepatotoxicidade intrínseca (dose dependente e predizível), a maioria das hepatites medicamentosas é idiossincrática.

45. Sobre a Doença de Wilson, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A idade de expressão clínica da doença é muito variável, embora raramente as manifestações clínicas da doença aconteçam antes dos 5 anos de idade.
- (B) É uma enfermidade metabólica transmitida por herança autossômica recessiva associada ao acúmulo de ferro no fígado, cérebro, na córnea e nos rins.
- (C) A apresentação clínica mais comum é a doença hepática aguda ou crônica.
- (D) Os sintomas neurológicos são mais tardios e compõem-se desde alterações discretas do comportamento até psicose franca ou manifestações similares às doenças de Parkinson.
- (E) Um sinal clínico importante é o anel de Kayser-Fleischer.

46. Sobre as doenças hepáticas causadas por protozoários, assinale a alternativa correta.

- (A) A histoplasmose é causada pelo protozoário *Echinococcus*.
- (B) Na amebíase, as lesões podem ser únicas ou múltiplas e mais frequentemente estão localizadas no lobo hepático inferior esquerdo.
- (C) A anemia não está presente na malária.
- (D) Os locais mais afetados pelas leishmanias são o fígado, o baço, a medula óssea, os pulmões e o tecido linfóide do intestino delgado.
- (E) Na amebíase, ocorre acometimento somente do fígado ou dos pulmões, não ocorrendo a possibilidade de atingir o Sistema Nervoso Central e outros órgãos.

47. Sobre as doenças exantemáticas, assinale a alternativa correta.

- (A) O sarampo assintomático é muito comum, sendo o número de casos subclínicos muito alto.
- (B) Na rubéola, não existe apresentação assintomática.
- (C) O exantema na rubéola é preferencialmente macular, com início em membros inferiores. A febre geralmente é elevada e persiste por vários dias.
- (D) A varicela no início da gestação pode causar aborto. No entanto, quando a doença ocorre no final da gestação, não há riscos para mãe e/ou criança.
- (E) O período de transmissibilidade da varicela é de cerca de 48 horas antes do primeiro sintoma até o aparecimento da última crosta.

48. Sobre a mononucleose infecciosa, assinale a alternativa correta.

- (A) Na maioria dos casos de mononucleose infecciosa, a febre ultrapassa duas semanas.
- (B) O período de incubação da mononucleose infecciosa é de uma a três semanas.
- (C) A mononucleose infecciosa é caracterizada clinicamente por febre, amigdalofaringite, linfadenomegalia generalizada e hepatoesplenomegalia.
- (D) Na mononucleose infecciosa, a faringe encontra-se muito hiperemiada, e o exsudato de amígdalas invade os tecidos adjacentes à loja amigdaliana, diferentemente do que ocorre na difteria.
- (E) A linfadenomegalia é indolor. Está presente no final do quadro clínico da doença.

49. Sobre as *Estafilococcias*, assinale a alternativa correta.

- (A) Na síndrome da pele escaldada estafilocócica, há envolvimento de mucosas, o que é importante para o diagnóstico diferencial com síndrome de Lyeel, relacionada à reação das drogas.
- (B) A síndrome do choque tóxico ocorre em mulheres durante o período menstrual, geralmente relacionada ao uso de absorventes internos por longo período. A hipoalbuminemia é um achado laboratorial incomum; as hemoculturas costumam ser positivas.
- (C) A gastroenterocolite relacionada a *S. aureus* (toxi-infecção alimentar) causa mal-estar associado a náuseas e vômitos, com início após 12 horas da ingestão de alimento contaminado por enterotoxinas. A enterotoxina estafilocócica não é termossensível, portanto, o cozimento evita a ocorrência desta doença.
- (D) Impetigo é pouco contagioso, não há a necessidade de manter o paciente isolado.
- (E) A carbunculose caracteriza-se como uma infecção mais profunda, resultando da coalescência de diversos folículos pilosos acometidos e aprofundamento da lesão pelo tecido subcutâneo.

50. Sobre a nefropatia diabética, assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira fase da nefropatia diabética é conhecida como microalbuminúria caracterizada por albuminúria entre 30mg/dia e 100mg/dia.
- (B) A segunda fase da nefropatia diabética, conhecida como fase de hiperfiltração, é caracterizada por um incremento na taxa de filtração glomerular.
- (C) A terceira fase da nefropatia diabética é a fase de macroalbuminúria e é caracterizada pela presença de 300mg/dia.
- (D) Na fase de hiperfiltração, o paciente começa a notar progressivamente a presença de urina espumosa.
- (E) Em indivíduos normais, a excreção de proteínas na urina não é superior a 90mg/dia a 200mg/dia para adultos ou 200mg/dia para crianças.