



**DENTISTA**

**21. (CONCURSO MAURITI/2018). Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS), assinale entre as alternativas a seguir aquela que se apresenta INCORRETA:**

- A) Constituem-se em arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial.
- B) É representado pelo trabalho da equipe multidisciplinar que assiste toda a população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo às suas necessidades de saúde.
- C) Compreende os serviços de Emergência e Urgência como portas de entrada exclusivas ao sistema, tendo em vista a sua característica de livre demanda ou “portas abertas”.
- D) É uma resposta à fragmentação do sistema público de saúde brasileiro e propõe a construção processual de sistemas integrados de saúde que articulem os territórios sanitários, os componentes da integração e a gestão da clínica.
- E) Tem na atenção básica estruturada o acesso do usuário ao sistema, racionalizando a assistência sob a lógica da complexidade, deles partindo o referenciamento ao longo da rede.

**22. (CONCURSO MAURITI/2018). A respeito da Política Nacional de Humanização (2003) e considerando os seus princípios norteadores, pode-se**

**afirmar que é INCORRETA a alternativa:**

- A) Preconiza a valorização da dimensão subjetiva e social permeando todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo processos integradores e promotores responsabilização.
- B) Tem como foco a atuação no tratamento da doença pelo modelo biomédico de assistência.
- C) Propõe o fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade.
- D) Estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
- E) Utiliza da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção da autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.

**23. (CONCURSO MAURITI/2018). No âmbito da Epidemiologia em Saúde Bucal, pode-se afirmar que está INCORRETA a afirmativa:**

- A) Os principais objetivos dos levantamentos epidemiológicos são: conhecer a prevalência e severidade da doença; conhecer as necessidades de tratamento associadas a ela; permitir a análise do comportamento da doença ao longo do tempo; documentar a distribuição da doença; permitir o planejamento em saúde pública; subsidiar, de maneira indireta, a avaliação dos serviços.



- B) Com a introdução do índice CPO-D, obtido através da contagem de dentes cariados, perdidos e obturado, tornou-se disponível um indicador de avaliação das condições de cárie dentária em populações, usado até hoje, apesar das inúmeras modificações.
- C) A idade de 12 anos é adotada internacionalmente como parâmetro básico para uso do indicador.
- D) Os valores do índice correspondem aos seguintes graus de severidade: muito baixo (0,0 a 1,1), baixo (1,2 a 2,6), moderado (2,7 a 4,4), alto (4,5 a 6,5) e muito alto (6,6 e mais).
- E) Estima a experiência presente e futura do ataque da cárie dental à dentição permanente.

**24. (CONCURSO MAURITI/2018). Com relação ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção da cárie, julgue os itens subsequentes, e assinale a alternativa CORRETA:**

- ( ) O principal responsável pela ação do flúor tópico é o fluoreto de cálcio (CaF<sub>2</sub>), que age como um reservatório de flúor no meio bucal.
- ( ) As opacidades fluoróticas são simétricas, arredondadas e localizadas; as não fluoróticas, por sua vez, são difusas e transversais.
- ( ) As lesões localizadas no esmalte, quando paralisadas, se caracterizam por apresentar superfície lisa e brilhante, podendo ter coloração escura ou branca.
- ( ) As lesões que se estabelecem no esmalte, no cimento ou na dentina hípidos são denominadas lesões de cárie primárias.

( ) A lesão de cárie oclusal apresenta forma de cone com o ápice voltado para a junção amelodentinária.

- A) V, F, V, V, F  
B) V, V, V, F, F  
C) F, F, V, V, V  
D) F, V, F, V, F  
D) F, V, F, F, V

**25. (CONCURSO MAURITI/2018). Para o controle de infecção durante o atendimento odontológico, são necessárias algumas medidas de biossegurança. O conjunto de meios adotados para impedir a contaminação de micro-organismos numa determinada área pode ser definido como:**

- A) assepsia  
B) antisepsia  
C) degermação  
D) descontaminação  
E) esterilização

**26. (CONCURSO MAURITI/2018). Após os procedimentos de exodontia de terceiros molares, complicações como alveolite e infecções podem ocorrer. O manejo adequado destas condições define a remissão dos sintomas e o restabelecimento da hígidez do paciente. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o tratamento farmacológico considerado adequado para o manejo da alveolite e de infecções com micro-**



**organismos anaeróbicos e aeróbicos (local ou sistêmica):**

- A) talidomida associada a metotrexato, tendo em vista que é necessário o uso de agentes imunossupressores.
- B) bochecho de solução alcoólica a 10% de concentração, pois trata-se de bacteremia transitória local.
- (C) analgesia sistêmica e espera da remissão dos sintomas sem, em virtude de ser uma condição clínica autolimitada.
- (D) clindamicina, em virtude do espectro de ação amplo.
- (E) Curativo com anestésico local e hidróxido de cloroquina, a fim de limitar o desconforto doloroso e a inflamação.

**27. (CONCURSO MAURITI/2018). Para orientar corretamente os pacientes em relação à necessidade de autoexame para prevenção do Câncer Bucal, é necessário que o cirurgião dentista tenha pleno conhecimento da anatomia regional, inclusive da língua, que tem uma estrutura anatômica complexa, e em cujo terço posterior, encontram-se:**

- A) glândulas salivares serosas, que fazem parte da tonsila palatina.
- B) folículos linfoides, que são conhecidos como tonsila lingual e fazem parte do anel de Waldeyer.
- C) glândulas salivares maiores, chamadas de glândulas sublinguais.
- D) órgãos linfoides, que fazem parte da úvula lingual.

- E) órgãos linfoides e receptores gustatórios, que fazem parte da prega glossoepiglótica.

**28. (CONCURSO MAURITI/2018). As doenças infectocontagiosas acometem considerável parte da população, e em sua fase prodrômica, apresentam-se por vezes assintomáticas, sendo estas passíveis de transmissão, em ambiente de atendimento para a equipe de saúde bucal, caso haja uso inadequado das medidas de Biossegurança. No que concerne às doenças infectocontagiosas de risco ocupacional frequente para a Equipe de saúde bucal, assinale apenas a alternativa INCORRETA:**

- A) As hepatites virais são infecções do fígado causadas por vírus e constituem importante problema de saúde pública. Podem ser causadas por agentes hepatotrópicos, em que o fígado é o principal órgão-alvo da replicação viral (ex.: vírus da hepatite A, da hepatite B) e por agentes não hepatotrópicos (ex. vírus da dengue, febre amarela, citomegalovírus).
- B) A principal forma de transmissão do vírus da hepatite B é a via fecal-oral pela ingestão de água e alimentos contaminados, sendo o vírus eliminado em grande quantidade nas fezes duas semanas antes e até uma semana depois do início do quadro clínico.
- C) A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium leprae, que tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa



patogenicidade), e essas propriedades dependem das características intrínsecas do bacilo, de sua relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do meio.

D) Em relação à tuberculose, os grupos mais vulneráveis à doença são as pessoas vivendo com HIV/ AIDS, pessoas em situação de rua, população indígena, profissionais de saúde e a população privada de liberdade.

E) São considerados sinais e sintomas clínicos sugestivos de imunodeficiência grave que demandam urgência relativa no encaminhamento dos pacientes portadores do HIV para serviço de referência a Pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*, e a Candidíase esofágica ou de traqueia, brônquios ou pulmões.

**29. (CONCURSO MAURITI/2018). A execução de procedimentos anestésicos pelo cirurgião dentista requer conhecimento das estruturas anatômicas da cabeça e do pescoço. Considerando isto, assinale a alternativa que descreve, respectivamente em relação ao bloqueio pterigomandibular, os nervos submetidos à anestesia e os músculos que podem ser afetados acidentalmente, causando trismo:**

- A) nervos alveolar inferior e mentoniano; digástrico.
- B) nervos lingual e bucal; tireoglosso.
- C) nervos alveolar e gengival; pterigoideo distal.
- D) nervos alveolar inferior, lingual e bucal; pterigoideo medial.

E) nervos alveolar inferior e superior; temporal.

**30. (CONCURSO MAURITI/2018). De acordo com a Organização Mundial da Saúde, anemia é um problema de saúde pública global, que afeta o estado de saúde, a capacidade laborativa e a qualidade de vida de cerca de 2 bilhões de pessoas, cerca de um terço da população mundial. A Deficiência de Ferro (DF) é responsável por 75% de todos os casos de anemia. Carências nutricionais causam repercussões clínicas relevantes na cavidade bucal, e ao cirurgião dentista cabe o correto diagnóstico destas alterações. Assim sendo, podemos afirmar que a anemia por deficiência de ferro repercute na cavidade bucal sob a forma de:**

- A) periodontite infecciosa e hemorragia
- B) síndrome da ardência bucal e osteomielite
- C) queilite exfoliativa e fraturas mandibulares.
- D) nevralgia do trigêmeo e alveolite
- E) atrofia de papilas linguais e atrofia de mucosa

**31. (CONCURSO MAURITI/2018). Um paciente adscrito ao território da unidade básica de saúde, sob acompanhamento e tratamento psicofarmacológico para ansiedade e depressão, faz uso crônico de Rivotril (um benzodiazepínico) diariamente, conforme dados colhidos do seu prontuário. Este paciente necessita ser submetido à cirurgia para extração múltipla, sendo necessário realizar a prescrição correta para analgesia pós-**



**operatória. Considerando apenas os aspectos citados, deve-se evitar a prescrição de:**

- A) dipirona
- B) paracetamol com codeína
- C) ibuprofeno
- D) diclofenaco sódico ou potássico.
- E) nimesulida

**32. (CONCURSO MAURITI/2018)**

**Considerando a grande frequência de abordagens cirúrgicas realizadas na prática odontológica, o controle da dor e da inflamação são indispensáveis para o bem estar do paciente no período pós-operatório. Assim sendo, a alternativa CORRETA, no que diz respeito aos fármacos antiinflamatórios e analgésicos:**

- A) A classe de fármacos denominados anti-inflamatórios esteroidais inclui diversos ácidos orgânicos independentes, que compartilham propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas, sendo utilizados no tratamento da dor branda a moderada.
- B) Os antiinflamatórios esteroidais inibem as cicloxigenase 1 e a cicloxigenase 2, isoenzimas da cicloxigenase, que assim agem como inibidores diretos da síntese de prostaglandina e tromboxano a partir do ácido araquidônico.
- C) Os corticosteroides promovem a inibição da fosfolipase A2 impedindo a liberação do ácido araquidônico seguido de seus metabólitos (prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano).

D) Paracetamol é o analgésico de escolha para manejo de dores leves a moderadas e possui ação analgésica, ainda que não seja dotado de ação anti-inflamatória. No entanto, sua administração submete o paciente a diminuição da função plaquetária, efeitos gastrointestinais e renais, o que limita seu uso em gestantes.

E) Como analgésicos indicados para dor pós operatória leve ou moderada, os opióides são comumente utilizados na Odontologia, tendo nos efeitos respiratórios seus principais efeitos adversos e limitantes de dose.

**33. (CONCURSO MAURITI/2018).**

**Enquanto doença sistêmica, o diabetes tem sido relacionada a alguns problemas bucais. Considere os itens abaixo enumerados, quanto às repercussões bucais associadas ao controle metabólico deficiente em pacientes diabéticos:**

- I. candidíase oral;
- II. hipersalivação, com saliva de alta viscosidade;
- III. líquen plano e xerostomia;
- IV. glossite rombóide mediana.
- V. carcinoma verrucoso

**Estão corretas somente:**

- A) I, III e IV.
- B) II, III e V.
- C) I, e IV.
- D) III e V.
- E) I e V.

**34. (CONCURSO MAURITI/2018).**

**Paciente do sexo Feminino, 57 anos, apresentou tontura, mal-estar, sudorese,**



**formigamento nas pontas dos dedos e visão turva, sem perda de consciência, logo após ser submetido ao procedimento anestésico local, durante tratamento odontológico. Ao tomar o pulso, o cirurgião dentista constatou aumento da frequência cardíaca. A partir dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, trata-se provavelmente de um quadro de:**

- A) síncope vasovagal.
- B) choque anafilático
- C) crise hipertensiva.
- D) síncope extrapiramidal.
- E) transtorno convulsivo leve.

**35. (CONCURSO MAURITI/2018).**

**Paciente do sexo feminino, 63 anos, relatou durante a anamnese em consulta pré-operatória para exodontia dos elementos 45 e 46 com pulpite irreversível e extensa perda coronária, estar fazendo uso de bisfosfonatos (Alendronato). Uma possibilidade de complicação neste caso é a ocorrência de:**

- A) hiperssalivação.
- B) hipossalivação.
- C) parestesia perioral.
- D) osteonecrose dos maxilares.
- E) manchamento de tecidos moles bucais.

**36. (CONCURSO MAURITI/2018). Quanto à semiotécnica dos tecidos moles bucais, Indique a lesão que apresenta diascopia positiva:**

- A) Mancha melânica
- B) Granuloma
- C) Hemangioma

- D) Papiloma
- E) Melanoma

**37. (CONCURSO MAURITI/2018)**

**Traumatismos dentoalveolares são ocorrências comuns em indivíduos em idade escolar e exigem que o cirurgião-dentista seja capaz de instituir diagnóstico e terapêutica adequados, a fim de evitar prejuízos funcionais e estéticos de grande impacto na qualidade de vida. Considerando as assertivas e julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F), selecione entre as alternativas, aquela que apresenta a sequência CORRETA:**

- ( ) Concussões e subluxações representam lesões menores do ligamento periodontal e da polpa, causados por impacto agudo.
  - ( ) A concussão pode resultar em hemorragia e edema no interior do ligamento periodontal, gerando sensibilidade à percussão e à mastigação.
  - ( ) A subluxação provoca ruptura de algumas fibras do ligamento periodontal, sem causar deslocamento, sendo freqüente a ocorrência de ligeiro sangramento do sulco gengival.
  - ( ) O tratamento das concussões e subluxações incluem dieta líquida e alívio das interferências oclusais, além de imobilização dentária rigorosa por 90 dias para possibilitar o adequado reparo ósseo.
- A) V,F,V,F
  - B) V,V,F,V
  - C) F,V,V,F



D) F,F,V,F

E) V,V,V,F

**38. (CONCURSO MAURITI/2018 Na abordagem de dentes decíduos ou permanentes jovens com necessidade de terapia pulpar, é possível afirmar CORRETAMENTE que:**

A) O capeamento pulpar direto de exposições pulpares cariosas em dentes decíduos tem um prognóstico favorável, sendo exceção a falha terapêutica.

B) O tamanho da exposição pulpar é fator determinante no prognóstico do capeamento pulpar direto.

C) Em virtude das dificuldades na determinação da situação pulpar e do prognóstico imensamente superior do capeamento pulpar direto, a pulpotomia não pode ser recomendada na denteição decídua.

D) O capeamento pulpar direto das exposições pulpares pontuais, seja mecânica ou cariada, tem um prognóstico desfavorável no dente permanente imaturo.

E) O uso de materiais dentários à base de hidróxido de cálcio é amplamente relatado como detentor de resposta mais favorável em capeamentos pulpares diretos, apresentando bom desempenho clínico e custo-benefício.

**39. (CONCURSO MAURITI/2018). No tratamento da doença periodontal, um dos fatores importantes no estímulo à reinserção do ligamento periodontal consiste:**

A) na remoção do tecido inflamatório e no debridamento de contaminantes da superfície radicular como as endotoxinas bacterianas.

B) no controle do tecido de granulação e na indução de pequenos defeitos e poros no cimento adjacente à lesão.

C) na indução do crescimento de epitélio sobre a superfície radicular e na inibição dos fibroblastos gengivais.

D) na aplicação de solução fluoretada sobre a superfície radicular para estimular a mineralização do cimento.

E) na permanência do tecido de granulação que aumenta a vascularização local após o período de reparo periodontal.

**40. (CONCURSO MAURITI/2018). Os preparos cavitários para restaurações são constituídos de várias partes, principalmente paredes e ângulos. Como se chama o ângulo formado pela união de duas paredes circundantes?**

A) Ângulo cavo-superficial.

B) Ângulo diedro de segundo grupo.

C) Ângulo chanfrado

D) Ângulo cérvico-proximal.

E) Ângulo diedro de primeiro grupo.

**41. (CONCURSO MAURITI/2018). A escolha de materiais dentários funcionais, a exemplo daqueles que liberam flúor como o ionômero de vidro, para o planejamento de restauração em pacientes que têm alto índice de cáries é desejável, porque o flúor liberado:**



- (A) não garante as propriedades anticariogênicas, mas inibe o metabolismo bacteriano por meio da formação de ácido hidrofluórico.
- (B) forma ácido hidrofluórico, que tem propriedades anticariogênicas, mas este ácido pode induzir a alteração do esmalte remanescente e a formação de novas cáries.
- (C) tem longa duração e, dessa forma, a restauração garante a integridade do elemento dentário sem o aparecimento de novas cáries.
- (D) além das propriedades anticariogênicas, inibe o metabolismo bacteriano por meio da formação de ácido hidrofluórico.
- (E) tem longa duração, mas não tem boas propriedades adesivas, o que pode acelerar o processo de microfissuras e infiltrações.

**42. (CONCURSO MAURITI/2018) O isolamento do campo operatório corresponde a um conjunto de procedimentos realizados na cavidade bucal, com a finalidade de eliminar a umidade e proporcionar condições assépticas para o tratamento e restauração dos dentes, conforme as indicações dos materiais a serem empregados. Assim sendo, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a abordagem a ser utilizada para o tratamento restaurador adesivo com resina composta no elemento 11 com extensa lesão cervical não cariiosa, cuja margem encontra-se parcialmente encoberta por gengiva:**

- A) Não é necessário o uso de isolamento absoluto, bastando que se realize o controle de umidade com sugador e rolos de algodão.
- B) Utilização de isolamento relativo com grampo W8A posicionado no elemento 11.
- C) Utilização de isolamento absoluto com grampo 212 posicionado no elemento 11.
- D) Realização de anestesia local e posicionamento de matriz metálica, fixada por porta-matriz, bem como controle de umidade com sugador e rolos de algodão.
- E) Utilização de isolamento absoluto com grampo 209 posicionado nos caninos para permitir a instrumentação, sem a interferência do posicionamento de um grampo no elemento a ser restaurado.

**43. (CONCURSO MAURITI/2018) Os desgastes dentais se apresentam de forma variada e constituem um grupo de lesões provocadas por fatores químicos e mecânicos intervenientes na cavidade bucal. Sendo assim, podemos afirmar que é CORRETA a afirmação:**

- A) A abfração dental é uma lesão cervical não cariiosa de etiologia química, tendo em vista que a mesma é provocada pela ação de ácidos da cavidade bucal.
- B) A erosão dental é comum na borda incisal dos incisivos superiores, em virtude do choque oclusal dos mesmos com os incisivos inferiores mal posicionados.





- C) A erosão dental é decorrente da ação dos ácidos bacterianos, especialmente quando o pH da saliva encontra-se abaixo de 5,5.
- D) As abfrações dentais são caracterizadas como lesões em formato de cunha, cujas bordas são bem definidas e decorrem de trauma oclusal.
- E) Quando superfícies oclusais sofrem desgastes dentais mediados por contatos oclusais prematuros ou sobremordida com choque oclusal, este desgaste é denominado faceta de desgaste.

**44. (CONCURSO MAURITI/2018). A respeito do tratamento restaurador atraumático (ART), julgue os seguintes itens e assinale a alternativa INCORRETA:**

- A) O termo atraumático refere-se à técnica restauradora empregada em lesões dentinárias, que dispensa o uso de anestesia, isolamento absoluto e instrumentos rotatórios.
- B) Apenas instrumentos manuais são utilizados para a remoção da maior parte do tecido alterado (amolecido, desmineralizado e irreversivelmente lesado) pela doença cárie.
- C) É uma abordagem de mínima intervenção que procura preservar o máximo de estrutura dentária e emprega materiais adesivos nas restaurações, rotineiramente os cimentos ionoméricos.
- D) Por dispensar o uso de anestesia e instrumentos rotatórios, a técnica do ART aumenta a probabilidade de maior cooperação obtida pelo paciente, reduzindo

o tempo operatório, evitando as fobias relacionadas a punções, ruídos e vibrações e, conseqüentemente, gerando menor ansiedade.

- E) Nas lesões ativas profundas, ou seja, aquelas que atingem o terço interno da espessura de dentina, o ART é uma terapia inviável, pois a vigorosa curetagem do tecido cariado ocasionaria exposição pulpar e a conseqüente necessidade de procedimentos mais invasivos como capeamento direto e pulpotomia.

**45. (CONCURSO MAURITI/2018). A erupção dos dentes de um indivíduo que possa ser considerada fora dos padrões normais, e de alguma forma traga problemas, geralmente é aquela que se afasta muito das datas consideradas normais. Sobre os fatores sistêmicos que podem afetar a erupção, podemos afirmar que está INCORRETO:**

- A) Os casos, fora dos limites normais, na maioria das vezes, estão relacionados com problemas endócrinos, como hipotireoidismo e hipopituitarismo, que retardam a erupção. Por sua vez, o distúrbio por excesso de funcionamento dessas glândulas geralmente provoca erupção precoce dos dentes.
- B) Quanto a problemas endócrinos, deve-se citar ainda que o retardo da puberdade em geral provoca atraso na erupção.
- C) Outros fatores que influenciam a erupção podem ser citados, por exemplo, a desnutrição. Quando isso ocorre, geralmente na dentição decídua, está



relacionado com a carência de vitaminas B, E e K.

- D) Alguns estudos também apontam que crianças prematuras e/ou com peso muito baixo ( $< 1.500 \text{ g} = 1,5 \text{ kg}$ ) ao nascimento podem apresentar atraso na erupção dos primeiros dentes decíduos, provavelmente relacionado com distúrbios nutricionais durante a gestação.
- E) Os pacientes portadores de síndrome de Down apresentam alterações da sequência de erupção, com atrasos.

**46. (CONCURSO MAURITI/2018). A maioria dos carcinomas de boca parece ser originada da mucosa aparentemente normal, mas algumas condições podem predispor à malignização, ou serem precedidos por lesões potencialmente malignas. Dentre estas lesões e/ou condições, podemos destacar, EXCETO:**

- A) síndrome de Plummer-Vinson
- B) glossite romboidal mediana
- C) eritroplasia
- D) leucoplasia
- E) displasias liquenóides

**47. (CONCURSO MAURITI/2018) O Amálgama é um dos materiais dentários mais utilizados em toda a história da Odontologia e conhecer suas propriedades permite um uso clínico eficiente e seguro, garantindo longevidade à restauração dental confeccionada com ele. Assinale, a seguir,**

**apenas a alternativa que apresenta uma afirmativa INCORRETA sobre o amálgama de prata:**

- A) A liga usada nos amálgamas dentários tradicionais consiste em uma mistura de prata, estanho, zinco e mercúrio.
- B) A prata é o constituinte principal, presente em combinação com o estanho na forma do composto intermetálico  $\text{Ag}_3\text{Sn}$ , conhecido como fase  $\gamma$ .
- C) O cobre está presente para aumentar a resistência e dureza do amálgama, e um efeito mais pronunciado é produzido quando seu conteúdo é aumentado além de 6%.
- D) As variáveis que estão sob controle do dentista e que podem afetar a qualidade final da restauração são: proporcionamento da liga e mercúrio, trituração, condensação, escultura e polimento.
- E) O *creep* consiste no escoamento resultante da carga oclusal repetitiva e atuante por longo prazo, e pode causar o achatamento dos pontos de contato, sobre-extensão e protrusão das margens da restauração na superfície dentária, motivando fratura marginal.

**48. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre os princípios de Radiologia Odontológica, podemos afirmar CORRETAMENTE que:**

- A) A sensibilidade ou velocidade radiográfica refere-se à quantidade de radiação necessária para produzir uma imagem com contraste padrão.



- B) A sensibilidade dos filmes radiográficos intra-orais é indicada por um número que designa um grupo em particular.
- C) Processar um filme exposto aos raios X faz com que ele fique translúcido na área exposta.
- D) A energia do feixe de raios X, fornecida pelo kVp, não influencia o contraste da imagem.
- E) Contraste radiográfico é um termo que descreve as variações de densidades em uma radiografia, representado pela diferença de densidades entre as áreas claras e escuras na mesma.

**49. (CONCURSO MAURITI/2018).  
Considerando os procedimentos odontológicos onde são empregados os princípios cirúrgicos, a necrose do retalho pode ser prevenida, se forem observados os seguintes princípios, COM EXCEÇÃO DE:**

- A) O planejamento do aporte sanguíneo do retalho é fundamental para a prevenção da necrose do mesmo.
- B) A base do retalho nunca deve ser mais ampla do que o seu ápice (extremidade).
- C) Em geral, a dimensão da base do retalho não pode ser menor que a altura.
- D) Deve-se, sempre que possível, incluir um suprimento sanguíneo axial na base do retalho.
- E) A base do retalho não deve ser excessivamente torcida ou distendida.

**50. (CONCURSO MAURITI/2018).  
Constituem deveres fundamentais dos profissionais inscritos no Conselho Federal de Odontologia, conforme emanado pelo código de ética da categoria, e cuja violação caracteriza infração ética, EXCETO:**

- A) manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional e manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional.
- B) exercer a profissão mantendo comportamento digno e manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno desempenho do exercício profissional.
- C) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, quando exercer a profissão no setor público, estando isento quando atuar no setor privado, e elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais.
- D) Propugnar pela harmonia na classe e abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização da Odontologia ou sua má conceituação.
- E) Não manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que os caracterizem como empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea, e comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da Odontologia e que sejam de seu conhecimento.