



GINECOLOGISTA E OBSTETRA

21. (CONCURSO MAURITI/2018) Com relação as pacientes portadoras de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) que necessitam de contracepção os seguintes cuidados estão corretos, exceto:

- A) As pacientes com LES deve ser pesquisada a presença de anticorpos antifosfolípedes antes do início de anticoncepcionais orais.
- B) É necessário cautela com uso de anticoncepcionais orais com drospirenona, pois podem predispor à hipercalcemia.
- C) O estrogênio influencia a atividade da doença no LES com efeito imunoestimulatório.
- D) Acetato de medroxiprogesterona injetável trimestral pode ser usado sem restrições em pacientes recebendo corticosteroides.
- E) Dispositivo intrauterino pode ser usado em pacientes com doença ativa.

22. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o cancroide, doença sexualmente transmissível causada pelo *Haemophilus ducreyi*, estão corretas as seguintes alternativas, exceto:

- A) Caracteriza-se por múltiplas lesões, mas, às vezes, pode ser única, e muito dolorosas.
- B) Sem tratamento, o período de transmissibilidade pode ser de semanas ou meses (enquanto durarem as lesões).
- C) O diagnóstico diferencial é realizado com o cancro duro, herpes simples,

linfogranuloma venéreo, donovanose e erosões traumáticas infectadas.

- D) É recomendado o tratamento do parceiro sexual, mesmo que este esteja assintomático.
- E) É doença de notificação compulsória nacional no Brasil.

23. (CONCURSO MAURITI/2018) Qual das seguintes opções abaixo corresponde ao tratamento correto da candidíase vulvovaginal na infância?:

- A) Metronidazol.
- B) Mebendazol.
- C) Amoxicilina.
- D) Ceftriaxona.
- E) Nistatina.

24. (CONCURSO MAURITI/2018) A doença inflamatória pélvica (DIP) aguda consiste na infecção polimicrobiana do trato genital superior. Seu diagnóstico pode ser sugerido a partir dos seguintes parâmetros, exceto:

- A) Dor à mobilização do colo e do corpo uterinos.
- B) Secreção vaginal mucóide.
- C) Dor abdominal.
- D) Velocidade de hemossedimentação elevada.
- E) Identificação de infecção cervical por *N. gonorrhoeae* ou *C. trachomatis*.



25. (CONCURSO MAURITI/2018) Para as pacientes com suspeita de síndrome dos ovários policísticos (SOP) os seguintes exames podem ser solicitados para esclarecimento diagnóstico, exceto:

- A) Prolactina.
- B) 17 hidroxiprogesterona.
- C) Estradiol
- D) SDHEA
- E) Cortisol salivar ou sérico.

26. (CONCURSO MAURITI/2018) Para as mulheres assintomáticas portadoras de mioma uterino (útero com volume de 200cm³), assinale a alternativa que sugere o melhor tratamento?:

- A) Anticoncepcionais orais combinados.
- B) Gestrinona.
- C) Análogos do GnRH.
- D) Anti-inflamatórios não esteroides.
- E) Seguimento.

27. (CONCURSO MAURITI/2018) Paciente de 26 anos de idade, com 20 meses de duração de infertilidade, foi submetida à videolaparoscopia cirúrgica há 2 semanas com realização de adesiólise e eletrocauterização de lesões endometrióticas. Apresenta tubas pérvias bilateralmente e o seu companheiro tem espermograma normal. Qual a melhor recomendação para o tratamento de infertilidade neste momento?:

- A) Orientar o casal otimizar a fertilidade natural.
- B) Injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI).
- C) Inseminação intrauterina.
- D) Fertilização in vitro (FIV).
- E) Clomifeno.

28. (CONCURSO MAURITI/2018) Na abordagem cirúrgica primária do câncer de ovário observa-se os seguintes princípios, exceto:

- A) Retirada de linfonodos suspeitos sempre que possível.
- B) Esplenectomia.
- C) Laparotomia mediana.
- D) Biópsias das aderências.
- E) Omentectomia.

29. (CONCURSO MAURITI/2018) Representam causas de trombofilias hereditárias, exceto:

- A) Deficiência de proteína C.
- B) Deficiência de proteína S.
- C) Hipo-hocisteinemia.
- D) Mutação G20210A da protrombina.
- E) Mutação do fator V de Leiden.

30. (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale a alternativa correta em relação as mastites:



- A) A mastite puerperal é a mastite crônica mais comum.
- B) O tabagismo não influencia para o surgimento de mastites.
- C) Podem ocorrer sintomas sistêmicos como febre alta, anorexia, náuseas e vômitos.
- D) A drenagem cirúrgica é obrigatória.
- E) O tecido mamário pode ser comprometido por bactérias, fungos e vírus apenas.

31. (CONCURSO MAURITI/2018) Qual a causa mais comum de malformação do trato genital associado à amenorréia primária?:

- A) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.
- B) Síndrome de Sheehan.
- C) Síndrome de Asherman
- D) Hímen imperfurado.
- E) Feminização testicular.

32. (CONCURSO MAURITI/2018) Achados mamográficos provavelmente benignos pela classificação de BIRADS corresponde a:

- A) BIRADS 1
- B) BIRADS 2
- C) BIRADS 3
- D) BIRADS 4
- E) BIRADS 5

33. (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale a alternativa verdadeira para os fármacos que devem ser utilizados para prevenção e/ou tratamento de osteoporose:

- A) Alendronato, terapatida, tibolona.
- B) Alendronato, raloxifeno, heparina.
- C) Ibandronato, calcitonina, prednisona.
- D) Terapatida, raloxifeno, lítio.
- E) Vitamina D, cálcio, dexametasona.

34. (CONCURSO MAURITI/2018) Qual fármaco abaixo não é utilizado para tratamento da incontinência urinária de esforço?:

- A) Estrogênio.
- B) Cloridrato de oxibutinina.
- C) Cloridrato de clomipramina.
- D) Toxina botulínica.
- E) Duloxetina.

35. (CONCURSO MAURITI/2018) Qual a conduta mais adequada para uma paciente com 57 anos de idade, de risco baixo para câncer de mama, com mamografia normal (BIRADS 1), que após mastoplastia redutora apresentou em uma das mamas um único foco de hiperplasia atípica?:

- A) Acompanhamento.
- B) Quadrantectomia.
- C) Mastectomia profilática.



D) Raloxifeno 60mg/dia.

E) Radioterapia.

36. (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale a alternativa correta em relação as gestações gemelares:

A) Para gestações gemelares monocoriônicas a forma diamniótica é mais frequente.

B) Gestações monocoriônicas complicam menos em relação as dicoriônicas.

C) A ultrassonografia quando realizada no segundo trimestre tem melhor performance para a determinação da corionicidade.

D) Os sinais ecográficos Ω (ômega) e T servem para distinção da corionicidade.

E) Placentas inseridas separadamente são sempre de gestações dizigóticas.

37. (CONCURSO MAURITI/2018) A distocia de ombro afeta de 0,2 a 3% dos partos vaginais. Os principais fatores de risco são elencados abaixo, exceto:

A) Diabetes gestacional.

B) Trombofilia.

C) Parto instrumentado.

D) Macrossomia fetal.

E) Gestação prévia complicada por distocia de ombros.

38. (CONCURSO MAURITI/2018) A cesariana está indicada rotineiramente na seguinte situação:

A) Gestação prolongada.

B) Circular cervical de cordão umbilical.

C) Pré-eclâmpsia.

D) Oligoâmnio.

E) Apresentação pélvica.

39. (CONCURSO MAURITI/2018) Entre os fatores de risco listados abaixo, assinale aquele que mais está associado a ocorrência de parto prematuro na gestação atual:

A) Ausência de eco glangular no canal endocervical.

B) Sangramento vaginal no primeiro trimestre.

C) Obesidade.

D) Malformações uterinas.

E) História de parto pré-termo anterior.

40. (CONCURSO MAURITI/2018) A translucência nucal é a imagem ultrassonográfica do acúmulo de líquido que se forma na região da nuca fetal. Para avaliação quanto ao risco de cromossomopatias deve ser obtida entre:

A) 11 e 14 semanas.

B) 10 e 14 semanas.

C) 11 e 13 semanas e 6 dias.

D) 10 e 13 semanas e 6 dias.

E) 11 e 13 semanas.



41. (CONCURSO MAURITI/2018) Para a avaliação de fetos com restrição do crescimento qual o vaso que precisa ser melhor avaliado?:

- A) Artérias uterinas.
- B) Duto venoso.
- C) Artéria cerebral média.
- D) Veia umbilical.
- E) Artéria umbilical.

42. (CONCURSO MAURITI/2018) A síndrome HELLP tem como diagnóstico diferencial as seguintes patologias, exceto:

- A) Lúpus eritematoso sistêmico.
- B) Síndrome hemolítica urêmica.
- C) Púrpura trombocitopênica trombótica.
- D) Síndrome de anticorpos antifosfolípido.
- E) Fígado gorduroso agudo da gravidez.

43. (CONCURSO MAURITI/2018) Uma adolescente de 12 anos engravidou do seu namorado de 16 anos e veio, acompanhada por seus pais, solicitar a interrupção da gestação por estupro. Assinale a alternativa verdadeira:

- A) Considera-se estupro de vulnerável, e com a autorização dos pais pode-se realizar a interrupção da gestação.
- B) Solicitar aos pais que levem sua filha ao Instituto de Medicina Legal.

C) Não é obrigatória a comunicação ao conselho tutelar no caso de proceder com a interrupção da gestação.

D) A interrupção da gestação pode ser realizada, independentemente da aprovação dos pais, mediante exame mental da paciente.

E) Não se trata de estupro, interrupção da gestação é ilegal nesses casos.

44. (CONCURSO MAURITI/2018) Qual é a principal causa de morte materna no Brasil?:

- A) Hemorragias.
- B) Infecções.
- C) Tromboembolismo.
- D) Hipertensão Arterial.
- E) Cardiopatias.

45. (CONCURSO MAURITI/2018) Que avaliação dopplerfluxométrica abaixo se correlaciona a possibilidade de anemia fetal?:

- A) Índice de resistência aumentado na artéria cerebral média.
- B) Índice de pulsatilidade aumentado na artéria cerebral média.
- C) Velocidade sistólica máxima aumentada na artéria cerebral média.
- D) Velocidade sistólica máxima diminuída na artéria cerebral média.
- E) Centralização hemodinâmica fetal.



46. (CONCURSO MAURITI/2018) Gestante Rh negativo na 28ª semana com pesquisa de anticorpos irregulares negativa. Qual a conduta mais adequada?:

- A) Encaminhar a paciente ao serviço em medicina fetal.
- B) Solicitar ultrassonografia obstétrica com Doppler colorido.
- C) Prescrever imunoglobulina anti-D.
- D) Solicitar pesquisa de anticorpos irregulares mensalmente.
- E) Prescrever corticóide para interrupção prematura da gestação.

47. (CONCURSO MAURITI/2018) Entre os antibióticos abaixo assinale a alternativa que apresenta maior segurança para seu emprego no primeiro trimestre de gravidez:

- A) Carbenicilina, cefalexina, penicilina G benzatina, espiramicina.
- B) Ampicilina, cefalotina, doxiciclina, penicilina G procaína.
- C) Eritromicina, ceftriaxona, espiramicina, norfloxacin.
- D) Cefazolina, estreptomicina, penicilina G benzatina, amoxicilina.
- E) Amoxicilina, tetraciclina, cefuroxima, eritromicina.

48. (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale a causa mais frequente de hemorragia após o parto vaginal:

- A) Laceração cervical.
- B) Atonia uterina.
- C) Retenção de restos placentários.
- D) Laceração vaginal.
- E) Coagulopatia.

49. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre as doenças da tireoide que na gestação assinale a alternativa errada:

- A) O hipertireoidismo acomete cerca de 2:1.000 gestações, sendo sua principal causa a doença de Graves.
- B) O tratamento cirúrgico do hipertireoidismo é a melhor opção durante a gestação.
- C) O propiltiouracil é a droga de escolha para o tratamento do hipertireoidismo.
- D) O diagnóstico do hipotireoidismo na gestação é fundamentalmente laboratorial.
- E) Toda paciente com depressão pós-parto deve ter sua função tireoidiana avaliada.

50. (CONCURSO MAURITI/2018) O líquido amniótico desempenha importante papel na gestação, protegendo o feto de traumatismos e infecções, proporcionando condições para a movimentação fisiológica do concepto, fundamental para seu desenvolvimento musculoesquelético, contribuindo para a evolução pulmonar e



prevenindo compressões do cordão umbilical e da placenta. Dos distúrbios que o acometem assinale a alternativa verdadeira:

- A) A maioria das causas conhecidas de polidramnia está ligada à presença de diabetes mellitus materno e de malformações do sistema nervoso central e trato urinário do concepto.
- B) A utilização da medida do índice de líquido amniótico (ILA) é o método mais frequentemente utilizado para estimar o volume de líquido amniótico nas gestações gemelares.
- C) A interrupção da gestação por cesariana, nos casos de oligodramnia, só acontece quando há comprometimento da vitalidade fetal.
- D) Na avaliação ultrassonográfica considera-se que há polidramnia quando o maior bolsão vertical de líquido amniótico é maior que 8cm ou índice de líquido amniótico é maior que 18cm.
- E) Para as gestações com polidramnia a amniocentese descompressiva é indicada em caso de dispneia materna progressiva ou dor abdominal.