



UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
FeSaúde – FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE / NITERÓI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS DO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO
EDITAL Nº 1/2020



Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova

Emprego: MÉDICO PEDIATRA
Núcleo de Apoio à Saúde da Família

NÍVEL:
SUPERIOR

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato

(Parte integrante do Edital – subitem 11.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o emprego indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um emprego diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões de múltipla escolha** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido **na última hora** que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”

A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade.

Aristóteles

Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS

01 Analise as afirmações abaixo sobre assistência à saúde pela iniciativa privada prevista na Constituição Federal de 1988.

- I As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo as diretrizes de contrato de direito privado, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- II É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que prevista expressamente no contrato celebrado com o ente federativo.
- III É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país.
- IV A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

Está(ão) correta(s) somente:

- (A) II.
- (B) I, II e III.
- (C) III.
- (D) II, III e IV.
- (E) IV.

02 À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

- (A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) Promover a descentralização dos serviços e das ações de saúde para os municípios.
- (C) Autorizar consórcios administrativos intermunicipais.
- (D) Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.
- (E) Coordenar e, em caráter exclusivo, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica.

03 De acordo com Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, **EXCETO**:

- (A) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- (B) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo a assistência terapêutica e a recuperação de deficiências nutricionais.
- (C) Limpeza urbana e remoção de resíduos.
- (D) Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.
- (E) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde.

04 O Sistema Único de Saúde será financiado de acordo com a Constituição Federal de 1988, com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Diz o artigo 198 do mesmo diploma legal, no parágrafo segundo, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso da União, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, **NÃO** podendo ser inferior a:

- (A) 2%.
- (B) 4%.
- (C) 8%.
- (D) 10%.
- (E) 15%.

05 São instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras da gestão compartilhada do SUS previstas no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011:

- (A) Comissões intergestores.
- (B) Redes de atenção à saúde.
- (C) Protocolos clínicos.
- (D) Redes de atenção primária.
- (E) Serviços de acesso aberto.

06 Entre as várias maneiras de alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde previstas na Lei nº 8.142, de 1990, há aquela destinada à cobertura de ações e serviços de saúde a ser implementada pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito Federal (art. 2º, inciso IV). Esses recursos destinam-se a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde, cabendo do total aos municípios, pelo menos:

- (A) 30%.
- (B) 40%.
- (C) 50%.
- (D) 60%.
- (E) 70%.

07 Assinale a opção que **NÃO** faz parte das diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizadas na Atenção Básica (Portaria nº 2.436, de 2017).

- (A) Coordenação do cuidado.
- (B) Integralidade.
- (C) Cuidado centrado na pessoa.
- (D) Ordenação da rede.
- (E) Longitudinalidade do cuidado.

08 São portas de entrada previstas no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, **EXCETO** o serviço:

- (A) De atenção primária.
- (B) De atenção de urgência e emergência.
- (C) De atenção hospitalar especializado.
- (D) De atenção psicossocial.
- (E) Especial de acesso aberto.

09 O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) de cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.142/90. O processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento de Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais

Indígenas, sob a coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera correspondente. Assim, os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.

De acordo com a Resolução 453, de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde), a participação de entidades e movimentos representativos de usuários no Conselho de Saúde corresponde a:

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 40%.
- (D) 50%.
- (E) 60%.

10 Analise as afirmativas abaixo.

- I A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal de 1988, sendo exercida, no âmbito da União, pela Agência de Vigilância Sanitária.
- II Os municípios poderão constituir convênios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- III À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
- IV A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

De acordo com a Lei nº 8.080/1990, estão corretas:

- (A) Somente I, II e III.
- (B) Somente II, III e IV.
- (C) Somente I e II.
- (D) Somente III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Tópico: Conhecimentos Específicos

11 Assinale uma contraindicação de aplicação de vacina viva atenuada de bactéria ou vírus.

- (A) Em desnutrição.
- (B) Resfriado com febre baixa.
- (C) Em corticoterapia inalatória.
- (D) Recém-nato com mais de dois quilogramas.
- (E) Em tratamento com corticoides em doses elevadas por período superior a duas semanas.

12 Em relação à utilização do zinco no tratamento da diarreia aguda, a Organização Mundial de Saúde recomenda seu uso com a seguinte finalidade:

- (A) Diminuir o risco de contaminação dos expostos.
- (B) Fazer a profilaxia do risco de disseminação da doença.
- (C) Diminuir o tempo de duração dos sintomas.
- (D) Acelerar o processo de hipomotilidade intestinal.
- (E) Diminuir o trofismo celular.

13 Assinale o sintoma que persiste por mais tempo no paciente com sarampo.

- (A) Tosse.
- (B) Conjuntivite.
- (C) Cefaleia.
- (D) Febre.
- (E) Fotofobia.

14 Os sinais clássicos que ocorrem na coarctação da aorta são:

- (A) Cianose leve e hipotensão postural.
- (B) Hipotensão arterial e extrassístoles ventriculares.
- (C) Impulso precordial diminuído e bulhas cardíacas hiperfonéticas.
- (D) Disparidade em pulsação e pressão arterial nos braços e pernas.
- (E) Impulso precordial aumentado e bulhas cardíacas hipofonéticas, em geral.

15 Assinale o fármaco eficaz tanto no tratamento de helmintos quanto no de protozoários intestinais.

- (A) Metronidazol.
- (B) Nitazoxanida.
- (C) Levamisole.
- (D) Mebendazol.
- (E) Pamoato de pirvínio.

16 Entre as complicações da varicela, a mais frequente é a:

- (A) Nefrite.
- (B) Pneumonia.
- (C) Encefalite.
- (D) Artrite assimétrica.
- (E) Infecção secundária da pele.

17 Assinale a cardiopatia congênita com hipofluxo pulmonar.

- (A) Defeitos dos coxins endocárdicos.
- (B) Persistência do canal arterial.
- (C) Atresia da válvula tricúspide.
- (D) Comunicação interventricular.
- (E) *Truncus arteriosus*.

18 A cistite hemorrágica aguda em crianças, geralmente, é causada por:

- (A) Norovírus.
- (B) Adenovírus.
- (C) *Proteus mirabilis*.
- (D) *Escherichia coli*.
- (E) *Klebsiella pneumoniae*.

19 Em relação à maturação sexual feminina, é correto afirmar que o primeiro sinal visível da puberdade é o surgimento de

- (A) Menarca.
- (B) Botões mamários.
- (C) Pelos axilares.
- (D) Pelos pubianos.
- (E) Acne.

20 Menino de três anos apresenta febre há vinte e quatro horas e manchas vermelhas pouco pruriginosas que se transformaram em bolhas nos pés e nas mãos. O exame físico indicou febre baixa, irritação e presença de exantema vesiculoso nas regiões palmares e plantares. A orofaringe apresenta lesões ulceradas na língua e no palato. Segundo a mãe, a criança frequenta creche. O agente etiológico mais provável do quadro apresentado pelo paciente é:

- (A) Vírus Coxsackie.
- (B) Parvovírus.
- (C) Herpes simples.
- (D) Paramixovírus.
- (E) Herpes-zóster.

21 Corresponde a um marco de desenvolvimento neuropsicomotor já alcançado no sétimo mês de vida do lactente:

- (A) Fazer pinça.
- (B) Imitar gestos.
- (C) Produzir jargão.
- (D) Andar sem apoio.
- (E) Sentar-se sem apoio.

22 Assinale o período em que ocorre o primeiro estirão de crescimento na criança.

- (A) No pré-puberal.
- (B) No pré-escolar.
- (C) Na idade escolar.
- (D) No primeiro ano de vida.
- (E) A partir dos dois anos de vida.

23 São manifestações clínicas essenciais da dermatite atópica aguda:

- (A) Hiperidrose e hipocromia.
- (B) Eritema nodoso e pápulas.
- (C) Liquenificação e hiperidrose.
- (D) Prurigo nodular e hiperpigmentação.
- (E) Prurido intenso e reatividade cutânea.

24 De acordo com o calendário de imunizações do Ministério da Saúde 2020, a segunda dose da vacina contra a varicela deverá ser aplicada com:

- (A) 4 meses.
- (B) 15 meses.
- (C) 1 ano.
- (D) 6 anos.
- (E) 9 anos.

25 A gravidade da pneumonia em lactentes e crianças é predominantemente avaliada por critérios clínicos. É considerada sinal de gravidade na pneumonia a presença de:

- (A) Vômito.
- (B) Febre alta.
- (C) Tiragem subcostal.
- (D) Diminuição do murmúrio vesicular.
- (E) Tiragem intercostal.

26 Assinale a opção correta sobre a crise convulsiva febril.

- (A) Geralmente é focal.
- (B) É rara depois dos cinco anos de idade.
- (C) É descrita como complexa ou complicada, quando a duração é maior que dois minutos.
- (D) Associa-se, mais tarde, à redução do desempenho intelectual.
- (E) A maioria das crianças apresenta, mais tarde, alto risco de desenvolver epilepsia, em comparação à população em geral.

27 Assinale a opção que contempla o índice de massa corpórea compatível com o diagnóstico de risco de sobrepeso, segundo a tabela da OMS de 2006.

- (A) $<+1$ e >-2 escores z.
- (B) <-2 escores z.
- (C) $>+3$ escores z.
- (D) $<+3$ e $>+2$ escores z.
- (E) <-3 e >-3 escores z.

28 Em relação à infecção urinária na criança, é correto afirmar que:

- (A) Nas meninas a grande maioria dos casos é causada por *Klebsiella spp.*
- (B) O principal agente etiológico é o *Proteus mirabilis*.
- (C) No sexo masculino há uma incidência maior depois dos cinco anos de vida.
- (D) A cistite indica o acometimento do trato urinário superior.
- (E) Em lactentes os sintomas são inespecíficos.

29 É considerada a principal causa de crise convulsiva no período neonatal.

- (A) Meningite.
- (B) Encefalopatia hipoxico-isquêmica.
- (C) Hemorragia intracraniana.
- (D) Microcefalia.
- (E) Hiperbilirrubinemia.

30 A artrite, presente em mais de dois terços das crianças com púrpura de Henöch-Schönlein, geralmente, localiza-se:

- (A) Nos joelhos e tornozelos.
- (B) Nos punhos e cotovelos.
- (C) Nas articulações sacroilíacas e coxofemorais.
- (D) Nos cotovelos e ombros.
- (E) Nas articulações metacarpofalangeanas e metatarsofalangeanas.

31 A vacina anti-HPV, no esquema atual do Ministério da Saúde (2020), deve ser aplicada em meninos na faixa etária de:

- (A) 6 a 9 anos, 11 meses e 29 dias.
- (B) 8 a 11 anos, 11 meses e 29 dias.
- (C) 9 a 14 anos.
- (D) 10 a 14 anos.
- (E) 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

32 Recém-nascido (RN) de parto cesárea e prematuro (36 semanas e três dias). A mãe fez pré-natal regular. Feto macrossômico nasceu com bom apgar. Logo depois do nascimento, evoluiu com quadro de taquipneia e retração intercostal. Esse RN tem maior probabilidade de apresentar:

- (A) Hipoglicemia.
- (B) Anemia hemolítica.
- (C) Taquipneia transitória.
- (D) Displasia broncopulmonar.
- (E) Doença da membrana hialina.

33 Em relação à infecção por citomegalovírus, é correto afirmar que:

- (A) Lactentes infectados excretam vírus na saliva e na urina durante anos.
- (B) O tratamento farmacológico é indicado.
- (C) A transmissão perinatal é incomum.
- (D) O tratamento farmacológico é indicado somente para pessoas imunocompetentes.

(E) Crianças com infecções congênitas sintomáticas demonstram raramente defeitos auditivos e do sistema nervoso central nos anos seguintes.

34 No momento, a obesidade infantil (OI), no cenário brasileiro, tem aumentado de forma acentuada, gerando prejuízo a longo prazo na adolescência e vida adulta. Na prevenção da OI, o fator que exerce um impacto positivo é o(a):

- (A) Uso de fluoxetina.
- (B) Uso precoce de orlistat.
- (C) Aleitamento materno.
- (D) Suplementação nutricional com produtos ultraprocessados.
- (E) Alimentação com predomínio de cereais.

35 Considera-se fator de risco para o desenvolvimento de asma brônquica:

- (A) Broncoaspiração.
- (B) Rinite alérgica.
- (C) Laringomalácia.
- (D) Desvio de septo nasal.
- (E) Laringite estridulosa.

36 Assinale o exame de imagem considerado padrão ouro para o diagnóstico de osteomielite aguda.

- (A) Cintilografia.
- (B) Ultrassonografia.
- (C) Densitometria.
- (D) Ressonância magnética.
- (E) Tomografia computadorizada.

37 Em relação ao calendário vacinal de um lactente que irá completar quinze meses, a orientação adequada, de acordo com o Ministério da Saúde, é:

- (A) Primeiro reforço DTP, primeiro reforço da VOP, dose única da tetraviral e dose única da hepatite A.
- (B) Reforço da pneumocócica decavalente, reforço da febre amarela e primeiro reforço da meningocócica.
- (C) Segunda dose da varicela, primeiro reforço da meningocócica e terceira dose da VIP.
- (D) Primeiro reforço da DTPa, primeira dose da tetraviral e dose única da tríplice viral.
- (E) Primeiro reforço da VOP, primeira dose de tríplice viral e dose única da hepatite A.

38 Um adolescente de 12 anos de idade comparece à consulta com sua mãe, que está preocupada com seu crescimento puberal. Exame físico sem alterações. Escala de Tanner correspondeu a G1, P1. Com base nesse exame, o médico deve esclarecer que o próximo evento normal da puberdade será:

- (A) Ginecomastia.
- (B) Aparecimento de acne.
- (C) Voz mais grave.
- (D) Aumento dos testículos.
- (E) Aparecimento de pelos axilares.

39 Mais de noventa por cento dos casos de hiperplasia congênita da adrenal são causados por deficiência de:

- (A) 21-hidroxilase.
- (B) 11-desoxicorticosterona.
- (C) 17-hidroxiprogesterona.
- (D) 16-beta-hidroxilase.
- (E) 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase.

40 Assinale a opção correta sobre a doença de Hirschsprung (DH).

- (A) No exame físico da DH, o toque retal demonstra presença de fezes em grande quantidade.
- (B) Os sintomas clínicos da DH, normalmente, começam no nascimento, com retardo na liberação do mecônio.
- (C) Há alteração no tônus anal e queda ou diminuição paradoxal da pressão, com a distensão retal, na manometria da DH.
- (D) Déficit de crescimento, com hipoproteinemia decorrente de enteropatia perdedora de proteína, é a forma de apresentação mais comum atualmente, porque a DH, em geral, é reconhecida tardiamente em seu curso.
- (E) O diagnóstico radiográfico da DH baseia-se na presença de uma zona de transição entre o cólon proximal de menor calibre e o cólon distal dilatado, provocado pelo relaxamento do segmento agangliônico.

41 Assinale a opção correta sobre o eritema infeccioso.

- (A) Pode ser tratado com aciclovir.
- (B) Causa manifestação articular.
- (C) A etiologia é o parvovírus B19.
- (D) Apresenta exantema maculopapular.
- (E) Pode ser transmitido por via vaginal no parto.

42 Em relação à diarreia aguda (DA), é correto afirmar que:

- (A) Os antieméticos de ação central em caso de vômito devem ser sempre utilizados.
- (B) O paciente deve ficar em jejum nos casos de diarreia infecciosa durante a reidratação oral.
- (C) O aporte calórico deve ser diminuído, independentemente da etiologia da DA.
- (D) A terapia de hidratação e a nutrição adequada são os fundamentos do seu tratamento.
- (E) A antibioticoterapia é sempre parte integrante do tratamento, quando a causa é infecciosa e a escolha do antimicrobiano deve, inicialmente, atender ao princípio do amplo espectro.

43 Pacientes com síndrome de Down têm risco aumentado de desenvolver:

- (A) Pneumonia.
- (B) Convulsões afebris.
- (C) Esterno aumentado.
- (D) Hipertireoidismo.
- (E) Leucemia.

44 Assinale a vacina que é composta de vírus vivo atenuado.

- (A) BCG.
- (B) Antirrotavírus.
- (C) Anti-hepatite A.
- (D) Anti-hepatite B.
- (E) VIP.

45 O fármaco recomendado para o tratamento de todas as formas de *Tinea capitis* é:

- (A) Anfotericina B.
- (B) Metronidazol.
- (C) Griseofulvina.
- (D) Imidazol.
- (E) Tolnaftato.

46 O estudo de imagem mais efetivo e com maior acurácia para demonstrar a presença de cicatriz renal é:

- (A) Cintilografia com DTPA.
- (B) Urografia excretora.
- (C) Ultrassonografia bidimensional.
- (D) Retrocistografia com duplo contraste.
- (E) Cintilografia com DMSA marcado com tecnécio.

47 A dermatite da fralda pode ser interpretada como o protótipo da(o):

- (A) Eczema disidrótico.
- (B) Eczema numular.
- (C) Epidermólise bolhosa.
- (D) Dermatite de contato por irritante.
- (E) Dermatite de Rhus.

48 O envolvimento cardíaco é a manifestação mais importante da:

- (A) Escarlatina.
- (B) Doença de Kawasaki.
- (C) Síndrome de Stevens-Johnson.
- (D) Leptospirose ictérica.
- (E) Síndrome do choque tóxico.

49 Colecistite aguda e/ou obstrução das vias biliares ocorrem com mais frequência em associação com uma das verminoses abaixo relacionadas. Indique-a.

- (A) Ascaridíase.
- (B) Ancilostomíase.
- (C) Tricuríase.
- (D) Enterobíase.
- (E) Cisticercose.

50 São critérios menores para o diagnóstico da febre reumática:

- (A) Artralgia e coreia.
- (B) Poliartrite e nódulos subcutâneos.
- (C) Febre e proteína C reativa.
- (D) Intervalo PR prolongado e cardite.
- (E) VHS aumentado e eritema marginado.