

CONCURSO PÚBLICO

Técnico em ENFERMAGEM

LEIA COM ATENÇÃO



- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** - Preencha os dados pessoais.
- 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha e apresenta como resposta uma alternativa correta.
- 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a **folha de respostas**.
- 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de respostas é definitiva: não se admitem rasuras.**
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais questões da matéria correspondente.
- 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Duração desta prova: 04 horas.

Nome:

Inscrição:

Identidade:

Órgão Expedidor:

Assinatura:

Prédio:

Sala:

Edital nº 53/2019

PROGEPE

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE
PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA

TEXTO 1

Indígenas na cidade: pobreza e preconceito marcam condição de vida

(01) Há muito tempo, a Floresta Amazônica deixou de ser o lar de milhares de indígenas. A escassez de alimentos, o desmatamento e o avanço das cidades sobre as matas são alguns fatores que motivaram povos tradicionais a migrar para áreas urbanas. Em Manaus, no Amazonas, eles podem ser encontrados em todas as regiões da cidade. A Fundação Estadual do Índio estima que de 15 a 20 mil indígenas de diversas etnias vivam em áreas urbanas amazonenses, como os sateré-mawé, apurinã, kokama, miraña, dessana, tukano e piratapuaia. “Acredito que 90% dos bairros de Manaus tenham indígenas morando”, informou o presidente da Fundação Estadual do Índio, Raimundo Atroari.

(02) Apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, a maioria dos indígenas vive em situação de pobreza, tem dificuldade de conseguir emprego e a principal renda vem do artesanato. “Geralmente, as comunidades estão localizadas em área de risco. Nunca é numa área boa. A gente sente muito essa dificuldade de viver na cidade. A maioria dos Sateré daqui da aldeia está no trabalho informal, sem carteira assinada. A maior parte fica dentro da aldeia trabalhando com artesanato. A gente consegue gerar uma renda mais no mês de abril, quando o público procura. Fora isso a gente fica dependendo de doações”, contou o tuxaua ou cacique Moisés Sateré, líder de uma comunidade no bairro da Paz, zona oeste de Manaus, onde vivem 14 famílias.

(03) A antropóloga Lúcia Helena Rangel, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, confirma que é comum os indígenas, mesmo em áreas urbanas, viverem em comunidade. “Conforme vai passando o tempo, vem um, vem outro e mais outros, as famílias acabam se juntando em determinado bairro, ou em uma periferia que ninguém morava, e os indígenas foram morar. Você vai ver que nas grandes cidades como Manaus, Campo Grande, Porto Alegre, tem bairros eminentemente indígenas, ou segmentos de bairros”, ressaltou a antropóloga.

(04) Moisés Sateré também reclama das dificuldades para acessar os serviços públicos de saúde. “Às vezes a gente não consegue esse atendimento porque muitos profissionais desconhecem a nossa realidade e acabam tendo preconceito com a gente. Quando eles reconhecem que a gente pertence a algum povo, começam a jogar dizendo que a gente precisa ir pra aldeia pra ser atendido ou procurar a Casai [Casa de Saúde Indígena]. Então, fica empurrando”, disse a liderança indígena.

(05) De acordo com o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) de Manaus, Ronaldo Barros, da etnia maraguá, as políticas públicas de saúde são voltadas aos indígenas nas aldeias. Aqueles que vivem nas cidades enfrentam os mesmos problemas que o restante da população.

(06) Ainda de acordo com Raimundo Atroari, a Fundação Estadual do Índio está desenvolvendo projetos para ajudar na geração de renda dos indígenas dentro das aldeias, como uma alternativa para evitar a migração deles para os centros urbanos. “A gente está trabalhando para mudar essa história porque todas as áreas indígenas são riquíssimas, têm um potencial econômico grande. O mercado consumidor tem uma carência muito grande de tudo que tem na aldeia: da alimentação, da matéria-prima, daquilo que pode ser transformado em joia, em remédio, em perfume, enfim. Tudo que tem lá dá pra se transformar em moeda. E a Matriz Econômica Ambiental vem justamente trazendo toda essa possibilidade de geração de renda lá no habitat para os caboclos e indígenas”, explicou Raimundo.

(07) A Matriz Econômica Ambiental foi lançada pelo governo do Amazonas em fevereiro para desenvolver, entre outros projetos, a economia do estado de forma sustentável, com a colaboração dos povos tradicionais.

(08) Morar em centros urbanos sem ocultar a ancestralidade e as próprias referências é ainda uma luta para mais de 315 mil indígenas, segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa 49% do total da população indígena do país. Em todo o Brasil, São Paulo é a cidade com maior população indígena, com cerca de 12 mil habitantes; seguida de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, com pouco mais de 11 mil e Salvador, com mais de 7,5 mil índios.

(09) Foi na década de 50, com o desenvolvimento industrial, que o processo de migração para as cidades se intensificou. Moradores do campo seguiam em busca de emprego nas fábricas e, com os indígenas, não foi diferente. Mas a própria Fundação Nacional do Índio (Funai), que tem como missão promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, sofre o preconceito e percebe a situação dos indígenas que moram nas cidades. “Essa questão do preconceito é até com os servidores [da Funai]. Se é com o servidor, imagine para o próprio indígena”, diz o coordenador regional da Funai em Roraima, Riley Mendes.

(10) O Padre Robert Marie de Zalicourt, do Conselho Indigenista Missionário no Amazonas, acredita que, para manter as próprias referências na cidade, os indígenas precisam se unir. “Tem famílias indígenas em todos os bairros de Manaus, mas não são reconhecidas. Então, eles têm tendência de perder a sua cultura. Eles estão mantendo essa especificidade quando estão unidos e organizados.”

Por Bianca Paiva e Maíra Heinen. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-04/indigenas-na-cidade-pobreza-e-preconceito-marcam-condicao-de-vida>. Acesso em: 12/10/2019. Adaptado.

01. O Texto 1 aborda questões referentes à população indígena. Acerca desse tema, o texto focaliza prioritariamente:

- A) o fato de os índios enfrentarem escassez de alimentos nas florestas.
- B) as precárias condições de vida dos indígenas, nas grandes cidades.
- C) a participação dos indígenas em projetos de geração de renda.
- D) a procura dos índios por emprego, nas fábricas, desde a década de 1950.
- E) a falta de união dos indígenas, o que acarreta perda de sua cultura.

02. Dentre as informações a seguir, assinale aquela que consta no Texto 1.

- A) Os profissionais da área de saúde conhecem bem a realidade dos índios e rechaçam todo tipo de preconceito.
- B) Inexistem políticas públicas de saúde que se voltem para os índios, tanto nas aldeias quanto nas cidades.
- C) Embora tenham certo potencial econômico, as áreas indígenas são carentes e não podem atender ao mercado consumidor.
- D) A Funai está sediada em São Paulo, pois é nessa cidade que se concentra a maior população indígena do país.
- E) O mês de abril é mais rentável para a população de índios que sobrevive às custas do artesanato.

03. No trecho: “Apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, a maioria dos indígenas vive em situação de pobreza”, podemos identificar uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) condição.
- C) concessão.
- D) consequência.
- E) conclusão.

04. No 3º parágrafo, lemos: “Conforme vai passando o tempo, vem um, vem outro e mais outros, as famílias acabam se juntando em determinado bairro [...]”. O sentido do trecho destacado é o mesmo de:

- A) “À medida que vai passando o tempo”
- B) “Ao passo que vai passando o tempo”
- C) “Apesar de ir passando o tempo”
- D) “Sempre que vai passando o tempo”
- E) “Quando vai passando o tempo”

05. Analise as relações de sentido apresentadas abaixo.

- 1) A expressão “escassez de alimentos” equivale semanticamente a “carência de comida”.
- 2) A afirmação de que “a maioria dos Sateré [...] está no trabalho informal” deve ser compreendida como “a maioria dos Sateré [...] está desempenhando trabalho braçal”.
- 3) Devemos entender o trecho: “Foi na década de 50, [...] que o processo de migração para as cidades se intensificou” como: “Foi na década de 50, [...] que o processo de migração para as cidades recrudesciu”.
- 4) Afirmar que a Funai “tem como missão promover os direitos dos povos indígenas no Brasil” é o mesmo que afirmar que a Funai “tem como missão tolher os direitos dos povos indígenas no Brasil”.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 2 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, apenas.

06. Assinale o enunciado em que a regência atende à norma-padrão da língua.

- A) Prover trabalho para os índios implica em reconhecer seus direitos.
- B) Muitos índios migraram para as grandes cidades devido o desemprego.
- C) Poucos estudiosos fazem alusão à importância da cultura indígena para os brasileiros.
- D) Certamente, as condições econômicas dos índios estão relacionadas em sua diminuição como povo.
- E) É muito triste chegar numa grande cidade e ver índios mendigando pelas ruas.

07. Considerando as normas da concordância (verbal e nominal), assinale a alternativa que apresenta um enunciado correto.

- A) Diversos estudos têm comprovado, de maneira inequívoca, que haviam muitas outras tribos indígenas no passado.
- B) A atenção à saúde e a preservação das condições de salubridade é fundamental para a população indígena.
- C) Para ajudar os indígenas, é preciso que se considere todos os fatores que contribuem para seu bem-estar.
- D) No Brasil, sabemos que inexistem entidades que cuidam especificamente da saúde dos povos indígenas.
- E) Cada um dos povos indígenas de que temos conhecimento deve preservar as suas especificidades culturais.

08. No título do Texto 1, encontramos a palavra “pobreza”, que se grafa com “z”. Também se grafa com “z” a palavra:

- A) repreza.
- B) paralização.
- C) teimozia.
- D) cozimento.
- E) querozene.

TEXTO 2

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas

A Assembleia Geral,

Guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e pela boa-fé no cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados de acordo com a Carta,

Afirmando que os povos indígenas são iguais a todos os demais povos e reconhecendo ao mesmo tempo o direito de todos os povos a serem diferentes, a se considerarem diferentes e a serem respeitados como tais,

[...]

Proclama solenemente a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, cujo texto figura à continuação, como ideal comum que deve ser perseguido em um espírito de solidariedade e de respeito mútuo:

Artigo 1

Os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito internacional dos direitos humanos.

Artigo 2

Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e indivíduos e têm o direito de não serem submetidos a nenhuma forma de discriminação no exercício de seus direitos, que esteja fundada, em particular, em sua origem ou identidade indígena. [...]

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Declaracao_das_Nacoes_Unidas_sobre_os_Direitos_dos_Povos_Indigenas.pdf.
Excerto adaptado.

09. No trecho da Declaração apresentado, está claro que os indígenas:

- A) têm nacionalidade internacional, sendo povos de todas as nações.
- B) não podem ser discriminados em razão de sua identidade.
- C) sendo povos diferentes, têm direito a leis específicas para cada tribo.
- D) gozam da liberdade de manifestarem a sua fé como queiram.
- E) não devem ser tratados especificamente como cidadãos brasileiros.

10. No trecho: “Os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao pleno desfrute de todos os direitos humanos [...]”, o segmento destacado significa:

- A) como povo ou como indivíduo.
- B) se tiverem algum título indígena.
- C) quer pertençam a alguma tribo ou não.
- D) se estiverem dentro ou fora de sua tribo.
- E) mesmo que não tenham família indígena.

11. Assinale a alternativa na qual as formas verbais estão corretas.

- A) Não se surpreenda se você vir pessoas desrespeitando os direitos dos índios.
- B) Há quem ainda acredite que os povos indígenas não tem problemas de saúde.
- C) É preciso que todos os governantes dêem atenção especial aos povos indígenas.
- D) Somente se os povos indígenas fizerem uma forte pressão social, garantirão seus direitos.
- E) Muitos índios quiseram direitos iguais, mas poucos, de fato, conseguiram.

12. Observe que na expressão “Assembleia Geral”, presente no Texto 2, a palavra “assembleia” está grafada sem acento, em conformidade com as normas ortográficas vigentes. Está igualmente de acordo com as normas a grafia de:

- A) heroína
- B) tireóide
- C) auto-retrato
- D) voo
- E) pêlo.

13. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em:

- A) direito à ser livre
- B) direito à liberdade plena
- C) direito à uma vida digna
- D) direito à respeito e atenção
- E) direito à remunerações justas

TEXTO 3



Disponível em: <https://imagohistoria.blogspot.com/2017/03/charges-historicas-descobrimento-do.html>. Acesso em 17/10/2019.

14. Com base na proposta temática do Texto 3, é correto afirmar que, nele, o autor pretendeu defender que:

- A) as crianças devem ser estimuladas a criarem histórias acerca do descobrimento do Brasil.
- B) o descobrimento do Brasil precisa ser contado numa versão mais fácil para as crianças.
- C) os índios desconhecem a verdadeira história acerca do descobrimento do Brasil.
- D) as crianças têm dificuldade de entender que não foram os índios que descobriram o Brasil.
- E) é preciso estudar, na escola, outras versões acerca do descobrimento do Brasil.

15. Os sinais de interrogação e exclamação foram empregados juntos, no segundo e terceiro quadrinhos, com a intenção de:

- A) sinalizar que o garoto falou muito alto.
- B) indicar que a pergunta feita era retórica.
- C) reforçar a ideia de espanto do garoto.
- D) sugerir que o garoto estava sendo irônico.
- E) representar entonação descendente na fala.

Conhecimentos Específicos

16. Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial constituem os sinais vitais (SSVV). As alterações dos SSVV geralmente indicam mudanças na saúde. Sobre esses indicadores, é correto afirmar:

- A) Bradicardia, hipoventilação, letargia, tremores e perda de consciência são sinais e sintomas de hipertensão arterial.
- B) Valores normais para a frequência de pulso de um paciente adulto é de 70 a 110 bat/min.
- C) A hipotermia é uma temperatura abaixo de 36°C que pode ser causada por uma exposição prolongada ao frio.
- D) O deficit de pulso ocorre frequentemente em pacientes jovens do sexo masculino e não está associado a arritmias cardíacas.
- E) Para a estimativa do nível da pressão sistólica, palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, desinflar rapidamente e aguardar de 15 a 30 segundos antes de inflar novamente; essa é uma das etapas da mensuração da pressão arterial.

17. M.S.B, 55 anos, sexo feminino, internada na clínica médica de um hospital universitário apresenta os seguintes SSVV: T= $38,2^{\circ}\text{C}$, R=18 mov/res/min, PA=130x85 mmHg e P= 95 bat/min. Sendo os SSVV parte do exame do paciente, como o Técnico de Enfermagem caracteriza os SSVV de M.S.B?

- A) Febre moderada, eupneia, pré-hipertensão e normofigmia.
- B) Afebril, dispneia, normotensão e normofigmia.
- C) Febrícula, bradpneia, hipertensão e bradisfigmia.
- D) Febre alta, taquipneia, normotensão e taquisfigmia.
- E) Febrícula, eupneia, hipertensão estágio 1 e normofigmia.

18. Sobre os cuidados de enfermagem na coleta de materiais para exames laboratoriais, assinale a alternativa correta.

- A) O período de jejum habitual para a coleta de rotina de sangue é de 8 horas, que podem se prolongar até acima de 16 horas, sem trazer prejuízos ao resultado.
- B) Para a coleta do material fecal, utilizar frascos específicos com conservante; nessas condições, as formas parasitárias se mantêm íntegras e bem preservadas por, pelo menos, trinta dias em temperatura ambiente.
- C) Na coleta de urina de pacientes com sonda vesical de demora para cultura de aeróbio, fungos e pesquisa de fungos, a sonda deve ser mantida fechada por um período de 24 horas, antes de colher a urina,
- D) A coleta de urina de pacientes com sonda vesical pode ser feita da própria bolsa coletora, colhendo um total de 30 a 60 ml de urina.
- E) Na escolha do local de punção venosa, as veias basilica mediana e cefálica são as mais frequentemente utilizadas. A veia cefálica mediana costuma ser a melhor opção, pois a basilica é mais propensa à formação de hematomas.

19. O enfermeiro precisa realizar um exame físico em um paciente que apresenta dispneia severa. Em que posição o Técnico de Enfermagem deve colocar esse paciente?

- A) Ventral
- B) Trendelenburg
- C) Fowler
- D) Dorsal
- E) Litotímica

20. Considerando as práticas seguras para prevenção de lesão por pressão em serviços de saúde, analise as proposições abaixo.

- 1) Uso de colchão especial, almofadas e/ou de coxins, para redistribuir a pressão. Uso de apoio (travesseiros, coxins ou espumas) na altura da panturrilha, a fim de erguer os pés e proteger os calcanhares.
- 2) Manutenção da higiene corporal, mantendo a pele limpa e seca.
- 3) Hidratação diária da pele do paciente com hidratantes e umectantes, e massagem nas proeminências ósseas.
- 4) Uso de barreiras protetoras da umidade excessiva, quando necessário, como, por exemplo: creme barreira, película semipermeável, espuma de poliuretano, sacos retais e/ou substâncias oleosas.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 4.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

21. Considerando o cuidado e tratamento de feridas, as feridas com cicatrização por primeira intenção (bordas aproximadas por sutura), analise as proposições abaixo.

- 1) Recomenda-se permanecer com curativo estéril por 24 h a 48 h, exceto se houver drenagem da ferida ou indicação clínica.
- 2) Deve-se realizar limpeza exaustiva da lesão até a retirada dos debris, crostas e do exsudato presente no leito da ferida.
- 3) Deve-se avaliar local da incisão; se não apresenta exsudato, manter as incisões expostas até a remoção da sutura.
- 4) Deve-se proceder a limpeza da lesão inicialmente com Soro Fisiológico 0,9%, removendo crostas e sujidades. Após, realizar aplicação de álcool a 70%.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 3 e 4.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 2 e 3.
- E) 2, e 4.

22. A higiene corporal é imprescindível para a manutenção da saúde, fundamental para a prevenção de lesões na pele e para a promoção do conforto, e ainda possibilita uma melhor avaliação do estado geral do paciente. Para os pacientes totalmente dependentes da enfermagem, o banho no leito é o mais indicado. Quanto a esse procedimento, é correto afirmar que:

- A) o procedimento do banho no leito deve ser iniciado pelos membros inferiores e pés, em seguida, membros superiores e mãos, que devem ser colocados em uma bacia com água morna.
- B) a toalha ou luva de banho, que substitui a luva de procedimentos, está contraindicada, porque pode trazer riscos de infecção hospitalar por microrganismos gram-negativos.
- C) a higiene da face deve ser realizada com sabão neutro e os olhos devem ser higienizados do canto externo para o interno, evitando, assim, o risco de infecção.
- D) a higiene do couro cabeludo e a higiene íntima não fazem parte do banho no leito completo, devem realizados separadamente, já que esses procedimentos não devem ser diários.
- E) no momento do banho, o técnico de enfermagem deve observar o comprometimento da integridade do tegumento, evitar massagear áreas avermelhadas da pele, preservar e manter pérvios os possíveis dispositivos instalados, primando pela privacidade e pelo conforto do paciente.

23. Na clínica médica de uma unidade hospitalar, o paciente J. S, sexo masculino, 57 anos, consciente, foi admitido com hipótese diagnóstica de pancreatite leve. Para manter o suporte nutricional adequado, foi prescrita a instalação de uma sonda nasoenteral (SNE) para alimentação. Quanto à alimentação por SNE, é correto afirmar que:

- A) a nutrição por SNE refere-se à administração de nutrientes diretamente na cavidade estomacal. Esse tipo de alimentação deve ser administrado nos pacientes acamados que têm risco aumentado de aspiração.
- B) para administrar a alimentação enteral, o paciente deve estar confortável e posicionado o mais próximo possível do decúbito de Fowler, evitando o risco de aspiração.
- C) o paciente deve ser avaliado antes e após a administração da dieta enteral; a ausculta intestinal deve ser realizada imediatamente após o procedimento, a fim de identificar a presença de peristalse.
- D) a alimentação enteral deve ser administrada fria, pois dessa forma evitam-se as cólicas gástricas tão comuns ao iniciar a infusão da solução.
- E) no caso da SNE, evita-se verificar o posicionamento da sonda antes de realizar a administração da alimentação, uma vez que manusear a sonda pode fazer com que ela saia da posição e cause transtorno para o paciente.

24. Sobre a assistência de enfermagem no transporte de pacientes, é correto afirmar que é de responsabilidade do Técnico em Enfermagem:

- A) entrar em contato com o local de destino, dando informações sobre o quadro clínico e dados pessoais do cliente.
- B) classificar o tipo de transporte: baixo, médio e alto risco e estimar os tempos de transporte e de permanência do cliente no local de destino.
- C) realizar o planejamento do transporte: meio de locomoção; trajeto; tempo de permanência; materiais e equipamentos necessários; cuidados específicos e número e categoria dos profissionais envolvidos.
- D) elevar as grades laterais da cama/maca; checar novamente o funcionamento dos equipamentos portáteis, se for o caso, e cobrir o cliente com lençol ou cobertor.
- E) programar e instalar o ventilador de transporte (VT) (ciclado a pressão e/ou a volume), ajustando-o às necessidades do paciente, observando o padrão respiratório, ausculta pulmonar e sinais vitais.

25. Quanto às vias de administração de medicamentos assinala a afirmativa correta.

- A) Os medicamentos aplicados na pele e na mucosa geralmente possuem efeitos gerais, pois chega rapidamente à corrente sanguínea.
- B) O músculo ventroglúteo está situado profundamente e afastado dos principais nervos e vasos sanguíneos, local mais seguro e preferido para administração nos adultos, crianças e neonatos.
- C) As injeções intradérmicas são utilizadas para medicamentos de ação e absorção rápida, e resposta terapêutica imediata.
- D) A via intravenosa tem ação imediata, é importante seguir rigorosamente os 11 certos para a administração segura, porém essa via é contraindicada quando se necessita estabelecer níveis sanguíneos terapêuticos constantes.
- E) Na administração por via subcutânea, a medicação é colocada dentro do tecido conjuntivo frouxo, facilitando, assim, a absorção rápida do medicamento.

26. Para um paciente atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento foi prescrito: 500 mL de SG a 5% e 1000 mL de SF a 0,9% para ser administrado por via endovenosa em 24 horas. Calcule o gotejamento em microgotas e o volume de infusão por hora.

- A) 21 microgotas/minuto e 42 mL/hora.
- B) 43 microgotas/ minuto e 42,5 mL/ hora.
- C) 23 microgotas/ minuto e 46 mL/ hora.
- D) 63 microgotas/ minuto e 62,5 mL/ hora.
- E) 72 microgotas/ minuto e 35 mL/ hora.

27. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), os registros realizados no prontuário do paciente são considerados como um documento legal de defesa dos profissionais, devendo, portanto, estarem imbuídos de autenticidade e de significado legal. Eles refletem todo o empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando, assim, suas ações e a segurança do paciente. Sobre registro de enfermagem, leia as afirmações abaixo.

- 1) É responsabilidade do Técnico de Enfermagem assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro, uma vez que os registros não podem ficar sem assinatura.
- 2) O registro de enfermagem deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional.
- 3) As anotações de enfermagem não precisam ser registradas após a realização de cada procedimento executado pelo Técnico de Enfermagem, só devendo serem registradas no final de cada plantão, para evitar repetição de informação sobre o paciente.
- 4) O Técnico de Enfermagem deve realizar o registro de enfermagem após cada procedimento executado e em seguida assinar, sendo ainda obrigatório o uso do carimbo.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 3.
- B) 1 e 2.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 4.
- E) 3 e 4.

28. A Precaução de Contato deve ser utilizada sempre que houver infecção (ou suspeita de infecção) ou colonização por bactérias multirresistentes ou microorganismos epidemiologicamente importantes, passíveis de transmissão por contato direto. O conjunto de medidas que inclui a precaução de contato, além da higienização das mãos, é formado pelo uso de:

- A) luvas e avental.
- B) luvas, avental, quarto privativo com portas fechadas e máscara.
- C) luvas, avental, quarto privativo e equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio, de uso exclusivo do paciente.
- D) máscara cirúrgica para o paciente, máscara 95 para o profissional e quarto privativo.
- E) luvas, avental e quarto privativo.

29. O ambiente ocupado por pacientes pode funcionar como reservatório para microrganismos resistentes (MR), favorecendo a disseminação desses agentes. As rotinas de limpeza, desinfecção ambiental e isolamento são indispensáveis para a prevenção da transmissão desses microrganismos no ambiente hospitalar. Partindo desta premissa, deve-se isolar um paciente quando:

- A) ele apresenta sintomas de febre, calafrios e tosse produtiva há mais de 24h.
- B) é preciso prolongar o período de seu internamento por ausência de diagnóstico conclusivo.
- C) ele apresenta contagem de leucócitos acima de $17.000/\text{mm}^3$.
- D) não há vaga para a sua transferência para outro hospital.
- E) se quer evitar infecção cruzada entre pacientes internados.

30. Sobre os cuidados imediatos realizados ao recém-nascido (RN), analise as proposições abaixo.

- 1) O RN a termo e com boa adaptação ao ambiente extrauterino, ao nascimento, deverá ser colocado no colo da mãe dentro do primeiro minuto de vida.
- 2) Recomenda-se a administração de 1mg de vitamina K, por via intradérmica, em todos os RN nascidos a termo para evitar hemorragias.
- 3) Todo RN e sua mãe devem receber uma identificação, através de pulseira fixada no tornozelo. Ela deve conter, no mínimo, as seguintes informações: nome da mãe e registro; data e hora do nascimento e sexo do neonato.
- 4) O Ministério da Saúde recomenda a administração de uma gota de nitrato de prata a 1% em cada olho de todos os recém-nascidos. RN do sexo feminino devem receber 1 gota adicional do nitrato de prata a 1% na genitália externa.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 1 e 2.
- C) 1 e 3.
- D) 2 e 3.
- E) 2 e 4.

31. Sobre o crescimento e desenvolvimento infantil, assinale a alternativa correta.

- A) O melhor método de acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico do peso, da estatura e do IMC da criança na Caderneta de Saúde da Criança.
- B) Na avaliação do crescimento infantil, é considerada com peso adequado para a idade a criança que estiver entre o escore $z > -3$ e $z < -2$ na curva de peso para a idade da caderneta da criança.
- C) O perímetro cefálico (PC) deve ser verificado em todas as crianças de zero a 18 meses. Crianças com PC escore $z >$ que -2 escores ou $z >$ que $+2$ escores apresentam risco de atraso no desenvolvimento.
- D) Espera-se que aos seis meses a criança consiga se manter sentada, sem apoio.
- E) Aos 15 meses, a criança deve ficar de pé e andar com apoio de um adulto.

32. Sobre os cuidados de enfermagem nas queimaduras, assinale a alternativa correta.

- A) Nas queimaduras de segundo grau, existe lesão da epiderme e parte da derme. A lesão causada provoca eritema e evolui sem necessidade de curativos.
- B) No atendimento às queimaduras térmicas, no ambiente pré-hospitalar, a primeira intervenção do profissional de saúde será realizar a limpeza das lesões e aplicação de curativo.
- C) Segundo a extensão, são considerados grandes queimados indivíduos que possuem mais de 20% de área corporal queimada.
- D) Segundo a regra dos nove, que auxilia na determinação da extensão da queimadura, cada membro inferior de um adulto queimado equivale a 9% de superfície corpórea.
- E) A administração de oxigenoterapia só é indicada quando existe suspeita de queimadura nas vias aéreas inferiores.

33. Sobre os acidentes envolvendo picadas de animais peçonhentos, assinale a alternativa correta.

- A) No atendimento pré-hospitalar de acidentes por animais peçonhentos, o técnico socorrista deve, além dos cuidados à vítima, capturar o animal.
- B) Os acidentes com escorpião classificados como graves, apresentam, inicialmente, manifestações locais como parestesia e dor.
- C) Pessoas com extremos de idade (crianças e idosos) devem receber atenção especial quando sofrem acidentes com animais peçonhentos, porque são mais susceptíveis a complicações decorrentes do veneno inoculado.
- D) Nos acidentes com abelhas, o grau de sensibilidade da vítima não interfere na sensibilidade da reação causada, e o quadro será grave, independentemente do número de ferroadas.
- E) Os acidentes com formiga não causam reações graves e não necessitam de assistência médica de urgência.

34. A adolescência é marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. Sobre os fatores de risco relacionados aos agravos físicos, psíquicos e sociais na adolescência, assinale a alternativa correta.

- A) São considerados risco biológico na adolescência, a depressão e o uso e abuso de drogas.
- B) A depressão, uso e abuso de drogas são considerados fatores de risco emocional na adolescência.
- C) Pais alcoolistas, com transtornos mentais, são fatores de risco inerentes à adolescência.
- D) Morar em áreas de tráfico de drogas e pobreza extrema são riscos inerentes à faixa etária.
- E) Obesidade e doenças crônicas não acometem gravemente os adolescentes.

35. A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. Quanto a essa infecção, assinale a afirmativa correta.

- A) A primeira manifestação da sífilis é caracterizada pela presença de manchas avermelhadas na pele da palma da mão e da planta dos pés.
- B) A transmissão é exclusivamente sexual, não ocorrendo por transfusão de sangue ou derivados.
- C) Por tratar-se de doença sexualmente transmissível, no Brasil, a sífilis não é doença de notificação compulsória.
- D) Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para formas mais graves, costumando comprometer especialmente o sistema nervoso e o cardiovascular.
- E) O tratamento deve ser realizado por via intramuscular, realizado exclusivamente em ambientes com suporte hospitalar.

36. A Vacina dTpa deve ser administrada durante a gestação. Considerando as recomendações e cuidados para a administração dessa vacina durante a gestação, assinale a alternativa correta.

- A) Gestantes com esquema vacinal completo com dT e dTpa, numa nova gestação recente (menos de 5 anos), não precisam ser revacinadas com dTpa.
- B) Em gestantes não vacinadas previamente, devem-se administrar três doses de vacina, sendo duas doses de dT, em qualquer momento da gestação, e uma dose de dTpa, a partir da vigésima semana de gestação.
- C) Para gestantes que precisam tomar mais de uma dose da vacina, o intervalo entre as doses deve ser idealmente de 90 dias ou no mínimo 45 dias.
- D) Gestantes com esquema de vacinação completo, recente, com a vacina dT só precisam tomar a vacina dTpa se acontecer uma nova gestação, depois de mais de cinco anos após a última dose da Dt ou dTpa.
- E) Para as gestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, deve-se administrar uma dose de dTpa no puerpério, após quatro semanas de pós-parto.

37. A hemorragia pós-parto (HPP) é um problema sério que pode levar muitas mulheres ao óbito. Diante da necessidade de prevenção e controle deste problema para evitar desfechos fatais, assinale a alternativa correta.

- A) A HPP pode ocorrer devido a retenção de restos placentários, lacerações de trajeto do parto; hipotonia uterina e coagulopatias. A principal causa, no entanto, é a hipotonia uterina.
- B) A HPP é a perda sanguínea acima de 700 ml, após parto vaginal; ou acima de 1500 ml, após parto cesariana nas primeiras 24 horas; ou qualquer perda de sangue pelo trato genital, capaz de causar instabilidade hemodinâmica.
- C) O principal fator de risco para a ocorrência da HPP é o parto prolongado com toques repetidos, devido ao aumento do risco de lacerações no colo, vagina, períneo e vulva.
- D) A principal forma de prevenir a HPP é a utilização de sulfato ferroso na gestação.
- E) A administração de ocitocina para a prevenção da HPP deve ser, de preferência, por via endovenosa.

38. O cuidado da mulher no puerpério é fundamental para a saúde materna e neonatal e deve incluir o pai, a família em seus diversos arranjos e toda a rede social envolvida nesta fase do ciclo vital e familiar. Em relação aos cuidados recomendados para a mulher nesta fase, assinale a alternativa correta.

- A) A puérpera que deseja contracepção no pós-parto pode ser orientada a solicitar a colocação do DIU (dispositivo intrauterino), após 48 horas de pós-parto e até as primeiras quatro semanas.
- B) O DIU no pós-parto só pode ser colocado após a saída da placenta, no pós-parto normal, contraindicando-se no pós-parto cirúrgico.
- C) Em mulheres que não amamentam, o uso de contraceptivos hormonais está contraindicado.
- D) O uso de medicamento para prevenir anemia ferropriva (sulfato ferroso), no pós-parto de mulheres que amamentam, deve ser suspenso logo após o parto ou, se detectada anemia no pós-parto, manter a medicação a critério médico.
- E) O agendamento da consulta ambulatorial da puérpera deve ser realizado até, no máximo, 42 dias de pós-parto.

39. A infecção do trato urinário (ITU) pode ocorrer na uretra, bexiga, ureteres e rins. Sobre ITU analise as afirmações abaixo.

- 1) Vários microorganismos podem causar a ITU, porém a *Escherichia coli* é a responsável pela maioria dos casos.
- 2) Todos os pacientes com ITU e internados na clínica médica têm indicação de sondagem vesical de demora.
- 3) Homens, mulheres e crianças estão sujeitos à infecção, mas ela é mais prevalente em mulheres porque suas características anatômicas as tornam mais vulneráveis.
- 4) Os sintomas dependem do local onde a bactéria se instala. Quando a bactéria infecta os rins, pode causar febre alta, dores nas costas (do lado do rim infectado), náuseas e vômitos.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 2 e 3.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.
- E) 1, 2 e 3.

40. Na anemia falciforme, a baixa disponibilidade de hemoglobina carreadora do oxigênio é a responsável pela

- A) dispneia.
- B) hepatomegalia.
- C) hipertensão.
- D) cianose.
- E) taquicardia.

41. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou encefálico (AVE) pode ser isquêmico ou hemorrágico. Acerca dessa doença vascular, analise as afirmativas abaixo.

- 1) O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), o mais comum, é causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro, decorrente da obstrução de uma artéria.
- 2) Nos dois tipos de AVC, uma vez que o sangue, que contém nutrientes e oxigênio, não chega a determinadas áreas do cérebro, ocorre a perda das funções dos neurônios, causando os sinais e sintomas os quais dependerão da região do cérebro envolvida.
- 3) A escala de coma de Glasgow é um parâmetro de avaliação dos pacientes que apresentam acidentes vasculares; nessa escala, a pontuação para abertura ocular espontânea é 2.
- 4) Na avaliação da resposta verbal através da escala de coma de Glasgow, o Técnico de Enfermagem pontuou com 3, o que corresponde ao paciente confuso.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2 e 3.
- C) 3 e 4.
- D) 2 e 4.
- E) 1 e 2.

42. Quanto às doenças isquêmicas do miocárdio, assinale a afirmativa correta.

- A) A Arteriosclerose, doença universal que acomete muitos indivíduos, especialmente no mundo ocidental, é responsável por 45% das mortes na população adulta.
- B) A Angina é definida como desconforto ou dor retroesternal, desencadeada por exercício físico ou estresse emocional.
- C) Paciente portador de coronariopatia não deve receber o ácido acetilsalicílico, em virtude do risco de sangramento iminente.
- D) Na angina existem fatores que melhoram a dor imediatamente, como: parar o esforço físico, repousar e fazer uso de AAS.
- E) A dor tende a ter aparecimento e desaparecimento súbito e dura no máximo 1 minuto; caso a dor persista, o paciente deve ser encaminhado para emergência.

- 43.** Sobre o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), assinale a alternativa correta.
- A) O IAM apresenta dor torácica constrictiva, com ou sem irradiação para a mandíbula, de forte intensidade e de início agudo.
 - B) O diagnóstico do IAM é feito apenas pelo eletrocardiograma.
 - C) Os principais fatores desencadeantes do IAM, são: embolia gordurosa, hipertensão, Diabetes Mellitus, leucemia e prótese valvular.
 - D) O exame laboratorial para avaliação das enzimas só deve ser realizado após 24 horas do início do evento.
 - E) Ao ser admitido em uma Unidade de Tratamento Intensivo, o tratamento do paciente é baseado especificamente na realização do RX e da monitoração do eletrocardiograma – ECG.
- 44.** O paciente João compareceu ao Serviço de Pronto Atendimento apresentando epigastralgia importante há 5 dias. Ao realizar a anamnese e o exame físico, o enfermeiro sugeriu a possibilidade de o paciente estar apresentando um quadro de gastrite. Após a solicitação de exames de imagem e demais exames complementares, a hipótese diagnóstica foi confirmada pela equipe médica. Foi traçado pelo enfermeiro e delegado ao técnico de enfermagem um plano assistencial, em que o técnico de enfermagem deve orientar quanto à:
- A) importância de uma alimentação branda, entretanto, não haverá restrição para alimentos que contenham cafeína ou álcool.
 - B) alimentação não irritativa, promovendo uma nutrição adequada; administrar os medicamentos prescritos, estabelecer avaliação criteriosa da dor.
 - C) dieta livre, sem restrição; retirar os fatores determinantes da gastrite fazendo uso de medicação anti-inflamatória.
 - D) importância do uso correto e dos horários dos anti-inflamatórios não esteroides; orientar quanto à necessidade de uma alimentação líquida não irritativa, orientar quanto à importância do controle do estresse.
 - E) importância do controle do estresse, administrar medicação anti-inflamatória para dor, orientar a dieta livre.
- 45.** As doenças metabólicas são bastante importantes, pois podem comprometer o funcionamento de diversos sistemas do organismo. O fígado é um órgão importante para o controle metabólico. Quanto às manifestações da disfunção hepática, é correto afirmar que:
- A) a icterícia é causada pela diminuição da concentração de bilirrubina no sangue, levando a uma coloração amarronzada da pele, mucosas e escleras.
 - B) a ascite provoca o abdômen escavado; realizar a medida diária desse abdômen auxilia no controle da patologia.
 - C) a ascite provoca o aumento da circunferência abdominal, podendo causar inclusive falta de ar, pelo aumento exagerado do abdômen.
 - D) a hipertensão portal refere-se à pressão diminuída em todo o sistema porta e que pode resultar na presença de icterícia, como sua principal manifestação.
 - E) a principal complicação da hipertensão portal é a hemorragia digestiva baixa, que pode levar à hipóxia com risco de morte.
- 46.** O “diabetes mellitus” (DM) é uma patologia complexa que causa um transtorno metabólico caracterizado por hiperglicemia, e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. É uma patologia preocupante que vem sendo considerada um grave problema de saúde pública. Sobre o DM tipo 2, é correto afirmar:
- A) dor abdominal, presença de retenção urinária com disúria são sintomas comuns no início da doença.
 - B) dentre os fatores precipitantes, a obesidade é um dos mais prevalentes e pode ser avaliada através do índice de massa corporal (IMC).
 - C) um dos sinais importantes para o rastreio da patologia é a presença de hipotensão arterial.
 - D) os primeiros sinais e sintomas aparecem com maior prevalência na primeira década de vida.
 - E) o DM tipo 2 tem início agudo já com o aparecimento de um quadro grave.
- 47.** As arboviroses têm constituído uma grande preocupação para as autoridades em Saúde Pública e para a população. Qual das doenças apresentadas abaixo é transmitida pelo *aedes aegypti* e que pode causar malformações congênitas nos bebês de mães acometidas pela virose no decorrer da gestação?
- A) Dengue
 - B) Chikungunya
 - C) Sarampo
 - D) Zika
 - E) Roséola
- 48.** O Sarampo é uma doença viral, infecciosa e aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa. Assinale os principais sinais e sintomas dessa viremia.
- A) Provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas, entre elas, o exantema cutâneo maculopapular, morbiliforme, de coloração vermelha e de direção cefalocaudal.
 - B) Caracteriza-se por febre baixa, exantema de início súbito com lesões que iniciam nos membros inferiores, principalmente na região do calcanhar.
 - C) No período de infecção, o paciente pode apresentar tosse produtiva, conjuntivite purulenta, febre baixa e um quadro exantemático, iniciado pelo abdômen.
 - D) O período de remissão tem como sinais e sintomas um quadro característico de superinfecção viral ou bacteriana; os adultos e as crianças desnutridas são os mais acometidos pelas lesões exantemáticas.
 - E) As manchas de Koplik são pequenos pontos brancos amarelados que aparecem na mucosa nasal, após o exantema, no período de remissão.

49. Sobre os cuidados de enfermagem nas disfunções respiratórias, assinale a alternativa correta.

- A) É importante remover as secreções retidas, de forma mecânica, independentemente da condição em que se encontra o paciente, para facilitar a troca gasosa.
- B) A tosse precisa ser iniciada através de estímulos para direcionar a umidificação das secreções.
- C) O uso de máscara facial com alta umidade libera o ar quente e umidificado para a árvore brônquica, ajuda a liquefazer as secreções e alivia a irritação traqueal.
- D) O técnico de enfermagem delibera, de forma efetiva, a necessidade de se administrar e ajustar a terapia com oxigênio.
- E) É importante manter o repouso do paciente no leito a maior parte do tempo, respeitando a posição de Sim's para facilitar a drenagem de secreções.

50. Acerca das Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (DPOC), analise as proposições abaixo.

- 1) Segundo a Organização Mundial de Saúde, a DPOC é um estado patológico caracterizado por limitação do fluxo de ar, que não é totalmente reversível.
- 2) A fibrose cística, a bronquiectasia e a asma são atualmente classificadas como distúrbios pulmonares crônicos e não mais como DPOC.
- 3) Na DPOC, a limitação do fluxo de ar é progressiva e está associada a uma resposta inflamatória normal nos pulmões para partículas ou gases nocivos.
- 4) No enfisema pulmonar, o comprometimento da troca de gases resulta da destruição das paredes hiperdistendidas dos alvéolos.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.
- E) 3 e 4.

51. Sobre as modalidades de assistência à saúde do idoso, assinale a alternativa correta.

- A) As Unidades Básicas de Saúde (UBS) têm pouca importância, uma vez que não são a porta de entrada do atendimento ao idoso.
- B) Nas UBS, o atendimento à saúde bucal do idoso é o único que se destaca devido às ações realizadas pelos profissionais.
- C) Os centros-dia são centros de atenção diurna, criados para idosos dependentes ou graves, garantindo às famílias um apoio sustentado.
- D) As instituições de longa permanência (ILP) são uma garantia para os idosos mais independentes em suas necessidades básicas de vida diária.
- E) O hospital-dia é um lugar onde os pacientes usam uma parte do dia sob um regime terapêutico e que promove serviços de diagnóstico e reabilitação, sem necessidade de internação.

52. As vacinas permitem à prevenção, o controle, a eliminação e a erradicação das doenças imunopreveníveis, assim como a redução da morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua utilização bastante custo-efetiva. A via de administração e a dosagem da vacina BCG são, respectivamente:

- A) via intradérmica e 0,5 mL.
- B) via subcutânea e 1,5 mL.
- C) via intramuscular e até 5 mL.
- D) via intramuscular e 0,5 mL.
- E) via endovenosa e 0,5 mL.

53. A assistência ao paciente crítico requer cuidados de toda a equipe para evitar o risco de transmissão de infecções. Quais ações de enfermagem podem ser desenvolvidas pelo técnico para prevenção das pneumonias associadas a ventilação mecânica?

- A) Não aspirar a secreção subglótica conforme indicado, para não haver irritação da mucosa e exacerbação do processo inflamatório.
- B) Manter o paciente em decúbito dorsal com o objetivo de não mobilizar a secreção traqueobrônquica.
- C) Evitar o uso de antissépticos no momento da higiene oral, prevenindo irritação da mucosa.
- D) Manter o decúbito elevado em 30-45°, evitando, assim, o risco de infecção e o aparecimento da pneumonia.
- E) Manter por 7 dias, sem desinfecção ou troca, o uso dos inaladores e nebulizadores; após esse período, realizar uma desinfecção com álcool a 70°.

54. Na emergência psiquiátrica, um paciente foi admitido pela equipe de enfermagem com um quadro de percepções sensoriais falsas, não associadas a estímulos externos reais. Este paciente está apresentando

- A) alucinação.
- B) projeção.
- C) delírio.
- D) supressão.
- E) isolamento.

55. Sobre a estrutura física do Centro de Material e Esterilização, relacionada ao fluxo unidirecional dos artigos, assinale a alternativa correta.

- A) Área de recepção e limpeza é considerada setor limpo.
- B) Área de preparo e esterilização é considerada setor sujo.
- C) Área de aquisição é considerada setor auxiliar.
- D) Área de monitoramento do processo de esterilização é considerada setor limpo.
- E) Área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados é considerada setor sujo.

56. Sobre a assistência da enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatório, assinale a alternativa correta.

- A) O período pré-operatório abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até a transferência do paciente para a mesa cirúrgica.
- B) O trans e intra- operatório se iniciam com a saída do paciente do centro cirúrgico.
- C) O pós-operatório é o momento da alta do paciente.
- D) O pré-operatório mediato corresponde às 24 horas anteriores à cirurgia.
- E) No pré-operatório imediato, o paciente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que auxiliarão o planejamento cirúrgico.

57. Em relação à vigilância epidemiológica, analise as afirmativas a seguir.

- 1) Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada por profissionais de saúde ou por responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- 2) Vigilância sentinela é um modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, e é imposta de forma obrigatória aos gestores de saúde.
- 3) Evento de saúde pública é uma situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida.
- 4) As ações de vigilância epidemiológica se iniciam com a notificação das doenças, seguida da investigação dos casos.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 2 e 4.
- E) 2 e 3.

58. A vigilância sanitária originou-se na Europa dos séculos XVII e XVIII e no Brasil dos séculos XVIII e XIX, com o surgimento da noção de “polícia sanitária”. Acerca desse tema, analise as afirmativas a seguir.

- 1) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- 2) A partir da interpretação da Constituição e Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080, artigo 18), depreende-se que é dada ao município a competência para a execução de todas as ações de vigilância sanitária.
- 3) As ações de vigilância sanitária abrangem o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviço, que nem sempre se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

- 4) As equipes de trabalho da vigilância sanitária devem ser multiprofissionais, pois seus campos de abrangência se inter-relacionam e, conseqüentemente, as ações programáticas também.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 3 e 4.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 2 e 4.

59. Sobre os princípios e responsabilidades do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- A) o princípio da Integralidade tem como objetivo diminuir as desigualdades.
- B) a Universalidade é o princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades.
- C) a Equidade objetiva diminuir as desigualdades, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
- D) a Equidade considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
- E) o princípio da Integralidade garante que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

60. Sobre a Resolução COFEN 564/2017, assinale a alternativa correta.

- A) Nos princípios fundamentais, o cuidado de enfermagem se fundamenta exclusivamente no conhecimento das ciências humanas e sociais aplicadas e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana do assistir.
- B) No capítulo I, dos direitos, no art. 6, o fundamental é direcionar e aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos de excelência para a prática profissional.
- C) No capítulo II, dos deveres, no art. 33, os dados cadastrais só precisam ser atualizados na instituição profissional onde o profissional exerce as atividades profissionais.
- D) No capítulo III, das proibições, o ato de executar atividades que não sejam da sua competência técnica deverá ocorrer em caso(s) de urgência.
- E) No capítulo IV, das infrações e penalidades, a gravidade da infração é caracterizada por meio do(s) fato(s), do(s) ato(s) praticado(s) ou ato(s) omissos(s), e do(s) resultado(s).