

Caderno de Prova

S46

Médico (Urologia)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. **1808**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

17. Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. () Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. () Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. () Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. () Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. () A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. () A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. () A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. () A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

19. Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. () Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
- b. () Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
- c. () Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
- d. () Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
- e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.

20. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- b. () Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
- c. () Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
- d. () Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
- e. () Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.

21. Em relação ao achado no sedimento urinário na investigação de infecção, assinalar a alternativa **correta**.

- a. () Piúria com bacteriúria é indicativo de litíase.
- b. () Piúria com bactérias é indicativo de câncer de urotélio.
- c. (X) Piúria sem bacteriúria exige investigar tuberculose.
- d. () Piúria é a presença de células brancas na urina e geralmente é indicativo de corpo estranho no trato urinário.
- e. () Bacteriúria sem piúria indica infecção mais do que colonização.

22. A identificação da posição anterior ou posterior dos cálices renais é informação importante para a realização do acesso renal para a cirurgia percutânea. Em relação à anatomia dos cálices renais, podemos observar que:

- a. () Os cálices perpendiculares ocorrem em cerca de 40% dos casos.
- b. () Os cálices perpendiculares anteriores são facilmente identificáveis à urografia excretora.
- c. () Pelos achados da urografia excretora, os cálices anteriores apresentam posição mais lateral em 50% dos casos.
- d. (X) Em 50% das vezes a determinação precisa da posição anterior ou posterior dos cálices é difícil, mesmo com urografia excretora.
- e. () Pelos achados da urografia excretora, podemos concluir que os cálices posteriores apresentam posição mais lateral em 50% dos casos.

23. Em relação à técnica cirúrgica da nefrectomia parcial, assinalar a alternativa **correta**:

- a. (X) O isolamento e a ligadura da artéria segmentar superior devem ser o primeiro passo para a realização da nefrectomia do pólo superior.
- b. () A artéria segmentar posterior ou retropiélica deve ser ligada quando fazemos a nefrectomia do pólo superior.
- c. () O isolamento e a ligadura da artéria polar superior somente devem ser realizados em casos restritos de nefrectomia do pólo superior.
- d. () Mesmo quando existe artéria polar superior, devemos ligar a segmentar superior na nefrectomia do pólo superior.
- e. () Quando houver artéria polar inferior, esta não deve ser ligada, devido ao risco de necrose ureteral.

24. Assinalar em qual das condições relacionadas abaixo a pneumatúria é menos provável de ocorrer.

- a. () Diverticulite.
- b. () Diabetes mellitus.
- c. () Câncer de cólon sigmóide.
- d. (X) Fratura peniana com lesão de uretra.
- e. () Instrumentação do trato urinário recente.

25. Qual dessas doenças é a menos associada à candidúria?

- a. Hepatite.
 - b. Desnutrição.
 - c. Diabetes mellitus.
 - d. Doenças neoplásicas.
 - e. Doenças do trato urinário.
-

26. Na estenose arteriosclerótica da artéria renal, observa-se que a doença progressiva tende a causar mais deterioração da função renal do que a doença estável. Assinalar a alternativa que indica qual o papel da hipertensão arterial sistêmica nesse processo.

- a. A hipertensão está relacionada com agravamento do quadro.
 - b. A hipertensão está relacionada com melhora do quadro.
 - c. A hipertensão ajuda a manter a estabilidade do quadro.
 - d. A hipertensão não serve como marcador.
 - e. Somente a hipertensão arterial de causa renal está relacionada com agravamento do caso.
-

27. Em relação às funções da túnica albugínea do corpo cavernoso, assinale a alternativa **correta**.

- a. Contém o corpo esponjoso e fornece rigidez a estes.
- b. Contém o tecido erétil e fornece rigidez aos corpos cavernosos.
- c. Regula a entrada e saída do sangue dos sinusóides e contém o tecido erétil.
- d. Atua como um colchão, amaciando o impacto do pênis com o órgão feminino e regula o fluxo de sangue aos sinusóides.
- e. Serve como suporte para o corpo esponjoso e glândula e comprime o bulbo para ajudar a expelir o sêmen.

28. Em relação à hematúria macroscópica, assinale a alternativa **correta**.

- a. A hematúria total indica a causa do sangramento na próstata ou na uretra.
 - b. A hematúria no início do jato indica a causa do sangramento na próstata ou trígono vesical.
 - c. A hematúria no final do jato indica a causa do sangramento na próstata ou trígono vesical.
 - d. A hematúria no final do jato indica a causa do sangramento no trato urinário alto ou próstata.
 - e. A hematúria total indica a causa do sangramento na bexiga ou na uretra.
-

29. Quando comparamos a prostatectomia aberta (PA) com ressecção endoscópica da próstata RTU no tratamento da hiperplasia prostática benigna, assinale a alternativa **correta**.

- a. A RTU tem durabilidade maior do que a PA.
 - b. A hiponatremia dilucional é mais comum na PA.
 - c. A hemorragia perioperatória é mais comum de ocorrer na RTU do que na PA.
 - d. A PA necessita tempo de hospitalização menor do que a RTU.
 - e. A PA tem necessidade de retratamento menor do que a RTU.
-

30. A prostatectomia retropúbica (PRP) para tratamento da hiperplasia prostática benigna tem algumas vantagens sobre a prostatectomia transvesical (PTV). Assinale a alternativa que indica em qual das situações clínicas esta vantagem se confirma.

- a. Cálculo vesical.
- b. Paciente obeso.
- c. Menos sangramento.
- d. Divertículo de bexiga.
- e. Lobo mediano grande.

31. Em relação às doenças sexualmente transmitidas (DST), assinale a alternativa **correta**.

- a. () Os sintomas e sinais são mais freqüentes em mulheres do que em homens porque as mulheres tendem a ter maior número de parceiros do que os homens.
 - b. (X) Certas doenças tendem a ser mais freqüentes em homossexuais do que em heterossexuais.
 - c. () Os sintomas e sinais são mais facilmente identificáveis em mulheres do que em homens.
 - d. () A incidência de DST nas mulheres diminuiu nos últimos anos.
 - e. () Fatores socioeconômicos afetam muito pouco a prevalência e o tipo de DST.
-

32. Sabe-se que o tumor urotelial do trato urinário pode implantar-se desde a pelvis renal até a uretra. Assinale a alternativa mais adequada a esse fenômeno.

- a. (X) Presença de carcinogênese multi focal.
 - b. () A localização múltipla do tumor é ocorrência pouco freqüente.
 - c. () A recidiva em locais diferentes é ocorrência pouco freqüente.
 - d. () O implante por migração do tumor é pouco provável.
 - e. () A recorrência tumoral é devido a tratamento inicial inadequado.
-

33. Em relação aos tumores uroteliais, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É mais comum em afro-americanos do que em americanos brancos.
- b. () A incidência aumenta com a idade somente nos homens.
- c. () Apresenta formas mais agressivas da doença em americanos brancos do que em afro-americanos.
- d. () Mulheres americanas brancas apresentam menor sobrevida em 5 anos do que mulheres afro-americanas.
- e. (X) A sobrevida em 5 anos é maior em homens do que em mulheres.

34. Em tumores invasivos de bexiga, assinalar a alternativa que melhor se adequa à utilização da re-ressecção endoscópica nesses tumores:

- a. (X) É recomendada pela maioria dos autores.
 - b. () É recomendada pela maioria dos autores somente nos tumores superficiais.
 - c. () A maioria dos autores não recomenda essa prática.
 - d. () Pouco ajuda sobre a informação de doença residual.
 - e. () A maioria dos autores observa que não altera a sobrevida a longo prazo.
-

35. A tomografia computadorizada helicoidal (TC) é o exame de imagem padrão ouro para avaliação do trauma renal. Em relação ao assunto, qual das alternativas é a **correta** no sentido de detectar trauma renal de grande porte?

- a. () Hematoma lateral, extravasamento urinário medial, ausência de contraste no rim.
 - b. (X) Hematoma medial, extravasamento urinário medial, ausência de contraste no rim.
 - c. () Hematoma medial, extravasamento urinário medial, contrastamento normal do rim.
 - d. () Hematoma medial, extravasamento urinário medial, áreas de redução de contraste no rim.
 - e. () Hematoma medial, ausência de extravasamento urinário, ausência de contraste no rim.
-

36. Assinalar qual é a seqüência de agressividade crescente em relação aos subtipos de seminomas de testículos.

- a. () Anaplásico – clássico – espermatocítico.
- b. () Anaplásico – espermatocítico – clássico.
- c. () Clássico – anaplásico – espermatocítico.
- d. () Clássico – espermatocítico – anaplásico.
- e. (X) Espermatocítico – clássico – anaplásico.

37. Em relação aos tumores não seminomatosos do testículo, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O teratoma imaturo é o tumor mais freqüente em meninos.
 - b. () O tumor de saco vitelino apresenta como característica patológica típica estruturas semelhantes ao tecido benigno derivado do ectoderma, endoderma e mesoderma.
 - c. (X) O carcinoma embrionário apresenta como característica patológica típica células epitelióides distintamente malignas arranjadas em glândulas ou túbulos.
 - d. () O coriocarcinoma apresenta como característica principal tecidos primitivos indiferenciados das três camadas de células germinativas.
 - e. () O teratoma maduro apresenta como característica patológica típica a presença de sincitiotrofoblasto e citotrofoblasto.
-

38. A linfadenectomia é alternativa de tratamento importante na estratégia de tratamento do câncer de pênis. Com relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Deve ser realizada somente do lado em que houver linfonodos persistentemente aumentados após excisão da lesão primária de qualquer estágio.
- b. (X) Deve ser realizada bilateralmente em pacientes com linfonodos persistentemente aumentados após excisão da lesão primária de qualquer estágio.
- c. () Não deve ser realizada em pacientes com linfonodos persistentemente aumentados após excisão da lesão primária de qualquer estágio, se a biópsia ganglionar for negativa.
- d. () Deve ser realizada bilateralmente mesmo em pacientes cujos linfonodos regrediram após excisão da lesão primária de qualquer estágio.
- e. () Deve ser realizada bilateralmente mesmo em pacientes com doença disseminada.

39. Em relação às papilas coronais, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Estão relacionadas com malignidade.
 - b. (X) São encontradas comumente na glândula.
 - c. () São mais comuns em homens circuncidados.
 - d. () A melhor opção de tratamento é a cauterização química.
 - e. () A melhor opção de tratamento é a cauterização elétrica.
-

40. A neoplasia intraepitelial (PIN) é achado freqüente em material obtido em biópsias de próstata e em espécimes de prostatectomia radical. Com relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A PIN, por si só, eleva o PSA.
 - b. () Não há necessidade de repetir a biópsia devido ao achado de PIN.
 - c. (X) O risco de câncer de próstata na re-biópsia é de 23% a 35%.
 - d. () A PIN não parece ser precursora do câncer de próstata.
 - e. () A PIN consiste de ácinos ou dutos prostáticos arquiteturalmente de aspecto maligno.
-

41. Em relação ao câncer de próstata, sabe-se que dados de autópsias, em homens com 50 anos ou mais, evidenciaram a neoplasia em que percentual?

- a. () 5%
 - b. () 10%
 - c. () 15%
 - d. () 20%
 - e. (X) 30%
-

42. Em relação ao câncer de próstata, o risco de um homem desenvolver a doença clinicamente detectável durante a sua vida é de:

- a. () 3%
- b. () 6%
- c. () 10%
- d. (X) 16%
- e. () 20%

43. Assinale a alternativa correta.

Quando comparados os resultados anátomo-patológicos de espécimes de prostatectomia radical cujo tumor foi diagnosticado exclusivamente devido ao PSA elevado (Grupo A) com aqueles em que o tumor era palpável ao toque retal (Grupo B) *versus* espécimes obtidos por cistoprostatectomia radical para tratamento de câncer de bexiga (Grupo C) foi observado que:

- a. () Tumores indolentes 9%, tumores curáveis 52% e tumores avançados 40% para o grupo A.
 - b. () Tumores indolentes 9%, tumores curáveis 52% e tumores avançados 40% para o grupo C.
 - c. (X) Tumores indolentes 12%, tumores curáveis 69% e tumores avançados 19% para o grupo A.
 - d. () Tumores indolentes 12%, tumores curáveis 69% e tumores avançados 19% para o grupo B.
 - e. () Tumores indolentes 78%, tumores curáveis 22% e tumores avançados 0% para o grupo A.
-

44. Com os dados obtidos pela biópsia da próstata, precisa-se fazer um esforço para classificar um câncer como indolente. Assinale a alternativa que confirma as características de Epstein como um tumor indolente.

- a. () Densidade do PSA < 0,2, nenhum grau de Gleason igual a 4 ou 5, biópsia positiva em menos de 3 fragmentos e nenhum fragmento com mais de 50% de envolvimento.
- b. () Densidade do PSA < 0,1, nenhum grau de Gleason igual a 5, biópsia positiva em menos de 3 fragmentos e nenhum fragmento com mais de 50% de envolvimento.
- c. () Densidade do PSA < 0,1, nenhum grau de Gleason igual a 4 ou 5, biópsia positiva em menos de 5 fragmentos e nenhum fragmento com mais de 50% de envolvimento.
- d. (X) Densidade do PSA < 0,1, nenhum grau de Gleason igual a 4 ou 5, biópsia positiva em menos de 3 fragmentos e nenhum fragmento com mais de 50% de envolvimento.
- e. () Densidade do PSA < 0,1, nenhum grau de Gleason igual a 4 ou 5, biópsia positiva em menos de 3 fragmentos e nenhum fragmento com mais de 70% de envolvimento.

45. A possibilidade de encontrar metástases na cintilografia óssea (CO) ou na tomografia computadorizada (TC) em pacientes com biópsia positiva para câncer de próstata e PSA entre 4 e 20 ng/ml é, respectivamente:

- a. (X) 5% e 12%.
 - b. () 5% e 20%.
 - c. () 10% e 12%.
 - d. () 10% e 20%.
 - e. () 12% e 20%.
-

46. A manobra de palpção renal na qual o paciente é examinado de pé, apoiando o pé contralateral ao rim examinado ao chão, e o membro homolateral levemente fletido é o processo de:

- a. () Israel.
 - b. () Goelet.
 - c. () Guyon.
 - d. () Glenard.
 - e. (X) Bellington.
-

47. O padrão típico, mais comum da disfunção miccional consequente à lesão medular supra sacral, é:

- a. () Arreflexia do detrusor, complacência normal, esfíncter interno sinérgico, esfíncter estriado dissinérgico.
- b. (X) Contração involuntária do detrusor, complacência normal, esfíncter interno sinérgico, esfíncter estriado dissinérgico.
- c. () Contração involuntária do detrusor, complacência diminuída, esfíncter interno sinérgico, esfíncter estriado dissinérgico.
- d. () Contração involuntária do detrusor, complacência normal, esfíncter interno incompetente em repouso, esfíncter estriado dissinérgico.
- e. () Contração involuntária do detrusor, complacência normal, esfíncter interno sinérgico, esfíncter estriado sinérgico.

48. A maioria dos especialistas orientam que casais inférteis não azoospermicos devem ter coito vaginal com que frequência, durante o período da ovulação?

- a. () Não é necessária orientação.
 - b. () Duas vezes por dia.
 - c. () Diário.
 - d. (X) A cada dois dias.
 - e. () Esperar 3 dias e copular no dia da ovulação.
-

49. Sabe-se que o aumento na ingestão de água é medida importante na prevenção da litíase urinária. No entanto, permanecem algumas dúvidas quando à água ingerida em determinadas regiões, onde ela possui elementos que facilitarão a precipitação de cristais; portanto, facilitando a litogênese. Com base nestes fundamentos, assinale a alternativa correta quanto à orientação que deve ser dada aos pacientes nessas condições:

- a. () Usar água filtrada.
 - b. () Usar somente água mineral.
 - c. () Ingesta normal de água.
 - d. () Diminuir a ingestão de água.
 - e. (X) Aumentar ingestão de água.
-

50. Citar qual das alternativas abaixo é indicação para ureteroscopia diagnóstica, como procedimento de rotina:

- a. (X) Acompanhamento de tumores uroteliais do trato urinário alto, tratados endoscopicamente.
- b. () Acompanhamento de tumores uroteliais do trato urinário alto, tratados com cirurgia aberta.
- c. () Acompanhamento de tumores uroteliais tratados endoscopicamente.
- d. () Acompanhamento de tumores uroteliais tratados endoscopicamente com citologia positiva.
- e. () Avaliação de hematúria.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>