

Caderno de Prova

956

Odontólogo (Odontopediatria)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. Assinale a alternativa **correta**:

A sensação dolorosa da região orofacial é mediada em crianças, principalmente, pelo:

- a. () nervo masseter.
- b. (X) nervo trigêmeo.
- c. () nervo temporal.
- d. () nervo nasal anterior e posterior.
- e. () nervo facial anterior e posterior.

17. Os ramos do V par de nervo craniano são aqueles citados na alternativa que deverá ser assinalada.

- a. () auricular, mandibular e temporal.
- b. () auricular, maxilar e masseter.
- c. () nasal, auricular e temporal.
- d. () nasal, mandibular e oftálmico.
- e. (X) oftálmico, maxilar e mandibular.

18. A anestesia tópica, em crianças, deve ser sempre realizada. Assinale a alternativa **correta** em relação à sua técnica de aplicação:

- a. (X) a mucosa deverá estar sempre limpa e seca.
- b. () o contato com o anestésico deverá ser em mucosa úmida.
- c. () o contato com a saliva intensifica sua ação.
- d. () o anestésico na forma de spray é mais seguro de ser utilizado.
- e. () o tempo de aplicação do anestésico é inversamente proporcional à sua eficácia.

19. Ao anestesiarmos um 2º molar decíduo inferior de uma criança de 5 anos de idade, para uma exodontia, existe uma técnica anestésica que **não** se aplica ao caso. Assinale a alternativa que a indica.

- a. () tópica, troncular e infiltrativa.
- b. () tópica, troncular e peridentária.
- c. (X) infiltrativa, intra-pulpar e peridentária.
- d. () infiltrativa, transpapilar e peridentária.
- e. () tópica, infiltrativa e peridentária.

20. Sabendo-se das sensações provocadas por uma anestesia, assinale a alternativa que contém a técnica anestésica que **não** deveria ser utilizada como a primeira anestesia, em crianças.

- a. () anestesia de tuberosidade.
- b. () anestesia ptérgico-mandibular.
- c. () anestesia do nervo mentoniano.
- d. () anestesia infiltrativa postero-inferior.
- e. (X) anestesia infiltrativa na região antero-superior.

21. A técnica radiográfica indicada para localizar corpos estranhos, se por vestibular ou lingual, na mandíbula está nomeada em uma das alternativas abaixo. Assinale-a.

- a. (X) técnica oclusal.
- b. () técnica de Clark.
- c. () técnica periapical.
- d. () técnica de Donovan.
- e. () técnica interproximal.

22. No diagnóstico de freio labial hipertrófico, na maxila, o tracionamento do freio indicado é o descrito em uma das alternativas abaixo. Assinale-a.

- a. () para frente e para cima.
 - b. (X) para frente e para baixo.
 - c. () para o lado e para cima.
 - d. () para os lados e para baixo.
 - e. () somente para os lados, direito e esquerdo.
-

23. Assinale a alternativa que apresenta a técnica anestésica correta utilizada numa cirurgia para a remoção de freio labial hipertrófico:

- a. () técnica transpapilar.
 - b. () técnica peridentária.
 - c. () técnica transpapilar bilateral.
 - d. () técnica infiltrativa na região do freio.
 - e. (X) técnica infiltrativa bilateral à distância.
-

24. Um paciente com 6 anos de idade, apresenta-se à consulta, com celulite facial na região do 55. O dente 55 apresentava lesão de cárie oclusal profunda, com fundo amarelado e amolecido. O paciente reclamava de dor espontânea e, ao exame radiográfico, a lesão de cárie apresentava comunicação com a câmara pulpar e havia espessamento da lâmina periodontal, mas sem a presença de lesão radiolúcida periapical. De acordo com estes dados, assinale a alternativa que apresenta o tratamento **correto**:

- a. () extração do dente nesta mesma sessão.
 - b. () trepanação + localização dos canais + curativo com corticóide.
 - c. () receitar antibiótico e marcar a trepanação para uma próxima consulta, 48 horas após.
 - d. (X) trepanação + localização e limpeza dos canais + irrigação + curativo com formocresol.
 - e. () trepanação + localização dos canais e deixar o dente aberto, por 72 horas.
-

25. Baseado no enunciado a seguir, assinale a alternativa **correta**:

Se durante um preparo cavitário, provocamos uma exposição pulpar durante a remoção de dentina cariada, amolecida e desorganizada de um dente decíduo sem sintomatologia, a conduta correta a seguir é:

- a. () tratar o dente como polpa necrosada e fazer uma necro-pulpectomia.
 - b. (X) realizar uma pulpotomia com hidróxido de cálcio.
 - c. () realizar um capeamento direto com hidróxido de cálcio.
 - d. () realizar um capeamento indireto com cimento de ionômero de vidro.
 - e. () realizar um capeamento indireto com hidróxido de cálcio.
-

26. Assinale a alternativa **correta**, baseado no enunciado a seguir:

O tratamento mais indicado para primeiros molares permanentes, parcialmente irrompidos e recobertos em parte por tecido gengival, em pacientes com alto risco à cárie é:

- a. () realizar a técnica do ART.
 - b. () restauração preventiva com resina composta.
 - c. () restauração preventiva com cimento de ionômero de vidro.
 - d. () aplicação de selante de cicatrículas e fissuras resinoso.
 - e. (X) selamento oclusal com cimento de ionômero de vidro.
-

27. Das alternativas abaixo, assinale aquela que **não** contém indicação para uma exodontia em dentes decíduos:

- a. () lesão de bifurcação e rizólise ectópica.
- b. () coroa com impossibilidade de restauração.
- c. (X) reabsorção interna e perfuração de assoalho da câmara pulpar.
- d. () retenção prolongada e dente tratado endodonticamente com lesão periapical.
- e. () fratura vertical de esmalte e dentina em dentes anteriores.

28. Ao realizarmos um preparo cavitário no dente 75, de uma criança de 7 anos de idade, após a remoção da dentina desorganizada, encontramos uma dentina mais dura, com maior resistência à remoção e que é removida em lascas. Baseado nestes dados, assinale a alternativa que apresenta a conduta **correta** a seguir:

- a. () parar a remoção da dentina, aplicar um verniz com flúor e restaurar com amálgama.
- b. () trepanar o dente e realizar uma pulpotomia preventiva com hidróxido de cálcio.
- c. () remover toda a dentina até encontrar resina sadia e restaurar com resina composta.
- d. (X) parar a remoção da dentina, fazer uma base de cimento de ionômero de vidro e restaurar com resina composta.
- e. () remover toda a dentina mais dura até encontrar dentina sadia, fazer uma base de hidróxido de cálcio e ionômero de vidro e restaurar com resina composta.

29. Toda exodontia de um dente decíduo deveria ser considerada como uma perda precoce. Assinale a alternativa na qual uma exodontia **não** traria problemas de perda de espaço:

- a. () $\frac{1}{3}$ de reabsorção radicular e dente permanente no estágio 4 de Nolla.
- b. (X) $\frac{2}{3}$ de reabsorção radicular e dente permanente no estágio 7 de Nolla.
- c. () $\frac{2}{3}$ de reabsorção radicular e dente permanente ainda em estágio de cripta.
- d. () dente permanente no estágio 3 de Nolla, independentemente da quantidade de reabsorção do dente decíduo.
- e. () nenhuma reabsorção radicular e dente permanente com coroa totalmente formada.

30. Assinale a alternativa **correta**:

Para calcularmos a dose de qualquer medicamento, em crianças, devemos nos basear no (na):

- a. () idade do paciente.
- b. () concentração da droga.
- c. (X) peso corporal do paciente.
- d. () idade e altura do paciente.
- e. () princípio ativo do medicamento.

31. De acordo com os dados a seguir, assinale a alternativa que indica uma dose segura de um anestésico local, para uma criança com 5 anos de idade, 23 kg de peso e 80 cm de altura:

- a. () 1 tubete ou 1,8 ml.
- b. () 1 tubete e meio ou 2,7 ml.
- c. (X) 2 tubetes e meio ou 4,8 ml.
- d. () 4 tubetes ou 7,6 ml.
- e. () 3 tubetes e meio ou 5 ml.

32. Assinale a alternativa que conceitua **corretamente** o "Lee way space de Nance":

- a. () O espaço ocupado pelos incisivos decíduos é maior que o espaço requerido para a erupção dos incisivos permanentes.
- b. () O espaço dos molares decíduos é maior que o espaço requerido para a erupção dos dentes anteriores permanentes.
- c. () O somatório dos espaços méso-distais dos elementos 72, 71, 81 e 82 é maior que o espaço requerido para a erupção dos elementos 42, 41, 31 e 32.
- d. (X) O somatório das distâncias méso-distais dos caninos, primeiros e segundos molares decíduos é maior que o espaço requerido para caninos, primeiros e segundos pré-molares.
- e. () O espaço de mesial do 1º molar permanente à mesial do incisivo lateral é menor que o espaço requerido para a erupção de caninos, primeiros e segundos pré-molares.

33. No mecanismo de ajuste no início da dentição mista, quando há a presença de um degrau distal para a mandíbula, no plano terminal dos 2º molares decíduos, a oclusão dos primeiros molares permanentes será:

- a. () topo a topo.
- b. (X) sempre em classe II.
- c. () sempre em classe III.
- d. () inicialmente topo a topo e depois em classe I.
- e. () inicialmente em classe I e depois em topo a topo.

34. Assinale a alternativa correta:

Na técnica da restauração atraumática, ART, o material restaurador utilizado é o cimento de ionômero de vidro (CIV). A proteção superficial do CIV com verniz ou vaselina tem por objetivo:

- a. prevenir a sorção de água e/ou ressecamento do CIV.
 - b. prevenir a perda de íons flúor para o meio externo.
 - c. impedir a contração de polimerização do CIV.
 - d. aumentar a resistência à liberação de flúor pelo CIV.
 - e. aumentar o tempo de geleificação do CIV.
-

35. Criança de 3 anos e meio de idade tem indicação de exodontia do dente 74. No planejamento do caso, o profissional deverá proceder como está descrito em uma das alternativas. Assinale-a.

- a. Extrair o dente e aguardar a erupção do 1º pré-molar.
 - b. Planejar a colocação de um arco lingual.
 - c. Planejar a colocação de um mantedor de espaço, tipo banda-alça.
 - d. Planejar a colocação de um mantedor de espaço, tipo aparelho removível.
 - e. Planejar a colocação de um aparelho fixo, tipo prótese Denari.
-

36. Dentre as características anatômicas dos molares decíduos, assinale a alternativa que contém aquelas características que irão influir num preparo de cavidade para amálgama:

- a. rizólise e constrição do colo.
 - b. raízes delgadas com achatamento mesio-distal e cornos pulpares proeminentes.
 - c. menor espessura de esmalte e dentina e tubérculo de Zuckerkandl.
 - d. constrição do colo e direção dos prismas de esmalte na região cervical.
 - e. superfícies vestibulares e linguais do 1/3 oclusal das coroas, divergentes para oclusal.
-

37. Assinale a alternativa correta:

O tempo ideal de condicionamento ácido do esmalte e dentina de dentes decíduos é:

- a. 15 segundos para esmalte e 7 segundos para dentina.
 - b. 60 segundos para ambos os tecidos.
 - c. 60 segundos para o esmalte e 25 segundos para a dentina.
 - d. 45 segundos para ambos os tecidos.
 - e. 45 segundos para o esmalte e 10 segundos para a dentina.
-

38. As propriedades físico-químicas do cimento de ionômero de vidro tornam este material com muitas indicações em Odontopediatria. Assinale a alternativa que contém as três propriedades mais importantes do material:

- a. alta resistência flexural, incorporação de flúor e pH ácido.
 - b. coeficiente de expansão térmica linear maior que o dos tecidos dentais, adesão física aos tecidos dentais e incorporação de flúor.
 - c. nenhum grau de contração de polimerização, pH ácido e adesão química aos tecidos dentais.
 - d. incorporação e liberação de flúor, maior resistência aos esforços mastigatórios do que as resinas e adesão física aos tecidos dentais.
 - e. adesão química aos tecidos dentais, incorporação e liberação de flúor e coeficiente de expansão térmica linear próxima ao dos tecidos dentais.
-

39. Assinale a alternativa correta:

Em restaurações classe II, em dentes decíduos, é obrigatório o uso de cunhas inter-proximais por causa do (da):

- a. constrição do colo.
- b. tamanho do dente.
- c. direção dos prismas de esmalte.
- d. presença do esmalte aprismático.
- e. menor espessura de esmalte e dentina.

40. Criança de 3 anos de idade chorou e apresentou resistência durante um atendimento clínico, onde foi realizado o exame clínico. Assinale a alternativa **correta** acerca do comportamento do paciente:

- a. o profissional, em casos como este, deverá orientar a criança como se comportar.
 - b. a mãe deverá, junto com o profissional, conversar com a criança.
 - c. a criança teve este comportamento porque o profissional não prometeu nenhum prêmio.
 - d. é um comportamento esperado devido às características da idade.
 - e. é característica de criança mimada, que faz birra por qualquer motivo.
-

41. Quando os molares decíduos apresentam envolvimento endodôntico, ao exame radiográfico, observamos rarefação óssea mais frequentemente localizada na região de bi ou trifurcação. Assinale a alternativa que contém a explicação **correta**:

- a. porque o osso desta região é mais compacto.
 - b. porque o padrão da rizólise dos molares favorece a rarefação óssea nesta área.
 - c. porque o ápice radicular dos decíduos se localiza na região da bi ou trifurcação.
 - d. porque os cornos pulpares dos molares decíduos são mais proeminentes e mais propensos às reações inflamatórias.
 - e. porque o assoalho da câmara pulpar apresenta canalículos que comunicam com a região inter-radicular.
-

42. Ao examinarmos uma radiografia de um dente decíduo anterior traumatizado, que alterações possíveis poderão ser identificadas aos raios-X? Assinale a alternativa **correta**:

- a. Reabsorção óssea, fratura radicular e rizólise.
- b. Reabsorção interna e externa, fratura radicular e calcificação distrófica.
- c. Reabsorção externa, mudança de coloração da coroa e fratura radicular.
- d. Mudança de coloração da coroa, luxações e reabsorções radiculares.
- e. Formação do ápice radicular, sub-luxação lateral e mudança de coloração da coroa.

43. Assinale a alternativa **correta**:

Uma das características observadas na deglutição atípica é o pressionamento da língua nos incisivos superiores, levando ao aparecimento de:

- a. diastemas e mordida aberta anterior.
 - b. mobilidade dental e diastemas anteriores.
 - c. apinhamento dental e mordida aberta anterior.
 - d. mordida aberta posterior e lateral e olheiras e bochechas caídas.
 - e. reabsorção radicular dos incisivos e mobilidade dental.
-

44. Assinale a alternativa **correta**:

Quando o profissional mostra para uma criança outra da mesma idade, com comportamento cooperador, ele está utilizando a técnica chamada de:

- a. reforço positivo.
 - b. diga, mostre e faça.
 - c. comunicação positiva.
 - d. reforço repetitivo.
 - e. modelação.
-

45. Dado o caso abaixo:

Criança com 7 anos de idade, que perdeu os dentes 83 e 73 quando da erupção dos incisivos inferiores, devido à falta de espaço para o irrompimento desses dentes e que está indicada a preservação do espaço restante.

Assinale a alternativa com o tipo de mantedor indicado para o caso descrito.

- a. alça-banda.
- b. arco lingual.
- c. aparelho tipo Hass.
- d. aparelho recuperador de espaço.
- e. mantedor removível funcional com dentes.

46. Assinale a afirmativa **correta**:

Durante uma necropulpectomia de um molar decíduo, num paciente de 06 anos de idade, na qual na segunda sessão só foi realizada a odontometria e os canais não foram instrumentados, o curativo de demora deverá ser feito com:

- a. () corticóide.
 - b. () iodofórmio.
 - c. (X) formocresol.
 - d. () hidróxido de cálcio.
 - e. () paramonoclorofenol canforado.
-

47. Assinale a alternativa **correta**:

O desenvolvimento radicular de dentes permanentes com rizogênese incompleta e com vitalidade pulpar tem sua continuidade quando:

- a. () não houver danos ao folículo pericoronário.
 - b. () a raiz possuir pelo menos $\frac{2}{3}$ de sua formação.
 - c. () se utilizar o formocresol como curativo de demora.
 - d. (X) houver a presença da bainha de Hertwig viável.
 - e. () houver estímulo à atividade osteoclástica, pelo hidróxido de cálcio.
-

48. O capeamento direto é um tratamento viável em dentes decíduos com exposição pulpar acidental. Assinale a alternativa que **não** contém uma indicação precisa:

- a. () rizólise.
- b. () dente assintomático.
- c. (X) hemostasia provocada.
- d. () polpa com coloração vermelho-vivo.
- e. () ausência de dentina cariada amolecida.

49. Assinale a alternativa **correta**:

A remineralização da dentina afetada por cárie, em dentes decíduos, está diretamente relacionada ao:

- a. () grau de rizólise.
 - b. () uso de corticóides.
 - c. () uso de primers e adesivos resinosos.
 - d. () condicionamento ácido da dentina.
 - e. (X) selamento hermético da cavidade.
-

50. Assinale a alternativa **correta**:

A complementação do desenvolvimento radicular de dentes permanentes necrosados com rizogênese incompleta só será possível quando:

- a. (X) há eliminação da infecção.
- b. () realizamos o "stop" apical a 2 mm do ápice.
- c. () a substância irrigadora usada durante o tratamento é a solução de Milton.
- d. () há um aumento da atividade osteoclástica provocada pelo uso do hidróxido de cálcio.
- e. () o material obturador é o óxido de zinco e eugenol tipo I.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>