

Caderno de Prova

\$59

Odontólogo (Prótese Dentária)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. **1808**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. Considere a longevidade, o alcance clínico e os riscos da reabilitação protética com Prótese Parcial Fixa (PPF), e assinale a alternativa **correta**:

- a. () Um dente desvitalizado, quando suporte de uma PPF, tem predisposição à fratura igual à de um dente vitalizado.
- b. (X) As observações *in vitro* e *clínicas* devem fornecer as evidências para definir as indicações, contra-indicações e a seqüência de condutas a serem respeitadas.
- c. () Cárie, perda de retenção, fratura de dentes e o comprometimento estético são conceitos distorcidos sobre o prognóstico do tratamento com PPF.
- d. () Espaços edêntulos extensos, com dentes desvitalizados e fragilizados, diminuem consideravelmente os riscos de fratura e descimentação, inclusive do pino/núcleo.
- e. () Se o preparo protético não apresentar excelente retenção e estabilidade e o suporte for um dente enfraquecido, aumento da estabilidade e fratura são iminentes.

17. A dentina e a polpa são tecidos com a mesma origem conjuntiva (ectomesenquimática), mas em estados distintos. O desenvolvimento desses tecidos complexos ocorre a partir da:

- a. () Pré-dentina.
- b. () Odontoblastos.
- c. (X) Papila dentária.
- d. () Arteriola e vênula.
- e. () Proteína plasmática.

18. Assinale a alternativa abaixo que identifica a origem das possíveis causas da inflamação do tecido pulpar:

- a. () Fagocitose e macrófagos.
- b. () Fibras colágenas e reticulares.
- c. () Nos materiais restauradores biologicamente aceitáveis.
- d. () Nos materiais restauradores biologicamente inertes.
- e. (X) Bacteriana, iatrogênica, decorrente de procedimentos operatórios ou traumática.

19. Assinale a alternativa que mostra os tratamentos conservadores mais utilizados para a polpa:

- a. () Condicionamento, selante e Flúor.
- b. () Condicionamento, adesivo e selante.
- c. (X) Capeamento, curetagem e pulpotomia.
- d. () Capeamento, curetagem e pulpectomia.
- e. () Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco e Eugenol e Clorexidina.

20. Assinale a maneira mais simples de classificar as pulpites, do ponto de vista histológico, uma vez que se trata de um processo inflamatório:

- a. (X) Aguda e crônica.
- b. () Aguda e recidivante.
- c. () Aguda e reagudizada.
- d. () Aguda e focal reversível.
- e. () Crônica e reagudizada.

21. Veja o texto abaixo.

O tempo em que o sistema de drenagem sanguínea e linfática permanece bloqueado pela estase sanguínea é de importância fundamental na patologia das inflamações pulpares. Se o reflexo nervoso vaso motor é transitório e logo se reverte, a condição é de pouca gravidade, manifestando-se apenas como uma dor de pequena duração, como na Se o reflexo nervoso vaso motor persiste por um período mais prolongado, haverá tempo para que o estrangulamento venoso e linfático, ao nível do ápice, provoque a saída de líquido para o espaço tissular, aumentando a pressão, provocando dor , porque a drenagem far-se-á lentamente – ou não se fará de modo algum, uma vez que está – mantendo o espaço doloroso por um período variável e indeterminado. É o que acontece na provocada por estase sanguínea e infarto pulpar.

Assinale a alternativa que completa **correta** e seqüencialmente as lacunas do texto dado.

- a. () Crônica ; necrose pulpar ; intermitente ; liberada ; pulpíte crônica.
- b. () Leve ; pulpíte crônica ; contínua ; dilatado ; necrose pulpar.
- c. () Intensa ; pulpíte crônica hiperplásica ; reduzida ; não obstruída ; hiperemia pulpar.
- d. (X) Aguda ; hiperemia pulpar ; persistente ; bloqueada ; pulpíte aguda.
- e. () Crônica ; hiperplásica ; persistente ; liberada ; pulpíte reagudizada.

22. Assinale a alternativa que representa, dentre as manifestações bucais relacionadas à AIDS, as que podem se manifestar antes mesmo que o paciente saiba que é portador do HIV:

- a. () História de exposição a risco, febre alta, linfadenopatia, mialgia, antralgia, dor de garganta, hepatoesplenomogalia, exantema máculo papular, meningite linfocitária, diarreia, perda de peso, tuberculose e Hepatite B.
- b. (X) Doenças periodontais de avanço rápido, leucoplasia pilosa, herpes simples, infecções oportunistas como candidíases, queilite angular, infecções bacterianas, condiloma acuminado, Sarcoma de Kaposi, tumores malignos como o carcinoma epidermóide e linfoma.
- c. () Tumores malignos, carcinomas, linfomas, candidíase, aftas, infecções localizadas, linfonodos, herpes, hepatites, leucemias, viroses, doenças periodontais incipientes, gengivites sem sangramentos, papiloma (HPV ou HDV).
- d. () Tumores malignos como o Sarcoma de Kaposi, carcinoma epidermóide, linfoma, infecções oportunistas como candidíase, infecções bacterianas, herpes simples, herpes Zoster, hepatites, condiloma acuminado leucoplasia pilosa, doenças periodontais incipientes, gengivites com sangramento intenso, pneumonite intersticial crônica e Hepatite C.
- e. () Hepatite B, problemas renais crônicos, hemofilia, gripes, tuberculose, hiperpigmentação melânica, linfomas, úlceras atípicas, leucoplasias, papiloma (HPV ou HDV), Sarcoma de Kaposi, meningite linfocitária, febre, diarreia, perda de peso superior a 10% da superfície corpórea.

23. A medida mais importante no tratamento de reações tóxicas ao uso de anestésicos local na odontologia consiste em:

- a. () Massagem cardíaca externa e entubação.
- b. () Evitar sobredose em pessoas hipersensíveis.
- c. (X) Manter um fluxo de oxigênio adequado, por meio de respiração artificial com oxigênio.
- d. () Evitar as regiões ricamente vascularizadas e nunca deixar o paciente sem vigilância.
- e. () Optar pela injeção subcutânea de acordo com a idade, o peso e as condições gerais do paciente.

24. Hepatites, AIDS, Difterias, Rubéola, Sarampo, Influenza (gripe), Caxumba (parotidite) e tuberculose são doenças passíveis de serem contraídas pelos integrantes da equipe odontológica na sua prática profissional. Entre essas doenças, a Hepatite B, frequentemente associada ao câncer hepático, merece destaque especial, por ser a doença ocupacional infecciosa mais frequente em equipe odontológica. Com relação ao assunto, assinale as duas medidas que são relevantes para a proteção desses profissionais:

- a. () O uso de barreiras é um dos equipamentos de proteção individual.
- b. () Luvas, máscaras, óculos, aventais, gorros e películas.
- c. () Evitar contato direto com matéria orgânica e limitar a propagação de microrganismos.
- d. () Proteger a saúde da equipe e cuidar no uso de artigos, peças e superfícies.
- e. (X) As imunizações e a adoção das normas de controle de infecção.

25. Todos os anestésicos locais disponíveis são, em grau maior ou menor, substâncias tóxicas, pelo que se estabeleceram doses máximas para cada um deles. As reações tóxicas que se produzem podem ser de dois tipos:

- a. (X) Locais e gerais.
- b. () Gerais e infecciosas.
- c. () Locais e infecciosas.
- d. () Inflamação e infecção.
- e. () Circulatórias e neurológicas.

26. Vários comprometimentos podem ser observados, na cavidade bucal de pacientes sob tratamento químico ou radioterápico, que os cirurgiões-dentistas precisam conhecer para que suas intervenções possam ser seguras. Que condição encontrada nestes pacientes está intimamente ligada às glândulas salivares?

- a. () Mucosite.
- b. () Fistulações.
- c. (X) Xerostomia.
- d. () Candidíase oral.
- e. () Osteorradionecrose.

27. Com relação aos vários fármacos disponíveis para o tratamento da dor músculo-esquelético, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () Destacam-se os analgésicos, os opióides, os miorrelaxantes anticonvulsivante e os agentes psicotrópicos.
- b. () O emprego por via oral, a combinação de analgésicos com psicotrópicos e o uso de medicamentos que se adaptam às condições biológicas de cada indivíduo torna o tratamento seguro e eficaz.
- c. () Com tratamento farmacológico adequado, potencializa-se a possibilidade de realizar procedimentos na odontologia física com rendimento mais apropriado.
- d. () Os medicamentos devem ser preferencialmente de baixo custo, de fácil aquisição e administração e prescritos segundo escala crescente de potência.
- e. (X) O conhecimento das vias mais convenientes de administração e dos efeitos colaterais independem da dose, da natureza e da química do fármaco para que o tratamento seja satisfatório.

28. Assinale a alternativa **incorreta**.

Todo paciente com dores de cabeça ou na face deveria ser examinado por um Cirurgião Dentista, para esclarecer se:

- a. () O fator de carga tem origem oclusal.
- b. () Os sintomas originam-se de uma estrutura no Sistema Mastigatório (= vetor de carga).
- c. () É oportuna uma terapia sintomática da prática odontológica.
- d. (X) Infecções na polpa, no periodonto e na mucosa não induzem a limitações artrogênicas e miogênicas da mobilidade mandibular.
- e. () É possível uma redução da parte de origem oclusal do vetor de carga total, com determinado tipo de trabalho restaurador.

29. Assinale a alternativa **correta**.

Quais os três músculos da mastigação que transmitem dores aos dentes?

- a. O músculo temporal, o masseter e o ventre anterior do músculo digástrico.
 - b. O músculo supra-hióideo, o gênio-hióideo e o músculo milo-hióideo.
 - c. O músculo pterigóideo lateral, o digástrico e o esternocleidomastóideo.
 - d. O músculo infra-hióideo, o milo-hióideo e o músculo digástrico.
 - e. O músculo esternocleidomastóideo, o pterigóideo lateral e o músculo pterigóideo medial.
-

30. O que é a dor?

“A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tecidual real ou potencial, ou descrita em termos desse dano”.

Assinale a alternativa adequada para este conceito:

- a. Falsa.
 - b. Inadequada.
 - c. Parcialmente verdadeira.
 - d. Parcialmente incorreta.
 - e. Totalmente verdadeira.
-

31. Uma condição aguda, inflamatória, do músculo e tecido conjuntivo, com a presença de edema e dor contínua, que limita a ação muscular e normalmente está associada a um traumatismo direto no músculo ou a uma infecção localizada. Esta afirmativa representa o quadro clínico de uma:

- a. Miosite.
- b. Contratura muscular.
- c. Espasmo muscular.
- d. Dor miofascial.
- e. Fibromialgia.

32. Assinale a alternativa que representa o quadro de uma disfunção da articulação temporomandibular que pode ou não ser responsável, em alguns casos, por sensações dolorosas. “Pode ser consequência de fraturas causadas por traumatismo, infecções e anormalidades de desenvolvimento mandibular, pode estar associada às artralguas”.

- a. Fratura.
 - b. Anquilose.
 - c. Fibromialgia.
 - d. Dor miofascial.
 - e. Miosite.
-

33. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito abaixo:

“Posição Intercuspídea (PIC) ou oclusão cêntrica, é uma posição que diz respeito aos dentes.”

- a. Oclusão Cêntrica (OC).
 - b. Dimensão Vertical (DV).
 - c. Dimensão Vertical de Oclusão (DVO).
 - d. Máxima Intercuspidação Habitual (MIH).
 - e. Relação Cêntrica (RC).
-

34. Assinale a alternativa **correta** que diz respeito à função e à adaptação estrutural dos músculos da mastigação:

- a. Na dependência da solicitação funcional, não ocorrem alterações do tônus e da trofia.
- b. Na dependência da solicitação funcional, não ocorrem alterações do comprimento muscular.
- c. Além de executar movimentos mandibulares, a atividade muscular antagonista também pode contribuir para a estabilização das ATMs.
- d. A adaptação não depende da composição fibrosa.
- e. No caso de sobrecarga crônica, são possíveis alterações infecciosas, mas não rupturas e ossificações.

35. Que situação abaixo citada contra-indica a utilização de uma Prótese Parcial Removível? Assinale-a.

- a. Espaço edêntulo pequeno.
 - b. Extremidades edêntulas bilaterais.
 - c. Auxiliar na contenção de fraturas maxilares.
 - d. Dentes-suporte com sustentação periodontal reduzida.
 - e. Necessidade de recolocação imediata de dentes anteriores.
-

36. Para facilitar a comunicação entre os profissionais e entre profissional e técnico de laboratório, as próteses parciais removíveis podem ser classificadas de diferentes formas. De acordo com a classificação de Kennedy, é **incorreto** afirmar:

- a. A classificação de Kennedy é baseada em um critério topográfico.
 - b. Tanto a classe I como a classe II apresentam edentulismo posterior.
 - c. A classe III é aquela que apresenta um espaço intercalar e unilateral.
 - d. A classe IV é única que pode receber modificações.
 - e. Se terceiros molares estiverem presentes e forem utilizados como suporte, eles devem ser considerados na classificação.
-

37. Diferentes grampos podem ser utilizados no desenho de uma prótese parcial removível. Com relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**:

- a. O braço de oposição do grampo atende ao princípio da retenção friccional.
- b. O efeito retentivo dos grampos de ação de ponta se dá por torção.
- c. Os grampos de ação direta são aqueles próximos ao conector menor.
- d. Um grampo em forma de "T" é um grampo tipo circunferencial ou braçadeira.
- e. Os grampos gêmeos ou duplos são amplamente utilizados em dentes anteriores.

38. Como uma Prótese Parcial Removível precisa funcionar biológica e mecanicamente sobre os dentes de suporte e rebordo tecidual é importante considerar diferentes situações durante o planejamento. Com relação ao assunto, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. Para serem utilizados, os dentes de suporte devem ser avaliados qualitativa e quantitativamente.
 - b. O rebordo residual descendente-distal é o que apresenta prognóstico mais desfavorável.
 - c. Nos casos de fibromucosa flácida, a intervenção cirúrgica está indicada.
 - d. Quanto maior o número de dentes faltantes, maior a participação da fibromucosa na sustentação do aparelho removível.
 - e. Dentes remanescentes, tecidos periodontais, fibromucosa e tecido ósseo alveolar constituem a sistema de retenção ou estabilização das próteses parciais removíveis.
-

39. Assinale a alternativa **correta**.

Ao realizarmos o preparo dos nichos e planos guias, é necessário considerar:

- a. Um tratamento ortodôntico prévio pode favorecer o futuro eixo de inserção da prótese.
- b. Dentes inclinados para o espaço edêntulo deverão receber o preparo de um nicho oclusal na face próxima à inclinação.
- c. Nos casos de Classe I de Kennedy, os preparos dos nichos devem ser feitos apenas no último dente contíguo ao espaço edêntulo.
- d. Intervenções em tecidos moles devem ser realizadas após a instalação da prótese parcial removível para que esta sirva de goteira cirúrgica.
- e. A adequação da linha equatorial deve ser realizada com o auxílio de uma broca diamantada esférica.

40. Os articuladores semi-ajustáveis são amplamente utilizados na Odontologia e possuem inúmeras indicações que vão desde o planejamento até a confecção de trabalhos protéticos. Sobre o tema, é **correto** afirmar:

- a. () Com o arco facial posso montar o modelo superior e o inferior simultaneamente.
- b. () Um desprogramador é utilizado para montar o modelo inferior em máxima intercuspidação habitual.
- c. (X) O modelo inferior pode ser montado tanto em relação cêntrica como máxima intercuspidação habitual.
- d. () A distância intercondilar é definida no momento em que o garfo oclusal é posicionado em boca.
- e. () O guia condilar referente à inclinação da cavidade glenóide deve estar regulado em 15°.

41. Assinale a alternativa que **não** se deve considerar:

- a. () A dimensão vertical de repouso e suas variações.
- b. (X) A posição que a mandíbula ocupa na cavidade glenóide para executarmos a reabilitação do paciente.
- c. () A presença ou não de contatos prematuros e a possibilidade de sua interferência durante as funções mandibulares.
- d. () O percurso que a mandíbula executa durante a função protrusiva e lateral.
- e. () A presença de facetas de desgaste na máxima intercuspidação habitual.

42. Dentes extremamente danificados precisam ser reconstruídos para que possam receber futuras peças protéticas. Uma maneira de reconstruirmos proteticamente estes dentes é a utilização de núcleos metálicos fundidos. Que aspecto devo respeitar durante o preparo intra-radicular?

- a. () A inclinação do dente em boca.
- b. () A presença de dentes adjacentes.
- c. () A quantidade de dentina coronária.
- d. () A espessura do ligamento periodontal.
- e. (X) A integridade do tratamento endodôntico.

43. Assinale a alternativa **correta**.

Durante o preparo para uma coroa metalo-cerâmica em um dente posterior, é necessário:

- a. () Que as brocas sejam utilizadas para definir a rugosidade superficial das paredes preparadas.
- b. () Que o desgaste realizado na face oclusal seja suficiente para receber a estrutura metálica.
- c. () Que o maior desgaste seja estabelecido nas faces proximais com o objetivo de garantir a solidez estrutural da futura prótese.
- d. (X) Que durante o preparo da primeira inclinação o eixo de inserção e a área de retenção friccional sejam definidos.
- e. () Que o término cervical esteja posicionado intra-sulcular em todas as faces preparadas.

44. Se uma superfície dentária pode ser preservada sem comprometer a resistência e a retenção da futura prótese, ela deve ser mantida. Portanto é **incorreto** afirmar que:

- a. () Preparos parciais podem garantir que as margens da restauração mantenham-se em áreas acessíveis à limpeza.
- b. (X) As ligas metálicas mais utilizadas para a confecção de coroas parciais são aquelas a base de cromo-cobalto.
- c. () Apesar das coroas parciais não serem tão retentivas como as coroas totais, durante o seu preparo podemos lançar mão de meios adicionais de retenção.
- d. () Os preparos parciais apresentam maiores dificuldades operacionais.
- e. () Devido ao eixo de inserção definido pelos preparos parciais, a cimentação das peças é facilitada e garante um assentamento preciso.

45. Durante o preparo intra-radicular, assinale a alternativa **incorreta** para pinos de fibra de vidro.

- a. () O alargamento do conduto radicular deve respeitar o diâmetro do pino escolhido.
 - b. () O pino de fibra de vidro deve ocupar toda a área preparada.
 - c. () As paredes do preparo devem manter-se expulsivas.
 - d. () O esvaziamento endodôntico deve ser realizado por brocas largo ou instrumentos aquecidos.
 - e. (X) Devo manter um proporcionamento de duas partes de esvaziamento endodôntico para uma parte de tratamento endodôntico.
-

46. Coroas provisórias são utilizadas durante a fase da temporização. Qual destas funções **não** está relacionada a este tipo de trabalho?

- a. () Manutenção e estabilização de dentes após cirurgias periodontais.
 - b. () Proteção pulpar nos casos em que realizamos preparos em dentes vitais.
 - c. () Meio de diagnóstico para tratamento cirúrgico.
 - d. (X) Meio de diagnóstico para tratamento ortodôntico.
 - e. () Definição de forma, função e estética em reabilitações orais.
-

47. Assinale a alternativa **correta**.

A utilização de fios afastadores durante os procedimentos de moldagem final tem duplo objetivo: o afastamento gengival e a manutenção de um campo operatório seco. O fio de afastamento pode ser utilizado em:

- a. (X) Preparos intra-sulculares.
- b. () Para obter um molde definitivo.
- c. () Moldagens com alginato adensado.
- d. () Moldagens com silicone de adição, condensação e mercaptanas.
- e. () Áreas em que possuo espaço suficiente para o posicionamento de dois fios.

48. Assinale a alternativa **correta**.

Durante a cimentação definitiva de peças protéticas, é possível afirmar que:

- a. () A espessura da camada de cimento não altera a posição oclusal das próteses.
 - b. () O agente de cimentação é um agente de preenchimento.
 - c. () Em próteses metal-free, sempre utilizamos cimentos resinosos.
 - d. (X) Posso fazer a utilização de fios de afastamento gengival durante a cimentação com fosfato de zinco.
 - e. () Com a utilização de uma placa de vidro resfriada aumento a resistência do cimento de fosfato de zinco.
-

49. Do ponto de vista estético, **não** é importante:

- a. () Utilizar a escala compatível com o material a ser utilizado na futura prótese.
 - b. (X) Escolher inicialmente o cromá, seguido do matiz e do valor.
 - c. () Cuidar para que a seleção da cor seja realizada no final da manhã ou no início da tarde.
 - d. () Considerar o valor da cor através do uso de fotografias em tons de cinza.
 - e. () Mandar para o técnico um modelo das coroas provisórias.
-

50. Assinale a alternativa **incorreta** no preparo de dentes para receber próteses adesivas indiretas.

- a. () O eixo de inserção do preparo deve ser mantido pelos sulcos acessórios.
- b. () O preparo dos nichos em dentes anteriores é realizado na região do cíngulo.
- c. (X) O término do preparo deve ser posicionado em função do tamanho da área de retenção friccional.
- d. () A face incisal dos dentes anteriores não deve ser preparada para garantir sua translucidez.
- e. () As paredes da caixa oclusal devem ser expulsivas e com os ângulos internos arredondados.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>