

CADERNO DE PROVA

Secretaria de Estado da Saúde
Edital 054/SES/2017

<http://ses.fepese.org.br>

Técnico em Enfermagem



Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



19 de novembro




30 questões



14 às 18h



4h de duração*



**GOVERNO
DE SANTA
CATARINA**

Secretaria de Estado da Saúde

Língua Portuguesa

5 questões

Versos Íntimos

Vês?! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável! (...)

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afoga é a mesma que apedreja.

Augusto dos Anjos.

1. Analise as afirmativas feitas abaixo sobre o poema “Versos Íntimos”.

1. O beijo dado por um amigo precede o abandono.
2. Os versos são dirigidos a um interlocutor, de forma direta, abordando-o com tratamento em segunda pessoa.
3. O interlocutor é esclarecido sobre a natureza da Ingratidão, na primeira parte do poema e do beijo, na segunda.
4. A palavra sublinhada no texto tem o sentido de sonho, utopia, ilusão.
5. A expressão “um fósforo” foi usada para, metaforicamente, queimar o último sonho do “eu poético”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Observe a frase:

“Ninguém assistiu ao formidável enterro
de tua última quimera”.

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase.

- a. () Se o termo “ao formidável enterro” fosse substituído por “a teu enterro formidável”, o “a” receberia crase.
- b. () O termo sublinhado está ligado por uma conjunção à palavra que o antecede. A coesão textual está perfeitamente estabelecida.
- c. () Na frase: “Fui ao teatro”, o verbo ir possui a mesma regência do verbo assistir, conforme frase do enunciado.
- d. (X) O verbo assistir rege um objeto indireto e, nessa regência, tem sentido de ver, olhar, testemunhar.
- e. () A palavra “ninguém” é um pronome demonstrativo e está exercendo a função de adjunto adnominal.

3. Assinale a alternativa **correta** sobre pontuação. Analise a explicação posta entre parênteses.

- a. () No Hospital Celso Ramos os pacientes, foram transferidos para uma ala nova. (vírgula usada para separar adjunto adverbial deslocado)
- b. () Técnicos e Médicos, optaram por trabalhar no feriado. (uso obrigatório da vírgula para separar o sujeito de seu predicado)
- c. (X) Um gesto, doutor, fará toda a diferença. (duas vírgulas usadas para isolar vocativo)
- d. () Florianópolis, a Ilha da Magia possui, belas praias. (uso correto da vírgula para separar apostro)
- e. () Nosso Estado que, ganhou todos os jogos, será homenageado. (uso correto e obrigatório das vírgulas para introduzir oração explicativa)

4. Apenas uma alternativa apresenta **todas** as palavras escritas **corretamente**. Assinale-a.

- a. () rigeza, lactância, advinhado
- b. (X) pretensão, exceção, privilégio
- c. () impecilho, catéter, bacteriófago
- d. () câimbra, iclâmpsia, encheragar
- e. () deslise, beneficente, analisar

5. Analise as afirmativas abaixo:

1. Os ditongos abertos **ei** e **oi** em palavras paroxítonas perderam o acento agudo, de acordo com as novas regras de acentuação. Assim, palavras como "ideia", "celuloide" e "boia" não recebem mais acento gráfico.
2. A frase: "Não falta em minha cidade belezas naturais" está correta de acordo com a concordância verbal.
3. Na frase: "As crianças são a paixão daquele hospital", o verbo ser está corretamente flexionado para estabelecer a perfeita concordância verbal.
4. Pode-se escrever: "Não se preocupe" ou "Não preocupe-se". Ambas estão corretas, embora a segunda use um linguajar mais tradicional.
5. Está correto o uso da crase em: "Entrego à Vossa Senhoria meu pedido de demissão."

Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas corretas.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.

Conhecimentos Específicos

25 questões

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) acerca da retirada de pontos.

- () A sutura do tecido tem como objetivos aproximar bordos da ferida, minimizar trauma, controlar sangramento, proteger o tecido da invasão de micro-organismos e propiciar a cicatrização.
- () Antes da retirada dos pontos deve-se limpar o local com solução fisiológica.
- () Para a retirada dos pontos deve ser utilizado pacote de retirada de pontos ou na ausência deste, é indicado o uso de luva estéril e lâmina de bisturi.
- () Ao iniciar a retirada dos pontos indica-se que os mesmos sejam retirados intercalados e caso tenha sinal de deiscência, deve-se suspender a retirada e comunicar o fato à enfermeira responsável.
- () Após a retirada dos pontos torna-se necessário que o local fique coberto com gaze para proteção.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•V•V•V
- b. (X) V•V•V•V•F
- c. () V•V•F•V•F
- d. () V•F•V•F•V
- e. () F•V•F•V•F

7. Assinale a alternativa **correta** em relação ao posicionamento do paciente no leito.

- a. () A posição semifowler é aquela cuja elevação de cabeceira é de 90 graus.
- b. () Na posição pronada ou decúbito ventral, o paciente permanece de barriga para cima.
- c. () A posição supina também é conhecida como decúbito ventral.
- d. () Na posição de Trendelenburg, toda a estrutura da cama deve ser inclinada, mantendo os pés para baixo.
- e. (X) A posição de Sims é uma posição geralmente utilizada para procedimentos como a realização de enema.

8. As mãos são consideradas as principais vias de disseminação de infecções relacionadas à assistência à saúde.

Analise as afirmativas abaixo em relação à higienização das mãos:

1. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde.
2. A higienização das mãos apresenta as seguintes funções: remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato; prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas.
3. O uso de esmaltes, unhas postiças e adornos não são contraindicados desde que se realize a higiene das mãos com a técnica correta.
4. O uso de luvas substitui a higienização das mãos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

9. Assinale a alternativa **correta** em relação à avaliação dos sinais vitais.

- a. Bradicardia são os batimentos cardíacos acima do normal.
- b. Taquicardia são os batimentos cardíacos abaixo do normal.
- c. O pulso é um dos sinais vitais que pode nos dar informações sobre o funcionamento do aparelho circulatório.
- d. Os valores considerados normais de pulsação de um adulto são de 90 a 120 bpm.
- e. Aspectos como dor, medo, exercício físico e temperatura corporal elevada não devem ser considerados pois não alteram a frequência do pulso.

10. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, sobre a administração de medicamentos por via intramuscular:

Coluna 1 Região

1. Região ventroglútea ou local de Hochstetter
2. Região lateral da coxa ou face ânterolateral
3. Região glútea
4. Região deltóidea

Coluna 2 Descrição

- Possui grande massa muscular, tem como vantagem o fácil acesso, pode ser indicada para lactentes e crianças e é representada pelo músculo vastolateral.
- Deve ser o local de preferência para administração intramuscular e é representada pelo músculo glúteo médio.
- Apesar de ser de fácil acesso, é um músculo pequeno, não sendo possível a administração de grandes volumes (máximo de 3 ml).
- É contraindicada em idosos ou pessoas imobilizadas no leito, cujo músculo glúteo esteja deteriorado, além de pessoas excessivamente magras e crianças menores de 1 ano.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1•2•3•4
- b. 1•4•2•3
- c. 2•1•3•4
- d. 2•1•4•3
- e. 3•2•4•1

11. Um paciente precisa receber 7.500 unidades de heparina EV. Na farmácia do hospital temos apenas frasco-ampola de 5 ml contendo 5000 UI/ml (unidades por ml).

Quantos ml o paciente receberá?

- a. 1,0 ml
- b. 1,5 ml
- c. 2,5 ml
- d. 5,0 ml
- e. 7,5 ml

12. Sobre a administração de medicamentos, é **correto** afirmar:

- a. () A absorção da medicação por via endovenosa é mais lenta que pela via intramuscular.
- b. () Na via intradérmica, é possível administrar um volume superior a 1 ml devido a sua intensa capacidade absorviva.
- c. () A absorção da medicação por via subcutânea é mais rápida que pela via intramuscular e endovenosa.
- d. (X) Na via endovenosa, é possível a administração de grandes volumes, sendo muito utilizada em situações de emergência.
- e. () A via subcutânea é contraindicada para medicamentos cuja absorção é lenta e contínua, a exemplo das insulinas e anticoagulantes como a heparina.

13. A realização de curativos simples é uma atribuição do técnico de enfermagem.

Assinale a alternativa **correta** sobre a realização dessa técnica.

- a. (X) Dentre os critérios do curativo ideal está o fato de se manter a umidade do leito da ferida.
- b. () O curativo a ser realizado deve impedir as trocas gasosas entre o meio externo e a ferida.
- c. () Ao realizar a limpeza da ferida, deve-se iniciar pela parte mais contaminada para a menos contaminada.
- d. () Em curativos com drenos deverá ser iniciada a limpeza pelos drenos e seguir posteriormente para o restante da ferida.
- e. () Durante a realização de curativos em feridas abertas devemos irrigar previamente o local com solução fisiológica a 0,9% morna e a seguir secar completamente o local, inclusive no centro da ferida, para impedir a umidade e proliferação de bactérias.

14. A aspiração de secreções oronasofaríngea é um procedimento realizado quando o paciente não é capaz de remover e eliminar secreções.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () O procedimento deve ser ágil, não devendo ultrapassar a 30 segundos.
- b. () O lubrificante lipossolúvel é o mais indicado para fazer a lubrificação da sonda, favorecendo o melhor deslize da mesma e minimizando possíveis traumas.
- c. (X) Antes de realizar o procedimento é importante avaliar se há alguma lesão nasal ou desvio de septo bem como analisar o tamanho da narina para a escolha da correta sonda de aspiração.
- d. () A utilização de equipamento de proteção individual não é necessária quando se trata de aspirações de boca e nariz. Esta apenas deve ser usada ao se aspirar traqueostomias e tubos orotraqueais.
- e. () Durante a introdução da sonda na narina, a aspiração deverá estar aberta e com sucção funcionando para facilitar a retirada da secreção desde a introdução da mesma, devendo esta ser clampeada no momento da retirada da sonda para evitar traumas.

15. A respeito da instalação de cateter nasal de oxigênio, é **correto** afirmar:

- a. () Trata-se de um procedimento estéril e para tanto deve ser instalado com o uso de luva estéril.
- b. () O oxigênio a ser ofertado precisa ser umidificado, sendo necessária a colocação de soro fisiológico no umidificador até o limite recomendado.
- c. () A medida do cateter a ser instalado, quando se tratar do intranasal, deve levar em consideração o lóbulo da orelha até a ponta do nariz e deste até o apêndice xifoide.
- d. () A fixação do cateter nasal deve ser firme, não sendo recomendada a troca do local da fixação, com o intuito de diminuir riscos de lesão.
- e. (X) A utilização do fluxômetro é essencial para medir a quantidade de litros/minuto do oxigênio prescrito que será administrado.

16. Sabe-se que os engasgos são intercorrências comuns que acontecem com recém-nascidos.

São ações **corretas** a serem realizadas diante de um engasgo em recém-nascido:

- a. () O recém-nascido deve ser colocado deitado e feitas compressões torácicas.
- b. () O recém-nascido deve ser levantado imediatamente e soprado seu rosto para ajudá-lo a respirar.
- c. (X) O recém-nascido deve ser posicionado de cabeça para baixo, apoiando-o na coxa e devendo-se bater com a parte mais saliente da mão aberta entre as escápulas.
- d. () O recém-nascido deve ser posicionado com a cabeça para cima, devendo-se bater com a parte mais saliente da mão aberta entre as escápulas.
- e. () O recém-nascido deve ser levantado imediatamente e o adulto, com os dedos indicadores e médio, deverá tentar retirar o corpo estranho, se for o caso.

17. A realização da punção venosa é uma técnica importante que requer conhecimento e habilidade.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () Sempre utilizar luvas estéreis durante a punção venosa periférica, pois trata-se de um procedimento de assepsia cirúrgica.
- b. () As veias de membros inferiores para punção podem ser utilizadas uma vez que não há risco de embolias e tromboflebites.
- c. () É indicado desconectar o equipo de soro para troca de roupas, banho, transporte do paciente, entre outros, pois favorece a movimentação do paciente e diminui os riscos de desconexão acidental.
- d. (X) Os locais de escolha para a punção devem respeitar os vasos distais e depois proximais, preferindo locais distantes de articulações, lesões ou malformações.
- e. () Para atender à necessidade da terapia intravenosa, devem ser selecionados cateteres de maior calibre e comprimento de cânula. Cateteres com maior calibre causam menos flebite mecânica e menos obstrução no fluxo da veia.

18. Amamentar é um processo que envolve interação entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe.

Analisar as afirmativas abaixo em relação ao processo de amamentação:

1. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo por quatro meses e complementado até dois anos ou mais.
2. Dentre as vantagens do aleitamento materno estão o fato de evitar diarreia, infecções respiratórias, diminuir o risco de alergias, melhorar o desenvolvimento da cavidade bucal e reduzir a chance de obesidade em crianças.
3. Uma forma de avaliar se a pega durante a amamentação está adequada é identificar se há uma abertura ampla da boca, onde o bebê abocanha não apenas o mamilo, mas também parte da aréola. Os lábios do bebê também devem estar curvados para fora.
4. Recomenda-se que a criança seja amamentada com horários pré-estabelecidos, com restrições de horários e de tempo de permanência na mama.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos equipamentos de proteção individual.

- () A máscara cirúrgica deve ser utilizada em precaução por gotículas pelos profissionais da saúde e nos pacientes na suspeita ou confirmação de doenças transmitidas de forma respiratória.
- () As máscaras com filtro biológico (n95, PFF2) são de uso exclusivo do profissional da saúde para precaução com gotículas, não sendo indicadas em caso de aerossóis.
- () As luvas de procedimento devem ser usadas pelos profissionais da saúde, e trocadas após contato com cada paciente ou entre os diversos procedimentos em um mesmo paciente, ao manusear objetos ou superfícies sujas de sangue e/ou líquidos, para punções venosas e outros procedimentos.
- () Os aventais devem ser utilizados sempre que houver risco de contato com materiais biológicos.
- () Óculos de proteção para os olhos devem ser usados em procedimentos que gerem respingos de sangue ou secreções (líquidos), evitando-se assim exposição da mucosa dos olhos, por exemplo, no momento de aspiração de secreções. Podem ser utilizados sobre os óculos de grau.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•F•V•V
- b. (X) V•F•V•V•V
- c. () V•F•V•F•V
- d. () F•V•V•V•V
- e. () F•V•F•V•F

20. As queimaduras são acidentes que podem ocorrer em ambiente doméstico e com alta incidência em crianças.

Acerca dos cuidados com queimaduras, é **correto** afirmar:

- a. () Em seguida ao acidente, procure lavar o local atingido com água morna para evitar o choque térmico, agravando ainda mais a área queimada.
- b. () É indicada a utilização de creme dental pois o mesmo possui componentes cicatrizantes que irão aliviar a sensação de ardência.
- c. () A queimadura de segundo grau (espessura parcial-superficial e profunda) afeta apenas a epiderme sem formação de bolhas ou flictenas.
- d. () A queimadura de terceiro grau (espessura total) afeta a epiderme, a derme e estruturas profundas e geralmente é em decorrência dela que o paciente mais sente dor.
- e. (X) Em caso de acidente envolvendo queimaduras, o primeiro cuidado é extinguir a fonte de calor, ou seja, impedir que permaneça o contato do corpo com o fogo, líquidos e superfícies aquecidas, entre outras causas do acidente.

21. Assinale a alternativa **correta** no que se refere às possíveis complicações de punções venosas periféricas.

- a. (X) Soroma é causado por extravasamento de solução fora do espaço vascular. É perceptível pela elevação da pele na ponta distal do cateter.
- b. () Nos casos de soroma, interromper imediatamente a infusão e retirar o cateter, devendo ser aplicado compressa fria no local.
- c. () Hematoma é quando há presença de sinais flogísticos no local da inserção do cateter, devendo ser removida a punção imediatamente.
- d. () Em situações de hematoma, deve-se aplicar compressa quente no local.
- e. () Os sinais flogísticos que devem ser atentados em um local de punção são dor, calor, hematoma e prurido.

22. Relacione abaixo a coluna 1 com a coluna 2:

Coluna 1 Semiologia

1. Melena
2. Mecônio
3. Poliúria
4. Disúria
5. Oligúria

Coluna 2 Descrição

- () Primeiras eliminações intestinais do recém-nascido.
- () Diminuição da produção de urina.
- () Sintoma comum caracterizado pela produção de urina acima do normal.
- () Sintoma clínico caracterizado por uma sensação de dor, ardor, ou desconforto ao urinar.
- () Fezes pastosas de cor escura e cheiro fétido, podendo ser sinal de hemorragia digestiva alta.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 • 2 • 3 • 4 • 5
- b. (X) 2 • 5 • 3 • 4 • 1
- c. () 3 • 1 • 2 • 4 • 5
- d. () 4 • 1 • 2 • 3 • 5
- e. () 5 • 2 • 3 • 4 • 1

23. Acerca do cuidado à gestante, assinale a alternativa que indica a melhor posição para que possamos orientar a gestante a permanecer quando estiver deitada, durante o trabalho de parto:

- a. () Posição prona
- b. () Decúbito dorsal
- c. () Decúbito ventral
- d. (X) Decúbito lateral esquerdo
- e. () Posição de Trendelenburg

24. Analise as afirmativas abaixo sobre a administração de insulina:

1. Pode ser administrada por via endovenosa e sub-cutânea.
2. Após sua administração o local deverá ser massageado para facilitar a absorção e melhorar o efeito.
3. Se o paciente estiver recebendo dois tipos de insulina (regular e NPH) no mesmo horário, as mesmas podem ser misturadas, desde que respeitados os princípios corretos da técnica e da mistura.
4. A insulina do tipo regular possui efeito prolongado enquanto a do tipo NPH é considerada uma insulina de efeito rápido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

25. A parada cardiorrespiratória (PCR) é a cessação abrupta das funções cardíaca, respiratória e cerebral.

São sinais de PCR em adulto:

- a. () Inconsciência e perda de controle esfíncteriano.
- b. () A ausência de movimentos respiratórios e perda de controle esfíncteriano.
- c. () Ausência de pulso e presença de movimentos respiratórios.
- d. () Torpor, pulso filiforme e respiração agônica (gasping).
- e. (X) Inconsciência, ausência de pulso, ausência de movimentos ventilatórios (apneia) ou respiração agônica (gasping).

26. A hipoglicemia é caracterizada por um nível anormalmente baixo de glicose no sangue e precisa ser precocemente identificada para que o cuidado possa ser realizado o mais breve possível.

São sinais de hipoglicemia:

- a. Tremores, sono e cansaço, fome e suor, tontura, estado de confusão.
- b. Bradicardia, angina, sudorese, boca seca e sede intensa.
- c. Taquicardia, falta de apetite, perda do controle esfinteriano.
- d. Movimentos tônico-clônicos, liberação esfinteriana e bradicardia.
- e. Suores, calafrios, pele fria, hipertermia, perda do apetite e sede.

27. Você é técnico de enfermagem de uma unidade e precisa administrar em um paciente 1500 ml de soro fisiológico a 0,9% nas 24 horas, porém na unidade só há frascos de 500 ml disponíveis.

O número de frascos que terá que ser administrado nas 24 horas e o tempo de infusão de cada frasco são, respectivamente:

- a. 2 frascos, 8 horas.
- b. 3 frascos, 6 horas.
- c. 3 frascos, 8 horas.
- d. 4 frascos, 4 horas.
- e. 4 frascos, 8 horas.

28. Dentre os cuidados ao recém-nascido, está o correto posicionamento do mesmo no berço. Este cuidado deve ser reforçado pela equipe de saúde a todos os pais e família, como forma também de prevenir a morte súbita do recém-nascido.

Considerando o exposto, a **correta** posição do bebê no berço deve ser:

- a. Posição prona.
- b. Decúbito dorsal.
- c. Decúbito ventral.
- d. Decúbito lateral direito.
- e. Decúbito lateral esquerdo.

29. Assinale a alternativa **correta** dentre os cuidados com a sonda gástrica e jejunal.

- a. Se o paciente estiver com medicações via oral prescritas, estas não podem ser administradas pela sonda gástrica.
- b. O equipo a ser utilizado para administração da dieta pela sonda gástrica é o mesmo a ser usado em infusões endovenosas.
- c. A fixação da sonda na narina não deve ser alternada pois isso pode aumentar o risco de exteriorização acidental da sonda.
- d. Quando a sonda tiver a finalidade de alimentação intermitente, a mesma deverá ser lavada após a administração de dietas e medicações para evitar obstrução.
- e. O paciente que recebe dieta por sonda gástrica não possui risco de vômitos, uma vez que sua porção distal está localizada em região jejunal.

30. Dentre os cuidados de enfermagem está o banho, possuindo fins terapêuticos ou de limpeza.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. O banho de aspersão é também conhecido como banho no leito.
- b. A região perineal deve ser a primeira área a ser lavada, para minimizar infecção.
- c. O banho no leito deve ser realizado preferencialmente por uma única pessoa, para minimizar o constrangimento do paciente.
- d. A sequência correta do banho no leito deve seguir o retorno venoso para favorecer a circulação, ou seja, no sentido caudal-cefálico.
- e. Dentre os objetivos do banho está o de proporcionar bem-estar e higiene, estimular a circulação, oportunizar exercícios ativos e passivos e realizar inspeção do paciente.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>