

E1 Enfermeiro

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



29 de setembro



40 questões



8 às 12h



4h de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.

O trabalho e a saúde mental

O carpinteiro imagina um móvel, faz o desenho com as medidas, corta madeira, dá a ela a forma que imaginou e depois monta, enverniza e lustra o móvel que construiu. Admira a obra que realizou com seu trabalho criativo. Ele tem um resultado que lhe dá satisfação, mesmo que não lhe dê muitos milhões em dinheiro por mês. Já o cobrador de ônibus fica o dia todo sentado, não fala com ninguém, mal olha para as pessoas, apenas recebe o dinheiro e dá o troco durante 8 horas por dia. No fim, está deprimido e cansado de fazer esse trabalho repetitivo e monótono. Nem muitos milhões em dinheiro seriam suficientes para pagar trabalho tão ingrato.

Um operário da linha de montagem de televisores põe uma pecinha em um aparelho que imediatamente é transportado pela esteira de montagem para outro operário, que coloca outra pecinha, e assim por diante. E um dia passa: um aparelho, uma pecinha, outro aparelho, outra pecinha, mês após mês, ano após ano.

Assim trabalham hoje milhões de pessoas em todo o mundo: sem gosto, sem alegria, sem prazer. Por isso, não é exagero dizer que o mundo moderno, com sua tecnologia, tirou da maioria dos seres humanos algo de que eles precisam e gostam: o trabalho criativo, que dá prazer.

Quem faz o que gosta enquanto trabalha sente pouco a diferença entre trabalho e lazer. Nesse caso, o trabalho faz bem à saúde.

Quem faz o que detesta fica o tempo todo olhando o relógio e o tempo não passa; espera com ansiedade o último dia de trabalho da semana e fica irritado quando a volta ao trabalho se aproxima; sonha com as férias e, mais do que tudo, sonha ganhar na loteria para fazer só o que gosta. Com tanto sofrimento, trabalhar acaba fazendo mal para a saúde.

O sonho da maioria dos jovens é encontrar um trabalho que dê muito dinheiro, mas isso não é suficiente. O trabalho deve dar prazer. Trabalhos feitos contra a vontade causam desânimo, falta de confiança em si próprio, tédio, tristeza. Esse estado de espírito negativo acaba criando doenças e perder a saúde não vale a pena por nenhum dinheiro do mundo.

Rosicler Martins Rodrigues
Vida e Saúde. São Paulo: Moderna.

1. Analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O trabalho criativo sempre gera lucro.
2. Satisfação e prazer no trabalho são ingredientes favoráveis à saúde.
3. O sonho dos jovens é conseguir um trabalho lucrativo.
4. O desânimo advém de trabalhos feitos sem prazer.
5. A tecnologia reforça o trabalho criativo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa em que a substituição do termo sublinhado pelo pronome oblíquo esteja **correta.**

- a. Vi os profissionais muito desanimados. / Vi-lhes muito desanimados.
- b. Eu obedeci mecanicamente às normas. / Eu as obedeci mecanicamente.
- c. Nós encontramos enfermeiros satisfeitos com seu trabalho. / Nós lhes encontramos satisfeitos com o trabalho.
- d. Assim que vi o paciente, notei seu desconforto. / Assim que vi ele, notei seu desconforto.
- e. Entrego a você esta proposta. / Entrego-lhe esta proposta.

3. Assinale a frase **correta quanto à concordância.**

- a. Ela mesmo fez o procedimento necessário.
- b. Naquele hospital, já faz cinco anos que não contratam enfermeiros.
- c. Na enfermaria, haviam pacientes em estado grave.
- d. Naquele posto de saúde, precisam-se de mais enfermeiros.
- e. Pode existir outras propostas para a melhoria deste ambiente.

4. Assinale a alternativa que requer um ponto de exclamação e uma vírgula obrigatória.

- a. Que é isso rapaz
- b. Coitado daquele profissional
- c. Ela atende com alegria e boa vontade
- d. Nunca lhe contrataram para o serviço
- e. Hoje vamos fazer a campanha da vacina contra o sarampo

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a. As palavras “ônibus”, “último” e “férias” são acentuadas pela mesma regra.
- b. A primeira frase do texto (que se encontra sublinhada) possui apenas verbos no tempo presente e isso indica satisfação no trabalho feito.
- c. Na frase: “O trabalho criativo, que dá prazer”, a palavra sublinhada é pronome e pode ser trocado por “o qual” sem alterar o sentido da frase.
- d. Na frase: “Não vale a pena lucro sem prazer”, a expressão sublinhada tem sentido de piedade e pode ser escrita com crase (à pena) sem alterar o sentido.
- e. Na frase: “Quem faz o que detesta fica o tempo todo olhando o relógio”, as palavras sublinhadas são pronomes e podem ser trocadas por “aquilo” e “um” respectivamente sem alterar o sentido da frase.

Conhecimentos Específicos

35 questões

6. Com relação ao paciente com Edema Agudo de Pulmão (EAP), é **correto** afirmar:

- a. O paciente apresenta rubor cutâneo.
- b. O paciente deve ser mantido deitado com as pernas elevadas para melhorar o retorno cardíaco.
- c. A dispneia intensa e a tosse com expectoração amarela são sinais iniciais de EAP.
- d. A taquipneia e dispneia leves, tosse seca, hipoxemia são sinais iniciais de EAP.
- e. A taquiarritmia não é considerada um fator desencadeante.

7. Os pacientes internados que estão em ventilação mecânica possuem risco aumentado para pneumonia.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A pneumonia relacionada à assistência é geralmente de origem aspirativa, sendo a principal fonte as secreções das vias aéreas superiores.
- () Manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 45° e higiene oral com antissépticos são medidas recomendadas para a prevenção da pneumonia.
- () Nos pacientes restritos ao leito, as pneumonias hospitalares desenvolvem-se nos lobos superiores e nos segmentos anteriores do pulmão.
- () Extremos de idade, desnutrição, doenças de base graves, incluindo imunossupressão, são fatores de risco para pneumonia.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • V • F
- b. V • V • F • V
- c. V • V • F • F
- d. V • F • F • V
- e. F • V • F • V

8. Analise o texto abaixo:

A antissepsia cirúrgica das mãos com antisséptico degermante deve ser feita de minutos para o primeiro procedimento do dia e de minutos para as cirurgias subsequentes, se realizadas dentro de hora após a primeira fricção.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 2 a 6 • 2 a 3 • 3
- b. 3 a 5 • 2 a 3 • 1
- c. 3 a 5 • 5 a 6 • 2
- d. 5 a 8 • 3 a 5 • 1
- e. 5 a 8 • 3 a 5 • 2

9. A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de infecções relacionadas à assistência a saúde, sendo que a maioria está associada à cateterização vesical.

As estratégias realizadas para a prevenção da ITU são:

1. Não utilizar rotineiramente cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano.
2. Realizar irrigação vesical contínua com antimicrobiano de rotina.
3. Não utilizar instilação rotineira de soluções antissépticas ou antimicrobianas em sacos de drenagem urinária.
4. Não trocar cateteres rotineiramente.
5. Utilizar, de rotina, lubrificantes antissépticos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

10. Analise as afirmativas abaixo acerca do cuidado à mulher em situação de abortamento.

1. Abortamento é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana e com produto da concepção pesando menos que 500 g.
2. Na ameaça de abortamento, o orifício interno do colo uterino está fechado e o volume uterino é compatível com o esperado para a idade gestacional.
3. O abortamento completo ocorre geralmente em gestações com mais de oito semanas.
4. No abortamento retido geralmente ocorre regressão dos sintomas e sinais da gestação e há perda sanguínea abundante.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

11. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, com relação aos sinais e sintomas de Descolamento Prematuro de Placenta (DPP) e a Placenta Prévia (PP).

Coluna 1

1. Descolamento Prematuro de Placenta (DPP)
2. Placenta Prévia (PP)

Coluna 2 Sinais e Sintomas

- () Aparecimento de dor abdominal súbita, com intensidade variável.
- () Sangramento vaginal súbito, de cor vermelho-vivo, recorrente e progressivo de quantidade variável.
- () Na fase inicial, ocorre taquisistolia, seguida de hipertonia uterina.
- () O volume e tono uterinos estão normais e frequentemente a apresentação fetal é anômala.
- () Pode evoluir para quadro grave caracterizado por atonia uterina (útero de Couvelaire).

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1 • 1 • 2 • 2 • 1
- b. 1 • 2 • 1 • 2 • 1
- c. 1 • 2 • 2 • 1 • 1
- d. 2 • 1 • 2 • 1 • 2
- e. 2 • 2 • 1 • 2 • 1

12. O aumento da bilirrubina direta em recém-nascidos pode ser sugestivo de doença hepatocelular ou biliar, necessitando observação e avaliação urgentes.

Assim sendo, o recém-nascido com idade igual ou superior a dias que persistir com icterícia, deve ser avaliado do ponto de vista clínico e laboratorial.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. 20
- b. 18
- c. 14
- d. 10
- e. 5

13. A utilização do Desfibrilador Externo Automático (DEA) requer alguns cuidados.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () O excesso de pelos deve ser removido somente da região onde serão posicionadas as pás.
- () Em crianças de 1 a 8 anos deve-se utilizar o DEA somente com pás pediátricas.
- () As pás infantis podem ser utilizadas para adultos, pois é só aumentar a carga.
- () Em lactentes (0 a 1 ano), utilizar o DEA com pás pediátricas e/ou atenuador de carga, somente quando esse tipo de desfibrilador estiver disponível.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V
- b. V • V • F • F
- c. V • F • F • V
- d. F • F • V • V
- e. F • F • V • F

14. As mãos são as principais vias de disseminação de infecções relacionadas à assistência à saúde.

Analisar as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O secador elétrico não é indicado para a higienização das mãos nos serviços de saúde.
2. A higienização das mãos deve ser feita com preparação alcoólica antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico.
3. A higienização antiséptica das mãos deve ter duração de 10 a 30 segundos.
4. O uso de luvas substitui a higienização das mãos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

15. Os principais fatores de risco para suicídio são:

- a. os distúrbios de sono, sociodemográficos e as doenças orgânicas incapacitantes.
- b. os transtornos de humor, de personalidade, de ansiedade e as comorbidades.
- c. os transtornos sociodemográficos, o isolamento social e as doenças orgânicas incapacitantes.
- d. os transtornos mentais, sociodemográficos, psicológicos e condições clínicas incapacitantes.
- e. as perdas de figuras parentais na infância, os transtornos de humor e a dinâmica familiar conturbada.

16. Quanto aos passos simplificados do atendimento em Suporte Básico de Vida do adulto para profissionais da saúde, o mnemônico CABD primário significa:

- a. **C** Checar responsividade e respiração da vítima, Chamar por ajuda e Compressões (30 compressões) • **A** Abertura das vias aéreas • **B** Boa ventilação (2 ventilações) • **D** Desfibrilação.
- b. **C** Chamar por ajuda, Checar o pulso da vítima e Compressões (30 compressões) • **A** Abertura das vias aéreas • **B** Boa ventilação (2 ventilações) • **D** Desfibrilação.
- c. **C** Checar a respiração da vítima, Chamar por ajuda, Checar a pressão arterial da vítima e Compressões (30 compressões) • **A** Abertura das vias aéreas • **B** Boa ventilação • **D** Desfibrilação.
- d. **C** Checar responsividade e respiração da vítima, Chamar por ajuda, Checar o pulso da vítima e Compressões (30 compressões) • **A** Abertura das vias aéreas • **B** Boa perfusão periférica • **D** Desfibrilação.
- e. **C** Checar responsividade e respiração da vítima, Chamar por ajuda, Checar o pulso da vítima e Compressões (30 compressões) • **A** Abertura das vias aéreas • **B** Boa ventilação (2 ventilações) • **D** Desfibrilação.

17. As complicações agudas do Diabetes Melitus (DM) requerem ação imediata dos profissionais de saúde para impedir que o quadro evolua para quadros clínicos mais graves.

Analisar as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A cetoacidose ocorre principalmente em pacientes com DM tipo 1, sendo, diversas vezes, a primeira manifestação da doença.
2. A pessoa com DM tipo 2, que mantém uma reserva pancreática de insulina, raramente desenvolve cetoacidose.
3. Os principais sintomas da cetoacidose são: poli-dipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga, visão turva e alterações do estado mental.
4. A síndrome hiperosmolar não cetótica é um estado de hiperglicemia grave acompanhada de desidratação e alteração do estado mental, que ocorre apenas no DM tipo 2.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

18. A triagem neonatal é um conjunto de ações preventivas, responsável por identificar precocemente indivíduos com doenças:

- a. cromossômicas, endocrinológicas, genéticas e cardíacas.
- b. genéticas, cardíacas, enzimáticas e degenerativas.
- c. degenerativas, endocrinológicas, genéticas e digestivas.
- d. metabólicas, genéticas, degenerativas e cromossômicas.
- e. metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas.

19. Analise as afirmativas abaixo acerca da hemorragia digestiva.

1. A hemorragia digestiva baixa (HDB) é a perda de sangue do trato gastrointestinal distal ao ligamento de Treitz.
2. A taxa de mortalidade por HDB é menor do que as associadas à hemorragia digestiva alta.
3. A HDB é mais comum entre os homens e aumenta significativamente nos idosos, sendo que a melena é o principal sintoma.
4. A ingestão de ferro pode simular melena, e a de beterraba pode simular hematoquezia, mas nesses casos, o teste de guaiaco de fezes será negativo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

20. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à classificação de risco em obstetria, proposto pelo Ministério da Saúde.

- () Ao enfermeiro generalista cabe classificar o risco, seguindo o protocolo adotado, sinalizando a respectiva cor na ficha de atendimento.
- () Ao enfermeiro obstetra cabe prestar atendimento às mulheres, de acordo com protocolo institucional e com o acesso imediato ao médico obstetra, quando necessário.
- () Gestantes classificadas com a cor Laranja devem ser atendidas em até 15 minutos.
- () Na Classificação Amarela, o atendimento da gestante deve ocorrer em até uma hora.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • V • F
- b. V • V • F • V
- c. V • F • V • F
- d. V • F • F • F
- e. F • V • F • V

21. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, condições sugestivas para o quadro de intoxicação alcóolica e os sinais para diferenciar esta da abstinência alcóolica.

- a. fala pastosa, sudorese e alterações do humor • hálito cetônico, convulsão, delírio
- b. fala pastosa, tremores e febre • sudorese profusa, convulsão, delírio
- c. fala pastosa, hálito cetônico e hipertermia • hipotermia, convulsão, delírio
- d. fala desconexa, sudorese e delírio • incoordenação motora, sudorese profusa, convulsão
- e. fala pastosa, odor de álcool no hálito e alterações do humor • sudorese profusa, convulsão, delírio

22. A eclâmpsia é o distúrbio hipertensivo gestacional mais grave, sendo responsável por um número significativo de óbitos.

Analisar as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O atendimento pré-natal é a forma mais eficiente de evitar óbitos por eclâmpsia, seguida do adequado atendimento de urgência/emergência.
2. A maioria das mulheres não precisa de intubação, apenas quando o escore na escala de Glasgow for menor ou igual a 8.
3. A avaliação do feto deve ser realizada antes do manejo materno.
4. A eclâmpsia é indicação de interrupção da Gestação, mas não deve ser intempestiva nem imediata.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

23. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) no que diz respeito a curativos.

- () Os princípios para um curativo ideal são: manter elevada a umidade entre a ferida e o curativo, remover o excesso de exsudação, permitir a troca gasosa, fornecer isolamento térmico, ser impermeável a bactérias, ser asséptico e permitir a remoção sem traumas e dor.
- () A papaína é bactericida, mantém o meio úmido, facilita a cicatrização, é hemostática e apresenta alta capacidade de absorção.
- () O Alginato com prata estimula a proliferação celular, o desbridamento químico, é bacteriostático, anti-inflamatório e diminui a formação de queleide.
- () Nas feridas com sistema de drenos fechados, o curativo deve ser trocado a cada 24 horas ou sempre que o mesmo se tornar úmido, solto ou sujo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a. V • V • F • F
- b. V • F • V • V
- c. V • F • F • V
- d. F • F • V • V
- e. F • F • F • V

24. Os agentes etiológicos mais comuns, responsáveis pela osteomielite em crianças de 0 a 2 anos, são:

- a. *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenza* tipo B, *Streptococcus pyogenes* e *Neisseria gonorrhoeae*.
- b. *Streptococcus agalactiae*, Bactérias gram-negativas entéricas, *Streptococcus pyogenes* e *Neisseria gonorrhoeae*.
- c. *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenza* tipo B, *Streptococcus agalactiae* e *Cândida Albicans*.
- d. *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus pneumoniae*, Bactérias gram-negativas entéricas e *Neisseria gonorrhoeae*.
- e. *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, Bactérias gram-negativas entéricas e *Cândida Albicans*.

25. Analise as afirmativas abaixo, em relação ao transporte neonatal.

1. A equipe de transporte deve ter, de preferência, um pediatra ou um neonatologista e estar acompanhado por um enfermeiro ou por um técnico de enfermagem que tenha conhecimento e prática no cuidado ao recém-nascido.
2. A ambulância de suporte avançado é eficaz para transportar recém-nascidos graves ou instáveis em um raio de até cerca de 50 km e recém-nascidos estáveis em um raio de até 160 km.
3. O cateter nasal é o ideal para se transportar o recém-nascido, pois mantém estáveis os parâmetros ventilatórios.
4. Os equipamentos utilizados para o transporte neonatal devem possuir bateria própria e recarregável, com autonomia de funcionamento de, no mínimo, o dobro do tempo previsto para o transporte.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

26. Na avaliação do Acidente Vascular Cerebral (AVC), observam-se alterações:

- a. na força e na fala, sendo que alteração em apenas uma delas, com início súbito, é suficiente para a suspeita de um AVC.
- b. na face, na força e na fala, sendo que alteração em apenas uma delas, com início súbito, é suficiente para a suspeita de um AVC.
- c. na face, na força e na fala, sendo que alteração em duas delas, com início súbito, é suficiente para a suspeita de um AVC.
- d. na face e na força, sendo que alteração em apenas uma delas, com início súbito, é suficiente para a suspeita de um AVC.
- e. na face, na força e na fala, sendo que alteração em todas, com início súbito, indica suspeita de AVC.

27. A hanseníase pode ser classificada, tomando-se como base as manifestações clínicas e o resultado da baciloscopia.

De acordo com o número de lesões na pele, podemos classificar em Paucibacilar se apresenta até lesões e Multibacilar se apresenta mais de lesões.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 2 • 2
- b. 3 • 3
- c. 5 • 5
- d. 6 • 6
- e. 7 • 7

28. A gastrectomia é a ressecção parcial ou total do estômago. Devido às complicações cirúrgicas, o cuidado de enfermagem no pós-operatório é de extrema importância.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O paciente deve ser posicionado em Semi-Fowler durante as refeições.
2. Após as refeições, deixar o paciente em decúbito lateral esquerdo por 20 a 30 minutos.
3. Orientar para que o paciente ingira líquidos durante as refeições, para facilitar a ingestão de alimentos.
4. Oferecer refeições mais frequentes e em pequenas quantidades.
5. Orientar para que o paciente evite a ingestão excessiva de carboidratos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2, 3, e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

29. O trauma de origem térmica pode ser resultante da exposição ou contato com chamas, líquidos ou superfícies quentes.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação aos cuidados a esse paciente.

- () As lesões que atingem apenas a epiderme são consideradas de 1º Grau, sendo que o paciente apresenta bolhas na pele.
- () Expor a área queimada, retirando as roupas que não estejam aderidas.
- () Prevenir a hipertermia aplicando compressas geladas.
- () Irrigar com soro fisiológico em abundância para resfriar a área queimada e cobrir com compressas secas, estéreis e não aderentes.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V
- b. V • V • F • F
- c. F • V • V • V
- d. F • V • F • V
- e. F • F • F • V

30. A hérnia abdominal encarcerada:

- a. não pode ser reduzida e o fluxo intestinal pode estar obstruído completamente.
- b. pode ser reduzida, mas há uma torção da alça intestinal.
- c. pode ser reduzida porque os fluxos sanguíneos e intestinais cessaram completamente.
- d. pode ser reduzida, colocando-se a massa proeminente de volta para a cavidade abdominal.
- e. não pode ser reduzida, havendo o risco de gangrena, devido à redução parcial do fluxo intestinal.

31. Os acidentes por animais peçonhentos requerem cuidados para o alívio dos sintomas e a prevenção de complicações.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A remoção dos ferrões de abelhas pode ser feita por raspagem com lâminas, pois o uso de pinças leva à inoculação do veneno ainda existente no ferrão.
- () Em casos de acidentes por águas-vivas e caravelas, não se deve utilizar água doce para lavar o local da lesão, pois a água doce pode piorar o quadro do envenenamento.
- () Nos acidentes com aranhas, recomenda-se fazer torniquete ou garrote na área atingida, furar, espremer ou fazer sucção no local da ferida.
- () Em caso de acidente escorpiónico, deve-se limpar o local com água e sabão e aplicar compressa gelada no local.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • F
- b. V • F • V • F
- c. V • F • F • V
- d. F • V • F • V
- e. F • F • V • F

32. O bom administrador em Enfermagem deve desenvolver estratégias que contribuam para a melhoria da assistência.

Assim sendo, sua equipe deve ser :

- a. preparada para a competitividade.
- b. preparada para seguir ordens.
- c. resguardada.
- d. controlada.
- e. motivada.

33. São cuidados de Enfermagem aos clientes com distúrbios hidroeletrólíticos:

1. Realizar a pesagem diária, não havendo necessidade de ser no mesmo horário, mas de preferência na mesma balança e se possível com o mesmo tipo de roupa.
2. Assegurar a adequada ingestão de alimentos e líquidos, de acordo com a patologia do cliente.
3. Observar e registrar sinais e sintomas do desequilíbrio hídrico: grau de hidratação, sinais de retenção de líquido, edema, fraqueza, pulso irregular, irritabilidade, entre outros.
4. Proceder balanço hídrico: manter controle real, documentado, da ingestão e eliminação hídrica durante as 24 horas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

34. Uma das infecções mais frequentes relacionadas à assistência à saúde dentro das Unidades de Terapia Intensiva brasileiras é:

- a. Traqueobronquite.
- b. Pneumonia associada à ventilação mecânica.
- c. Infecção da corrente sanguínea.
- d. Infecção do sítio cirúrgico.
- e. Infecção do trato urinário.

35. Assinale com V as afirmativas Verdadeiras e com F as Falsas, em relação à respiração do recém-nascido.

- () É do tipo costoabdominal, sendo comuns variações de frequência e ritmo respiratório, observando-se pausas respiratórias curtas nos recém-nascidos prematuros.
- () A palpação, a percussão e a ausculta devem ser feitas em toda a área de extensão do parênquima pulmonar.
- () A frequência respiratória média é de 60 a 70 incursões por minuto, devendo ser contada em um minuto completo.
- () A percussão pulmonar deve revelar som claro característico, exceto na área de projeção do fígado, onde o som pode ser submaciço ou maciço.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V
- b. V • V • F • F
- c. V • F • F • V
- d. F • V • V • V
- e. F • V • F • V

36. Na administração de Enfermagem nos Serviços de Saúde, cinco processos são necessários: organização, planejamento, execução, liderança e controle.

Qual deles é o mais importante?

- a. Controle
- b. Execução
- c. Liderança
- d. Organização
- e. Planejamento

37. O eixo estratégico da Atenção Humanizada à Gestação, Parto, Nascimento e Recém-Nascido prioriza ações de boas práticas de atenção ao parto e nascimento, ao puerpério e de atenção infantil até:

- a. 1 ano de vida.
- b. 2 anos de vida.
- c. 3 anos de vida.
- d. 4 anos de vida.
- e. 5 anos de vida.

38. Em situações de múltiplas vítimas, o socorrista deve realizar a triagem das vítimas de acordo com o método START (Triagem simples e rápida).

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. As vítimas classificadas com a cor cinza devem ser removidas.
2. Avaliar a capacidade de cumprir ordens simples. Não cumpre ordens simples, classificar e identificar com a cor amarela.
3. Orientar verbalmente todas as vítimas que estejam andando pelo local do acidente ou que consigam andar para que saiam do local, identificando-os com a cor verde.
4. Mover-se pela área avaliando as vítimas e a respiração. Se a vítima não respira realizar manobra manual de abertura das vias aéreas, procurando desobstruir se houver corpo estranho visível. Se não respira, após abertura das vias aéreas, identificá-la com a cor cinza.
5. O processo de classificação deve ser dinâmico, podendo ocorrer reclassificação de prioridade conforme evolução clínica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

39. O atendimento da Parada Cardiorrespiratória (PCR) em adultos requer cuidados específicos, dependendo da situação em que ela ocorre.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Em vítimas de trauma, é fundamental lembrar da estabilização da coluna cervical, sendo que a manobra do deslocamento anterior da mandíbula deve ser substituída pela manobra e hiperextensão da cabeça e elevação do mento.
2. Na PCR em situações de afogamento, a ventilação deve ser iniciada o mais rápido possível, mas somente após se retirar a vítima da água.
3. O atendimento da PCR associada às intoxicações segue o tratamento-padrão adotado de Suporte Básico de Vida, sendo indicado o uso de antídotos ou intervenções toxino-específicas.
4. Nos casos de PCR por hipotermia acidental, a hipotermia grave (< 30°C), com intensa disfunção e depressão orgânica, pode oferecer risco de óbito já em seu manuseio inicial.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

E1 Enfermeiro

40. A hemorragia pós-parto é uma das principais causas de mortalidade e morbidade materna no mundo, sendo que no Brasil ela ocupa a segunda causa de morte materna.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () O uso excessivo de ocitocina durante a assistência ao trabalho de parto aumenta o risco da hemorragia puerperal.
- () Com as elevadas taxas de cesariana tem se observado um número crescente de casos de acretismo placentário, que culminam com quadros graves de hemorragia.
- () As mulheres no pós-parto devem receber ocitocina profilática, pois essa é a principal estratégia para se evitar o quadro hemorrágico no puerpério.
- () Na puérpera com atonia uterina, a primeira manobra é a massagem uterina para estimular o tônus uterino, devendo evitar a compressão bimanual do útero.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•F
- b. V•F•V•V
- c. V•F•V•F
- d. F•V•V•F
- e. F•V•F•V

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		E1 Enfermeiro	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>