

ANALISTA JUDICIÁRIO

MEDICINA PSIQUIÁTRICA

TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno, contendo **70 (setenta)** questões objetivas e **1 (uma)** questão discursiva, você receberá do fiscal de sala
 - o cartão de respostas das questões objetivas;
 - a folha de textos definitivos da questão discursiva.



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas e preenchimento da folha de textos definitivos.
- **3 (três) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova.
- A partir dos **30 minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas e a folha de textos definitivos.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s).
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas e da folha de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não** será permitida a troca do cartão de respostas e da folha de textos definitivos em caso de erro do candidato.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas e na folha de textos definitivos.
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

Em todas as frases a seguir foi usada a conjunção “porque”; as opções a seguir apresentam formas adequadas de reescrever essas frases, retirando-se essa conjunção, com a manutenção do sentido original, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque os outros gozam / Por causa do gozo dos outros, o invejoso sofre e é tirano e verdugo de si próprio.
- (B) Muitos homens são louvados porque são mal conhecidos / Pelo mau conhecimento que se tem de alguns homens, eles são louvados.
- (C) Arguimos a vaidade alheia porque ofende a nossa própria / Por ofensa à nossa própria vaidade, arguimos a vaidade alheia.
- (D) A mocidade é temerária; presume muito porque sabe pouco / Pela pouca sabedoria, a mocidade é temerária e presume muito.
- (E) As nações não envelhecem como as pessoas, porque todos os dias se renovam pelos nascimentos / Pela renovação diária por meio dos nascimentos, as nações, como as pessoas, não envelhecem.

2

A oração “Acreditou que venceria facilmente o inimigo” poderia ser reescrita do seguinte modo: “Acreditou em fácil vitória contra o inimigo”.

Seguindo esse modelo, assinale a frase que realiza a mesma modificação de forma adequada.

- (A) O problema necessita ser resolvido urgentemente / o problema precisa de dissolução urgente.
- (B) Essa questão merece ser examinada detidamente / essa questão merece um exame detalhado.
- (C) O Museu será reinaugurado proximamente / o museu terá uma reinauguração próxima.
- (D) Vamos dividir os doces equitativamente / vamos dividir os doces de forma idêntica.
- (E) O deputado declarou repentinamente que sairia do partido / o deputado fez uma declaração repetida de que sairia do partido.

3

Em todas as frases abaixo substituímos por um participio o segmento sublinhado.

Assinale a frase em que essa substituição foi feita de forma **inadequada**.

- (A) Um edifício que está sobre quatro colunas / erigido.
- (B) Os carros que estão em fila dupla / estacionados.
- (C) O território que está entre Rio e São Paulo / localizado, situado.
- (D) Os presos que estão nessa cela / inseridos.
- (E) Uma esmeralda que está nesse anel / encrustada.

4

Em todas as frases abaixo está presente o verbo “ver”.

A substituição desse verbo por outro, adequada ao contexto, é:

- (A) Ficamos paralisados, vendo a paisagem maravilhosa / contemplando.
- (B) É difícil ver a diferença de cores neste quadro / apreciar.
- (C) O diretor verá hoje os requerimentos dos alunos / notará.
- (D) Os médicos veem muitos pacientes por dia / percebem.
- (E) Não conseguiram ver a grandeza das ações / destacar.

5

Assinale a frase abaixo cujo vocábulo sublinhado **não** apresenta uma impropriedade léxica (vocábulo mal-empregado no contexto da frase).

- (A) Recebeu um elogio pelo ato heroico que cometeu.
- (B) O carro deslizou na pista graças à chuva da noite anterior.
- (C) Eu garanto que não fui eu o autor do crime.
- (D) Os passageiros fizeram um esforço sobre-humano para escapar.
- (E) O paciente chegou ao hospital gozando de má saúde.

6

Nas frases abaixo, os adjetivos sublinhados estão relacionados à ideia de “movimento”.

Assinale a opção na qual o adjetivo foi selecionado adequadamente para o contexto da frase.

- (A) Assim que a orquestra iniciou a valsa, os formandos começaram a dançar com movimentos frenéticos.
- (B) Os soldados, perfeitamente perfilados, exibiam uma marcha ritmada.
- (C) O passante sofreu um ataque e caiu ao chão com movimentos oscilantes.
- (D) O pêndulo do relógio mostrava um movimento giratório.
- (E) O mar se chocava contra as rochas com força convulsiva.

7

Assinale a frase em que há **problema** de norma culta em função da confusão entre “todo-a” / “todo o - toda a”.

- (A) Toda alegria é uma vitória, e uma vitória é uma vitória, por menor que seja.
- (B) Quem não sabe chorar de todo o coração também não sabe rir.
- (C) Ele chorou todo o dia após receber a notícia trágica.
- (D) Todo trabalho ficou manchado do vinho derramado.
- (E) Toda tristeza deve ser afastada de nossa vida.

8

Assinale a frase em que houve emprego correto do pronome LHE.

- (A) “Se você de fato leva a sério a preparação de seu filho para o futuro, não lhe ensine a subtrair – ensine a deduzir”.
- (B) “Os que são incapazes de recordar o passado são condenados a repetir-lhe”.
- (C) “Se você conta os anos, o tempo parecer-lhe-á breve”.
- (D) “Lembre-se – quando você achar que tudo está perdido, o futuro ainda lhe aguardará”.
- (E) “A história é um cavalo que galopa atravessando a janela, e você deve decidir se saltará para montar-lhe ou não”.

9

Em todas as frases abaixo ocorre a presença do adjetivo “bom” / “boa” com diferentes sentidos.

Assinale a frase em que há a indicação de um sinônimo **inadequado** para esse adjetivo.

- (A) Uma boa risada é um raio de sol na casa / barulhenta.
- (B) É um prazer navegar com bom tempo / estável.
- (C) Aquele apartamento está sendo vendido por bom preço / barato.
- (D) Acho que esse vestido está bom nela / bem ajustado.
- (E) Aquele aluno tem uma boa letra / legível.

10

O diminutivo em língua portuguesa mostra valores variados. Assinale a frase abaixo em que o diminutivo tem valor afetivo.

- (A) Nesse frio, bom mesmo é um cobertorzinho amigo.
- (B) O governo deseja que a inflação vá embora depressinha.
- (C) O deputado mostrava em seu pulso um reloginho barato.
- (D) Na Europa ocorre agora uma guerrinha suja.
- (E) A mobília da boneca tinha apenas duas cadeirinhas.

Raciocínio Lógico Matemático

11

Uma distribuidora de produtos químicos recebeu 1600 litros de certo composto e deve distribuir toda essa quantidade entre 5 laboratórios em partes proporcionais aos números 3, 4, 5, 6 e 7.

O laboratório que receber a menor quantidade receberá

- (A) 190 litros.
- (B) 192 litros.
- (C) 194 litros.
- (D) 196 litros.
- (E) 198 litros.

12

Flávio é engenheiro e seu salário é constituído de duas partes: 60% do valor bruto referem-se ao trabalho de escritório e 40%, pelas visitas às obras.

Flávio foi promovido; com isso, a parte do seu salário referente a visitas às obras teve aumento de 100%, mas a outra parte permaneceu igual.

Sobre o novo salário, a parte relativa ao trabalho de escritório representa, aproximadamente,

- (A) 37%.
- (B) 39%.
- (C) 41%.
- (D) 43%.
- (E) 45%.

13

Milton, Nei e Otávio são técnicos e trabalham no interior do estado da Paraíba. Neste ano de 2022, os três fizeram cursos de aperfeiçoamento no Centro de Treinamento (CT) em João Pessoa. Considere as informações:

- Milton chegou no CT em 27 de abril e permaneceu lá por 40 dias.
- Nei chegou no CT em 03 de maio e permaneceu lá por 37 dias.
- Otávio chegou no CT em 25 de abril e permaneceu lá por 36 dias.

Nas informações acima, o dia de chegada e o dia da partida são considerados como dias de permanência no CT.

O número de dias que Milton, Nei e Otávio estiveram juntos no CT foi

- (A) 27.
- (B) 28.
- (C) 29.
- (D) 30.
- (E) 31.

14

Miguel, Artur e Heitor possuem idades diferentes e nasceram em cidades diferentes; um nasceu em Patos, outro em Cabedelo e outro em Santa Rita.

As três afirmações seguintes sobre eles são verdadeiras:

- Miguel é mais velho que o cabedelense.
- Artur nasceu em Patos.
- Heitor não é o mais novo.

É correto concluir que

- (A) Miguel é mais novo que Artur.
- (B) Heitor nasceu em Santa Rita.
- (C) o santa-ritense é o mais velho.
- (D) o cabedelense é mais velho que Miguel.
- (E) Artur é mais velho que o patoense.

15

Carlos considera que um número é *agradável* quando a soma dos seus algarismos é 7 ou múltiplo de 7. Por exemplo, o ano de 2005 foi agradável pois $2 + 0 + 0 + 5 = 7$, e o de 2039 será também, pois $2 + 0 + 3 + 9 = 14$.

Por esse critério, o número de anos agradáveis do século XX foi igual a

- (A) 7.
- (B) 10.
- (C) 11.
- (D) 13.
- (E) 14.

16

O valor da expressão numérica

$$\frac{2^{2022} - 2^{2021} - 2^{2020} + 2^{2019}}{2^{2020} - 2^{2019}}$$

é

- (A) 5.
- (B) 4.
- (C) 3.
- (D) 2.
- (E) 1.

17

Um número inteiro positivo é chamado de “quadrado perfeito” quando ele é o quadrado de um número inteiro positivo. Por exemplo, 16 é um quadrado perfeito pois é igual a 4^2 .

O número de quadrados perfeitos maiores do que 100 e menores do que 2023 é

- (A) 28.
- (B) 34.
- (C) 42.
- (D) 44.
- (E) 48.

18

Sobre 4 grandezas X, Y, Z e W sabe-se que:

- A razão de W para X é 4:3
- A razão de Y para Z é 3:2
- A razão de Z para X é 1:6

A razão de X+Y para Z+W é

- (A) 5:6
- (B) 4:7
- (C) 3:5
- (D) 6:11
- (E) 8:11

19

A soma de 2 números naturais é 22253. Um dos números é divisível por 10 e se retirarmos o algarismo das unidades desse número obtém-se o outro número.

A diferença entre o maior e o menor número é

- (A) 13222.
- (B) 14644.
- (C) 15876.
- (D) 17732.
- (E) 18207.

20

Considere como verdadeiras as seguintes sentenças:

- Se Gerson não é torcedor do Botafogo, então Luiz é torcedor do Treze.
- Se Luiz é torcedor do Treze, então Débora não é torcedora do Campinense.
- Se Débora não é torcedora do Campinense, então Lúcia é torcedora do Botafogo.
- Lúcia não é torcedora do Botafogo.

É correto concluir que

- (A) Luiz é torcedor do Treze.
- (B) Gerson é torcedor do Botafogo.
- (C) Luiz não é torcedor do Botafogo.
- (D) Débora é torcedora do Campinense.
- (E) Lúcia é torcedora do Treze.

Atualidades

21

É um romance brasileiro de 2019 escrito pelo autor baiano Itamar Vieira Junior. Conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. O romance foi originalmente publicado em Portugal, pela editora Leya, após vencer o prêmio de mesmo nome. No Brasil, é publicado pela editora Todavia. Além do Prêmio Leya, venceu também importantes competições como o Prêmio Jabuti 2020 e o Prêmio Oceanos 2020.

(adap. wikipedia)

O texto refere-se ao romance

- (A) Torto Arado.
- (B) Baixo Esplendor.
- (C) Tudo é Rio.
- (D) Vista Chinesa.
- (E) Anos de Chumbo e Outros Contos.

22

Conceito, surgido a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, que visa à diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam diversos problemas ambientais associados às mudanças climáticas. Eles fazem parte de um mecanismo de flexibilização que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão de gases poluentes a alcançá-las.

A cada tonelada não emitida, gera-se um crédito. Assim, quando um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis para serem comercializados com os países que não alcançaram suas metas.


A geração do crédito é realizada à medida que os países esforçam-se em projetos e ações que visam ao desenvolvimento sustentável, evitando, assim, o aumento do efeito estufa. Exemplos desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso de fontes de energia alternativas, entre outros.

(mundoeducacao.uol.com.br. Adaptado)

O texto refere-se aos créditos de

- (A) Hidrogênio.
- (B) Oxigênio.
- (C) Carbono.
- (D) Enxofre.
- (E) Silício.

23



O mundo tem acompanhado o que acontece com a inflação nos Estados Unidos da América. Recentemente, a inflação por lá saiu de um platô de cerca de 2% ao ano e atualmente gira em torno de 8 a 9%. Na zona do euro, vemos acontecer fenômeno similar. Economias emergentes também sentem os efeitos negativos de uma inflação mais alta.

Avalie se, entre as causas do aumento recente da inflação nos EUA, podem ser citados:

- I. O movimento de alta nas taxas de juros.
- II. Os incentivos econômicos concedidos aos americanos (pessoas e empresas) durante a pandemia do coronavírus.
- III. As paralisações nas cadeias produtivas por conta dos surtos de Covid.
- IV. A invasão da Ucrânia pela Rússia.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

24



Grande artista brasileira, Gal Costa nos deixou neste mês de novembro de 2022. Artista única, de voz afinadíssima, transitou sempre por diversos movimentos artísticos da música popular brasileira. Seu nome, entretanto, estará para sempre associado, fundamentalmente, ao seguinte movimento:

- (A) Bossa Nova.
- (B) Jovem Guarda.
- (C) BRock.
- (D) Tropicalismo.
- (E) Mangue Beat.

25

Recentemente, algumas nações europeias foram sacudidas por crises políticas que afetaram vivamente seus Paramentos. Um caso particularmente importante é o do Reino Unido, onde sucessivas crises sacudiram o Parlamento após a saída da União Europeia, no episódio conhecido como *brexit*.

Em relação ao tema, avalie se as descrições a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- I. A Primeira-Ministra Theresa May, do Partido Trabalhista, esteve à frente do governo por ocasião das intensas negociações com a União Europeia que culminaram no *brexit*. Vitoriosa no *brexit*, deixou o cargo de Primeira-Ministra pouco depois, dando por encerrada sua exitosa gestão.
- II. O poderoso Primeiro-Ministro Boris Johnson, do Partido Conservador, sucedeu Theresa May. No cargo, Johnson tentou desfazer o *brexit*. Com isso, administrou crise após crise até ser acusado de comportamento inadequado em dois episódios: no primeiro, foi acusado de promover uma festa na residência oficial e escritório do Primeiro-Ministro, bem no auge da pandemia; um segundo episódio, no qual promoveu a vice-chefe da bancada do governo no parlamento uma pessoa acusada reiteradas vezes de assédio sexual, causou a renúncia de vários ministros e acabou por levar à renúncia de Johnson, em 2021.
- III. Johnson foi sucedido por Liz Truss, que serviu como Primeira-Ministra do Reino Unido por cerca de seis meses, sem entretanto ocupar o cargo de líder do Partido Conservador nesse período. Caiu por conta de uma desastrosa política econômica, agravada pelos efeitos da pandemia e da guerra Rússia-Ucrânia.

As descrições são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – V.

Legislação Básica

26

Joana, servidora pública federal, ocupante de cargo de provimento efetivo há uma década, almejava obter licença para resolver um grave problema particular, afeto à administração de uma empresa deixada por seu falecido pai.

Ao se inteirar sobre a existência de licença dessa natureza no âmbito da Lei nº 8.112/1990, foi-lhe corretamente informado que

- (A) em razão da prevalência do interesse público sobre o privado, a lei não prevê licença dessa natureza.
- (B) a licença alvitrada pode ser deferida pelo prazo máximo de dois anos, sendo que Joana somente receberia sua remuneração no primeiro ano.
- (C) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem remuneração, não podendo ter a sua duração reduzida ou cessada por decisão superveniente.
- (D) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a pedido de Joana ou no interesse do serviço.
- (E) a licença alvitrada pode ser deferida por até um ano, sem prejuízo da remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a pedido de Joana ou no interesse do serviço.

27

Determinado órgão de segurança pública almejava realizar o tratamento dos dados pessoais de diversos indivíduos, sendo que todos eram pessoas naturais, para um objetivo estritamente relacionado às suas atividades finalísticas.

Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a organização não governamental “amigos da privacidade” consultou o seu advogado a respeito de sua compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo corretamente esclarecido que

- (A) a LGPD não é aplicada à referida espécie de tratamento, que deve ser regida por legislação específica.
- (B) a LGPD autoriza expressamente essa espécie de tratamento, que pode ser livremente realizado por órgão público ou por pessoa jurídica de direito privado.
- (C) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, salvo se houver prévia e expressa autorização do titular dos dados pessoais.
- (D) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, ressalvada, apenas, a possibilidade de ponderação, no caso concreto, à luz dos interesses envolvidos;
- (E) a LGPD somente permite o arquivamento dos dados pessoais, não o tratamento almejado pelo órgão de segurança pública, sem o consentimento do titular dos dados.

28

Igor, servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo, encontrava-se em débito com o erário. Apesar disso, ao fim de processo administrativo disciplinar, no qual lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, a autoridade competente decidiu demiti-lo, mas foi informada por um assessor a respeito do referido débito.

À luz dessa narrativa e considerando os balizamentos estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que a autoridade competente

- (A) não pode demitir João, que será posto em disponibilidade até a quitação do débito.
- (B) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa.
- (C) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de sofrer a penhora de seus vencimentos.
- (D) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de sofrer o arresto de seus vencimentos.
- (E) não pode demitir João, que permanecerá exercendo suas funções até quitar o débito existente, mediante desconto mensal não superior a 10% dos seus vencimentos.

29

Maria forneceu os seus dados pessoais para usufruir determinado benefício assistencial ofertado pelo Estado Alfa. Considerando que Maria figurava como parte interessada em um processo administrativo no qual certo órgão da Administração Pública lhe aplicara a sanção de multa, um servidor constatou que as referidas informações poderiam ser utilizadas, neste último processo, para demonstrar que Maria não tinha razão em suas alegações.

À luz da sistemática estabelecida pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), é correto afirmar que

- (A) é vedado que órgão da Administração Pública, enquanto controlador dos dados pessoais, os utilize para qualquer outro fim que não aquele indicado pelo titular.
- (B) o princípio da universalidade das provas, contemplado na LGPD, autoriza a utilização dos dados pessoais de Maria para os fins pretendidos pelo servidor.
- (C) como os dados pessoais foram apresentados por Maria, para o exercício regular de um direito, não poderiam ser utilizados em seu prejuízo.
- (D) a Administração Pública, sempre que figure como operadora dos dados pessoais, pode utilizá-los da forma que melhor lhe aprouver.
- (E) a LGPD autoriza a utilização dos dados fornecidos por Maria caso o bem jurídico a ser tutelado seja de interesse público.

30

João, servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo, sofreu grave acidente quando se encontrava no exercício de suas funções regulares. Em razão da limitação que sofreu em sua capacidade física, conforme verificado em inspeção médica, viu-se impossibilitado de voltar a exercer a função anterior.

Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que João deve ser

- (A) necessariamente aposentado.
- (B) necessariamente exonerado.
- (C) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, caso não haja cargo vago, atuará como excedente, até a ocorrência da vaga.
- (D) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, caso não haja cargo vago, posto em disponibilidade, até a ocorrência de vaga.
- (E) transferido para cargo diverso, de carreira distinta, de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos.

Conhecimentos Específicos

31

O sistema límbico é um grupo de estruturas que se localiza na junção dos hemisférios cerebrais e o diencefalo. Tais estruturas estão relacionadas ao processamento emocional e da memória e vem sido implicadas na fisiopatologia de diversos transtornos psiquiátricos.

Fazem parte do sistema límbico as seguintes estruturas:

- (A) hipocampo, giro do cíngulo, hipotálamo e amígdala.
- (B) hipocampo, giro parahipocampal, globo pálido e ponte.
- (C) mesencéfalo, amígdala, globo pálido e núcleo caudado.
- (D) amígdala, tálamo, núcleo caudado, bulbo e putâmen.
- (E) núcleo caudado, putâmen, globo pálido, cápsula interna e tálamo.

32

A Síndrome de Korsakoff ocorre como consequência do alcoolismo crônico; os principais sintomas apresentados por pacientes com esta síndrome são as amnésias anterógradas e retrógradas, associadas comumente à confabulação.

Na síndrome de Korsakoff, ocorre a degeneração das seguintes estruturas cerebrais:

- (A) hipocampo e amígdala.
- (B) núcleo lentiforme e mesencéfalo.
- (C) corpos mamilares e núcleos anteriores do tálamo.
- (D) córtex parietal e occipital.
- (E) sistema reticular ativador ascendente e mesencéfalo.

33

As sequelas físicas e psicológicas de um traumatismo cranioencefálico (TCE) podem ser devastadoras para um indivíduo. As manifestações psiquiátricas que sucedem um TCE podem tanto ser leves e quase imperceptíveis, quanto apresentar alterações cognitivas e comportamentais graves que impactam diretamente na funcionalidade.

Sobre as sequelas psiquiátricas dos TCE, é correto afirmar que

- (A) limitam-se às alterações cognitivas e de humor.
- (B) as alterações de personalidade constituem a manifestação psiquiátrica mais comum.
- (C) os transtornos do humor, quando presentes, influenciam nas características clínicas, resposta ao tratamento e prognóstico do trauma.
- (D) as sequelas cognitivas permanentes já podem ser observadas nas primeiras semanas pós TCE.
- (E) os transtornos do sono e a psicose não são comuns nos pacientes pós TCE e a presença dessas manifestações indica outros diagnósticos.

34

Entre os psicofármacos abaixo, assinale aquele com maior potencial teratogênico e que deve ser evitado no período gestacional.

- (A) haloperidol.
- (B) ácido valpróico.
- (C) nortriptilina.
- (D) sertralina.
- (E) lítio.

35

A eletroconvulsoterapia (ECT) é um procedimento usado há muitas décadas no contexto dos transtornos mentais e consiste na indução de uma convulsão generalizada, de duração limitada, através da passagem de corrente elétrica pelo cérebro.

Sobre a ECT, é correto afirmar que

- (A) seu uso deve ser evitado em idosos, pelos riscos de alterações cognitivas.
- (B) podem causar sérios danos ao feto e, portanto, deve ser evitada no período gestacional, ao menos que os benefícios do tratamento superem em muito os riscos.
- (C) o mecanismo de ação da ECT hoje é bem conhecido e baseia-se na liberação simultânea de serotonina e noradrenalina no cérebro.
- (D) a necessidade de rápida resposta ao tratamento e o histórico de intolerância ou resistência prévia ao tratamento medicamentoso estão entre as principais indicações da ECT.
- (E) o número de sessões de ECT é fixo e pré-determinado para cada indicação de tratamento.

36

A depressão é um transtorno prevalente na população mundial que causa grande impacto na saúde física e mental, bem como na qualidade de vida dos pacientes que dela padecem. A Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstrou que a depressão é uma das principais causas de *anos vividos com incapacidade*, além de se tratar de importante causa de absenteísmo e presenteísmo no trabalho.

Sobre os transtornos depressivos, é correto afirmar que

- (A) entre os critérios diagnósticos de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª edição (DSM-V), o paciente necessita apresentar ao menos três critérios de igual importância entre: humor deprimido, perda de energia, baixa autoestima, dificuldade de concentração, alterações do apetite e insônia.
- (B) reatividade aumentada do humor a eventos positivos, aumento do apetite, hipersonia e paralisia plúmbea são algumas das características que determinam a depressão atípica.
- (C) para o diagnóstico de transtorno depressivo persistente, ou distímia, o paciente adulto precisa apresentar sintomas de forma ininterrupta por pelo menos um ano.
- (D) sintomas psicóticos, ausência de humor deprimido e predomínio de ansiedade são características que não apoiam o diagnóstico de depressão.
- (E) idade de início do quadro, história de depressão pós-parto, história familiar e sintomas psicóticos são características semelhantes entre a depressão uni e bipolar e, dessa forma, não contribuem para diferenciar estas duas etiologias.

37

Paciente do sexo masculino, 28 anos de idade, é trazido ao serviço de psiquiatria pela sua família; a família refere que, há cerca de 2 semanas, o paciente iniciou quadro de agitação psicomotora, deixou de comparecer ao trabalho, apresentou discurso místico em que alegava que era uma divindade e podia se comunicar por meio de ondas de rádio e reduziu progressivamente as horas de sono, a ponto de não dormir mais nas últimas noites. O paciente foi levado ao serviço de emergência psiquiátrica da região há cerca de 5 dias e foi medicado com haloperidol. No momento da consulta apresenta significativa melhoras dos referidos sintomas.

O caso representa uma situação comumente vivenciada pelo médico psiquiatra e duas grandes hipóteses diagnósticas são levantadas.

Sobre a diferenciação entre um quadro de Esquizofrenia ou de Transtorno Bipolar do Tipo I, é correto afirmar que

- (A) a presença de alucinações auditivas permite diferenciar as duas condições.
- (B) o quadro de redução do sono é visto no Transtorno Bipolar e não costuma ocorrer na crise da Esquizofrenia.
- (C) a boa resposta aos antipsicóticos na fase aguda permite diferenciar as duas condições.
- (D) o diagnóstico diferencial raramente é possível durante a crise psicótica, mas a evolução do nível de funcionamento ao longo do tempo permitirá a diferenciação.
- (E) a ocorrência de episódios depressivos permitirá a diferenciação.

38

Segundo as diretrizes de tratamento de um episódio depressivo na vigência do Transtorno Bipolar pode-se afirmar que

- (A) a quetiapina é considerada droga de primeira linha tanto no tratamento da fase aguda quanto na manutenção.
- (B) a carbamazepina é uma das drogas de escolha na fase aguda.
- (C) o lítio é considerado primeira linha de tratamento de manutenção, porém não de fase aguda.
- (D) a eletroconvulsoterapia apresenta evidência de eficácia somente na mania e não no tratamento da depressão.
- (E) a lurasidona tem melhor evidência no tratamento da mania / hipomania do que no tratamento da depressão.

39

Sobre as características epidemiológicas, fatores de risco e curso do Transtorno do Humor Bipolar (THB), é correto afirmar que

- (A) estado civil casado e renda familiar baixa são fatores de risco ambientais para o THB.
- (B) história familiar de transtorno bipolar configura um dos mais fortes e consistentes fatores de risco.
- (C) o risco de suicídio costuma ser 2 vezes maior do que na população geral.
- (D) a média de idade do primeiro episódio maniaco ou hipomaniaco é antes dos 15 anos.
- (E) a presença ou não de psicose pouco influencia na probabilidade de recorrência de episódios maniacos ou na recuperação dos sintomas.

40

A opção de primeira linha para o tratamento do episódio maniaco na fase aguda é

- (A) ziprasidona.
- (B) valproato de sódio.
- (C) lamotrigina.
- (D) carbamazepina.
- (E) lurasidona.

41

Os transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente no comportamento relacionado à alimentação que compromete a saúde física ou o funcionamento psicossocial.

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5), faz parte dos critérios diagnósticos do Transtorno de Compulsão Alimentar a

- (A) ingestão de pequenas quantidades de alimentos muitas vezes durante o dia, especialmente em situações de estresse ou ansiedade.
- (B) sensação contínua de fome, que leva à ingesta de alimentos ao longo de todo o dia.
- (C) ingestão de grandes quantidades de comida em um curto período de tempo (em geral cerca de 2 horas).
- (D) perda da capacidade de saciedade e da sensação de desconforto ao ingerir grandes quantidades de alimentos.
- (E) realização de mecanismo compensatório à ingesta de grande quantidade de alimentos.

42

Entre os transtornos alimentares, a Anorexia Nervosa configura o mais grave transtorno, e com pior prognóstico. Sobre a Anorexia Nervosa é correto afirmar que

- (A) caracteriza-se pela intensa restrição alimentar, portanto não ocorrem momentos de compulsão ou purgação compensatória.
- (B) a caracterização da gravidade do quadro é feita pela quantificação da ingesta calórica diária.
- (C) embora classicamente relacionada como um transtorno do sexo feminino, a prevalência entre os sexos feminino e masculino é semelhante.
- (D) além da restrição calórica, o peso corporal significativamente baixo como consequência desta restrição é necessário para o diagnóstico.
- (E) medo intenso de ganhar peso e a perturbação no modo como o próprio peso ou corpo são vivenciados não são características necessárias para o diagnóstico.

43

Os agentes antipsicóticos são comumente prescritos para o tratamento da esquizofrenia, como também para o tratamento da mania bipolar. Esses agentes são classificados em dois grupos, os antipsicóticos típicos, ou de primeira geração, e os antipsicóticos atípicos, ou de segunda geração.

A característica farmacológica dos agentes antipsicóticos típicos é

- (A) sua ação anti-histamínica.
- (B) sua ação anticolinérgica.
- (C) o bloqueio de receptores D1.
- (D) antagonismo de receptores 5HT2A.
- (E) o bloqueio de receptores D2.

44

Um efeito colateral temido e de difícil manejo no tratamento com antipsicóticos é a discinesia tardia.

Sobre esse efeito adverso, é correto afirmar que

- (A) os pacientes que apresentam sintomas extrapiramidais no início do tratamento têm probabilidade duas vezes maior de apresentar discinesia tardia.
- (B) ocorre por ação do bloqueio dopaminérgico na via mesocortical.
- (C) é reversível, uma vez interrompido o uso do agente antipsicótico causador.
- (D) cerca de 50% dos pacientes tratados com antipsicóticos estão sujeitos a desenvolver discinesia tardia todos os anos.
- (E) o risco de desenvolver discinesia tardia após 15 anos de tratamento com antipsicóticos típicos é semelhante ao do início do tratamento.

45

A quetiapina é um agente antipsicótico atípico que apresenta diferentes propriedades farmacológicas, dependendo da dose e da formulação utilizadas.

Sobre esses diferentes efeitos da quetiapina, é correto afirmar que

- (A) a formulação de liberação prolongada é ideal para o efeito indutor do sono.
- (B) apresenta ação antidepressiva já em doses baixas de 25mg a 50mg por dia.
- (C) a formulação de liberação prolongada é ideal para o efeito antipsicótico em doses altas, pois mantém a ocupação necessária dos receptores D2 por mais tempo.
- (D) a ação antidepressiva se mostra efetiva apenas para casos de depressão bipolar.
- (E) sua ação como antipsicótico atípico é mantida até doses de 300mg, passando a apresentar a mesma incidência de sintomas extrapiramidais que os antipsicóticos típicos em doses mais altas.

46

A lamotrigina é um fármaco anticonvulsivante que se mostrou eficaz no tratamento do Transtorno Bipolar.

Sobre o manejo desta droga, é correto afirmar que

- (A) tem maior eficácia no tratamento da mania ou hipomania bipolar do que na depressão bipolar.
- (B) em geral é bem tolerada, a não ser pelo raro risco de síndrome de Stevens-Johnson, que pode ser mitigado pelo aumento lento e progressivo da dose.
- (C) seu efeito antidepressivo se dá pela ação excitatória glutamatérgica.
- (D) possui perfil de interação medicamentosa semelhante à carbamazepina, sendo necessária cautela na administração com antipsicóticos.
- (E) apresenta mecanismo de ação semelhante ao lítio como estabilizador do humor.

47

As opções a seguir apresentam parâmetros laboratoriais que costumam figurar na investigação de potenciais causas de demências reversíveis, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Vitamina B12.
- (B) Homocisteína.
- (C) V.D.R.L..
- (D) TSH.
- (E) Triglicerídeos.

48

Sobre a disfunção sexual em pacientes que fazem tratamento com antidepressivos é **incorreto** afirmar que

- (A) apenas uma pequena parcela dos pacientes relata espontaneamente esse efeito adverso e, portanto, é preciso perguntar ativamente.
- (B) o risco de desenvolver disfunção sexual é maior em pacientes com doenças crônicas concomitantes, como diabetes mellitus, ou doença cardiovascular.
- (C) a bupropiona e a agomelatina estão entre os antidepressivos de menor risco de disfunção sexual.
- (D) a disfunção sexual como efeito colateral do tratamento antidepressivo pode ser avaliada mesmo na presença de sintomas depressivos residuais ou na resposta parcial ao tratamento.
- (E) o risco de desenvolver disfunção sexual é maior em pacientes tabagistas e acima dos 50 anos de idade.

49

O diagnóstico psicopatológico baseia-se no perfil de sinais e sintomas observados durante a entrevista psiquiátrica e relato pelo paciente na descrição da sua história.

Em relação ao exame psíquico, assinale a opção que apresenta a correta correlação entre o termo psicopatológico e o que ele representa.

- (A) Hipoprosexia é a incapacidade total ou parcial de obter prazer com determinadas atividades ou experiências, antes prazerosas ao indivíduo.
- (B) Alucinação é a incapacidade do indivíduo de reconhecer sua própria doença ou déficit.
- (C) Confabulação é a produção involuntária de um relato ou narrativa incongruente com a história passada do indivíduo ou com a sua verdadeira situação presente.
- (D) Anosognosia é a percepção clara e definida de uma imagem, sem a presença de um estímulo visual real.
- (E) Anedonia é a perda básica da capacidade de concentração, com fatigabilidade aumentada e dificuldade com atividades psíquicas complexas.

50

Assinale a opção que indica o transtorno que costuma cursar com alucinações visuais na quase totalidade dos casos.

- (A) Esquizofrenia.
- (B) Transtorno de personalidade *borderline*.
- (C) Demência de Alzheimer
- (D) Síndrome de Charles Bonnet.
- (E) Atrofia cortical posterior.

51

A avaliação do pensamento constitui um dos aspectos mais importantes da entrevista psiquiátrica, pois pode revelar características típicas de muitos transtornos e fornecer importantes pistas para o diagnóstico.

Sobre as alterações de pensamento, assinale a afirmativa correta.

- (A) Fuga de ideias, aceleração do pensamento e bloqueio do pensamento são alterações do curso do pensamento.
- (B) Desagregação do pensamento ocorre quando há um afrouxamento leve dos nexos associativos, mantendo ainda uma concatenação lógica entre as ideias.
- (C) Roubo do pensamento ocorre quando percebemos um bloqueio no discurso de um indivíduo, que no meio de uma conversa interrompe brusca e repentinamente seu discurso sem motivo aparente.
- (D) Ideias persecutórias ou de poder ou místicas constituem alterações da forma do pensamento.
- (E) Descarrilhamento do pensamento é uma vivência na qual o indivíduo tem nítida sensação de que seu pensamento foi roubado de sua mente.

52

Assinale a opção que apresenta a correta associação entre uma característica psicopatológica e um transtorno mental no qual ela tipicamente ocorre.

- (A) Delírio de ruína e mania bipolar.
- (B) Desagregação do pensamento e depressão maior.
- (C) Alucinações auditivas e *delirium tremens*.
- (D) Estereotípias e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
- (E) Roubo do pensamento e esquizofrenia.

53

Segundo a Classificação Internacional de doenças e problemas relacionados à saúde (CID) e o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-5), os transtornos de personalidade são definidos por

- (A) surgir desde o início da infância e podem apresentar curso flutuante.
- (B) envolver diversos aspectos da vida e da experiência do indivíduo.
- (C) comportamento tanto adaptativo quanto mal adaptativo em relação às expectativas sociais e culturais do indivíduo.
- (D) não afetarem o funcionamento do indivíduo.
- (E) decorrerem de lesões cerebrais ou uso de substâncias.

54

Ao avaliarmos um paciente que apresentou tentativa de suicídio ou comportamento autolesivo na emergência, é fundamental verificar quais os fatores de risco que este indivíduo apresenta de uma nova tentativa de suicídio. A verificação destes fatores poderá determinar o curso do tratamento do paciente e a necessidade de internação em unidade especializada para vigilância.

Entre os fatores de alto risco para uma nova tentativa de suicídio está

- (A) o ato impulsivo sem planejamento.
- (B) a presença de rede de apoio.
- (C) a declaração de intenção futura de nova tentativa de suicídio.
- (D) a ausência de doença atual ou histórico de doença psiquiátrica.
- (E) o estado civil casado.

55

Sobre o comportamento autolesivo e a ideação suicida é correto afirmar que

- (A) a taxa de ideações suicidas durante a pandemia de COVID foi semelhante à relatada em estudos na população geral antes da pandemia.
- (B) a média de idade na qual o comportamento autolesivo se inicia é de 18 anos e este comportamento não está associado ao maior risco de suicídio.
- (C) deve-se ter cautela ao abordar um paciente com comportamento autolesivo ou ideação suicida, pois abordar o assunto pode ser um gatilho para novas tentativas.
- (D) terapia dialética e terapia cognitivo comportamental constituem as terapias de maior evidência científica de prevenção ao suicídio e comportamento autolesivo.
- (E) mais da metade dos adolescentes ou jovens que apresentam ideação suicida solicitam ajuda a um profissional de saúde.

56

Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições que se manifestam tipicamente antes da criança ingressar na escola e geram déficits sociais, acadêmicos e até mesmo de funcionamento pessoal.

Sobre os transtornos do desenvolvimento intelectual é correto afirmar que

- (A) a prevalência de deficiência intelectual é significativamente menor que a prevalência do Transtorno do Espectro Autista.
- (B) crianças com deficiência intelectual apresentam déficits na aquisição de conhecimento acadêmico, porém não costumam apresentar déficits adaptativos em outras áreas da vida diária até atingir a fase adulta.
- (C) a avaliação neuropsicológica é essencial para o diagnóstico de deficiência intelectual e um quociente de inteligência (QI) abaixo de 100 confirma deste diagnóstico.
- (D) por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, crianças com deficiência intelectual não necessitam de investigação de causas etiológicas, pois esta condição raramente está associada a outras doenças.
- (E) a deficiência intelectual leve pode passar despercebida na fase pré-escolar e as dificuldades de aprendizado nos primeiros anos da escola são comumente confundidas com outros transtornos do aprendizado.

57

Assinale a opção que apresenta a característica essencial para o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista.

- (A) Padrões restritos e repetitivos de comportamento.
- (B) Seletividade alimentar.
- (C) Incômodo com o contato físico humano.
- (D) Déficits de linguagem oral.
- (E) Redução na capacidade de empatia.

58

Sobre as características do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), é correto afirmar que

- (A) a ausência de hiperatividade, especialmente em crianças fala contra o diagnóstico de TDAH.
- (B) a ocorrência de desatenção restrita às atividades acadêmicas, como fazer o dever de casa, por exemplo, é característica do diagnóstico.
- (C) a prevalência do TDAH é semelhante entre os gêneros feminino e masculino.
- (D) entre os diagnósticos diferenciais do TDAH estão os transtornos do aprendizado, o Transtorno do Espectro Autista e quadros depressivo-ansiosos na infância.
- (E) embora seja mais comum na infância, o TDAH pode se iniciar em algum momento da idade adulta.

59

Assinale o transtorno que representa o principal diagnóstico diferencial do Transtorno da Comunicação Social.

- (A) Fobia social.
- (B) Transtorno do Espectro Autista.
- (C) Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade.
- (D) Transtorno da Fluência com início na infância.
- (E) Mutismo seletivo.

60

Sobre o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é correto afirmar que

- (A) os sintomas de humor comórbidos ao TDAH, como depressão ou ansiedade, não necessitam de tratamento diferenciado, pois se resolvem com o tratamento direcionado ao TDAH.
- (B) por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, não há necessidade de tratar crianças com sintomas de TDAH, uma vez que a maturidade cerebral resultará na resolução dos sintomas na maioria dos casos.
- (C) o tratamento do TDAH baseia-se em medicamentos que aumentam a disponibilidade geral de dopamina no cérebro, como o metilfenidato, a bupropiona e a buspirona.
- (D) o uso das anfetaminas é seguro mesmo em altas doses e possuem baixo risco de adição.
- (E) o mecanismo de ação do metilfenidato inclui o aumento da liberação de dopamina no núcleo accumbens e de noradrenalina e dopamina no córtex pré-frontal.

61

Assinale a opção que indica uma interação medicamentosa que aumenta consideravelmente o risco de evento adverso grave e potencialmente fatal.

- (A) Ácido valpróico e escitalopram.
- (B) Escitalopram e bupropiona.
- (C) Ácido valpróico e lamotrigina.
- (D) Olanzapina e fluoxetina.
- (E) Lamotrigina e olanzapina.

62

Muitos pacientes com transtorno de humor, ou ansiedade referem sintomas de “pânico”. Estes sintomas, entretanto, são frequentemente confundidos pelos pacientes como medos, angustias e preocupações que podem tanto ser comuns, como fazer parte de outros transtornos de humor ou transtornos ansiosos.

As opções a seguir apresentam critérios diagnósticos para Transtorno do Pânico, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Ocorrência frequente de episódios de taquicardia, sudorese, tremores ou sensação de falta de ar ou sufocamento.
- (B) Preocupação persistente de novos episódios de pânico ou suas consequências.
- (C) Ocorrência de episódios breves de desrealização, parestesias, medo de morrer ou perder o controle e dor ou desconforto torácico.
- (D) Medo de sair de casa desacompanhado e, em caso de exposição, sensação de desconforto durante todo o período de exposição.
- (E) Mudança desadaptativa significativa no comportamento do indivíduo para se esquivar das situações que possam provocar ataques de pânico.

63

Em relação às características clínicas, curso da doença e subtipos do Transtorno de Pânico é correto afirmar que

- (A) ataques de pânico noturnos ocorrem em mais da metade dos pacientes com Transtorno de Pânico e surgem na fase do sono não-REM.
- (B) o curso clínico do Transtorno de Pânico é frequentemente autolimitado, resolvendo-se com o tratamento adequado.
- (C) por ser um transtorno amplamente conhecido e divulgado, é facilmente reconhecido e a maioria dos pacientes busca tratamento especializado psiquiátrico no início do quadro.
- (D) as comorbidades psiquiátricas são comuns em pacientes com Transtorno de Pânico, sendo a principal delas a Esquizofrenia.
- (E) sensibilidade exacerbada ao oxigênio caracteriza o subtipo respiratório, que costuma apresentar melhor prognóstico.

64

Assinale a opção que indica as medicações que têm maior nível de evidência para o tratamento do Transtorno do Pânico, sendo consideradas tratamentos de primeira linha.

- (A) Alprazolam, clonazepam e buspirona.
- (B) Propranolol, quetiapina e fluoxetina.
- (C) Fluoxetina, paroxetina e sertralina.
- (D) Bupropiona, escitalopram e mirtazapina.
- (E) Fluoxetina, alprazolam e risperidona.

65

A neuromodulação se apresenta como opção terapêutica cada vez mais frequente para os transtornos mentais, em particular aqueles com má resposta ao tratamento farmacológico. O motivo para o uso crescente da neuromodulação em psiquiatria é a evidência de alterações funcionais e conectivas entre regiões cerebrais, as quais a neuromodulação poderia, teoricamente, reverter.

Sobre os aspectos neurobiológicos do Transtorno de Pânico e da aplicação da neuromodulação, é correto afirmar que

- (A) Estudos de neuroimagem demonstraram disfunções entre o hipocampo e a amígdala no Transtorno do Pânico, indicando essas regiões como alvos para estimulação magnética transcraniana.
- (B) Anormalidades na conexão entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico ocasionam desinibição de circuitos da amígdala, de modo a propiciar os ataques de pânico.
- (C) Estudos com estimulação magnética transcraniana obtiveram resultados positivos com a estimulação de alta frequência sobre a amígdala.
- (D) A estimulação de baixa frequência sobre o córtex pré-frontal tem função ativadora sobre esta região, com resultados robustos em pacientes com ataques de pânico.
- (E) Está aprovado atualmente no Brasil o tratamento com estimulação magnética transcraniana em pacientes com Transtorno de Pânico refratários ao tratamento farmacológico convencional.

66

Assinale a opção que apresenta informações corretas sobre o mecanismo de ação, segurança ou indicações da estimulação magnética transcraniana (EMT) em Psiquiatria.

- (A) Uma das principais características da EMT é que ela atravessa o crânio sem desvio, permitindo uma estimulação ampla e difusa, capaz de atingir grandes profundidades no tecido cerebral.
- (B) Dependendo da frequência de pulso utilizada, podem ocorrer diferentes tipos de modulação do tecido cerebral, sendo que os pulsos em torno de 1Hz têm função estimulatória e os de 5Hz ou mais têm função inibitória cortical.
- (C) Os principais efeitos adversos da EMT são a cefaleia e as alterações cognitivas, em especial a amnésia global transitória, que configura o efeito colateral mais grave da EMT.
- (D) Atualmente, a EMT está aprovada no Brasil para o tratamento dos transtornos ansiosos, do humor e para o tratamento da psicose quando refratários ao tratamento medicamentoso.
- (E) As contraindicações ao uso da EMT incluem a presença de metais, como cliques de aneurismas, implantes cocleares, epilepsia mal controlada ou condições que favoreçam o risco de convulsões.

67

Paciente, 67 anos, sexo masculino, busca atendimento na Psiquiatria por queixas de piora da memória. Refere que tem esquecido cada vez mais de compromissos, nomes de pessoas que conheceu recentemente ou mesmo de recados e informações que lhe passaram há poucas horas. Para seguir trabalhando e administrando suas finanças domésticas tem feito uso frequente de lembretes, alarmes no celular e avisos à sua esposa. Tem histórico de tabagismo e hipertensão arterial bem controlada e possui história familiar positiva para Doença de Alzheimer.

Sobre o manejo deste paciente, está correto afirmar que

- (A) uma vez comprovado o declínio objetivo da memória, está indicado o tratamento com anticolinesterásicos e memantina.
- (B) por se tratar de um quadro inicial, recomenda-se iniciar o tratamento com memantina, que apresenta melhor perfil de tolerabilidade.
- (C) o alto risco de evolução para doença de Alzheimer indica a necessidade de tratamento precoce com anticolinesterásicos.
- (D) mesmo se houver comprovação objetiva de declínio cognitivo amnésico, não está indicado o tratamento com anticolinesterásicos nesse momento.
- (E) o quadro descrito não é sugestivo de declínio cognitivo e não está recomendada investigação neuropsicológica, clínica ou de imagem neste momento.

68

Assinale a opção que indica o achado de neuroimagem sugestivo de Doença de Alzheimer.

- (A) Hipometabolismo em cíngulo posterior.
- (B) Escala MTA (*medial temporal lobe atrophy*) igual a 1.
- (C) Extensa gliose por microangiopatia.
- (D) Atrofia em córtex pré-frontal.
- (E) Baixa captação de dopamina na cintilografia de perfusão.

69

Uma mulher de 63 anos desenvolveu sintomas psicóticos, incluindo delírios e alucinações auditivas, sem causa aparente. Ela disse que alguém queria machucá-la e estava falando sobre ela. Às vezes, ela dizia a seus familiares que ouvia batidas na porta e exibia expressão emocional e avolição diminuídas. Ela precisava do apoio dos familiares para realizar atividades diárias e se comunicar com outras pessoas. Sua qualidade de sono era ruim, mas ela não apresentava distúrbios da consciência. Foi tratada inicialmente com olanzapina e apresentou reversão completa dos sintomas psicóticos, embora tenha apresentado sintomas extrapiramidais significativos. Não havia história familiar ou pretérita de doenças psiquiátricas ou de episódios psicóticos. A ressonância de crânio dessa paciente revelou-se normal, porém o exame do líquido revelou aumento de proteína TAU fosforilada e diminuição da proteína beta amiloide. A genotipagem da APOE revelou alelos e4/e4.

A principal hipótese diagnóstica para este caso é

- (A) esquizofrenia de início tardio.
- (B) demência da Doença de Parkinson.
- (C) doença de Alzheimer.
- (D) demência por corpúsculos de Lewy.
- (E) transtorno do humor bipolar, episódio atual maníaco.

70

Uma mulher de 80 anos apresenta há 1 ano história de perda de memória. Seu parceiro notou que ela vem se repetindo mais do que costumava e esqueceu algumas consultas médicas. Apresentava também alguma dificuldade em encontrar a palavra certa. Nega sintomas depressivos e era capaz de realizar suas atividades da vida diária de forma independente. Seus níveis de vitamina B12, função da tireoidiana e a ressonância magnética de crânio estavam normais. O exame neuropsicológico evidenciou uma pontuação significativamente baixa no teste de nomeação de Boston, falhas de memória episódica no teste das três palavras e três figuras e a pontuação de rastreo cognitivo na avaliação Cognitiva Montreal (*Montreal Cognitive Assessment - MoCA*) foi 26/30, na qual acertou apenas uma das cinco palavras da evocação.

De acordo com o caso apresentado, o diagnóstico mais provável é

- (A) doença de Alzheimer.
- (B) comprometimento cognitivo leve amnésico de múltiplos domínios.
- (C) comprometimento cognitivo leve amnésico de único domínio.
- (D) envelhecimento normal.
- (E) afasia progressiva primária.

Questão Discursiva

Um homem de 52 anos foi trazido pelos filhos ao pronto-socorro com quadro de alucinação visual, ideação persecutória, inquietação e desorientação não flutuante nos últimos 4 dias. O exame físico revelou peso de 45 kg, temperatura de 36,4°C, pressão arterial de 129/84 mmHg e pulso de 100 bpm. Ele apresentava fraqueza em membros inferiores, incapacidade de deambulação, marcha atáxica, suas pupilas eram iguais e redondas, porém a pupila esquerda estava fixa e não apresentava reflexo à luz (pupila direita era reativa à luz). Apresentava ainda paralisia do olhar horizontal esquerdo. Tinha histórico de consumo de álcool nos últimos 25 anos com média diária de consumo de mais de 1 litro de álcool e sua família acreditava que sua ingestão alimentar no último ano havia diminuído significativamente. Os exames laboratoriais estavam normais e a ressonância magnética cerebral mostrou sinal T2 aumentado e difusão restrita nos gânglios basais bilaterais de forma simétrica.

- a) **Apresente sua principal hipótese diagnóstica e qual o tratamento recomendado.**
- b) **Cite ao menos um diagnóstico diferencial que deve ser levado em consideração no quadro acima e qual seria o tratamento recomendado no quadro diferencial.**
- c) **Identifique a principal causa, em nosso meio, para o quadro descrito e qual seria outra possível etiologia.**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Realização

