

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

Saneamento Básico: a Realidade Nua e Crua

O quadro retratado pela PNSB (Pesquisa Nacional de Saneamento Básico) 2000 mostra avanços em relação ao último estudo, realizado em 1989. No entanto, a melhoria das condições do saneamento brasileiro ainda é pequena dada a importância do tema para um país que busca o desenvolvimento. Se compararmos, por exemplo, os avanços relativos à telefonia ou o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil com o progresso feito na área de saneamento, pode-se constatar que os dois primeiros campos tiveram muito mais investimentos e atenção dos agentes públicos e privados. Assim como educação e saúde, os investimentos em saneamento trazem retornos consideráveis para todos os envolvidos. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, a cada R\$ 1,00 investido em saneamento, os municípios economizam R\$ 5,00 em medicina curativa da rede pública.

<http://www.ecoterrabrasil.com.br> - Luiz Antonio Bertussi Filho -
capturado em 25/03/2008

01. A leitura do texto 1 permite concluir que os investimentos, no Brasil:
- têm sido maiores nas áreas de educação e saúde do que no mercado financeiro
 - têm sido menores no mercado financeiro do que os avanços relativos à telefonia
 - têm sido maiores no SUS do que em quaisquer outras áreas
 - têm sido menores na área de saneamento básico do que na de telefonia
02. “Assim como educação e saúde, os investimentos em saneamento trazem retornos consideráveis...” Há, nesse segmento, uma **comparação**. O mesmo recurso é empregado em:
- Como haveria uma maratona na cidade, o trânsito foi interrompido.
 - Era um velho, próximo da morte, e chorava como uma criança.
 - Como esse novo programa é engraçado!
 - Fiz tudo certinho, como o médico prescreveu.
03. A última frase do texto 1, por seu significado, relaciona-se diretamente ao seguinte ditado popular:
- Dia de muito, véspera de pouco.
 - Santo de casa não faz milagre.
 - Não há marcas que o tempo não apague.
 - É melhor prevenir do que remediar.

04. “**No entanto**, a melhoria das condições do saneamento brasileiro ainda é pequena...” Uma conjunção que pode substituir a locução em destaque, com o mesmo significado, é:
- pois
 - logo
 - entretanto
 - como
05. A única frase **gramaticalmente** correta, quanto à flexão do verbo, é:
- O índice de óbitos por leptospirose relacionam-se ao destino do lixo.
 - Existem doenças transmitidas pelo contato com água contaminada.
 - Geralmente, o acúmulo de detritos aumentam o número de ratos.
 - Ocorrem, na maioria dos municípios, prestação de serviços de coleta de lixo.
06. Em “o progresso **feito** na área de saneamento”, há o **particípio** do verbo fazer. De acordo com a língua padrão, com relação ao particípio, há **erro** na seguinte construção:
- Os investimentos em saneamento tinham trago retornos consideráveis
 - Os investimentos em saneamento haviam trazido retornos consideráveis
 - a cada R\$ 1,00 que foi gasto em saneamento, os municípios economizam R\$ 5,00
 - a cada R\$ 1,00 que tenha gastado em saneamento, o município economiza R\$ 5,00

TEXTO 2

O final do século XIX viu o desenvolvimento da chamada revolução pasteuriana – a impressionante série de descobertas, por Louis Pasteur, seus colaboradores e seus discípulos, de agentes patogênicos causadores de doenças, de soros e vacinas destinados a evitar ou controlar essas doenças, como foi o caso do soro anti-rábico, que projetou o nome do pesquisador e de seu instituto – do qual o imperador Pedro II era grande admirador e para o qual destinou uma contribuição financeira. Entre 1880 e 1898 foram identificados quase 20 agentes causadores de lepra, malária, tuberculose, cólera, peste, difteria... Doenças muito prevalentes no Brasil e que, portanto, justificavam o interesse – mais que isso, o entusiasmo – de autoridades e de pesquisadores com esse trabalho, que representava uma nova postura na saúde pública. Era agora possível controlar doenças transmissíveis com medidas limitadas, sem a ampla intervenção social preconizada pela “polícia sanitária”...

MOACYR SCLIAR, “Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica” IN: *Saúde pública – histórias, políticas e revolta*. São Paulo: Scipione, 2002, p. 51.

07. A leitura do texto 2 permite concluir que:
- A) a revolução pasteuriana foi um movimento político de militantes da esquerda
 - B) antes de 1880 não se havia identificado nenhum agente causador de doenças
 - C) posturas relacionadas à saúde pública no Brasil não existiam, até o século XX
 - D) especialistas do instituto Louis Pasteur identificaram o soro anti-rábico
08. “Justificavam o entusiasmo de autoridades e de pesquisadores com esse trabalho, **que** representava uma nova postura na saúde pública”. O termo substituído pelo pronome relativo em destaque é:
- A) pesquisadores
 - B) trabalho
 - C) entusiasmo
 - D) autoridades
09. “*sem a ampla intervenção social **preconizada** pela polícia sanitária*” – um sinônimo para o vocábulo em destaque é:
- A) predestinada
 - B) antecipada
 - C) apregoada
 - D) dificultada
10. “*Doenças muito prevalentes no Brasil e que, **portanto**, justificavam o interesse ... de autoridades e de pesquisadores com esse trabalho...*” A conjunção em negrito pode ser substituída, **sem alteração do significado** do período por:
- A) todavia
 - B) contudo
 - C) mas também
 - D) por isso
11. “No século XIX, Louis Pasteur, seus colaboradores e seus discípulos, _____ agentes patogênicos causadores de doenças.” A flexão verbal que completa corretamente essa frase é:
- A) descobriram
 - B) descobriu
 - C) descobrirão
 - D) descobre
12. *Vacinas destinam-se à prevenção de doenças.* Nessa frase há crase, pois o verbo **destinar-se** exige complemento precedido pela preposição **a**. Também ocorre crase em:
- A) Os cidadãos nem sempre aceitaram bem **as** políticas públicas de saúde.
 - B) Todos aguardavam **a** comunicação que seria feita no rádio.
 - C) Muitos compareceram **a** reunião apenas para reclamar.
 - D) Os eleitores solicitam **as** intervenções necessárias dos governantes.
13. A palavra que obedece à mesma regra de acentuação gráfica que **século** é:
- A) saúde
 - B) discípulos
 - C) possível
 - D) transmissíveis
14. Em “*a **impressionante série** de descobertas*” o adjetivo está anteposto ao substantivo. O mesmo ocorre em:
- A) revolução pasteuriana
 - B) agentes patogênicos
 - C) ampla intervenção
 - D) contribuição financeira
15. “*...**foram identificados** quase 20 agentes causadores de lepra...*”. O verbo **identificar** está empregado na voz passiva analítica. Nesse contexto, a voz passiva sintética correspondente é:
- A) identificaram
 - B) identificou-se
 - C) identificou
 - D) identificaram-se

16. Em: “*agentes causadores de lepra, malária, tuberculose, cólera, peste, difteria...*” o uso da vírgula justifica-se, pois ocorre:
- coordenação entre termos com o mesmo valor sintático
 - isolamento de aposto ou oração subordinada apositiva
 - supressão de um grupo de palavras
 - intercalação de expressões explicativas
17. “O soro **anti-rábico** é um medicamento eficaz contra a raiva ou hidrofobia”. Nessa palavra, **anti** denota oposição; prefixo de sentido idêntico ocorre em:
- exportação
 - imigração
 - introdução
 - contradição
18. “*O final do século XIX viu o desenvolvimento da chamada revolução pasteuriana...*”. Neste segmento ocorre o uso de linguagem figurada, pois:
- estabelece-se uma comparação entre uma determinada época e as anteriores
 - atribui-se a uma época a ação exercida pelas pessoas que então viviam
 - busca-se amenizar ou suavizar termo ou expressão desagradável ou deselegante
 - marca-se uma oposição entre termos de sentidos contrários, criando um paradoxo
19. Em **doenças**, utiliza-se o ç. Essa letra **NÃO** é empregada em:
- compreen_ão
 - autoriza_ão
 - jurisdi_ão
 - elei_ão
20. “_____ as doenças transmissíveis vão sendo vencidas, a _____ de vida aumenta e, _____, aumentam as doenças que acometem pessoas mais velhas.” As palavras ou expressões que completam corretamente essa frase são:
- Na medida que; expectativa; conseqüentemente
 - Na medida em que; expectativa; conseqüentemente
 - À medida que; expectativa; conseqüentemente
 - À medida que; expectativa; conseqüentemente

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Ao se puncionar uma veia para administrar uma medicação, recomenda-se fazer a anti-sepsia do local com a seguinte solução:
- hipoclorito de sódio a 0,1%
 - ácido acético
 - álcool a 70%
 - éter
22. Num atendimento pré-hospitalar foi necessário realizar uma venóclise. O auxiliar de enfermagem realizou a punção na face interna do antebraço direito elegendo a veia denominada:
- cefálica
 - braquial
 - femoral
 - ulnar
23. Um trabalhador, em conseqüência de uma queda, apresentou uma lesão na altura do tornozelo esquerdo. O médico que o atendeu solicitou que a área afetada fosse imobilizada por meio de bandagem. Nesse caso, o auxiliar de enfermagem utilizou a bandagem do tipo:
- recorrente
 - em oito
 - oblíqua
 - espiral reversa
24. Uma trabalhadora foi ao serviço de saúde da empresa, informando que não estava se sentindo bem. Antes de encaminhá-la à consulta médica, o auxiliar de enfermagem verificou os sinais vitais e observou que a frequência cardíaca correspondia a 58 bpm. O profissional de enfermagem registrou este tipo de alteração na ficha de atendimento, utilizando o seguinte termo técnico:
- taquisfigmia
 - arritmia
 - taquicardia
 - bradicardia
25. A lesão do nervo ciático causa parestesia em todo o nervo e dor intensa durante longas horas. Esse tipo de ocorrência pode se dar quando não se observa a técnica correta da injeção intramuscular na região do corpo denominada:
- ventroglútea
 - ântero-lateral da coxa
 - deltoideana
 - glútea

26. Ao realizar a desinfecção de superfícies no posto de trabalho, **NÃO** é indicado utilizar o seguinte produto:
- quaternário de amônia
 - glutaraldeído
 - álcool etílico
 - fenol sintético
27. Para o médico realizar uma sutura, o auxiliar de enfermagem deverá providenciar, necessariamente, agulhas cirúrgicas, fios de sutura e o seguinte instrumental:
- porta-agulha de Hegar
 - pinça Kocher hemostática
 - tesoura de Mayo curva
 - pinça dente de rato
28. Para se administrar uma vacina por via subcutânea, posicionando-se a seringa num ângulo de 90° em relação à pele, a agulha adequada é a do tipo:
- 30 X 8
 - 25 X 7
 - 10 X 6
 - 40 X 12
29. Ao orientar uma trabalhadora que faz uso de insulina por via subcutânea, o auxiliar de enfermagem recomendou que observasse os sinais e sintomas da principal complicação da insulino terapia, que é:
- a hipoglicemia
 - o edema insulínico
 - a resistência insulínica
 - o efeito Somogy
30. Ao verificar a pressão arterial nos membros superiores, o manguito do esfigmomanômetro deve ser posicionado de modo que a bolsa de borracha fique centralizada sobre a seguinte artéria:
- poplítea
 - antecubital
 - basílica
 - braquial
31. Quando o auxiliar de enfermagem do trabalho solicita que o trabalhador hipertenso permaneça em repouso, sentado, por cinco a dez minutos, significa que, após esse tempo, estará verificando:
- glicemia capilar
 - pulso radial
 - pressão arterial
 - temperatura axilar
32. A doença ocupacional causada pela inalação de poeira de algodão recebe o nome de:
- bissinose
 - silicose
 - asbestose
 - enfisema
33. O processo de esterilização de um material que já foi esterilizado anteriormente, mas não foi utilizado, é denominado de:
- desinfecção
 - reesterilização
 - reprocessamento
 - esterilização
34. O exame ocupacional realizado num trabalhador que fica afastado por período igual ou superior a 30 dias, em razão de doença, parto e acidente, seja ele ocupacional ou não, é denominado:
- admissional
 - retorno ao trabalho
 - demissional
 - mudança de função
35. A Lei orgânica nº 8080 /1990 preconiza a execução de ações de vigilância sanitária, saúde do trabalhador e outras para a promoção, proteção e:
- internação do trabalhador
 - observação da saúde
 - avaliação do trabalhador
 - recuperação da saúde
36. A primeira etapa do processamento de artigos hospitalares é a:
- desinfecção
 - esterilização
 - limpeza
 - inspeção
37. A prova tuberculínica é indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose. O resultado da mensuração da área de endurecimento que indica reator fraco, em indivíduo vacinado com BCG ou infectado pelo *M.tuberculosis*, corresponde ao seguinte intervalo:
- 5 a 9 mm
 - 0 a 4 mm
 - 10 a 14 mm
 - 15 a 19 mm
38. Máscara e luvas são E.P.I. utilizados pelo trabalhador como medida de biossegurança, fazendo uma barreira de proteção individual para a prevenção da seguinte patologia:
- resfriado
 - tuberculose
 - sinusite
 - pneumoconiose

- 39.** Constitui sinal sugestivo de tuberculose a presença de tosse seca ou produtiva por um período de:
- 3 semanas ou mais
 - 1 semana ou menos
 - 3 dias apenas
 - 1 dia apenas
- 40.** As compressões torácicas e as respirações artificiais devem ser combinadas para que a RCP seja eficaz. A relação compressões / ventilações deve ser de:
- 15 / 1
 - 30 / 1
 - 15 / 2
 - 30 / 2
- 41.** Na suspeita de obstrução por corpo estranho, em vítima inconsciente, a remoção do corpo estranho e a inspeção orofaríngea devem ser realizadas no seguinte período da respiração artificial:
- durante
 - depois
 - antes
 - intercalada
- 42.** O auxiliar de enfermagem do trabalho, ao socorrer um trabalhador que apresenta envenenamento com produtos químicos, deverá utilizar como protetor respiratório o seguinte dispositivo de barreira:
- botina
 - avental
 - capacete
 - máscara
- 43.** Se um trabalhador recebe um diagnóstico de Lesões de Esforços Repetitivos (LER) relacionadas com trabalho, significa que o seu problema afeta:
- os ossos
 - as unhas
 - os tendões
 - as veias
- 44.** Segundo a Lei Nº 7498/86, que regulamenta o Exercício de Enfermagem, ações de tratamento simples devem ser executadas por:
- auxiliar de enfermagem
 - parteira
 - atendente de enfermagem
 - técnico de enfermagem
- 45.** A competência dos profissionais integrantes do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho está determinada na norma regulamentadora de número:
- 5
 - 4
 - 7
 - 6
- 46.** Segundo a norma regulamentadora nº32, o empregador deverá vedar, entre outros, o ato de fumar, o uso de adornos, o consumo de alimentos e bebidas, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Essa norma diz respeito a:
- Inspeção Prévia
 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde
 - Sinalização de segurança
- 47.** Conforme preconiza a NR-32, os trabalhadores de saúde deverão ser vacinados minimamente contra as seguintes doenças:
- tétano, difteria e hepatite B
 - difteria, rubéola e coqueluche
 - hepatite B, tuberculose e meningite
 - tuberculose, tétano e rubéola
- 48.** As atividades de promoção da saúde e de proteção específica realizadas nos trabalhadores são ações de prevenção:
- secundária
 - primária
 - terciária
 - quartenária
- 49.** Ao atender um trabalhador com mal súbito, o auxiliar de enfermagem do trabalho estará realizando a prevenção secundária. Um exemplo desse tipo de atividade é:
- vacinação
 - pronto atendimento
 - orientação alimentar
 - educação sanitária
- 50.** A adaptação das condições de trabalho é uma característica psicofisiológica do trabalhador, estudada pela seguinte ciência específica:
- Matemática
 - Física
 - Ergonomia
 - Psicologia
- 51.** O tipo de postura no trabalho mais freqüente, em um trabalhador que realiza atividade de informática, é:
- em pé
 - deitado
 - agachado
 - sentado
- 52.** A higiene do trabalho ou higiene industrial possui também a denominação de higiene do tipo:
- ambiental
 - ocupacional
 - física
 - organizacional

53. É considerado risco químico no ambiente de trabalho, para o auxiliar de enfermagem do trabalho:
- A) gás
 - B) ruído
 - C) vibração
 - D) radiação
54. É exemplo de agente biológico a que um trabalhador poderá estar exposto:
- A) neblina
 - B) vapor
 - C) bactéria
 - D) névoa
55. Os limites de tolerância ou limites de exposição ocupacional, encontrados em um resultado de exame ocupacional, são expressos pelas seguintes siglas:
- A) LT e LEO
 - B) LTs e LEOs
 - C) LiT e LExO
 - D) LimT e LExp
56. O trabalhador que se acidentou no local e horário de trabalho, realizando suas funções, e foi liberado para residência, após o atendimento médico, teve um acidente do tipo:
- A) trajeto com perda
 - B) trajeto sem perda
 - C) trabalho com perda
 - D) trabalho sem perda
57. As patologias do sistema tegumentar (pele) relacionadas com o trabalho são chamadas de:
- A) dermatoses ocupacionais
 - B) pneumoconioses
 - C) tendinites
 - D) bissinoses
58. O trabalhador acidentado com material biológico deverá estar imunizado contra:
- A) difteria e tétano
 - B) febre amarela
 - C) hepatite B
 - D) rubéola
59. As vacinas deverão ser conservadas na rede de frio a uma temperatura ideal de:
- A) + 1° C a +4 ° C
 - B) + 8° C a +12 ° C
 - C) + 12° C a +16 ° C
 - D) + 4° C a +8 ° C
60. O auxiliar de enfermagem do trabalho, ao realizar a profilaxia contra o tétano em um trabalhador que nunca foi vacinado, deverá realizar o esquema inicial de vacinação com as seguintes quantidades de doses:
- A) 1
 - B) 3
 - C) 2
 - D) 4