

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -
Núcleo comum**

QUESTÃO 01

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

QUESTÃO 02

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

QUESTÃO 03

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

QUESTÃO 04

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5º C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

QUESTÃO 07

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

QUESTÃO 08

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilactóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclinas e antitireoideanos (exceto propiltiouracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

QUESTÃO 11

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncoética e perfil lipídico.
- Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

QUESTÃO 12

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folícular estimulante.
- Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e consequente transformação secretora do endométrio.
- Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

QUESTÃO 13

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peribrônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

QUESTÃO 14

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene feita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

QUESTÃO 15

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

QUESTÃO 17

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

QUESTÃO 18

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa saudável.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

QUESTÃO 20

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06.Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO:**

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Mastologia

QUESTÃO 21

Em relação à glândula mamária feminina adulta, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) é composta por 15 a 20 lóbulos.
- b) é constituída por glândulas túbulo-alveolares.
- c) o tecido adiposo presente no tecido conjuntivo dos espaços inter-lobulares é abundante.
- d) o tecido conjuntivo intra-lobular contém pouca gordura.

QUESTÃO 22

Durante a gestação, a glândula mamária sofre as seguintes alterações, **EXCETO**:

- a) diminuição relativa dos tecidos adiposo e conjuntivo.
- b) o desenvolvimento do tecido glandular é uniforme.
- c) os díctulos se ramificam e começam a surgir alvéolos
- d) as células secretórias contêm abundante retículo endoplasmático.

QUESTÃO 23

A mama feminina atinge seu maior desenvolvimento por volta dos:

- a) 16 anos.
- b) 18 anos.
- c) 20 anos.
- d) 24 anos.

QUESTÃO 24

O principal estímulo hormonal para a lactogênese durante a gravidez avançada é dado pela (o):

- a) Ocitocina.
- b) Estrogênio.
- c) Prolactina.
- d) Progesterona.

QUESTÃO 25

Na classificação do câncer de mama pelo sistema TNM, podemos afirmar, **EXCETO:**

- a) T3 - Tumor com mais de 5 cm de diâmetro.
- b) T2 - tumor com diâmetro entre 1 e 3 cm.
- c) Tx - o tumor primário não pode ser avaliado.
- d) T4d - carcinoma inflamatório.

QUESTÃO 26

Em relação ao linfonodo sentinela, podemos afirmar, **EXCETO:**

- a) pode ser individualizado através da infocintilografia mamária.
- b) sua pesquisa está indicada após quimioterapia neo-adjuvante.
- c) pode ser individualizado com o uso de corante vital.
- d) está contra-indicada sua pesquisa em pacientes com axilas clinicamente suspeitas de metástase.

QUESTÃO 27

Em relação à fisiopatologia da doença de Mondor, podemos afirmar, **EXCETO:**

- a) a sua fisiopatologia é especulativa.
- b) é uma doença benigna autolimitada.
- c) é uma doença indicativa de neoplasia.
- d) compromete as veias superficiais da parede toracoabdominal anterior e lateral.

QUESTÃO 28

Os quadros clínicos radiológicos abaixo podem simular carcinoma, com **EXCEÇÃO** de:

- a) cicatriz radial.
- b) tumor filóide.
- c) ectasia ductal.
- d) necrose gordurosa.

QUESTÃO 29

Assinale a opção **INCORRETA**:

- a) Os genes BRCA1 e BRCA2 operam como genes supressores de tumores.
- b) Mutações no BRCA2 estão associadas a um risco aumentado de câncer de mama em pessoas do sexo masculino.
- c) Mulheres que nascem com mutações em BRCA1 apresentam risco aumentado para câncer de mama.
- d) Homens com mutações em BRCA2 apresentam risco aumentado para carcinoma nos testículos.

QUESTÃO 30

Assinale a opção que **NÃO** caracteriza aspecto do carcinoma lobular *in situ*:

- a) ser multifocal.
- b) incidência decrescente após a menopausa.
- c) freqüentemente identificado à mamografia.
- d) é considerado indicador de risco de desenvolvimento subsequente de carcinoma ductal invasivo.

QUESTÃO 31

O carcinoma ductal *in situ* pode apresentar os seguintes aspectos histopatológicos, **EXCETO**:

- a) adenocarcinoma.
- b) cribiforme.
- c) micro-papilar.
- d) comedocarcinoma.

QUESTÃO 32

Células claras isoladas ou em pequenos grupos com grandes núcleos vesiculares e nucléolos proeminentes, são características do carcinoma:

- a) lobular.
- b) tubular.
- c) de Paget.
- d) mucinoso.

QUESTÃO 33

Assinale a opção que **NÃO** corresponde aos sarcomas mamários:

- a) têm origem no tecido epitelial dos ductos.
- b) correspondem a menos de 1% das doenças malignas da mama.
- c) representam menos de 5% de todos os sarcomas.
- d) têm tendência a metastatizar por via hematogênica.

QUESTÃO 34

Em relação ao tumor filóide, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) corresponde a 0,5% de todos os tumores mamários.
- b) a variedade benigna tem aspecto histológico semelhante ao fibroadenoma, porém apresenta maior densidade celular.
- c) de modo geral, tem mau prognóstico.
- d) seu prognóstico pode ser imprevisível.

QUESTÃO 35

Em relação à biópsia incisional, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) É indicada para tumores pequenos, suspeitos de malignidade, para os quais não foi possível estabelecer diagnóstico prévio por *core biopsy* ou PAAF.
- b) Deve ser realizada em tumores grandes, suspeitos de malignidade.
- c) É bem indicada em lesões eczematosas do complexo aréolo-papilar, suspeitas de carcinoma de Paget.
- d) Dependendo das condições da paciente, pode ser feita sob anestesia local associada à sedação.

QUESTÃO 36

Em relação ao carcinoma lobular *in situ*, podemos afirmar que:

- a) é comum na população em geral.
- b) incide mais em mulheres na faixa de idade dos 50 aos 55 anos.
- c) é dez vezes mais freqüente em mulheres brancas.
- d) é detectável ao exame macroscópico.

QUESTÃO 37

Assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) A maioria das mulheres com carcinoma lobular *in situ* não desenvolve carcinoma invasor de mama.
- b) A maior parte dos carcinomas que se desenvolvem após carcinoma lobular *in situ* são carcinomas ductais invasivos.
- c) A radioterapia está indicada no tratamento do carcinoma lobular *in situ*.
- d) O carcinoma lobular *in situ* é um fator de risco para o desenvolvimento de carcinoma invasor.

QUESTÃO 38

São subtipos de carcinoma ductal *in situ*, **EXCETO**:

- a) Comedocarcinoma.
- b) Cribiforme.
- c) Papilar.
- d) Mucinoso.

QUESTÃO 39

Em relação ao carcinoma ductal *in situ*, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A multicentricidade está geralmente relacionada ao tamanho da lesão principal.
- b) A probabilidade de ser observada uma invasão oculta está relacionada com o tamanho da lesão inicial.
- c) Há maior freqüência de multicentricidade nos tipo comedocarcinoma.
- d) A incidência de invasão oculta parece estar relacionada com as lesões do tipo comedocarcinoma.

QUESTÃO 40

Em relação ao comprometimento linfático no câncer de mama, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) O prognóstico tem relação com o envolvimento axilar.
- b) O local mais comum do envolvimento metastático é o grupo central.
- c) Quanto maior o número de gânglios comprometidos com metástases, pior o prognóstico.
- d) Cerca de 35 a 40% das pacientes com axila negativa desenvolvem metástases à distância em um período de 08 anos.

QUESTÃO 41

O principal suprimento sangüíneo da mama vem da (s):

- a) artérias torácica lateral e mamária interna.
- b) quarta e quinta artérias intercostais.
- c) artérias subescapular e toracodorsal.
- d) do ramo peitoral da artéria toracoacromial.

QUESTÃO 42

Em relação à fisiologia mamária, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Os estrogênios promovem a proliferação do epitélio.
- b) A progesterona leva a uma dilatação dos ductos e estimula as células epiteliais se diferenciarem em colunares secretoras.
- c) Os receptores mediadores da ação da prolactina são intracelulares.
- d) Os receptores da ação dos esteróides são intracelulares.

QUESTÃO 43

Assinale a opção que **NÃO** caracteriza a ação do estrogênio sobre a mama:

- a) Resulta em alteração da micro-circulação mamária.
- b) Seu efeito é parecido com o da histamina.
- c) Promove um aumento máximo do fluxo sanguíneo mamário.
- d) Estimula as células alveolares a se diferenciarem em células secretoras.

QUESTÃO 44

Caracterizam a esteatonecrose, **EXCETO**:

- a) Pode ser seqüela de trauma.
- b) Tem aspecto mamográfico do fibroadenoma.
- c) Pode ser seqüela de radioterapia.
- d) É mais comum em mulheres obesas.

QUESTÃO 45

Em relação ao cisto mamário, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Pode ser diferenciado da lesão sólida com o uso do ultra-som.
- b) A PAAF é uma maneira direta e de baixo custo para identificá-lo.
- c) São mais comuns em mulheres acima de 52 anos.
- d) O aspirado do cisto não necessita de avaliação citológica de rotina quando o nódulo desaparece completamente.

QUESTÃO 46

NÃO é característica dos fibroadenomas:

- a) são encontrados entre 9 e 10% de mulheres em estudos de autópsias.
- b) ao exame, são redondos ou lobulados e móveis.
- c) apresentam-se como lesões múltiplas em cerca de 25 a 30 % das pacientes.
- d) são mais comuns em pacientes jovens.

QUESTÃO 47

Em relação aos tumores benignos das mamas, podemos afirmar, EXCETO:

- a) O diagnóstico de fibroadenoma deve ser feito por biopsia incisional.
- b) Exame clínico + ultra-som + PAAF pode dar o diagnóstico definitivo de fibroadenoma.
- c) Os hamartomas podem produzir uma imagem clássica que é visualmente diagnóstica à mamografia.
- d) As características clínicas e radiológicas da esteatonecrose lembram as características de um carcinoma.

QUESTÃO 48

Em relação às mastites puererais, podemos afirmar, EXCETO:

- a) Ocorrem em cerca de 10% das mulheres que estão amamentando.
- b) Clinicamente, apresentam sintomas gerais e locais.
- c) A ultra-sonografia é indispensável para iniciar o tratamento.
- d) O leite representa um ótimo meio de cultura para os patógenos.

QUESTÃO 49

Assinale a afirmativa CORRETA:

- a) A quimioterapia adjuvante está indicada em tumores de grande volume para redução da massa tumoral.
- b) A quimioterapia neo-adjuvante deve ser recomendada para pacientes com tumores com 1cm, independente do status linfonodal.
- c) A resposta a quimioterapia adjuvante é um fator preditivo de sobrevida livre de doença.
- d) Hormonioterapia adjuvante com tamoxifeno, na dose de 20 mg / dia durante 05 anos deve ser empregada em todas as pacientes cujos tumores apresentarem positividade para receptores de estrogênio.

QUESTÃO 50

Em relação à radioterapia, a dose de reforço (boost) deve ser indicada em pacientes com menos de 50 anos de idade, que apresentem, **EXCETO**:

- a) Margens cirúrgicas exígues.
- b) Linfonodo sentinela negativo para metástases.
- c) Mais de 25 % de carcinoma ductal *in situ* na peça cirúrgica.
- d) Tumores com alta agressividade local.

QUESTÃO 51

Assinalar a afirmativa **INCORRETA**:

- a) A biópsia excisional é suficiente para o tratamento do carcinoma lobular *in situ*.
- b) No carcinoma ductal *in situ*, a mastectomia simples é um tratamento curativo em 98 % dos casos.
- c) No carcinoma ductal *in situ* de alto grau não há necessidade de investigar o linfonodo sentinela.
- d) O carcinoma ductal *in situ* menor que 2 cm e margens cirúrgicas livres pode ser tratado por ressecção segmentar, seguida de radioterapia.

QUESTÃO 52

Sobre a epidemiologia do câncer de mama, assinale a alternativa **FALSA**:

- a) Na África, Ásia e países do terceiro mundo, as taxas de incidência são 10 vezes mais baixas que na América do Norte e Europa Ocidental.
- b) O risco da doença em familiares de 1º grau é quase o dobro do encontrado em mulheres que não apresentam a enfermidade na família.
- c) Tumores mamários podem ser induzidos por radiação ionizante, sendo o risco crescente, diretamente proporcional à idade da exposição e inversamente proporcional à dose recebida.
- d) Menarca precoce e menopausa tardia são fatores relacionados com maior risco da doença.

QUESTÃO 53

São fatores de risco de desenvolvimento de carcinoma de mama avaliados através do modelo de Gail, **EXCETO**:

- a) Idade da menarca.
- b) Resultado de biopsias previas.
- c) Idade da primeira gestação a termo.
- d) Idade no momento do primeiro diagnóstico.

QUESTÃO 54

Em relação ao exame clínico das mamas, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Retração cutânea e desvio da papila são sinais freqüentemente observados na presença de tumores malignos.
- b) Na inspeção dinâmica, a mulher deve ser avaliada com atenção, em local com iluminação adequada, assentada ou de pé, com os braços ao longo do corpo.
- c) Derrame papilar multicanalicular, geralmente se relaciona com tumor retro areolar.
- d) Um nódulo deve ser avaliado quanto ao tamanho, forma, contorno, consistência, mobilidade, sensibilidade e localização.

QUESTÃO 55

Sobre fatores de risco para câncer de mama, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Nuliparidade é fator de risco muito elevado.
- b) Antecedentes de hiperplasia epitelial sem atipias estão incluídos como indicadores de risco medianamente elevados.
- c) Menarca precoce e menopausa tardia são fatores que levam a um aumento mediano do risco.
- d) Mãe ou irmã com câncer de mama na pós-menopausa são fatores de risco muito elevados.

QUESTÃO 56

Sobre a incidência de câncer de mama, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) São esperados cerca de 49.400 novos casos de carcinoma de mama no mundo para 2008.
- b) A incidência aumenta de forma lenta até os 50 anos, depois se dá de forma mais rápida.
- c) O câncer de mama é o mais incidente na população feminina brasileira.
- d) Na região sudeste, é a neoplasia maligna mais incidente, à frente inclusive do câncer de pele não-melanoma.

QUESTÃO 57

O principal fator de avaliação do prognóstico para o câncer de mama é:

- a) acometimento de linfonodos regionais por metástases.
- b) tamanho tumoral.
- c) grau histológico.
- d) invasão vascular.

QUESTÃO 58

Têm bom prognostico quando detectados precocemente, **EXCETO:**

- a) carcinoma tubular.
- b) carcinoma mucinoso.
- c) carcinoma lobular invasivo.
- d) carcinoma ductal *in situ* tipo comedo.

QUESTÃO 59

Sobre a mastalgia cíclica, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Ocorre principalmente no período menstrual.
- b) Geralmente é bilateral, mas também pode acometer uma só mama.
- c) Costuma ser mais intensa na região retro areolar.
- d) Raramente irradia para as axilas.

QUESTÃO 60

Sobre o tratamento da dor mamária, marque a opção **FALSA**:

- a) O óleo de primula é composto por ácidos linoleico e gamalinoleico, precursores das prostaglandinas.
- b) O citrato de clomifeno tem o seu uso recomendado por um período de 03 meses, na dose de 20 mg / dia, tendo como efeitos colaterais alterações menstruais e ondas de calor.
- c) O uso de análogos de GnRH é restrito, sendo o medicamento mais eficaz no caso de mastalgias refratárias e severas.
- d) Diuréticos, vitamina B6 e acetato de medroxiprogesterona não têm a sua eficácia comprovada.

QUESTÃO 61

Sobre câncer de mama e gravidez, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) As alterações fisiológicas decorrentes da gravidez, podem dificultar o diagnóstico clínico de processos patológicos.
- b) A mamografia raramente é indicada à gestante, pois além do risco de exposição fetal à radiação, é pouco esclarecedora devido à alta densidade das mamas nesta fase.
- c) A ultra-sonografia é o método de imagem de escolha para avaliação de alterações palpáveis nas mamas no ciclo gravídico puerperal.
- d) Os cânceres de mama detectados na gravidez tem prognóstico pior que nas mulheres não-gestantes, quando comparados de acordo com idade e tamanho tumoral.

QUESTÃO 62

São complicações possíveis, no pós-operatório imediato de reconstrução mamária pós-mastectomia, com prótese de silicone, **EXCETO**:

- a) Ruptura da prótese.
- b) Hematoma.
- c) Infecção.
- d) Deiscência.

QUESTÃO 63

Sobre reconstrução mamária pós-mastectomia, marque a alternativa **FALSA**:

- a) O posicionamento da prótese posteriormente ao músculo peitoral reduz o risco de contratura capsular para 30%.
- b) A reconstrução com retalho toracodorsal tem como desvantagem deixar cicatriz lateral extensa.
- c) O retalho do m. reto abdominal recebe irrigação das artérias epigástricas superiores e inferiores.
- d) O retalho miocutâneo do músculo reto abdominal não sofre necrose.

QUESTÃO 64

Sobre os métodos de detecção precoce de câncer de mama, assinale a alternativa **FALSA**:

- a) O auto-exame pode ser desconsiderado, já que pode ser fonte maior de consultas desnecessárias e preocupações descabidas por parte das mulheres.
- b) O exame clínico das mamas deve ser realizado a cada três anos dos 20 aos 40 anos, e, depois, anualmente.
- c) O exame clínico é mais importante em mulheres mais jovens, em faixa etária de menor sensibilidade da mamografia.
- d) A triagem mamográfica para mulheres acima de 70 anos deve ser feita de acordo com a avaliação individual da expectativa de vida da mulher e de condições clínicas que permitam a adequada realização do exame.

QUESTÃO 65

São indicações de PAAF, **EXCETO**:

- a) Nódulos sólidos circunscritos.
- b) Nódulos sólidos espiculados.
- c) Cistos complexos / atípicos.
- d) Densidades assimétricas.

QUESTÃO 66

Sobre a prevenção primária do câncer de mama, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) O alto consumo de gordura de origem animal implica maior risco da doença.
- b) O maior consumo de frutas e vegetais na idade adulta diminui a chance de surgimento do câncer de mama.
- c) Mulheres que amamentam apresentam pequena redução no risco de câncer de mama, principalmente na pré-menopausa.
- d) O uso de contraceptivos hormonais por período prolongado, antes da primeira gestação a termo, aumenta o risco da doença em mulheres na pós-menopausa.

QUESTÃO 67

Sobre procedimentos invasivos para diagnóstico de lesões mamárias, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Nos casos de citologia inconclusiva, a primeira escolha é a exérese da lesão
- b) Nódulos menores que 2 cm devem ser preferencialmente encaminhados para mamotomia.
- c) Nódulos maiores que 1 cm devem ser encaminhados para biopsia por agulha grossa.
- d) Em lesões clinicamente suspeitas e com citologia positiva para câncer, deve ser feita obtenção de amostra histológica para confirmação diagnóstica.

QUESTÃO 68

São condições que deram origem ao tratamento conservador do câncer de mama, **EXCETO**:

- a) Falência dos tratamentos cirúrgicos agressivos.
- b) Introdução da mamografia em larga escala.
- c) Uso de tomografia computadorizada no diagnóstico do câncer de mama.
- d) O melhor conhecimento dos aspectos biológicos da doença.

QUESTÃO 69

Assinale a afirmativa que não faz parte do arsenal terapêutico do tratamento conservador do câncer de mama:

- a) Quadrantectomia.
- b) Cirurgia de Halsted.
- c) Radioterapia.
- d) Exérese de linfonodo sentinel.

QUESTÃO 70

Fazem parte das alterações funcionais benignas da mama (AFBM), **EXCETO:**

- a) micro cistos.
- b) hiperplasia florida.
- c) síndrome de Tietze.
- d) hiperplasia lobular atípica.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

"A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático."

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.