

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -
Núcleo comum**

QUESTÃO 01

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

QUESTÃO 02

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

QUESTÃO 03

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

QUESTÃO 04

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

QUESTÃO 07

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

QUESTÃO 08

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

QUESTÃO 11

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

QUESTÃO 12

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

QUESTÃO 13

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

QUESTÃO 14

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

QUESTÃO 15

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

QUESTÃO 17

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

QUESTÃO 18

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

QUESTÃO 20

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Neurocirurgia

QUESTÃO 21

Quanto aos diversos tipos de edema cerebral, é **CORRETO** afirmar:

- a) O edema citotóxico ocorre quando a barreira hemato-encefálica não está lesada e não há extravasamento de proteínas. A hipóxia é a causa mais freqüente deste tipo de edema.
- b) No edema citotóxico, temos barreira hemato-encefálica lesada e há extravasamento de proteínas sendo o edema típico de intoxicação exógena e da isquemia.
- c) O edema vasogênico ocorre quando a barreira hemato-encefálica não está lesada e não há extravasamento de proteínas. É o edema visto em tumores cerebrais.
- d) Nos meningiomas, nos gliomas e metástases o edema típico é o citotóxico e por isso o uso de corticóide é indicado em seu tratamento.

QUESTÃO 22

São exemplos de hérnias cerebrais com depressão do nível de consciência e estão correlacionados de forma **CORRETA** com suas apresentações clínicas associadas:

- a) Hérnia tonsilar do forame magno - paraparesia.
- b) Hérnia tentoriais - bossa subcutânea.
- c) Hérnias transtentoriais centrais - hemorragias mesencéfalo-pontinas de Duret.
- d) Hérnias do giro do cíngulo - midríase ipsilateral ao déficit motor, (síndrome de Kernohan).

QUESTÃO 23

Quanto à hipertensão intracraniana, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A pressão intracraniana (PIC) acima de 20 mmhg está relacionada a maior mortalidade no trauma crânio encefálico.
- b) A tríade de Cushing (bradicardia, hipertensão e irregularidade respiratória) é vista em cerca de 70 % dos casos de hipertensão intracraniana.
- c) Em pacientes conscientes com tomografia de crânio alterada a monitorização da PIC normalmente não é necessária.
- d) A DVE (derivação ventricular externa) é o padrão ouro na monitorização da PIC apesar do risco infeccioso.

QUESTÃO 24

Quanto ao tratamento da hipertensão intracraniana no TCE, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) O objetivo é mantermos uma PIC menor que 20 mmhg e uma pressão de perfusão cerebral maior ou igual a 60 mmhg.
- b) A sedação leve com opióides deve ser evitada por causar vasodilatação cerebral.
- c) A elevação da cabeceira do leito melhora o retorno venoso diminuindo a PIC.
- d) A elevação da cabeceira pode diminuir a pressão arterial ao nível do sifão carotídeo.

QUESTÃO 25

Assinalar a afirmativa **INCORRETA**:

- a) É típica nos astrocitomas pilocíticos de fossa posterior a presença de lesão cística freqüentemente com nódulo mural.
- b) Caracteristicamente, os oligodendrogliomas não captam contraste aos exames de imagem.
- c) O oligodendroglioma ocorre, tipicamente, em localização supratentorial.
- d) Os Oligodendrogliomas são fortemente positivos para GFAP.

QUESTÃO 26

A respeito da biologia molecular dos oligodendrogliomas é **INCORRETO** afirmar:

- a) A deleção do braço curto do cromossomo 1 (1p) está presente em até 90 % dos casos.
- b) A presença da deleção 1p indica melhor resposta a quimioterapia.
- c) Entre 50 e 80 % dos oligodendrogliomas apresentam deleção do braço longo do cromossomo 19 (19q).
- d) A mutação do gene P53 é característica freqüente dos oligodendrogliomas, indicando comportamento agressivo.

QUESTÃO 27

Na infância, qual dos tumores abaixo é mais freqüente:

- a) Meduloblastoma.
- b) Glioblastoma.
- c) Astrocitoma fibrilar.
- d) Carcinoma do Plexo Coróide.

QUESTÃO 28

De acordo com a classificação de tumores cerebrais da Organização Mundial de Saúde, de 2007, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Xantoastrocitoma pleomórfico é um tumor grau III.
- b) Astrocitoma gemistocítico é um tumor grau II.
- c) Gliossarcoma é um tumor grau IV.
- d) Astrocitoma subependimário de células gigantes é um tumor grau I.

QUESTÃO 29

São tumores Grau IV pela classificação de tumores cerebrais da organização mundial de saúde de 2007, **EXCETO**:

- a) Meduloblastoma.
- b) Tumor teratóide/rabdóide atípico.
- c) Carcinoma de plexo coróide.
- d) Pineoblastoma.

QUESTÃO 30

Criança com 1 ano de idade cursando com quadro de irritabilidade e aumento do perímetro cefálico. Ressonância magnética evidencia tumor de 4º ventrículo infiltrando seu assoalho com extensão para os forames de Luschka e Magendie insinuando-se até o forame magno. Lesão heterogênea em seqüência ponderada T1 e hiperintensa em seqüência ponderada T2. TC mostra micro calcificações esparsas. Qual o **diagnóstico provável** ?

- a) Teratoma.
- b) Astrocitoma pilocítico.
- c) Cisto dermóide.
- d) Ependimoma.

QUESTÃO 31

A criança da questão anterior foi submetida a tratamento cirúrgico com exérese da lesão. Sem morbidade cirúrgica. Ressonância magnética realizada no 3º dia de pós-operatório mostra resquício tumoral de cerca de 20% da lesão original. Qual a **conduta mais adequada**?

- a) Reoperação.
- b) Radioterapia.
- c) Radioterapia seguida de quimioterapia.
- d) Punção lombar para pesquisa de células neoplásicas no líquido e seguimento com ressonância magnética de 6 em 6 meses. Reoperar se houver crescimento tumoral.

QUESTÃO 32

A respeito dos gliomas difusos intrínsecos do tronco, é **CORRETO** afirmar:

- a) A radioterapia é extremamente efetiva. Não se justifica o tratamento cirúrgico a não ser para biópsia.
- b) Perfazem 50% dos gliomas do tronco e a cirurgia radical não traz qualquer benefício para estes pacientes que raramente vivem mais de 2 anos após o diagnóstico.
- c) São meduloblastomas invasivos e sua ressecção radical melhora o prognóstico dos pacientes.
- d) A quimioterapia prolonga a sobrevida em mais de 2 anos.

QUESTÃO 33

Em relação aos acessos para abordagem dos Schwannomas do vestibular, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) Na via retrossigmóide o nervo facial, se encontra oculto pelo tumor.
- b) A via pela fossa média não é um bom acesso para tumores com maior componente extracanalicular.
- c) Na via retrossigmóide deve-se abrir o meato acústico interno e o canal auditivo sempre que possível.
- d) Na via translabiríntica, o nervo facial só é visualizado após a exérese do tumor, pois se localiza posteriormente ao complexo acústico-vestibular.

QUESTÃO 34

Em relação à anatomia do nervo trigêmeo, em seu trajeto intracraniano, é **CORRETO** afirmar:

- a) Está em íntima relação com a artéria cerebelar póstero-inferior.
- b) Penetra no meato acústico interno junto com a artéria labiríntica que é ramo da AICA.
- c) O nervo facial encontra-se em posição posterior ao trigêmeo.
- d) Origina-se no sulco bulbo-pontino.

QUESTÃO 35

Em relação aos cistos epidermóides, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A obtenção de imagens de ressonância magnética em flair e difusão permitem diferenciá-los de cistos aracnóides.
- b) A radiocirurgia é uma opção para tumores pequenos.
- c) São cistos de inclusão de material ectodérmico
- d) Enquanto os cistos dermóides são tumores formados na linha média (pineal, haste hipofisária, verme cerebelar), os epidermóides são tumores laterais, ocorrendo no ângulo ponto cerebelar, região parasselar e canal espinhal.

QUESTÃO 36

Sobre os meningiomas, é **CORRETO** afirmar:

- a) Meningiomas malignos metastatizam com frequência para fora do SNC.
- b) A principal causa de morte nos meningiomas está ligada à recorrência à distância.
- c) Os meningiomas papilíferos são classificados com grau III na classificação 2007 da Organização Mundial de Saúde.
- d) Invasão do tecido cerebral não está ligada a malignidade.

QUESTÃO 37

São características dos meningiomas, aos exames de imagem, **EXCETO**:

- a) Grande nutrição por ramos da carótida interna à angiografia.
- b) "Dural tail" à ressonância magnética em seqüência ponderada T1 com gadolínio.
- c) Edema freqüente e pronunciado.
- d) Blush de início precoce e desaparecimento lento à angiografia.

QUESTÃO 38

Sobre as alterações visuais nos adenomas hipofisários, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O achado clássico é de quadrantanopsia ou hemianopsia bitemporal.
- b) O déficit visual pode ser unilateral.
- c) As alterações visuais típicas se devem a compressão do quiasma óptico.
- d) O papiledema é um achado freqüente nestes tumores.

QUESTÃO 39

A respeito dos marcadores biológicos dos tumores da região da pineal, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Alfa feto proteína elevada no líquido é classicamente associada a germinomas.
- b) A fração beta da gonadotrofina coriônica humana (β HCG) elevada no líquido é classicamente associada aos coriocarcinomas.
- c) Em cerca de 10% dos germinomas, podemos observar elevação na β HCG.
- d) A Alfa feto proteína pode estar elevada em carcinomas embrionários e teratomas.

QUESTÃO 40

Qual é a **principal indicação do tratamento radiocirúrgico** nos adenomas hipofisários?

- a) Microadenoma produtor de ACTH.
- b) Microadenoma produtor de prolactina.
- c) Resquício tumoral intra-cavernoso de macroadenoma não funcionante tratado inicialmente cirurgicamente.
- d) Microadenoma não secretor.

QUESTÃO 41

A respeito das metástases cerebrais, é **INCORRETO** afirmar:

- a) São o segundo grupo de tumores mais comuns do encéfalo em adultos, precedidos apenas pelos tumores gliais.
- b) 15 a 20 % dos pacientes que morrem de câncer têm metástase cerebral à autópsia.
- c) Em 15 % dos casos, a metástase cerebral é a apresentação inicial de um câncer.
- d) A principal rota de semeadura de metástases cerebrais é hematogênica.

QUESTÃO 42

A respeito das metástases cerebrais, é **INCORRETO** afirmar:

- a) As metástases cerebrais tendem a se localizar em topografia subcortical na junção entre substância branca e cinzenta.
- b) Metástases de melanoma respondem mal a radioterapia e quimioterapia e os pacientes têm uma sobrevida de cerca de 3 meses.
- c) Nos portadores de tumores pulmonares de pequenas células com mais de 2 anos de diagnóstico, 80 % têm metástases cerebrais.
- d) As metástases são infreqüentes nos hemisférios cerebelares.

QUESTÃO 43

Qual o sítio primário mais comum em metástases cerebrais?

- a) Carcinoma de células renais.
- b) Melanoma.
- c) Carcinoma de mama.
- d) Carcinoma de pulmão.

QUESTÃO 44

A respeito da hidrocefalia, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A estenose do aqueduto é um exemplo de hidrocefalia comunicante.
- b) O olhar de sol poente é devido à disfunção tectal.
- c) As hidrocefalias neonatais manifestam-se inicialmente por vômitos e sonolência.
- d) A distensão venosa cutânea no escalpo, vista na hidrocefalia do lactente é conhecida como sinal de Mc Ewen.

QUESTÃO 45

Quanto ao sinus dérmico, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O sinus dérmico se manifesta comumente com meningite de repetição.
- b) Em crianças que não apresentaram meningite, o tratamento cirúrgico é de cunho estético.
- c) Um diagnóstico diferencial importante é com cisto pilonidal.
- d) O objetivo básico da cirurgia é corrigir a fístula entre o espaço intradural e a pele.

QUESTÃO 46

A síndrome da epilepsia mesial do lobo temporal é uma das principais formas de epilepsia refratária com indicação cirúrgica. São elementos característicos da epilepsia mesial do lobo temporal, **EXCETO**:

- a) Crises febris complicadas antes dos 5 anos de idade.
- b) História familiar de epilepsia.
- c) Crises secundariamente generalizadas são freqüentes.
- d) Auras isoladas são freqüentes.

QUESTÃO 47

Quanto à compressão medular metastática em pediatria, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) Não há indicação cirúrgica após 12 horas de déficit motor completo instalado pela incapacidade de recuperação funcional.
- b) Ocorre em cerca de 3 a 5 % das crianças com neoplasias.
- c) Pode ocorrer em qualquer neoplasia, sendo mais freqüente em neuroblastomas e sarcomas.
- d) Na grande maioria dos casos, o sintoma inicial é dor vertebral ou irradiada.

QUESTÃO 48

Quanto à hidrocefalia crônica do idoso (hidrocefalia de pressão normal) é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) O distúrbio de marcha normalmente é o sintoma inicial.
- b) A incontinência urinária se manifesta principalmente por urgência urinária.
- c) As punções líquóricas de alívio têm bom valor preditivo positivo, mas têm baixa especificidade.
- d) A demência avançada responde bem ao tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 49

Quanto ao uso de Metilprednolona (Solumedrol) no trauma raquimedular é **CORRETO** afirmar:

- a) Deve ser utilizado em crianças a partir de 5 anos.
- b) Após bolus inicial de 30 mg/kg mantém-se 8,4 mg/kg por hora por 24 horas.
- c) Estudos recentes questionam a real indicação do tratamento e tornaram a adoção deste protocolo motivo de controvérsia.
- d) Os efeitos colaterais do tratamento são desprezíveis.

QUESTÃO 50

Sobre as lesões expansivas da fossa posterior é **CORRETO** afirmar que:

- a) O hemangioblastoma é o tumor mais comum na fossa posterior em adultos.
- b) As metástases são mais freqüentes que os gliomas em adultos.
- c) O tumor mais comum em crianças é o glioma de tronco.
- d) No tratamento dos meduloblastomas, a radioterapia só é indicada em recidivas.

QUESTÃO 51

Sobre as hidrocefalias é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) As malformações do sistema nervoso central são a principal causa de hidrocefalia adquirida.
- b) A terceira ventriculostomia endoscópica é indicada nas hidrocefalias não comunicantes do adulto.
- c) O sinal de Parinaud indica lesão tectal.
- d) A derivação ventrículo peritoneal tem elevada taxa de complicação a longo prazo.

QUESTÃO 52

Sobre as lesões traumáticas do complexo C1-C2 é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) As fraturas isoladas de C1 raramente cursam com déficits neurológicos.
- b) A maior parte das fraturas isoladas de C1 são do arco posterior.
- c) Entre as fraturas do odontóide, a que encontra maior indicação cirúrgica é a do tipo III.
- d) Das fraturas do odontóide, a mais comum é a do tipo II.

QUESTÃO 53

Paciente vítima de TCE após acidente automobilístico apresenta o seguinte exame à admissão em serviço de urgência: sonolento, abertura ocular ao chamado, localiza estímulo doloroso prontamente, responde ao estímulo com palavras inapropriadas. Qual a sua classificação na escala de coma de Glasgow?

- a) 10
- b) 9
- c) 11
- d) 12

QUESTÃO 54

Sobre as cirurgias descompressivas, é **CORRETO** afirmar:

- a) Deve preferencialmente ser realizada antes que a PIC atinja valores de 20 mmhg apesar do tratamento instituído.
- b) A craniectomia fronto-temporo-parietal é o procedimento de escolha no swelling hemisférico com hipertensão intracraniana refratária.
- c) São indicadas no manejo inicial do TCE grave como forma de evitar aumentos da PIC.
- d) A descompressão temporal basal não necessariamente necessita ser feita quando do edema hemisférico.

QUESTÃO 55

Quanto à neuralgia do trigêmeo, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A artéria mais comumente envolvida na compressão neurovascular do trigêmeo é a cerebelosa superior.
- b) É mais freqüente em mulheres.
- c) O acometimento simultâneo das divisões V2 e V3 do trigêmeo é a apresentação mais comum.
- d) Cerca de 10 % dos portadores de esclerose múltipla apresentam neuralgia do trigêmeo.

QUESTÃO 56

Quanto aos abscessos cerebrais, é **CORRETO** afirmar:

- a) São mais comuns em homens.
- b) No estágio de cerebrites, a ressonância magnética mostra a lesão hiperintensa nos tempos de relaxamento T1 e T2.
- c) Abscessos em proximidade com os ventrículos têm melhor prognóstico.
- d) A punção lombar quando não contra-indicada por hipertensão intracraniana tem papel importante no diagnóstico do abscesso cerebral e sua etiologia.

QUESTÃO 57

São indicações de cirurgia nos traumas raqui-medulares por projétil de arma de fogo, **EXCETO**:

- a) Fístula liquórica.
- b) Lesão de cauda eqüina com compressão radicular.
- c) Deterioração neurológica progressiva.
- d) Lesão medular completa cervical recente.

QUESTÃO 58

Paciente de 45 anos do sexo feminino apresenta quadro súbito de cefaléia e perda da consciência. Encaminhada a um serviço de urgência tem o seguinte exame à admissão: Sonolenta, confusa, desorientada, abertura ocular ao chamado, queixa cefaléia intensa, atende aos comandos verbais, sem déficit motor. Tomografia de crânio mostrou hemorragia subaracnóidea difusa, pior em vale Silvano D associada à hematoma temporal D. Qual a classificação à escala de Fischer para hemorragia ?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 1

QUESTÃO 59

Ainda com relação à paciente da questão anterior, qual a sua classificação à escala de Hunt-Hess?

- a) 3
- b) 4
- c) 2
- d) 5

QUESTÃO 60

Em relação ao meduloblastoma, é **CORRETO** afirmar:

- a) Em adultos, predomina no espaço supra tentorial.
- b) É o tumor encefálico primário mais comum em crianças.
- c) Não é radiosensível.
- d) Crianças abaixo de 2 anos têm melhor prognóstico.

QUESTÃO 61

Com relação aos traumas raque medulares cervicais com lesão medular completa, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O tratamento cirúrgico de urgência não melhora o prognóstico.
- b) A cirurgia permite mobilização precoce e redução da morbidade.
- c) A fusão da fratura pode ser obtida sem tratamento cirúrgico.
- d) O tratamento cirúrgico traz melhora motora em até 20 % dos casos.

QUESTÃO 62

Paciente se apresenta com quadro de lombociatalgia esquerda em face póstero-lateral de coxa e perna. Reflexo aquiliano abolido à esquerda. Lassègue 15° à esquerda. Ressonância magnética evidencia hérnia discal. Qual o **nível provável** desta hérnia?

- a) L5-S1 extra foraminal.
- b) L4-L5 médio lateral.
- c) L5-S1 médio lateral.
- d) L4-L5 extra foraminal.

QUESTÃO 63

Sobre as hérnias discais lombares, é **correto** afirmar, **EXCETO**:

- a) Em uma hérnia mediolateral L5-S1 normalmente temos compressão da raiz S1.
- b) O reflexo patelar está associado à raiz L5.
- c) As hérnias L5-S1 são as mais freqüentes.
- d) As hérnias extra-foraminais são mais freqüentes no segmento L4-L5.

QUESTÃO 64

Sobre as hérnias discais cervicais, é **CORRETO** afirmar:

- a) São mais comuns no segmento C6-C7.
- b) Cerca de 50 % dos pacientes com radiculopatia por hérnia discal cervical necessitarão de tratamento cirúrgico.
- c) Nas hérnias C7-T1 laterais temos normalmente acometimento da raiz T1.
- d) As hérnias medianas com mielopatia são mais facilmente tratadas por via posterior.

QUESTÃO 65

Assinale a alternativa **INCORRETA** a respeito da síndrome de Crouzon:

- a) É a mais freqüente das craniossinostoses sindrômicas.
- b) Tem herança autossômica dominante.
- c) Está associada a malformação facial e obstrução de vias aéreas.
- d) Cursa com déficit mental grave.

QUESTÃO 66

Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre as craniossinostoses sindrômicas.

- a) Na síndrome de Apert, o retardo mental é freqüente.
- b) Na síndrome de Saethre-Chotzen, normalmente encontramos déficit mental leve.
- c) Na síndrome de Crouzon, são freqüentes as sindactilias.
- d) A síndrome de Pfeiffer, está associada a déficit auditivo.

QUESTÃO 67

Em relação à localização dos hematomas intracerebrais espontâneos, assinale a opção **INCORRETA**:

- a) Os hematomas cerebelares perfazem cerca de 10% do total.
- b) Os hematomas pontinos perfazem cerca de 15% do total.
- c) Os hematomas lobares perfazem cerca de 35 % do total.
- d) Os hematomas de tálamo e gânglios da base perfazem cerca de 50% do total.

QUESTÃO 68

Quanto às estenoses carotidianas, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Mulheres tabagistas têm pior resultado cirúrgico.
- b) O uso de dispositivos de proteção anti-embolia melhora de maneira significativa o resultado do tratamento endovascular.
- c) Após oclusão completa da carótida, a angioplastia percutânea não está indicada, sendo proposta a endarterectomia.
- d) O tratamento cirúrgico ainda é de primeira escolha.

QUESTÃO 69

Paciente de 30 anos com crises convulsivas. Propedêutica evidencia malformação arteriovenosa (MAV) temporal interna D com cerca de 4 cm, drenando para a veia de Labbé. Qual a classificação pela escala de Spetzler-Martin?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 2

QUESTÃO 70

Quanto à história natural das Malformações Ateriovenosas (MAVs) Sintomáticas, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O intervalo médio para o ressangramento após hemorragia inicial é de 2 anos.
- b) O índice de sangramento é de 4 % ao ano.
- c) 50 % da mortalidade é por hemorragia.
- d) A mortalidade é de 1 % ao ano.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.