

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.**

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -  
Núcleo comum**

**QUESTÃO 01**

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

**QUESTÃO 02**

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

**QUESTÃO 03**

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

**QUESTÃO 04**

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

**QUESTÃO 05**

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

**QUESTÃO 06**

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

**QUESTÃO 07**

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

**QUESTÃO 08**

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilactóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

**QUESTÃO 09**

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

**QUESTÃO 10**

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

**QUESTÃO 11**

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

**QUESTÃO 12**

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

**QUESTÃO 13**

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

**QUESTÃO 14**

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

**QUESTÃO 15**

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

**QUESTÃO 16**

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

**QUESTÃO 17**

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

**QUESTÃO 18**

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

**QUESTÃO 19**

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

**QUESTÃO 20**

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**  
**Pediatria**

**QUESTÃO 21**

São contra-indicações à administração da vacina MMR, **EXCETO**:

- a) Teste do PPD positivo.
- b) Gravidez.
- c) Reação Alérgica grave.
- d) Terapia imunossupressiva prolongada.

**QUESTÃO 22**

Em relação ao tratamento das queimaduras graves, todas são verdadeiras, **EXCETO**:

- a) O uso do gelo sobre a queimadura ajuda a diminuir a profundidade da lesão e diminui a intensidade da dor.
- b) Nas queimaduras extensas, é importante evitar a administração excessiva de líquidos para reduzir a formação de edema nas áreas queimadas.
- c) As queimaduras de terceiro grau são mais profundas e muito mais dolorosas que as de segundo grau.
- d) Curativos diários com sulfadiazina de prata a 1% estão indicados nas queimaduras de segundo e terceiro graus, mas o tratamento cirúrgico é essencial nos casos de queimaduras de terceiro grau.

**QUESTÃO 23**

São complicações da insuficiência renal crônica, **EXCETO**:

- a) Osteodistrofias.
- b) Miocardiopatia.
- c) Hipotensão grave.
- d) Disfunção plaquetária.

**QUESTÃO 24**

A definição de miliária é:

- a) Mancha de coloração arroxeadada em região sacral e nádegas.
- b) Pápula branca, perolada de um a dois centímetros, aparecendo com freqüência na face.
- c) Lesão eritematosa, maculo-papular, caráter migratório, desaparece espontaneamente.
- d) Lesão eritematosa, papulovesiculoso, causado pelo aumento de secreção das glândulas sudoríparas.

**QUESTÃO 25**

São complicações da cetoacidose diabética, **EXCETO**:

- a) Edema cerebral.
- b) Insuficiência cardíaca congestiva.
- c) Coma hiperosmolar não cetótico.
- d) Pseudo abdômen agudo.

**QUESTÃO 26**

São considerações verdadeiras no que concerne às infecções de vias aéreas superiores, **EXCETO**:

- a) A "Febre Faringoconjuntival" caracteriza-se por febre alta por 4-5 dias, conjuntivite, rinite, faringite, dor na garganta e linfadenopatia cervical.
- b) Os seios maxilares são os únicos presentes ao nascimento.
- c) A rinorréia seossanguinolenta pode ter como causa a sífilis congênita precoce.
- d) O controle de cura da sinusite bacteriana é feito com a realização de uma radiografia de seios da face após 15 dias do uso de antibióticos.

**QUESTÃO 27**

É a estratégia medicamentosa mais adequada para analgesia em ordem:

- a) Uso de dipirona, tenoxicam, tramadol e morfina.
- b) Uso de paracetamol, tramadol e fentanil.
- c) Uso de tenoxicam, quetamina e bloqueio epidural.
- d) Uso de dipirona, paracetamol e alfentanil.

**QUESTÃO 28**

São causas de apnéia no recém-nascido, **EXCETO**:

- a) Hiperglicemia.
- b) Asfixia perinatal.
- c) Persistência de canal arterial.
- d) Anemia.

**QUESTÃO 29**

A coagulação intravascular disseminada é representada pelas seguintes alterações laboratoriais, **EXCETO**:

- a) Trombocitopenia.
- b) Redução do Fibrinogênio.
- c) Dímero D reduzido.
- d) Aumento dos Tempos de protrombina e parcial de tromboplastina.

**QUESTÃO 30**

Todas são corretas em relação aos distúrbios metabólicos do recém-nascido, **EXCETO**:

- a) Um aporte hídrico excessivo pode produzir hiponatremia e um aporte insuficiente leva a hipernatremia.
- b) Por ser uma complicação comum, a hipercalemia deve ser monitorizada e o aporte de cálcio ajustado.
- c) O aporte excessivo de cálcio leva a hipofosfatemia.
- d) O aporte inicial de glicose deve tolerar a glicemia idealmente entre 50 e 100 mg/dl.

**QUESTÃO 31**

Sobre a prematuridade, todas as afirmativas estão corretas, **EXCETO**:

- a) O enfisema intersticial está relacionado a pressões excessivas de ventilação, e com pneumonia congênita.
- b) Na diferenciação da apnéia, é importante avaliar se esta é central, obstrutiva ou mista.
- c) A hemorragia intracraniana pode ser um evento agudo grave e rapidamente fatal.
- d) Na retinopatia da prematuridade, a hiperoxemia determina lesão da retina por efeito direto do oxigênio.

**QUESTÃO 32**

São afirmativas corretas relacionadas à sepse neonatal precoce, **EXCETO**:

- a) Tem predomínio por um quadro abdominal.
- b) Estão entre os principais fatores de risco: a ruptura precoce de membranas maior que 24h, febre materna maior que 38° C no trabalho de parto e sinais de corioamnionite.
- c) Em cerca de 30% dos recém-nascidos, não existem fatores de risco.
- d) O diagnóstico diferencial é feito com cardiopatias congênicas cianogênicas.

**QUESTÃO 33**

São afirmativas corretas relacionadas à sepse neonatal tardia, **EXCETO**:

- a) A acidose normalmente é mais grave do que a acidose na sepse precoce.
- b) O diagnóstico diferencial pode ser feito com a persistência do canal arterial.
- c) O agente fúngico mais comum é o aspergillus em torno de 12% dos casos com 30% de mortalidade.
- d) A meningite ocorre em até 80% dos casos.

**QUESTÃO 34**

Sobre as TORCHS, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A toxoplasmose congênita geralmente se manifesta com febre, microcefalia, hepatoesplenomegalia, icterícia convulsões e calcificações cerebrais.
- b) Na citomegalovirose congênita pode ser observado como achados laboratoriais comuns a anemia, a trombocitopenia, a hiperbilirrubinemia e níveis aumentados de aminotransferases.
- c) A rubéola congênita tem por anormalidades mais comuns o retardo do crescimento, anomalias cardíacas, surdez, catarata, glaucoma, bem como encefalite crônica.
- d) A coriorretinite por toxoplasmose congênita é normalmente unilateral.

**QUESTÃO 35**

Sobre a insuficiência renal aguda é correto afirmar , **EXCETO**:

- a) A necrose tubular aguda é causa de insuficiência renal aguda.
- b) Os sinais mais comuns são oligúria ou anúria seguidos de edema e congestão.
- c) A válvula de uretra posterior é uma causa de insuficiência renal por alteração pré-renal.
- d) A uremia grave, normalmente acima de 200 mg/dl, pode ser indicação de diálise peritoneal.

**QUESTÃO 36**

Sobre os distúrbios ácidos básicos é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) São manifestações clínicas da acidose metabólica a taquipnéia, a hiperpnéia e a depressão miocárdica.
- b) O tratamento da acidose respiratória é feito única e exclusivamente com o tratamento da insuficiência respiratória.
- c) Dentre as causas de alcalose metabólica, podem-se citar a ingestão excessiva de bicarbonato, exsanguineotransfusão, diuréticos e hiperaldosteronismo primário.
- d) A alcalose respiratória tem por manifestação clínica uma vasoconstrição sistêmica e cerebral, cefaléia, confusão, parestesias e opressão torácica.

**QUESTÃO 37**

Sobre a hipopotassemia é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O tratamento é feito única e exclusivamente com a reposição de potássio.
- b) As causas mais freqüentes são vômitos repetidos, uso crônico de furosemida, cetoacidose diabética e insuficiência renal crônica.
- c) As manifestações clínicas são fraqueza muscular, hipotonia, paralisia, hiporreflexia, náuseas, vômitos e distensão abdominal dentre outros.
- d) O eletrocardiograma pode demonstrar bloqueio átrio-ventricular e a onda T achatada.

**QUESTÃO 38**

Sobre a hiperpotassemia, é correto afirmar **EXCETO**:

- a) O erro laboratorial por hemólise é freqüente.
- b) Em geral os pacientes são assintomáticos.
- c) O eletrocardiograma pode demonstrar ondas T altas, simétricas e QRS alargados.
- d) O uso de bolo de cálcio pode ser repetido várias vezes, mesmo em pacientes com hiperfosfatemia.

**QUESTÃO 39**

São manifestações clínicas da insuficiência cardíaca por congestão venosa sistêmica, **EXCETO**:

- a) Hepatomegalia.
- b) Ascite.
- c) Oligúria.
- d) Ingurgitamento jugular.

**QUESTÃO 40**

Com relação à diarreia todas estão corretas, **EXCETO**:

- a) O quadro clínico é definido pelas características das fezes e frequência das evacuações.
- b) A diarreia por má absorção normalmente se manifesta por esteatorreia, fezes pálidas, fétidas e com alimentos mal digeridos.
- c) A diarreia persistente é o prolongamento do quadro diarreico por mais de 14 dias, acompanhado de instabilidade hemodinâmica.
- d) Os exames laboratoriais são quase sempre úteis nos casos agudos, pois revelam a etiologia.

**QUESTÃO 41**

Sobre o refluxo gastro-esofágico, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O tratamento cirúrgico deve ser indicado apenas nos casos refratários.
- b) As manifestações sugestivas mais frequentes são: regurgitações e vômitos frequentes, atraso de crescimento e dificuldade em ganhar peso, dor esofágica com choro frequente e crises de engasgo.
- c) O REED é importante em afastar outras doenças como hérnia hiatal, acalasia, estenose de esôfago, de piloro, de duodeno e má-rotação.
- d) O diagnóstico diferencial se faz com infecção urinária, hipertensão intracraniana e alergia leite de vaca.

**QUESTÃO 42**

Sobre as convulsões, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Trata-se de uma alteração paroxística da atividade motora, limitada no tempo, com ou sem alteração da consciência.
- b) O eletroencefalograma é alterado em quase todos os pacientes com epilepsia.
- c) Nos casos ambulatoriais, a suspeita se baseia na descrição do episódio.
- d) São fatores desencadeantes: uso de álcool, foto-estimulação, hiperventilação.

**QUESTÃO 43**

Sobre as pneumonias bacterianas, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Manifesta-se por febre, prostração, taquipnéia e esforço respiratório.
- b) A tomografia computadorizada de tórax nunca é necessária.
- c) O pneumococo é o agente etiológico mais comum em todas as idades, exceto no período neonatal.
- d) O raio X de tórax é o exame mais importante para confirmar uma suspeita de pneumonia.

**QUESTÃO 44**

Sobre as complicações das pneumonias, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O empiema deve ser drenado em selo d'água.
- b) Os derrames parapneumônicos pequenos podem ser drenados com agulha.
- c) Não existe possibilidade de infecções metastáticas.
- d) Nos casos de derrames loculados pode ser necessário torocoscopia.

**QUESTÃO 45**

Sobre as doenças exantemáticas, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A história clínica epidemiológica é o principal item no diagnóstico diferencial
- b) O sarampo tem uma progressão clínica bastante característica.
- c) Na rubéola em sua fase prodômica, são os gânglios linfáticos retro-auriculares, cervicais posteriores e sub-occipitais que se encontram enfiados e dolorosos.
- d) O contágio da varicela-zóster é feito somente pelas vesículas.

**QUESTÃO 46**

Sobre a anorexia é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O tratamento, uma vez realizado, não determina recaídas da doença.
- b) A anorexia nervosa é um distúrbio psiquiátrico caracterizado pela redução drástica da ingestão de alimentos.
- c) O diagnóstico é 100% clínico.
- d) Dentre as complicações observa-se desnutrição grave, elevação do colesterol, gastrite, úlceras, desidratação, desmaios freqüentes e arritmia cardíaca.

**QUESTÃO 47**

Sobre o crescimento é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O acompanhamento do peso, estatura e perímetro cefálico é uma ação básica de saúde de grande impacto.
- b) As referências de normalidade são as curvas de percentil.
- c) O acompanhamento sistematizado do crescimento permite detectar doenças nutricionais, mas não tem impacto no diagnóstico de disfunções cardíacas, por exemplo.
- d) O perímetro cefálico é acompanhado sistematicamente nos primeiros dois ou três anos de vida.

**QUESTÃO 48**

Sobre o desenvolvimento infantil, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O desenvolvimento é um processo de aprendizado que envolve memória, linguagem, visão, coordenação motora, pensamento, interação com pessoas e objetos, reconhecimento de sons e vozes.
- b) No primeiro mês já ocorre o controle do pescoço, tenta atingir um brinquedo colocado na sua frente e volta-se para o som quando houve uma voz.
- c) A progressão do desenvolvimento é feito por testes que devem primeiramente ser usados como triagem.
- d) Um atraso de duas tarefas do mesmo setor ou de setores diferentes chama a atenção para um possível atraso real do desenvolvimento infantil.

**QUESTÃO 49**

Sobre a asma brônquica é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A sintomatologia da crise de asma tende a piorar no início da manhã.
- b) Tem por fatores de risco a bronquiolite anterior grave por vírus sincicial respiratório, história familiar positiva, prematuridade, baixo peso ao nascer e exposição à fumaça de cigarro.
- c) Trata-se de uma doença crônica comum caracterizada por crises reversíveis de broncoespasmo.
- d) A crise se manifesta por tosse seca, curta e irritativa, bastante característica, seguida de dispnéia, chiado e sibilos (predominantemente expiratórios).

**QUESTÃO 50**

Sobre a asma brônquica, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O diagnóstico diferencial nos primeiros meses é principalmente com bronquiolite.
- b) A aspiração de corpo estranho pode mimetizar uma crise de asma.
- c) O raio X pode mostrar complicações como por exemplo atelectasias e pneumotórax.
- d) Os exames complementares são necessários para determinar a gravidade da crise.

**QUESTÃO 51**

Sobre a hiponatremia é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A fração excretada de sódio auxilia na diferenciação de distúrbio hidroeletrólítico renal e pré-renal.
- b) A pseudo-hiponatremia é causada por hiperlipidemia extrema, hiperproteinemia ou uso de manitol.
- c) As manifestações clínicas são fadiga, fraqueza, letargia, náuseas, vômitos, câimbras.
- d) A queda dos níveis de sódio não influi na sintomatologia.

**QUESTÃO 52**

Sobre a hipernatremia é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O excesso do aporte de sódio pode ocorrer por infusão de bicarbonato para correção de acidose, quase afogamento em água salgada, uso excessivo de sódio na dieta.
- b) Nunca se deve usar água livre ou furosemida no tratamento.
- c) Dentre as complicações, a hemorragia cerebral é a mais temível.
- d) As manifestações clínicas na maioria das vezes são assintomáticas.

**QUESTÃO 53**

Sobre a insuficiência renal crônica, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Trata-se de uma disfunção renal irreversível.
- b) A classificação é feita a partir do clearance de creatinina.
- c) Dentre as alterações laboratoriais, a alcalose respiratória é um marcador importante.
- d) Os sinais de alerta de doença renal são edema, hipertensão, hematúria macroscópica.

**QUESTÃO 54**

Todas são complicações da insuficiência renal crônica, **EXCETO**:

- a) Tendência à trombose.
- b) Osteodistrofia.
- c) Infecção.
- d) Pericardite.

**QUESTÃO 55**

Sobre a saúde bucal e higiene oral, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A erupção dentária não tem uma data específica de acontecer, mas sim um intervalo de tempo.
- b) A cárie poderá ser evitada modificando-se o hábito alimentar da criança e cuidando da higiene oral.
- c) Os restos alimentares, inclusive do leite materno, depositam-se sobre a gengiva formando a placa bacteriana.
- d) Mesmo antes da erupção do primeiro dente poderá ser utilizada uma escova dental macia com o uso de qualquer dentífrico

**QUESTÃO 56**

Sobre o tratamento das infecções de vias aéreas superiores, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Na otite média aguda, a melhora da sintomatologia pode ocorrer até depois de 72 h de tratamento.
- b) Na laringite, o uso de dexametasona resulta em melhora clínica dos pacientes, reduzindo a necessidade de internação.
- c) No resfriado comum, são contra-indicados os medicamentos antitussígenos, mucolíticos e vasoconstritores nasais sistêmicos ou tópicos.
- d) Na epiglote, deve-se encaminhar o paciente rapidamente ao hospital, pois o mais importante é garantir a permeabilidade das vias aéreas.

**QUESTÃO 57**

Sobre a anemia na infância, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) É relacionada à presença de parasitoses intestinais, comumente associadas à anemia ferropriva. A deficiência de ferro é a carência nutricional mais comum e a causa mais freqüente de anemia em todo o mundo.
- b) A plaquetopenia e eosinopenia são achados freqüentes no hemograma de pacientes com anemia ferropriva.
- c) São fatores de risco: prematuros e recém-nascidos de baixo peso; lactentes a termo em aleitamento artificial; lactentes em aleitamento materno por mais de seis meses, sem aporte adequado de ferro dietético; adolescentes de ambos os sexos; gestantes e nutrízes; crianças com quadros diarréicos freqüentes e prolongados e com infestação parasitária.
- d) Os sintomas apresentados são palidez, irritabilidade, anorexia, falta de interesse, falta de atenção, perversão do apetite.

**QUESTÃO 58**

São indicações de ventilação por pressão positiva na sala de parto, **EXCETO**:

- a) Apnéia ou Gasping.
- b) FC < 100 bpm, mesmo se o bebê estiver respirando.
- c) Presença de movimentos respiratórios com esforço subdiafragmático.
- d) Cianose central persistente apesar de O<sub>2</sub> inalatório.

**QUESTÃO 59**

No que concerne à massagem cardíaca na sala de parto, todas são corretas, **EXCETO**:

- a) A pressão de compressão deve ser feita no terço médio do esterno.
- b) Pode ser utilizada a técnica dos polegares (preferível) ou dos dois dedos (aceitável).
- c) FC < 60 bpm após 30 segundos de efetiva ventilação com pressão positiva com O<sub>2</sub> a 100%.
- d) A ventilação e a massagem cardíaca devem estar bem coordenadas.

**QUESTÃO 60**

Sobre a síndrome hipóxico-isquêmica todas são corretas, **EXCETO**:

- a) É a maior causa de mortalidade perinatal e seqüelas incapacitantes nos sobreviventes.
- b) Nas crianças sobreviventes, nunca haverá qualquer restabelecimento parcial no decorrer de dias ou semanas após o episódio asfíxico.
- c) O diagnóstico baseia-se em: dados da história perinatal: presença de fator perinatal que leva a hipóxia, hipoperfusão tissular no pré-natal, parto e período neonatal; manifestações clínicas de disfunção de múltiplos órgãos; manifestações neurológicas incluindo convulsões, hipotonia e coma.
- d) O objetivo terapêutico principal é reverter o processo asfíxico prevenindo lesões permanentes.

**QUESTÃO 61**

Sobre os distúrbios do metabolismo do magnésio todas são corretas, **EXCETO**:

- a) No tratamento, se os sintomas da hipermagnesemia são graves, pode-se utilizar da infusão endovenosa de cálcio.
- b) A hipermagnesemia é um evento de causa desconhecida na quase totalidade das vezes.
- c) O transporte de magnésio da mãe para o feto é afetado por hipomagnesemia materna e por insuficiência placentária.
- d) A hipomagnesemia normalmente é assintomática, mas pode se manifestar por apresentar manifestações neurológicas (hiperreflexia, tetania e convulsões generalizadas ou focais) e cardiovasculares (hipertensão arterial e alterações eletrocardiográficas).

**QUESTÃO 62**

Sobre a insuficiência renal aguda, todas são corretas, **EXCETO**:

- a) Os níveis normais de creatinina aumentam com a idade e podem ser estimados pela estatura.
- b) Os níveis de uréia são influenciados por dieta rica em proteínas, corticoterapia, tetraciclina e degradação de proteínas endógenas.
- c) A biópsia renal geralmente não é realizada.
- d) A anemia da insuficiência renal aguda atinge níveis mais baixos do que a anemia da insuficiência renal crônica, uma vez que a primeira é decorrente de um quadro dilucional.

**QUESTÃO 63**

Sobre a insuficiência renal crônica, todas são corretas, **EXCETO**:

- a) Nos casos graves, deve se utilizar uma restrição hídrica, bem como de sódio devido a hipertensão, congestão e insuficiência cardíaca.
- b) Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são preferidos nos casos de proteinúria.
- c) Nos casos graves e refratários de hipertensão arterial, passa a ser a alternativa o uso de hidralazina.
- d) Os pacientes com baixa estatura podem ser beneficiados com o uso de hormônio recombinante de crescimento.

**QUESTÃO 64**

São sinais de alerta da forma grave da dengue, **EXCETO**:

- a) Exantema maculopapular e pruriginoso.
- b) Sinais de derrame pleural
- c) Hipotensão arterial
- d) Hepatomegalia volumosa e dolorosa

**QUESTÃO 65**

Sobre o calazar, todas são corretas, **EXCETO**:

- a) Trata-se de uma doença sistêmica e potencialmente fatal se não tratada.
- b) O diagnóstico diferencial se faz com leucemias, linfomas, mononucleose, toxoplasmose e endocardite, por exemplo.
- c) Os antimoniais pentavalentes são mais eficazes que a anfotericina na destruição parasitária.
- d) Deve ser suspeitada, quando o hemograma demonstra anemia, neutropenia, eosinopenia e plaquetopenia.

**QUESTÃO 66**

Sobre o tratamento das pneumonias, todas são corretas, **EXCETO**:

- a) Nos casos mais graves geralmente é necessária a correção de acidose, desidratação e distúrbios hidroeletrólíticos.
- b) Os broncodilatadores devem ser sempre utilizados, uma vez que a pneumonia sempre leva a broncoespasmo.
- c) A oxigenioterapia deve ser sempre utilizada se existe esforço respiratório significativo, antes mesmo que apareça a cianose.
- d) A antibioticoterapia inicial varia com a faixa etária do paciente.

**QUESTÃO 67**

Sobre a infecção urinária, todas são corretas, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são sexo feminino, esvaziamento vesical incompleto, constipação intestinal e oxiuríase, por exemplos.
- b) Na idade pré-escolar são comuns as queixas urinárias como disúria, urgência, polaciúria, incontinência, urina com mal-cheiro, náusea e dor abdominal.
- c) A infecção urinária só pode ser suspeitada ou afastada com exames de urina rotina e cultura.
- d) Os casos de cistite hemorrágica são sempre associados ao uso de medicamentos para tratamento da infecção.

**QUESTÃO 68**

Sobre a infecção urinária todas são corretas, **EXCETO**:

- a) Os casos de pielonefrite normalmente cursam com leucocitose, neutrofilia e desvio para a esquerda.
- b) Nos pacientes com distúrbios urológicos documentados, a profilaxia é essencial.
- c) A propedêutica inicial se faz com uma ultra-sonografia.
- d) Nos casos em que não há piúria, pode-se descartar a hipótese de infecção urinária.

**QUESTÃO 69**

Sobre o tratamento de manutenção na epilepsia, todas são corretas, **EXCETO**:

- a) Iniciar sempre com monoterapia e ir ajustando a dose.
- b) A suspensão de tratamento pode ser cogitada após seis meses sem crise.
- c) Se for retirada a droga, deve ser feita de forma gradativa devido ao risco de precipitar convulsão.
- d) Algumas associações de anticonvulsivante podem precipitar crises de ausência.

**QUESTÃO 70**

Sobre a acidose metabólica, todas são corretas, **EXCETO**:

- a) A correção do distúrbio está associada a hiperpotassemia.
- b) Ela tem por causa a perda de bicarbonato, o excesso de ácidos e redução da excreção ácida.
- c) A gasometria é o exame mais importante.
- d) Abaixo do pH 7 pode ocorrer letargia e coma.

**ATENÇÃO:**

**COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:**

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:  
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. Saúde Pública [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.