

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -
Núcleo comum**

QUESTÃO 01

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

QUESTÃO 02

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

QUESTÃO 03

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

QUESTÃO 04

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

QUESTÃO 07

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

QUESTÃO 08

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

QUESTÃO 11

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

QUESTÃO 12

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

QUESTÃO 13

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

QUESTÃO 14

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

QUESTÃO 15

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

QUESTÃO 17

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

QUESTÃO 18

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

QUESTÃO 20

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Psiquiatria

QUESTÃO 21

São fatores de risco para o *Delirium*, **EXCETO**:

- a) Sexo feminino.
- b) Idade avançada.
- c) Lesões cerebrais preexistentes.
- d) Dependência de álcool.

QUESTÃO 22

Os critérios diagnósticos do DSM-IV-TR para *Transtorno dissociativo de identidade* incluem, **EXCETO**:

- a) Uma dessas identidades assume de forma recorrente o controle do comportamento do indivíduo.
- b) Presença de duas ou mais identidades ou estados de personalidade distintos.
- c) Incapacidade de recordar informações pessoais importantes, demasiadamente extensa para ser explicada pelo esquecimento comum.
- d) A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância.

QUESTÃO 23

O suicídio é uma das principais causas de mortalidade entre pessoas que sofrem de esquizofrenia. Estima-se que a porcentagem de pacientes esquizofrênicos que podem morrer devido a uma tentativa de suicídio é de: Marque a opção **CORRETA**:

- a) 25%.
- b) 1%.
- c) 15%.
- d) 33%.

QUESTÃO 24

Em relação às neuroimagens na psiquiatria, pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) A tomografia cerebral permite a avaliação de lesões estruturais.
- b) A Ressonância Magnética Cerebral distingue a substância branca da cinzenta melhor que a TC e permite a visualização de lesões cerebrais menores.
- c) As neuroimagens funcionais PET e SPECT possibilitaram visualizações inéditas do SNC.
- d) A solicitação de neuroimagem deve ser feita nos casos de psicose crônica.

QUESTÃO 25

Em relação ao terror noturno, é **CORRETO** afirmar que:

- a) Ocorre no segundo terço da noite.
- b) Trata-se de um despertar durante o sono NREM (estágios 3 e 4).
- c) Episódios isolados são raros em crianças.
- d) Registros poligráficos são distintos aos de sonambulismo.

QUESTÃO 26

Os diagnósticos abaixo são classificados na categoria de Transtornos específicos de personalidade da CID-10, **EXCETO**:

- a) Transtorno de personalidade esquizóide.
- b) Transtorno de personalidade decorrente de lesão cerebral.
- c) Transtorno de personalidade anti-social.
- d) Transtorno de personalidade ansiosa.

QUESTÃO 27

Quanto ao transtorno Bipolar é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A maioria desses transtornos tende a ser recorrente.
- b) O início dos episódios é frequentemente relacionado com eventos estressantes.
- c) A perturbação fundamental é uma alteração do humor ou afeto.
- d) O termo hipomania é usado para denotar um estado intermediário, entre os extremos de mania e depressão, com delírios e alucinações.

QUESTÃO 28

Numere a **coluna II** de acordo com a **coluna I**, associando corretamente cada termo ao seu significado psicopatológico:

COLUNA I	COLUNA II
1. Hipermnésia	() Perda de elementos mnêmicos focais.
2. Amnésia orgânica	() Acréscimo de elementos falsos a um núcleo verdadeiro de memória.
3. Amnésia psicogênica	() Segue, de modo geral, a Lei de Ribot.
4. Ilusões mnêmicas	() As representações ganham em número e perdem em clareza.
5. Fabulações	() Elementos da imaginação completam as lacunas de memória.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) (3) (4) (2) (1) (5)
- b) (5) (1) (2) (4) (3)
- c) (3) (5) (2) (1) (4)
- d) (1) (2) (5) (3) (4)

QUESTÃO 29

São diretrizes para um tratamento farmacológico adequado, **EXCETO**:

- a) Verificar se os pacientes satisfazem critérios sintomáticos para um transtorno.
- b) Determinar a classe de droga ou o tratamento considerado eficaz nesse transtorno.
- c) Elaborar uma estratégia específica para pacientes com diagnósticos variados.
- d) Prescrever representantes clássicos da classe de droga específica.

QUESTÃO 30

O mecanismo de ação da Duloxetina:

- a) É um inibidor da recaptção de noradrenalina-serotonina.
- b) É um bloqueador da recaptção de dopamina.
- c) Aumenta a liberação de noradrenalina.
- d) É um bloqueador seletivo da recaptção de noradrenalina.

QUESTÃO 31

Sobre o tratamento farmacológico da agitação e violência (tranquilização rápida), pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) Uso de via de administração adequada para uma absorção rápida e maior biodisponibilidade.
- b) Combinação de benzodiazepínicos e antipsicóticos.
- c) A típica abordagem de “tranquilização rápida” emprega a via endovenosa.
- d) Tratar os sintomas alvos de agitação, excitação psicomotora, tensão e hostilidade.

QUESTÃO 32

São efeitos colaterais do lítio, **EXCETO**:

- a) Tremores.
- b) Hipertireoidismo.
- c) Náuseas crônicas.
- d) Ganho de peso.

QUESTÃO 33

Os inibidores da colinesterase são indicados para o tratamento dos sintomas cognitivos da Demência de Alzheimer. A primeira dessas drogas deixou de ser a droga de primeira escolha, devido a graves efeitos hepatotóxicos.

Trata-se da seguinte droga:

- a) Donepezill.
- b) Rivastigmina.
- c) Galantamina.
- d) Tacrina.

QUESTÃO 34

São sinais de abstinência de estimulantes, incluindo cocaína, anfetamina e suas diversas formas, **EXCETO**:

- a) insônia.
- b) depressão.
- c) fadiga.
- d) hiperfagia.

QUESTÃO 35

Podemos afirmar sobre os riscos de administração de psicofarmacos durante a gravidez, **EXCETO**:

- a) Todas as drogas psicotrópicas atravessam a placenta em algum grau.
- b) Durante o primeiro trimestre o risco é a teratogênese.
- c) A gravidez é uma contra-indicação absoluta para o uso de psicofármacos.
- d) As drogas podem afetar o trabalho de parto.

QUESTÃO 36

Todas as seguintes afirmativas concernentes aos estabilizadores de humor estão corretas, **EXCETO**:

- a) O termo estabilizador do humor foi aplicado pela primeira vez ao Lítio.
- b) O Divalproex sódico apresenta eficácia na prevenção de episódios maníacos tanto quanto o Lítio.
- c) A Carbamazepina é o estabilizador de terceira linha, depois do Lítio e do Valproato.
- d) Gabapentina e Lamotrigina, têm sido estudados no tratamento do transtorno bipolar.

QUESTÃO 37

São indicadores de mau prognóstico na esquizofrenia, **EXCETO**:

- a) Sintomas de desorganização.
- b) Sexo feminino.
- c) Co-morbidade com transtornos de substâncias.
- d) Início insidioso.

QUESTÃO 38

Sobre a Demência associada ao HIV, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É caracterizada por redução do desempenho cognitivo.
- b) O desenvolvimento da demência indica mau prognóstico.
- c) A demência é consequência fisiopatológica direta da infecção pelo vírus.
- d) A demência é do tipo cortical ou subcortical.

QUESTÃO 39

Um paciente apresenta ansiedade e preocupação excessiva sobre vários acontecimentos, na maior parte dos dias, durante os últimos 6 meses. A psicopatologia esperada para esse quadro é:

- a) ataques de ansiedade, hiperatividade autonômica, entorpecimento emocional.
- b) sobressalto, dissociação e irritabilidade.
- c) hiperatividade autonômica, revivescência do trauma, ansiedade.
- d) ansiedade, tensão muscular, hiperatividade autonômica e vigilância cognitiva.

QUESTÃO 40

São fatores de risco de suicídio a curto prazo (6 a 12 meses) em pacientes com depressão, **EXCETO**:

- a) Pânico, ansiedade grave e agitação.
- b) Insônia total.
- c) Depressão recorrente.
- d) Dificuldades cognitivas leves.

QUESTÃO 41

Marque a opção **CORRETA**: Alexia é uma alteração da linguagem que significa:

- a) Incapacidade de articular corretamente as palavras, devido a alterações neuronais referentes ao aparelho fonador.
- b) Deformação das palavras.
- c) Perda da capacidade previamente adquirida para a leitura, de origem neurológica.
- d) Perda da linguagem escrita, por lesão orgânica.

QUESTÃO 42

São sintomas da Distímia, **EXCETO**:

- a) Retraimento social.
- b) Inércia, pior no período vespertino.
- c) Baixa auto-estima.
- d) Fadiga crônica.

QUESTÃO 43

Em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) A maioria das crianças afetadas por TDAH tem evidência de dano estrutural no SNC.
- b) O TDAH é mais comum em meninos que em meninas.
- c) Nenhum achado laboratorial específico é patognomônico de TDAH.
- d) O curso é variável.

QUESTÃO 44

A lei Nº 10216, de 06/04/2001, dispõe sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental, **EXCETO**:

- a) Ter sua situação previdenciária regularizada.
- b) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.
- c) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
- d) Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental

QUESTÃO 45

A Lei Estadual n 11.802 de 18 de Janeiro de 1995, dispõe sobre, **EXCETO**:

- a) a promoção de saúde e da reintegração social do portador de sofrimento mental.
- b) a determinação da implantação de ações e serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos.
- c) a proteção dos portadores de sofrimento mental.
- d) A regulamentação das internações, especialmente a involuntária.

QUESTÃO 46

São condições de risco aumentado para a realização de eletroconvulsoterapia (ECT), **EXCETO**:

- a) Gravidez.
- b) Hemorragia cerebral.
- c) Hipertensão intracraniana.
- d) Hipertensão arterial.

QUESTÃO 47

“Aquilo que, no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, conservarei inteiramente secreto”. (Hipócrates)

Marque a opção **CORRETA**: essa prescrição diz respeito a:

- a) Autonomia.
- b) Confidencialidade.
- c) Beneficência.
- d) Competência.

QUESTÃO 48

São efeitos colaterais da Clozapina, **EXCETO**:

- a) Sedação.
- b) Hipotensão ortostática.
- c) Agranulocitose
- d) Perda de peso.

QUESTÃO 49

Sobre a Anorexia Nervosa, pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) De acordo com o DSM-IV-TR a idade mais comum de início é dos 14 a 18 anos.
- b) Ocorre em cerca de 4% das adolescentes.
- c) Manifesta-se 10 a 20 vezes mais em mulheres do que em homens.
- d) Associa-se a depressão em 65% dos casos.

QUESTÃO 50

Todas as seguintes afirmativas são concernentes à doença de Alzheimer, **EXCETO**:

- a) O diagnóstico definitivo de doença de Alzheimer exige exame neuropatológico do cérebro.
- b) A observação neuroanatômica clássica do cérebro de um paciente com doença de Alzheimer é a atrofia difusa, sulcos corticais achatados e ventrículos cerebrais aumentados.
- c) O curso caracteriza-se por início gradual e declínio cognitivo intermitente.
- d) Acetilcolina e Noradrenalina são os neurotransmissores mais implicados na fisiopatologia da doença de Alzheimer.

QUESTÃO 51

Considerando-se as estratégias e técnicas da Terapia Cognitiva, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Se o paciente não melhora nas 25 semanas, deve repetir a série.
- b) A terapia é curta, dura cerca de 25 semanas.
- c) Terapia de manutenção pode ser realizada durante anos.
- d) Os três componentes da Terapia Cognitiva são aspectos didáticos, técnicas cognitivas e técnicas comportamentais.

QUESTÃO 52

Considerando-se as formulações freudianas sobre o Caso Schreber, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Freud considera que a Paranóia deve manter-se como um tipo clínico independente da Demência Precoce.
- b) Distingue a Paranóia da Demência Precoce com relação ao mecanismo da formação de sintomas.
- c) Freud considera que no caso Schreber existe uma combinação de fenômenos paranóicos e esquizofrênicos.
- d) Freud identifica o mesmo ponto de fixação libidinal, nas formas de psicose, paranóia e esquizofrenia.

QUESTÃO 53

“Querem que eu fale menos, mas não consigo mesmo, tem uma coisa aqui dentro de mim que não me deixa parar de falar”. Essa “*pressão para falar*” refere-se a que transtorno de linguagem? Marque a opção **CORRETA**:

- a) Ecolalia.
- b) Palilalia.
- c) Bradifasia.
- d) Logorréia.

QUESTÃO 54

A apresentação de obsessões e compulsões é heterogênea, mas o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) apresenta quatro tipos de sintomas principais. Assinale um dos quatro tipos, marcando a resposta **certa**:

- a) Tricotilomania.
- b) Contaminação.
- c) Obsessões religiosas.
- d) Poupança compulsiva.

QUESTÃO 55

Segundo H. Ey, o grupo dos delírios crônicos sistematizados (paranóia) é caracterizado por, **EXCETO**;

- a) Exaltação (hipertimia, hiperestesia).
- b) Idéia prevalente que subordina todos os fenômenos psíquicos e todas as condutas a um postulado fundamental.
- c) Automatismo ideoverbal.
- d) Desenvolvimento em *setor*, no sentido em que o delírio constitui um sistema parcial que penetra como uma cunha na realidade.

QUESTÃO 56

Em seu texto, *Psicanálise e Psiquiatria*, Freud estabelece algumas correlações entre esses dois campos. Podemos afirmar, segundo o autor, **EXCETO**:

- a) A Psicanálise não se opõe à Psiquiatria.
- b) Ambas, Psicanálise e Psiquiatria, não podem influenciar os delírios.
- c) A Psicanálise propõe uma terapêutica para a psicose.
- d) A metodologia empregada em cada um dos campos é distinta.

QUESTÃO 57

Segundo Jaspers, o delírio tem três características essenciais, que são, **EXCETO**:

- a) A Extensão do delírio nas áreas da vida do paciente.
- b) Uma Certeza subjetiva, praticamente absoluta.
- c) A Impossibilidade da modificação do delírio pela experiência objetiva.
- d) A impossibilidade do conteúdo do delírio.

QUESTÃO 58

“Ao passar pela frente de um bar e observar as pessoas conversando e rindo o indivíduo entende que estão falando dele, rindo dele, dizendo que ele é homossexual ou ladrão; tudo, enfim, refere-se a ele“. O quadro descrito refere-se:

- a) Delírio de auto-referência.
- b) Delírio de influência.
- c) Delírio de reinvindicação.
- d) Delírio erótico.

QUESTÃO 59

Sobre os Retardos Mentais, segundo H. Ey, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Os Débeis Médios são semi-educáveis, têm Q.I. entre 0,50 e 0,65.
- b) Os Débeis Profundos são parcialmente educáveis, têm Q.I. entre 0,30 e 0,50.
- c) Os Retardados Profundos são denominados imbecis, têm Q.I. inferior a 0,30.
- d) Os Débeis leves são educáveis, têm Q.I. entre 0,65 e 0,80.

QUESTÃO 60

Em relação aos transtornos dissociativos, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A dissociação surge como uma autodefesa contra um trauma.
- b) Na maioria dos estados dissociativos, as representações que entram em conflito umas com as outras, são mantidas na consciência.
- c) Pensamentos, sentimentos e ações integradas, tudo aquilo que confere a uma pessoa sua personalidade, é anormal em indivíduos com transtorno dissociativo.
- d) A dissociação cria uma situação nas quais os conteúdos mentais coexistem em uma consciência paralela.

QUESTÃO 61

Aaron Beck postulou a tríade cognitiva da depressão, que consiste nos seguintes aspectos, **EXCETO**:

- a) Visão de si próprio, uma autopercepção negativa.
- b) Visão do ambiente, uma tendência a experimentar o mundo como hostil e exigente.
- c) Visão do futuro, a expectativa de sofrimento e fracasso.
- d) Visão do passado, uma percepção de fracasso e arrependimento.

QUESTÃO 62

Em relação às depressões pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) O humor depressivo e a perda de interesses ou de prazer são os sintomas-chaves da depressão.
- b) Cerca de dois terços dos pacientes deprimidos cogitam o suicídio.
- c) A ansiedade é um sintoma pouco comum na depressão.
- d) Cerca de 80% reclamam de dificuldades com o sono, especialmente despertar precoce na madrugada.

QUESTÃO 63

Considerando-se as indicações freudianas sobre a perda da realidade na neurose e na psicose é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Na psicose, o novo e imaginário mundo externo da psicose tenta colocar-se no lugar da realidade externa.
- b) Na neurose a perda da realidade é evitada.
- c) Na neurose e na psicose ocorre um processo análogo, mas que envolve distintas instâncias psíquicas, em cada uma delas.
- d) Tanto na neurose quanto na psicose interessa a questão da perda da realidade, mas também da instituição de um substituto para a realidade.

QUESTÃO 64

Em relação ao uso de antidepressivos podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Todos os antidepressivos são igualmente eficazes.
- b) O perfil de efeitos colaterais é geralmente citado como o principal fator de escolha de um antidepressivo.
- c) Parâmetros do paciente, incluindo subtipo de depressão, idade, sexo e estado médico são comparados a parâmetros da droga, como efeitos colaterais, segurança e custo.
- d) A remissão é um critério de eficácia.

QUESTÃO 65

A Ansiedade Grave pode ser uma característica de outros transtornos psiquiátricos incluindo os seguintes, **EXCETO**:

- a) Coronariopatia.
- b) Esquizofrenia.
- c) Intoxicação aguda por drogas.
- d) Depressão.

QUESTÃO 66

Considerando-se a epidemiologia dos Transtornos Relacionados ao Álcool é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Depois das doenças cardíacas e do câncer, os Transtornos relacionados ao álcool constituem, no momento, o terceiro maior problema de saúde dos USA.
- b) As causas de morte comuns entre pessoas com transtornos relacionados ao álcool são suicídio, doenças cardíacas e hepáticas.
- c) Os Transtornos relacionados ao álcool têm a mesma prevalência entre homens e mulheres
- d) O álcool é a primeira causa de morte relacionada ao uso de substâncias.

QUESTÃO 67

Sobre a avaliação diagnóstica em Psiquiatria, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) O diagnóstico de pacientes psiquiátricos difere, sob certos aspectos, daqueles de pacientes com doenças físicas.
- b) A psiquiatria não dispõe de critérios externos de validação.
- c) Um diagnóstico psiquiátrico vale tanto quanto o conhecimento e a habilidade do psiquiatra que o fez.
- d) Deve-se buscar o diagnóstico com base na etiologia da doença.

QUESTÃO 68

Sobre a avaliação neuropsicológica clínica de adultos, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) As técnicas padronizadas para avaliar o funcionamento adulto incluem a entrevista psiquiátrica e o exame mental.
- b) A neuropsicologia clínica é uma especialidade da psicologia que examina a relação entre o comportamento e a atividade cerebral.
- c) Os domínios avaliados são os funcionamentos cognitivo, motor, sensorial e emocional.
- d) O objetivo desses testes é alcançar resultados quantificáveis e reproduzíveis que possam ser comparados com os escores de pessoas normais, de idade e origem demográfica comparáveis.

QUESTÃO 69

Com relação ao texto: *Pessoa e bens: sobre a cidadania dos curatelados*, de Pedro Gabriel Delgado, analise as afirmativas abaixo e marque a opção **CORRETA**.

I – A incapacidade do louco só começa após a interdição, porém pode ser argüida em atos realizados antes dela.

II – A interdição pode ser promovida pelo Ministério público.

III – O juiz pronuncia a sentença acerca da interdição examinando os laudos e ouvindo os profissionais que examinaram o argüido.

Analisando-se as afirmativas, constata-se que:

- a) Os itens I, II e III estão corretos.
- b) Somente o item III está incorreto.
- c) Os itens II e III estão incorretos.
- d) Somente o item I está correto.

QUESTÃO 70

Em relação à Fobia Social, pode-se afirmar **EXCETO**:

- a) O êxito no tratamento da fobia social gerou uma hipótese neuroquímica específica para a fobia social: os pacientes com essa condição liberam mais noradrenalina periféricamente, do que os não-fóbicos.
- b) Os indivíduos com Fobia Social podem apresentar outros transtornos psiquiátricos, de ansiedade, depressivo, transtornos do humor, transtornos relacionados ao uso de substâncias e bulimia nervosa.
- c) Alguns indivíduos com fobia social podem ter exibido comportamento de inibição durante a infância.
- d) Parentes de primeiro grau de indivíduos com fobia social têm cerca de três vezes mais probabilidade de apresentarem a fobia social do que parentes de indivíduos sem transtornos.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.