



SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS
Edital n. 01/2009

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Código 117

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém as questões de **Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.**

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.
-

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 - preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
 - assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de **uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.**
-

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a **Folha de Respostas**.

ATENÇÃO: Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, “Será proibido, [...] fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep [...] ou qualquer outro equipamento eletrônico. O uso [...] determinarão a exclusão do candidato do processo seletivo [...]” (Item 7.20)

Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e assinada.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **70 (setenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria** e 4 (quatro) questões de **Saúde Pública** e 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

➤ Conhecimentos Gerais

CIRURGIA GERAL

Questão 1

Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular.
- B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia.
- C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento rápido do potássio.
- D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes para diminuição dos níveis séricos de potássio.

Questão 2

Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total.
- B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total sérico.
- C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia.
- D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia.

Questão 3

Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro acometido.
- B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou antigo.
- C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha, é a limitação da dorsiflexão do pé.
- D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado.

Questão 4

Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção.
- B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de risco associados.
- C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico.
- D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com a incidência de complicações pós-operatórias.

CLÍNICA MÉDICA

Questão 5

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é **CORRETO** afirmar que

- A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo.
- B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações do hipotireoidismo.
- C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante são encontrados no hipertireoidismo primário.
- D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída.

Questão 6

Em relação à tromboembolia pulmonar, é **INCORRETO** afirmar que

- A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença.
- B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns.
- C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o diagnóstico geralmente não é feito *ante-mortem*.
- D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente contraindicado.

Questão 7

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica.

- I. Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou completa, em até seis semanas.
- II. No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até 24 horas.
- III. Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas, sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 8

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a **melhor** correlação entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações.

COLUNA I

1. Bloqueadores beta-adrenérgicos
2. Bloqueadores do canal de cálcio
3. Bloqueadores dos receptores de angiotensina
4. Inibidores da enzima conversora de angiotensina

COLUNA II

- () Agravamento de insuficiência arterial periférica
- () Edema
- () Menor efeito em negros
- () Tosse

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (4) (3) (1) (2)
- B) (2) (1) (4) (3)
- C) (1) (3) (2) (4)
- D) (1) (2) (3) (4)

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Questão 9

Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia endometrial.

O dia do ciclo menstrual em que **deve** ser realizado esse exame é o

- A) 3º.
- B) 14º.
- C) 20º.
- D) 26º.

Questão 10

O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da menstruação.

Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio disfórico pré-menstrual.

- A) Inibidores da recaptção de serotonina
- B) Ansiolíticos
- C) Diuréticos
- D) Anticoncepcionais orais cíclicos

Questão 11

Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos exames complementares na **pré-eclâmpsia leve**.

- I. **Caracterização:** elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa.
- II. **Tratamento:** ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável.
- III. **Exames complementares:** função renal (proteínúria de 24 horas, ureia, creatinina, ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH) repetidos, semanalmente, se clínica estável.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
- B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- D) todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 12

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de 10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical.
- () O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra com a expulsão total do feto.
- () O terceiro período compreende a expulsão da placenta.
- () O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer anormalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (V)

➤ PEDIATRIA

Questão 13

Em crianças, a tétrede clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de

- A) insuficiência renal aguda.
- B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma).
- C) insuficiência cardíaca congestiva.
- D) desidratação aguda do segundo grau.

Questão 14

São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, **EXCETO**

- A) obesidade.
- B) fumo.
- C) álcool.
- D) hemoglobinopatia SS.

Questão 15

Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de 3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com

- A) 7,0 Kg e 70 cm.
- B) 9,5 Kg e 75 cm.
- C) 10,5 Kg e 80 cm.
- D) 11,0 Kg e 83 cm.

Questão 16

Assinale a droga que **NÃO** causa Síndrome de Abstinência Neonatal.

- A) Difenidramina
- B) Diazepan
- C) Imipramina
- D) Dipirona

SAÚDE PÚBLICA

Questão 17

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** relacionando cada estudo com a respectiva medida de associação.

COLUNA I

1. Ecológico
2. Caso-Controle
3. Seccional
4. Coorte

COLUNA II

- () Odds Ratio
() Risco Relativo
() Razão de Médias
() Razão de Prevalência

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (2) (4) (1) (3)
B) (4) (2) (3) (1)
C) (3) (4) (2) (1)
D) (3) (1) (2) (4)

Questão 18

O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação forte e significativa entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de pulmão, estômago e cólon.

Esse é um estudo caracterizado como:

- A) seccional.
B) caso-controle.
C) coorte histórica.
D) ecológico.

Questão 19

A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único de Saúde – SUS é viabilizada pela

- A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais.
- B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do sistema.
- C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade.
- D) participação das comunidades nas campanhas de saúde.

Questão 20

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas.

- I. As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH's que usam como critério o pagamento por procedimento.
- II. O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em que o município se encontra.
- III. A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes.

A análise permite concluir que

- A) está correta apenas a afirmativa I.
- B) estão corretas todas as afirmativas.
- C) estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- D) estão corretas apenas as afirmativas I e II.

➤ Conhecimentos Específicos

Questão 21

Assinale a afirmativa **CORRETA** em relação ao diagnóstico laboratorial de endocrinopatias.

- A) Na menina com Síndrome de Turner, níveis séricos elevados de FSH são detectados durante toda a infância.
- B) Níveis do cortisol plasmático pouco acima do normal são sugestivos de produção ectópica na Síndrome de Cushing.
- C) Os valores de corte para deficiência do GH podem variar em até três vezes, de acordo com o tipo de anticorpo monoclonal usado nos diferentes ensaios.
- D) Para o diagnóstico de hipocalcemia, a correção do cálcio total sérico em relação à albuminemia considera uma redução de 0,5 mg/dL para cada 1,0 g/dL de queda da albumina.

Questão 22

Assinale a afirmativa **INCORRETA** em relação ao tratamento da obesidade.

- A) A melhora do diabetes após cirurgia bariátrica ocorre mesmo antes de evidente perda de peso ser observada.
- B) Administração de suplementos vitamínicos está indicada durante o tratamento com orlistat.
- C) A hipotensão arterial é um efeito adverso que pode resultar na interrupção do tratamento com a sibutramina.
- D) Ausência de perda de peso no primeiro mês de terapia farmacológica torna improvável resposta terapêutica em longo prazo.

Questão 23

Em relação à hipertensão arterial observada no hipotireoidismo, analise as seguintes afirmativas.

- I. Está relacionada ao aumento da resistência vascular periférica.
- II. Está relacionada à expansão do volume extracelular.
- III. O tratamento com hormônio tireoidiano normaliza a PA em 1/3 dos pacientes.

A análise permite concluir que

- A) apenas a afirmativa I está correta.
- B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 24

A prescrição de insulina para a gestante previamente diabética deve levar em consideração

- A) o aumento da necessidade de insulina que ocorre durante o período gestacional.
- B) o aumento da necessidade de insulina que ocorre no final do 3º trimestre de gestação.
- C) a redução da necessidade de insulina que ocorre no 1º trimestre de gestação.
- D) a redução da necessidade de insulina que ocorre durante o período gestacional.

Questão 25

Analise as seguintes afirmativas que apresentam características clínicas que podem estar associadas ao hiperparatiroidismo e à insuficiência adrenal primária crônica em paciente caracterizando quadro sindrômico.

- I. Candidíase mucocutânea e surdez neurosensorial
- II. Atrofia da mucosa gástrica e hipogonadismo hipergonadotrófico
- III. Alopecia e má-absorção intestinal

A análise permite concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e III.
- B) apenas as afirmativas I e II.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) todas as afirmativas.

Questão 26

Assinale a afirmativa **INCORRETA** em relação aos análogos da insulina humana.

- A) Devido à sua preparação em veículo ácido, a insulina glargina não pode ser misturada com outras insulinas para aplicação conjunta.
- B) A insulina detemir apresenta um perfil de absorção mais homogêneo entre as insulinas de ação prolongada.
- C) Os análogos monoméricos de insulina apresentam farmacocinética similares e são associados a menor risco de hipoglicemia, quando comparados à insulina regular.
- D) Os análogos da insulina de ação prolongada não apresentam pico de ação sendo, por esse motivo, indicados para uso apenas uma vez ao dia.

Questão 27

Assinale a afirmativa **INCORRETA** em relação ao quadro clínico e manejo de paciente obeso que apresenta baixa estatura, retardo mental e achado laboratorial de hipocalcemia.

- A) A medida de AMPc urinário, após infusão de PTH, pode auxiliar a estabelecer o diagnóstico.
- B) O quadro apresentado é compatível com pseudo-pseudohipoparatiroidismo.
- C) O tratamento deverá incluir administração de 1-3g de Cálcio oral diário.
- D) O achado de dismorfismos ao exame objetivo é frequente nesses pacientes.

Questão 28

Assinale a afirmativa **INCORRETA** em relação aos achados endocrinológicos mais frequentes em pacientes infectados pelo HIV.

- A) Adrenalite por citomegalovirus é a causa mais frequente de insuficiência adrenal nesses pacientes.
- B) Na Síndrome do Eutiroidiano Doente os níveis de T3 reverso aumentam paralelamente à diminuição do T3.
- C) Ausência de fraqueza muscular proximal na Síndrome de Lipodistrofia por HIV auxilia no diagnóstico diferencial com a Síndrome de Cushing.
- D) Hipercolesterolemia é o principal distúrbio do metabolismo lipídico nesses pacientes e deve ser agressivamente tratada com Estatinas.

Questão 29

Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação ao diagnóstico da Síndrome Poliendócrina de Wolfram.

- A) Atrofia do nervo ótico é encontrada em todos os casos.
- B) Diabetes mellitus é decorrente de destruição não autoimune das células Beta pancreáticas.
- C) Surdez neurosensorial e Diabetes insípido estão frequentemente presentes nos portadores da síndrome.
- D) Hepatoesplenomegalia e hiperpigmentação cutânea são componentes obrigatórios para o diagnóstico.

Questão 30

Analise as seguintes afirmativas relativas ao tratamento da Doença de Graves.

- I. Uso do radiodo para ablação da tiroide é o mais indicado para inibir a progressão da orbitopatia, em relação a outras formas de tratamento.
- II. A dermatopatia infiltrativa apresenta remissão espontânea não necessitando tratamento medicamentoso.
- III. Dexametasona tem efeito aditivo ao propiltiouracil na inibição da conversão periférica de T4 para T3.

A análise permite concluir que

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) apenas a afirmativa I está correta.
- C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) apenas a afirmativa III está correta.

Questão 31

Assinale a afirmativa **INCORRETA** em relação às consequências do tratamento para Doença de Graves.

- A) A hipocalcemia transitória pode ou não estar relacionada ao hipoparatiroidismo no pós-operatório da cirurgia ablativa.
- B) Hepatite é um dos efeitos adversos observados após o uso de propiltiouracil, mas não do metimazol.
- C) O agravamento da tirotoxicose levando à precipitação de crise tirotrófica pode ocorrer depois do tratamento com iodo radioativo.
- D) Hipoparatiroidismo é uma complicação frequente após uso do iodo radioativo.

Questão 32

Em relação ao tratamento dietoterápico, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Tm balanço energético negativo é mais facilmente obtido pela redução do consumo alimentar do que pelo aumento da atividade física no início do tratamento da maior parte de pacientes obesos.
- B) As recentes recomendações alimentares do NCEP incluem ingestão < 200mg/dia de colesterol para todos os indivíduos acima de 2 anos de idade.
- C) A consumo de fibras solúveis exerce efeito benéfico sobre o controle das dislipidemias, resultando em decréscimo de até 10% nos níveis de LDL-colesterol.
- D) Embora alimentos com índice glicêmico reduzido possam exercer efeito benéfico no controle do paciente diabético, não há consenso sobre o benefício de alimentos com carga glicêmica e índice glicêmico reduzidos.

Questão 33

Analise os seguintes itens relativos aos achados clínicos da Síndrome de Pickwick.

- I. Hipoventilação e apneia do sono
- II. Policitemia e sonolência
- III. Insuficiência ventricular esquerda

A análise permite concluir que

- A) apenas o item I está correto.
- B) apenas os itens I e II estão corretos.
- C) apenas os itens II e III estão corretos.
- D) todos os itens estão corretos.

Questão 34

Assinale a afirmativa que apresenta drogas **NÃO** relacionadas com o surgimento de ginecomastia em adolescente do sexo masculino.

- A) Flutamida, ciproterona e metronidazol
- B) Diazepam, fenotiazinas e omeprazol
- C) Fitoestrógenos, tamoxifeno e maconha
- D) Captopril, enalapril e metildopa

Questão 35

Analise as seguintes afirmativas sobre o tratamento de pacientes diabéticos e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Na cetoacidose diabética a terapia com bicarbonato é geralmente indicada se o PH $\leq 7,2$.
- () A evolução de complicações renais no paciente com níveis pressóricos pouco elevados pode ser prevenida com o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- () A insulinoaterapia endovenosa peroperatória é o método de escolha para pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de grande porte.
- () A hiperglicemia hiperosmolar não cetótica é uma complicação aguda do DM que ocorre exclusivamente em pacientes idosos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (F) (F) (V) (V)

Questão 36

Considere o quadro de virilização observado ao nascimento que não apresenta progressão pós-natal em recém-nascido. Esse quadro é compatível com:

- I. deficiência da enzima 21-hidroxilase, forma não clássica.
- II. distúrbio do desenvolvimento sexual pelo uso de glicocorticoides pela mãe durante a gestação.
- III. distúrbio do desenvolvimento sexual por deficiência de aromatase.

Completa (m) **corretamente** o enunciado acima

- A) apenas a hipótese I.
- B) apenas as hipóteses II e III.
- C) apenas a hipótese III.
- D) todas as três hipóteses.

Questão 37

Analise as seguintes afirmativas sobre o diagnóstico diferencial do hirsutismo em mulher jovem.

- I. Ovulação normal e níveis normais de testosterona caracterizam o hirsutismo idiopático.
- II. Hiperfunção tireoidiana é uma possibilidade que deve ser excluída durante a investigação.
- III. Níveis de testosterona acima de 2ng/mL sugerem a presença de tumor secretor de andrógenos.

A análise permite concluir que

- A) apenas a hipótese I está correta.
- B) apenas a hipótese II está correta.
- C) apenas as hipóteses I e III estão corretas.
- D) as três hipóteses estão corretas.

Questão 38

Analise os seguintes efeitos adversos esperados durante o tratamento de paciente adulto com deficiência de GH e assinale com **V** os **verdadeiros** e com **F** os **falsos**.

- () Artralgias e parestesias
- () Hipertensão e edema
- () Rigidez muscular e mialgias

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (V) (F)
- B) (F) (F) (V)
- C) (F) (V) (V)
- D) (V) (V) (V)

Questão 39

Em relação ao tratamento farmacológico do DM2, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O principal problema com as glitazonas é sua capacidade para retenção de líquidos e potencial risco para insuficiência cardíaca.
- B) Pacientes em uso da metformina apresentam menor probabilidade de ganhar peso podendo até perder peso com o seu uso.
- C) Repaglinidas apresentam bons resultados no controle de hiperglicemia pós-prandial e redução de episódios hipoglicêmicos.
- D) Inibidores da alfa-glicosidase não podem ser indicados para tratar pacientes com predomínio de hiperglicemia pós-prandial.

INSTRUÇÃO – As questões de **40** a **42** devem ser respondidas com base no seguinte caso.

Paciente do sexo feminino, 21 anos, refere desenvolvimento excessivo e precoce de pelos pubianos na infância e acompanhamento médico, mas nunca fez uso de medicação. Relata hirsutismo e nega distúrbios menstruais. Ao Ex físico: P: 52 kg E:156 cm PA:120x80 mmHg FC:75 bpm. Sem outras alterações.

Questão 40

Considerando o quadro clínico atual apresentado pela paciente, analise as seguintes hipóteses diagnósticas.

- I. A Síndrome dos ovários policísticos é o diagnóstico mais provável.
- II. O diagnóstico de Deficiência de 21-OH forma não clássica é compatível com esse quadro.
- III. O quadro clínico atual pode ser consequência da pubarca precoce.

A análise permite concluir que

- A) apenas a hipótese I está correta.
- B) apenas a hipótese II está correta.
- C) apenas a hipótese III está correta.
- D) todas as hipóteses estão corretas.

Questão 41

Considerando a hipótese diagnóstica **mais provável** para a paciente, assinale a afirmativa **CORRETA** em relação aos exames laboratoriais utilizados para caracterização do quadro.

- A) A dosagem da 17-OHprogesterona plasmática vai definir o diagnóstico da paciente.
- B) Detecção de níveis elevados de LH são de utilidade para o diagnóstico diferencial das formas leves.
- C) A concentração plasmática da testosterona não tem utilidade para o diagnóstico.
- D) É necessário pesquisar resistência insulínica, diagnosticada em praticamente todos os casos.

Questão 42

Considerando a hipótese diagnóstica mais provável para o quadro da paciente anteriormente descrito, analise as alternativas abaixo e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Essa paciente deveria ter sido tratada desde a infância com glicocorticoides.
- () Anticoncepcionais orais são o tratamento de escolha para essas pacientes.
- () A prescrição de dexametasona está indicada para correção dos sintomas.
- () O uso de biguanidas está indicado para auxiliar na redução da produção androgênica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (F)
- C) (V) (V) (F) (V)
- D) (F) (V) (F) (V)

Questão 43

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta critério válido para o diagnóstico de Síndrome Metabólica de acordo com os critérios do NCEP.

- A) Concentração plasmática de triglicérides > 150mg/dL, concentração plasmática de colesterol HDL < 50mg/dL e circunferência de cintura > 88 cm em mulheres
- B) Pressão arterial sistólica > 130 mmHg, uso de droga hipoglicemiante e resistência à insulina
- C) Pressão arterial diastólica > 85mg, uso de drogas para correção de triglicérides elevados e colesterol – HDL baixo
- D) Glicemia plasmática de jejum > 100mg/dL, concentração plasmática de colesterol HDL < 40mg/dL e circunferência de cintura > 102 cm em homens

Questão 44

Em relação ao Carcinoma Medular de Tireoide, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ocorre predominantemente de forma esporádica.
- B) Diarreia é a manifestação extratiroideana mais frequente, ocorrendo em aproximadamente 30% dos casos.
- C) O teste de estímulo com a pentagastrina é útil no rastreamento de doença residual.
- D) A radioablação pós-operatória deve ser indicada em todos os casos, devido à gravidade da doença.

Questão 45

Analise as seguintes afirmativas sobre dietoterapia e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Nos pacientes com hipertrigliceridemia grave o consumo de carboidratos simples deve ser limitado.
- () Há evidências sugerindo que dietas com conteúdo proteico de 0,75g/kg/dia retardam a progressão de doença renal.
- () A restrição alimentar de colesterol para pacientes portadores de hipercolesterolemia familiar é responsável pela queda de aproximadamente 30% dos níveis plasmáticos de colesterol.
- () A redução no aporte energético de 500Kcal/dia por pacientes que apresentam obesidade classe 1, resulta na redução de 10% do peso inicial em 6 meses.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (V) (F) (V)
- D) (F) (F) (F) (V)

Questão 46

Em relação aos paradigmas nutricionais associados ao binômio saúde/doença, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A ocorrência de câncer colorretal e hepático está positivamente associada à maior ingestão de gordura e obesidade.
- B) A ingestão inadequada de cálcio na adolescência é fator determinante no desenvolvimento de osteoporose na vida adulta.
- C) A recuperação rápida do peso do recém-nascido pequeno para a idade gestacional, nos primeiros meses de vida, é fator de proteção para obesidade na vida adulta.
- D) O achado de estrias gordurosas na aorta de crianças com dislipidemia sugere que o excesso de peso também pode ter importante papel no risco cardiovascular futuro desses indivíduos.

Questão 47

Assinale a alternativa que apresenta condições que **NÃO** devem ser consideradas no diagnóstico diferencial de hiperprolactinemia.

- A) Hipofisite linfocítica
- B) Síndrome de ovários policísticos
- C) Câncer de tireoide e doença de Addison
- D) Uso de cocaína e inibidores de recaptação de serotonina

Questão 48

Em relação ao controle e secreção de hormônios esteroides das suprarrenais, é **INCORRETO** afirmar que

- A) os mineralocorticoides são produzidos pela zona glomerulosa sob a regulação principal do sistema renina-angiotensina.
- B) o cortisol é o principal glicocorticoide secretado no córtex, mas apenas uma pequena fração circula sob a forma livre.
- C) a secreção de Dehidroepiandrosterona (DHEA) diminui com a idade, mas não está relacionada ao quadro clínico do envelhecimento.
- D) o estresse é um dos principais reguladores da secreção de CRH.

Questão 49

Assinale a afirmativa **INCORRETA** em relação aos agentes terapêuticos abaixo relacionados.

- A) Análogos da somatostatina são de grande utilidade no tratamento de entidades que cursam com excesso de GH, hipertensão porta e sangramento gastrintestinal.
- B) O tratamento com metimazol está indicado para prevenção de exacerbação do hipertiroidismo iodoinduzido antes da exposição ao iodo em indivíduos de risco.
- C) Gabapentina tem se mostrado um agente efetivo na melhora da dor na neuropatia diabética, mas apresenta como principal efeito adverso o prejuízo do sono.
- D) Os glicocorticoides podem ser utilizados para redução dos níveis séricos de Ca⁺⁺.

Questão 50

Assinale a alternativa que apresenta os principais achados do distúrbio cromossômico mais frequentemente reconhecido como causa de infertilidade masculina.

- A) Hiposmia associada a hipogonadismo hipogonadotrófico.
- B) Desproporção corporal com relação SI/SS elevada, testículos endurecidos e gonadotrofinas elevadas.
- C) Hipospádia e hipogonadismo hipergonadotrófico.
- D) Obesidade, hipotonia neonatal, criptorquia e hipogonadismo.

Questão 51

Assinale a **melhor abordagem** para paciente masculino de 15 anos, com atraso constitucional do crescimento e da puberdade, apresentando dificuldades emocionais e escolares.

- A) Prescrever 50mg/mês de enantato de testosterona durante quatro meses.
- B) Indicar tratamento psicoterápico.
- C) Instituir curso limitado de hormônio de crescimento para melhorar autoestima.
- D) Prescrever Testosterona 50mg/mês, associada ao hormônio de crescimento, durante três meses.

Questão 52

Analise as seguintes afirmativas sobre o achado de ginecomastia em adolescente masculino no estágio puberal Tanner 2 e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Ginecomastia puberal é a causa mais frequente desse quadro.
- () Adenoma hipofisário produtor de gonadotrofinas é o principal diagnóstico diferencial.
- () Hipotireoidismo primário deverá ser pensado, se houver associação com galactorreia.
- () O achado de galactorreia associada sugere a presença de tumor produtor de prolactina.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (F) (F) (V) (V)

Questão 53

Paciente feminina de 15 anos com queixa de amenorreia e ausência do desenvolvimento das mamas apresenta útero pequeno a ultrassonografia; LH e FSH aumentados e estradiol abaixo dos valores de referência.

Assinale a alternativa que apresenta os achados clínicos **mais** compatíveis com o diagnóstico dessa paciente.

- A) Baixa estatura e hipertelorismo mamário
- B) Manchas café com leite e displasia óssea
- C) Obesidade e estrias violáceas
- D) Ondas de calor, irritabilidade e hirsutismo

Questão 54

Assinale o agente anti-hipertensivo que apresenta maior probabilidade de afetar a função erétil em paciente diabético.

- A) Diuréticos Tiazídicos
- B) Inibidores da enzima conversora da angiotensina
- C) Bloqueadores dos canais de cálcio
- D) Beta-antagonistas seletivos

Questão 55

Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação à secreção do GH e aos distúrbios do crescimento.

- A) O traumatismo perinatal é provavelmente consequência e não causa de hipopituitarismo congênito.
- B) Na obesidade, a secreção de GH está reduzida, mas o IGF1 está normal e as proteínas transportadoras aumentadas.
- C) Não há relato de mutação no gene da subunidade ácido láctica relacionado ao comprometimento do crescimento e baixa estatura.
- D) Achado de encurtamento dos membros na criança com baixa estatura idiopática sugere o diagnóstico de deficiência do gene SHOX.

Questão 56

Analise as seguintes afirmativas sobre o tratamento do hiperinsulinismo.

- I. O octreotida é usado para tratar o hiperinsulinismo neonatal causado por mutações que levam à hipersecreção da insulina na célula Beta pancreática.
- II. O uso de sensibilizadores da insulina está indicado em portadoras não obesas da Síndrome do Ovário Policístico porque promovem melhora do quadro de hiperandrogenismo.
- III. O propranolol é útil para melhorar a hipoglicemia pós-prandial de pacientes gastrectomizados.

A análise permite concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e III.
- B) apenas as afirmativas I e II.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) todas as afirmativas.

Questão 57

Assinale a alternativa **CORRETA** para o cálculo do hiato aniônico (*anion gap*) para correção da acidose na descompensação diabética.

- A) $(Na + K) - (Cl + HCO_3)$
- B) $K - (Cl + HCO_3)$
- C) $(Na + HCO_3) - (Cl + K)$
- D) $(Cl + HCO_3) - (Na + K)$

Questão 58

A segunda fase do diabetes insipidus pós-cirúrgico caracteriza-se por

- A) hiponatremia + osmolaridade urinária elevada.
- B) hipernatremia + osmolaridade urinária elevada.
- C) hiponatremia + osmolaridade urinária baixa.
- D) hipernatremia + osmolaridade urinária baixa.

Questão 59

Assinale a afirmativa **INCORRETA** em relação às manifestações clínico-laboratoriais do feocromocitoma.

- A) Miocardiopatia e insuficiência cardíaca congestiva são manifestações frequentemente não reconhecidas.
- B) A hipercalcemia é geralmente isolada, mas pode ocorrer no contexto da neoplasia endócrina múltipla tipo 2.
- C) O uso de antidepressivos tricíclicos nos portadores pode precipitar fibrilação atrial.
- D) O achado de hipotensão ortostática praticamente exclui esse diagnóstico.

Questão 60

Assinale a afirmativa **INCORRETA** sobre o hipotireoidismo congênito.

- A) Deformidades ósseas nos membros inferiores podem ocorrer em consequência do tratamento tardio.
- B) As seguintes alterações do crânio podem ser encontradas no recém-nascido: aumento da sela turcica, fontanelas abertas, aumento da relação crânio-face.
- C) Uso de antissépticos iodados para assepsia no parto pode ser responsável pela ocorrência de hipotireoidismo congênito transitório.
- D) Levotiroxina deve ser iniciada de forma fracionada no recém-nascido para evitar descompensação cardíaca.

Questão 61

Assinale a alternativa que apresenta o grupo de substâncias com ação hormonal e parácrina, secretadas pelo tecido adiposo.

- A) Leptina, Grelina e interleucina III
- B) Interleucina III, TNF- α , VIP
- C) Leptina, resistina e interleucina VI
- D) Grelina, interleucina VI e prostaglandina

Questão 62

Analise as seguintes afirmativas em relação à abordagem de criança com *teste do pezinho* positivo para hiperplasia congênita da suprarrenal:

- I. A prescrição de glicocorticoides deve ser imediata devido ao risco de hipoglicemias graves.
- II. O grande número de resultados falso-positivos impõe cautela na consideração desse diagnóstico.
- III. Devido ao risco de desidratação os mineralocorticoides devem ser prescritos fracionados em três tomadas ao dia.

A análise permite concluir que

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 63

Analise as seguintes afirmativas em relação ao uso de inibidores da aromatase e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Devido à inibição da ação do estrogênio sobre a maturação óssea devem ser prescritos como tratamento adjuvante da precocidade sexual em meninos.
- () Estudos controlados mostraram ausência de efeitos sobre a densidade mineral óssea indicando segurança do seu uso na baixa estatura.
- () Mulheres após a menopausa se beneficiam dos inibidores da aromatase para tratamento do câncer de mama.
- () Ausência de redução da mama, após um ano de acompanhamento de adolescentes com ginecomastia puberal, é indicação para uso dos inibidores da aromatase.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (F)
- C) (V) (V) (F) (V)
- D) (F) (V) (F) (V)

Questão 64

Assinale a afirmativa **INCORRETA** em relação a disfunções tiroidianas.

- A) No diagnóstico diferencial do hipertireoidismo transitório que ocorre como manifestação clínica inicial da Tireoidite de Hashimoto, ausência de anticorpos antirreceptor do TSH (TRAB) e níveis elevados de autoanticorpos antitiroperoxidase (ATPO) afastam o diagnóstico de doença de Graves.
- B) Na Síndrome de McCune-Albright pode ocorrer hipertireoidismo causado por mutação ativadora na subunidade alfa da proteína G.
- C) Disgenesias tiroidianas, ectopias ou hipoplasias são causadas por mutações nos fatores de transcrição PAX-8 ou TTF-2.
- D) Quadro clínico de hipotireoidismo ou hipertireoidismo pode ser encontrado na síndrome de resistência periférica aos hormônios tiroidianos.

INSTRUÇÃO – As questões **65** e **66** devem ser respondidas com base no seguinte caso.

Menina de 3 anos apresenta telarca há aproximadamente um ano, sem outras queixas. Ao exame: estatura e peso no percentil 75; estágio puberal de Tanner P1 M2; sem outras alterações. Idade óssea compatível com a cronológica.

Questão 65

O diagnóstico **mais** provável é

- A) Puberdade precoce verdadeira
- B) Tumor ovariano
- C) Telarca prematura isolada
- D) Hiperplasia adrenal congênita

Questão 66

Assinale as alterações laboratoriais que são esperadas na investigação para confirmar o diagnóstico.

- A) Níveis elevados de 17OHPregesterona, testosterona e androstenediona.
- B) Após estímulo com LHRH os níveis de FSH estarão mais elevados que os de LH.
- C) Níveis normais de LH e elevados de estradiol e progesterona.
- D) Após estímulo com LHRH os níveis de LH estarão mais elevados que os de FSH.

Questão 67

A liberação de insulina pela célula betapancreática é controlada por vários fatores neuro-hormonais.

Analise os seguintes itens que apresentam fatores de liberação de insulina.

- I. GLP-1, Glucagon, somatostatina e VIP
- II. Hormônio lactogênio placentário e prolactina
- III. Hormônio do Crescimento, glicocorticoides e esteroides sexuais

A análise permite concluir que

- A) apenas os itens I e III estão corretos.
- B) apenas o item I está correto.
- C) apenas os itens II e III estão corretos.
- D) todos os itens estão corretos.

Questão 68

Assinale a afirmativa **INCORRETA** em relação ao diagnóstico da Síndrome de *Cushing*.

- A) Níveis normais de ACTH são um achado comum na Doença de *Cushing*.
- B) Valores do cortisol salivar > que 2,0 ng/mL têm praticamente 100% de sensibilidade e especificidade para o diagnóstico.
- C) Ausência de gradiente entre os níveis de ACTH, após coleta de sangue do seio petroso inferior, pode sugerir presença de tumor carcinoide.
- D) Pacientes com depressão apresentam supressão ao teste noturno com dexametasona, o que possibilita o diagnóstico diferencial com a Síndrome de *Cushing*.

Questão 69

Em relação à atividade hormonal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os hormônios tireoidianos e esteroides agem via receptores de superfície de membrana.
- B) Inibição da secreção de GH pode ser resultado de níveis elevados ou reduzidos de glicocorticoides.
- C) A importância da calcitonina na homeostase do cálcio sérico em indivíduos adultos não está estabelecida.
- D) Mutações nos receptores da proteína G podem levar a doenças com perda ou ganho de função.

Questão 70

Analise as seguintes afirmativas em relação às complicações crônicas do diabetes *mellitus*.

- I. Ausência de sintomas não significa ausência de neuropatia, pois são comuns os quadros de neuropatia assintomática.
- II. A prevenção das complicações crônicas microangiopáticas depende principalmente do controle glicêmico, mas outros fatores de risco são tão importantes quanto o controle glicêmico para o aparecimento das complicações macroangiopáticas.
- III. Níveis elevados de lípides plasmáticos estão associados à ocorrência de retinopatia diabética.

A análise permite concluir que

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	41	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	61	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
02	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	42	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	62	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
03	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	43	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	63	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
04	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	44	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	64	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
05	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	45	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	65	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
06	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	46	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	66	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
07	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	47	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	67	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
08	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	48	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	68	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
09	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	29	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	49	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	69	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	50	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	70	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	31	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	51	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
12	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	32	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	52	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
13	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	33	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	53	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
14	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	34	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	54	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
15	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	55	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
16	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	36	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	56	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
17	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	37	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	57	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
18	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	38	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	58	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
19	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	39	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	59	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
20	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	40	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	60	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.