



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

RISOLETA TOLENTINO NEVES

CONCURSO PÚBLICO

CADASTRO DE RESERVAS EM  
EMPREGOS

Edital nº 01/2013

## MÉDICO PLANTONISTA GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Código 315

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 - Este caderno contém as questões da **PROVA OBJETIVA**.
- 2 - Use, como rascunho, a **Folha de Respostas** reproduzida ao final deste caderno.
- 3 - Ao receber a **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA**:
  - confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
  - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

- 4 - Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

### NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.**

**ATENÇÃO** - Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. (item 11.7.5) [...] somente poderá levar os Cadernos de Questões das Provas Objetiva ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas. (item 11.7.6) O tempo de duração das provas abrange a distribuição das provas, assinatura da **Folha de Respostas** e a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a **Folha de Respostas** [...]. Será proibido durante a realização das provas, **fazer uso** ou **portar**, mesmo que desligados relógios [...] **quaisquer equipamentos eletrônicos** [...] ou de **instrumentos de comunicação** interna ou externa, tais como **telefone celular** [...] entre **outros**. (item 11.7.22). “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...] **portar arma(s)** no local de realização das provas [...] de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...]” (subitem 11.7.32), alíneas “d”, “e” e “i”). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala. (item 11.7.34)

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: **20 (vinte) questões de Atualidades / Saúde Pública no Brasil e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

## Atualidades / Saúde Pública no Brasil

### Questão 1

De acordo com o Artigo 196 da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, “[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em relação ao exposto, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- B) as ações e serviços de saúde incluem a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- C) o acesso às ações e serviços de saúde é gratuito, inclusive nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas.
- D) o acesso universal aos serviços de saúde diz respeito ao acesso às ações e aos serviços de saúde a toda a população, com exceção dos índios, para os quais existe um sistema de saúde específico.

### Questão 2

A organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população é estruturada a partir de arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde, com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial.

Sobre essa estrutura organizacional, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a atenção básica é estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo às necessidades de saúde.
- B) a prática do encaminhamento pelos centros de saúde é feita com base nos processos de referência e contrarreferência, ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal.
- C) a contrarreferência do hospital para o centro de saúde é importante para que haja acompanhamento dos indivíduos após alta hospitalar.
- D) os hospitais constituem única e exclusiva porta de entrada do sistema, devido à sua complexidade e capacidade de resolutividade.

### Questão 3

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, prevê a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), em cada esfera de governo: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

Dessas instâncias, participam os seguintes segmentos da sociedade:

- A) usuários dos serviços de saúde, prestadores de serviços, profissionais de saúde e representantes do governo.
- B) usuários dos serviços de saúde, prestadores de serviços e profissionais de saúde apenas.
- C) usuários dos serviços de saúde apenas.
- D) profissionais de saúde apenas.

### Questão 4

Em relação ao processo histórico de construção do modelo assistencial à saúde brasileira, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) que no início do século XX, foi criado um modelo sanitário para o País centrado na promoção e proteção da saúde, para resolver os problemas de maior prevalência, como a varíola, a malária, a febre amarela e, posteriormente, a peste.
- B) que um ativo movimento de reforma sanitária emergiu no Brasil durante a primeira república, sob a liderança da nova geração de médicos higienistas, em 1920. Durante a primeira república, foram estabelecidas as bases para a criação de um Sistema Nacional de Saúde, caracterizado pela concentração e pela verticalização das ações no governo central.
- C) que na década de 1930, foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), que pretendiam estender a todas as categorias do operariado urbano organizado os benefícios da previdência.
- D) que em 1975, o modelo de saúde previdenciário implantado pela ditadura militar entra em crise. Por ter priorizado a medicina curativa, o modelo proposto foi incapaz de solucionar os principais problemas de saúde coletiva como as endemias, as epidemias e os indicadores de saúde (mortalidade infantil, por exemplo).

### Questão 5

O Sistema de Informações sobre Mortalidades (SIM) é o mais antigo sistema de informação de saúde no País.

Sobre as declarações de óbito **NÃO É CORRETO** afirmar que

- A) o registro da causa da morte se baseia na Classificação Internacional de Doenças (CID) 10ª revisão.
- B) a Declaração de Óbito (DO) é padronizada nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em três vias. A declaração deve ser preenchida pelo médico. Nos locais sem médico, o preenchimento é feito em cartório, diante de duas testemunhas.
- C) o preenchimento correto da declaração é importante para evitar sub-registros ou insuficiência das informações registradas. Isso impacta diretamente a assistência à saúde, por se tratar de indicador para o planejamento de políticas de saúde.
- D) os sub-registros são comuns em regiões mais desenvolvidas do Brasil, como sul e sudeste.

## Questão 6

A tabela a seguir descreve a proporção de internações hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) por causas externas, no período de 1998 a 2005.

**Proporção (%) de Internações Hospitalares (SUS)\* por Grupos de Causas Externas  
Brasil e Grandes Regiões, 1998 e 2005**

Grupos de Causas	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		C. Oeste	
	1998	2005	1998	2005	1998	2005	1998	2005	1998	2005	1998	2005
Quedas	40,5	41,8	41,8	27,9	33,4	31,3	43,5	48,7	44,8	47,7	31,0	37,3
Acidentes de transporte	19,7	15,8	14,1	8,0	14,8	17,7	24,1	17,5	15,6	12,1	22,3	16,1
Intoxicações	3,6	2,5	2,7	3,8	3,2	2,2	3,4	2,4	4,4	2,3	5,2	3,4
Agressões	6,1	6,1	9,8	4,9	6,3	7,1	5,9	6,7	4,3	4,4	5,6	4,5
Lesões auto-provocadas voluntariamente	1,6	1,3	1,7	2,4	1,2	0,7	2,0	1,6	1,2	0,6	1,2	1,0
Demais causas externas	28,6	32,6	30,0	53,0	41,1	41,0	21,1	23,2	29,6	32,9	34,7	37,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* Segundo local de residência.

Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Sobre esse indicador e a tabela, é **CORRETO** afirmar que

- A) o indicador mede a participação relativa dos grupos de causas externas de internação hospitalar no total de internações por causas externas realizadas no SUS.
- B) o indicador reflete a demanda hospitalar que, por sua vez, é condicionada pela oferta de serviços no SUS. Não expressa, necessariamente, o quadro nosológico da população residente.
- C) o indicador demonstra que a concentração de internações em determinados grupos de causas externas sugere correlações com os contextos econômicos e sociais.
- D) o indicador demonstra que os acidentes de transporte têm tido sua participação proporcional aumentada ao longo do período analisado em todas as regiões, com exceção da região Nordeste.

### Questão 7

Em relação à assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) que no nível hospitalar, o médico deve verificar se o medicamento preconizado existe no manual de padronização do hospital. Caso não exista, verificar se há algum equivalente terapêutico.
- B) que no nível ambulatorial, verificar se o medicamento está disponível em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas ou em listas padronizadas.
- C) que está incluída ainda no campo de atuação do SUS a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- D) que a assistência farmacêutica gratuita é restrita ao nível hospitalar.

### Questão 8

Em relação ao pacto pela saúde do Sistema Único de Saúde, é **CORRETO** afirmar

- A) se trata de um compromisso público para a definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão do SUS.
- B) o pacto pela vida, componente do pacto pela saúde, está constituído por um conjunto de compromissos políticos, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação econômica do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estadual e municipal.
- C) o pacto em defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como subsistema, fortalecendo seus princípios e diretrizes, que incluem coparticipação e regulação do acesso.
- D) o pacto de gestão estabelece as responsabilidades claras do sistema privado de saúde que atua de forma complementar ao SUS.

### Questão 9

O indicador que, de forma mais consistente, é influenciado por fatores econômicos e sociais é o da

- A) mortalidade infantil.
- B) natimortalidade.
- C) mortalidade neonatal.
- D) mortalidade pós-natal.

### Questão 10

Sobre as características da atenção básica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ser desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- B) As ações da atenção básica devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
- C) Ser o contato secundário dos usuários com o sistema de saúde.
- D) A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

### Questão 11

Em relação à saúde suplementar, normatizada pela Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) o plano privado de assistência à saúde é a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada.
- B) a assistência médica, hospitalar e odontológica, ao contrário do Sistema Único de Saúde (SUS), deverá ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.
- C) o plano-referência de assistência à saúde regulamentado tem cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar. Entretanto, exclui tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais, inseminação artificial e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.
- D) pacientes conveniados, quando necessitarem, podem utilizar o Sistema Único de Saúde sem ônus às prestadoras; e o contrário, pacientes que utilizam exclusivamente o Sistema Único de Saúde, quando necessitarem, podem utilizar o sistema privado, sem ônus ao sistema público.



### Questão 12

Considerando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), é **INCORRETO** afirmar que

- A) a universalidade diz respeito ao acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- B) a integralidade de assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- C) a igualdade diz respeito à assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- D) resolutibilidade está relacionada à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

### Questão 13

Um médico plantonista realiza um diagnóstico de edema pulmonar em um hospital universitário, devendo preencher uma (AIH) Autorização de Internação Hospitalar para a internação do paciente. A informação que consta desse preenchimento e que está relacionado ao valor a ser recebido pelo hospital por esse procedimento é

- A) o diagnóstico.
- B) o local de moradia.
- C) o local de nascimento.
- D) a titulação do profissional que realiza o preenchimento.

### Questão 14

São fatores relacionados à acessibilidade aos serviços de saúde:

- I. Econômicos.
- II. Geográficos.
- III. Culturais.
- IV. Funcionais.

Estão **CORRETOS** os itens.

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e IV apenas.
- C) I e II apenas.
- D) I, II e III apenas.

### Questão 15

A epidemiologia foi definida como “[...] o estudo da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas e sua aplicação na prevenção e controle dos problemas de saúde”.

Nesse sentido, pode-se dizer que a epidemiologia poderá:

- I. Fornecer dados para prevenção das doenças e na promoção da saúde.
- II. Servir como base para que os profissionais da área da saúde possam atender de forma integral a crescente demanda de serviços de saúde da população e assegurar que os recursos destinados à saúde sejam usados da melhor maneira possível.
- III. Encorajar a boa prática clínica por meio da introdução dos conceitos de epidemiologia clínica.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) I e III apenas.
- D) I, II e III.

### Questão 16

O estudo dos fatores causais das doenças e agravos à saúde é fundamental para a epidemiologia.

Sobre as doenças crônicas degenerativas, **NÃO** é correto afirmar que

- A) raramente os desfechos em saúde são determinados por uma única causa.
- B) o entendimento das causas das doenças e agravos à saúde não é necessário para o diagnóstico, uma vez que existem exames clínicos e laboratoriais para detectar todas as doenças existentes.
- C) os fatores causais podem ser organizados em uma ordem hierárquica, desde o mais proximal, até o mais distal fator socioeconômico.
- D) os critérios usados para avaliar evidências de causalidade incluem: relação temporal, plausibilidade, consistência, força, relação dose-resposta, reversibilidade e delineamento do estudo.

### Questão 17

São fatores que podem levar ao aumento da prevalência de doenças:

- A) aumento da duração das doenças.
- B) redução da sobrevivência dos indivíduos doentes.
- C) maior letalidade da doença.
- D) emigração de casos.

### Questão 18

Em relação aos tipos de estudos epidemiológicos, **NÃO** é correto afirmar

- A) os ensaios clínicos randomizados são estudos que avaliam a eficácia dos medicamentos e são utilizados pelas agências de vigilância sanitária (nacional e internacional) para aprovação da comercialização de medicamentos.
- B) os estudos de caso-controle são estudos observacionais e são muito úteis para estudo de doenças raras.
- C) os estudos de coorte são estudos longitudinais (prospectivos ou retrospectivos), que auxiliam o estudo de história natural das doenças, capazes de demonstrar a associação entre fatores de exposição e desfechos.
- D) os estudos transversais são estudos experimentais, úteis para avaliação de efetividade de novos medicamentos ou procedimentos hospitalares.

### Questão 19

Marques e Mendes (2012), no artigo sobre a problemática do financiamento da saúde pública, relatam que a falta de financiamento compatível com uma política de saúde universal e integral inequivocadamente produz resultados nefastos para a saúde pública.

De acordo com os autores, **NÃO** é correto afirmar

- A) que a carência de recursos adequados sistematicamente coloca em questão a qualidade das ações e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e fomenta o argumento daqueles que entendem a saúde pública como aquela que se dedica somente à atenção básica ou dirigida apenas aos segmentos mais pobres da população.
- B) que as tentativas realizadas durante o primeiro governo Lula de incluir como despesa do Ministério da Saúde itens não reconhecidos como gastos SUS indicam que o governo federal estava disposto a aumentar a participação no gasto com saúde, elevando-o a, pelo menos, 7% do Produto Interno Bruto (PIB) e, com isso, melhorar a qualidade da atenção, melhorar o acesso às ações e serviços de saúde.
- C) que o SUS foi criado sem ter havido, de fato, a opção de priorizar um sistema público, por ser incompatível com a permanência dos incentivos aos cuidados com a saúde privada, presentes no sistema tributário do País.
- D) que para dobrar o gasto público em saúde de modo a atingir nível condizente com a média dos demais países que têm sistema similar, seria preciso mais do que simplesmente obter aumento de recursos mediante barganha, seria necessário elevar o SUS à condição de prioridade entre as políticas de governo.

### Questão 20

Em relação aos recursos financeiros para a saúde, analise as seguintes alternativas e assinale a **INCORRETA**.

- A) Aplicação de recursos financeiros na saúde segue uma lógica hospitalocêntrica, na qual regiões com maior disponibilidade estrutural recebem maiores recursos, favorecendo o aumento das desigualdades regionais no acesso às ações e serviços de saúde.
- B) A decisão de investir recursos e esforços na vigilância à saúde e na atenção básica tem o mérito de perseguir a redução de riscos e preservação da saúde, mas tem, também, o mais longo prazo, o efeito de evitar gastos maiores com a recuperação e reabilitação de pacientes.
- C) As necessidades de recursos financeiros do setor tendem a ser sempre crescentes, ainda mais se considerarmos, a isso associados, o aumento e o envelhecimento da população, as características próprias do processo de transição epidemiológica e a rapidez do desenvolvimento e incorporação de tecnologias.
- D) A responsabilização do gestor (e gerentes), pelo planejamento, regulação, controle e avaliação de ações e serviços, não é somente uma forma regulatória, mas também útil para otimização dos recursos aplicados em saúde.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

Uma paciente de 38 anos de idade, G4P3A0, com 36 semanas de gestação, admitida na maternidade devido a hipertensão arterial crônica e crise convulsiva há 2 horas. Faz uso de metildopa (1,5g por dia). No exame físico apresenta PA de 160x100mmHg, pulso 94bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0cm.

Considerando esse quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta a conduta **CORRETA** a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever nifedipina via oral associada a alfametildopa e recomendar controle materno fetal.
- D) Prescrever hidralazina endovenosa e indicar resolução da gestação

### Questão 22

Uma paciente de 22 anos, portadora do HIV e em uso de antirretrovirais combinados, possui carga viral indetectável (menos de 50 cópias/mL) na 34ª semana.

Considerando que a via de parto escolhida foi a vaginal, é **CORRETO** afirmar que essa escolha necessariamente incluirá:

- A) episiotomia alargada.
- B) uso rotineiro de fórceps de alívio.
- C) espera do término da pulsação uterina para se fazer a ligadura do cordão umbilical.
- D) uso de zidovudina (AZT) intravenosa até o clampeamento do cordão umbilical.

### Questão 23

Vários são os distúrbios clínicos durante a gravidez. Diferenciá-los pode ser importante para a manutenção da mesma, assim como para a viabilidade fetal.

Sobre esses distúrbios, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a frequência cardíaca materna diminui cerca de 10bpm durante o terceiro trimestre.
- B) o débito cardíaco aumenta 40%, em grande parte devido a um aumento no volume sistólico.
- C) no segundo trimestre, a resistência vascular diminui, o que acarreta queda da pressão arterial.
- D) durante a gestação, a pressão arterial de 140/90mmHg é considerada anormalmente elevada e está associada a aumento da morbidade e mortalidade perinatais.

### Questão 24

Assinale a alternativa que apresenta descrição associada a grupos de alto risco em triagem de mulheres durante a gravidez para os casos de diabetes gestacional.

- A) Índice de massa corporal menor que 25kg/m<sup>2</sup>.
- B) Ausência de história materna de macrossomia.
- C) Nenhum diabético em parente de primeiro grau.
- D) Pertencimento a um grupo étnico (afrodescendentes, latinas e norte-americanas).

### Questão 25

Uma paciente de 20 anos, G2P1, com idade gestacional de 35 semanas, apresenta discreto retardo de crescimento intrauterino. A Frequência Cardíaca Fetal (BCF) foi avaliada por 20 minutos, período em que o feto se movimentou várias vezes sem que houvesse contrações uterinas. O BCF oscilou de 130 a 140bpm, com acelerações transitórias de até 160bpm, por 20 a 30 segundos, depois que o feto se mexia.

Considerando esse quadro, assinale a alternativa que apresenta a conclusão **CORRETA**.

- A) A oscilação do BCF sugere moderado comprometimento do bem-estar fetal.
- B) As acelerações transitórias, assim como a oscilação do BCF, sugerem bem-estar fetal.
- C) A oscilação do BCF sugere bem-estar fetal, mas as acelerações transitórias indicam certo grau de sofrimento fetal.
- D) O feto apresenta provável centralização da circulação sanguínea devido a hipóxia fetal.

### Questão 26

Uma paciente de 23 anos de idade, primigesta, 30 semanas de gestação, comparece a consulta pré-natal sem queixas. Os exames laboratoriais do início da gravidez encontravam-se normais; os exames de rotina do terceiro trimestre mostram VDRL positivo 1:4.

Considerando esse caso assinale a alternativa que apresenta a conduta **CORRETA** a ser tomada.

- A) Solicitar novo VDRL para confirmar resultado do exame anterior.
- B) Não há nada a fazer, pois o resultado do VDRL é um falso positivo.
- C) Solicitar prova treponêmica para definir o diagnóstico.
- D) Iniciar imediatamente tratamento com penicilina benzatina.

### Questão 27

Em uma gestante de 25 anos isoimunizada, a propedêutica complementar tem importância fundamental.

A respeito desse caso, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Em fetos comprometidos, o padrão sinusoidal em cardiocografia não é encontrado.
- B) *Doppler* da artéria cerebral média é o método confiável para avaliar o grau de comprometimento fetal.
- C) Títulos ascendentes de *Coombs* indireto não indicam provável agravamento do feto.
- D) A amniocentese seriada com espectrofotometria de líquido amniótico não tem indicação nesses casos.

### Questão 28

A respeito de gestações de mulheres com Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (SAF), é **CORRETO** afirmar que a perda fetal:

- A) está associada a malformação uterina.
- B) é a expressão clínica menos frequente da doença.
- C) pode ocorrer em qualquer trimestre.
- D) está associada a cromossomopatias.

### Questão 29

Uma paciente de 23 anos comparece a consulta médica com queixas de corrimento genital.

Considerando as diretrizes do programa de abordagem sindrômica de prevenção e assistência às DST/HIV/AIDS do Ministério da Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Uma paciente com corrimento e cujo parceiro tenha secreção uretral deve ser tratada para cervicite, mesmo sem achados clínicos sugestivos.
- B) Na dúvida entre vaginose e tricomoníase, o pH vaginal deve ser utilizado para o diagnóstico diferencial.
- C) A presença de hifas ao exame a fresco pode ser mais bem observada com a adição de KOH a 10% na lâmina.
- D) A visualização de um colo friável e sangrante com muco-pus leva à suspeita clínica de uma infecção por clamídia e/ou gonorreia.



### Questão 30

Assinale a alternativa que apresenta fatores que predispõem à instalação de um quadro de candidíase vaginal.

- A) Uso de DIU e nefropatia.
- B) Gravidez e diabetes *mellitus*.
- C) Antibioticoterapia e pós-operatório.
- D) Anticoncepcional oral e hipertensão arterial.

### Questão 31

A respeito das diretrizes do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A elaboração, a execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher dever-se-ão nortear pela perspectiva de gênero, de raça e de etnia e pela ampliação do enfoque, rompendo-se as fronteiras da saúde sexual e da saúde reprodutiva, para alcançar todos os aspectos da saúde da mulher.
- B) O processo de elaboração, execução e avaliação das Políticas de Atenção à Saúde da Mulher deverá ser de responsabilidade exclusiva dos gestores municipal, estadual e federal, não devendo haver interferências de classes ou grupos sociais nesse processo.
- C) O SUS deverá garantir o acesso das mulheres a todos os níveis de atenção à saúde, no contexto da descentralização, hierarquização e integração das ações e serviços. É responsabilidade dos três níveis de gestores, municipal, estadual e federal de acordo com as competências de cada um, garantir as condições para a execução da Política de Atenção à Saúde da Mulher.
- D) No âmbito do setor de saúde, a execução de ações será pactuada entre todos os níveis hierárquicos, visando a uma atuação mais abrangente e horizontal, além de permitir o ajuste às diferentes realidades regionais.

### Questão 32

Gestante com 32 semanas apresenta, em consulta de rotina pré-natal, pressão arterial de 150 x 100mmHg.

Assinale a conduta **CORRETA** a ser adotada.

- A) Administrar alfametildopa e realizar controle diário de pressão.
- B) Realizar monitorização da pressão arterial e, em caso de hipertensão, solicitar exames.
- C) Administrar levopromazina e iniciar controle rigoroso de pressão arterial.
- D) Solicitar proteinúria e exames para diagnóstico de síndrome *HELLP* imediatamente.

### Questão 33

Gestante com 28 semanas procura serviço médico com história de dor em baixo ventre. Ao exame, observam-se duas contrações de 30 segundos em 10 minutos e, ao toque o colo encontra-se pérvio para 3cm, com 80% de apagamento e apresentação pélvica.

Assinale a conduta **CORRETA** a ser adotada.

- A) Solicitar exame de urina e observação para reavaliação.
- B) Solicitar exame a fresco de conteúdo vaginal com retorno em 48 horas.
- C) Realizar cesariana após a corticoterapia.
- D) Internar e iniciar corticoterapia associada a tocolise.

### Questão 34

Mulher com diagnóstico de infertilidade procura serviço médico solicitando informações sobre a possibilidade de utilizar o útero de outra mulher para gestação.

Quanto à orientação a ser dada, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) esse procedimento somente é possível se houver parentesco de primeiro grau entre as doadoras.
- B) é possível esse procedimento desde que haja parentesco até o segundo grau entre as doadoras.
- C) a legislação brasileira não permite esse tipo de procedimento.
- D) esse procedimento é possível, sem necessidade de parentesco entre as doadoras; porém é necessária autorização prévia do CRM e não pode haver caráter comercial.

### Questão 35

Mulher com idade gestacional de sete semanas procura serviço médico solicitando abortamento, por tratar-se de gestação fruto de violência sexual.

Considerando esse caso, é **CORRETO** afirmar que:

- A) esse procedimento poderá ser realizado mesmo na ausência de boletim de ocorrência.
- B) a legislação brasileira não permite esse tipo de procedimento.
- C) esse procedimento poderá ser realizado mediante assinatura de três testemunhas.
- D) deve-se realizar esse procedimento, somente após tentativa de pré-natal e avaliação psicológica.

### Questão 36

Mulher procura serviço médico com história de surgimento de uma ferida pequena com pus na região genital. Após algum tempo, formou-se uma ferida úmida e bastante dolorosa, que se espalhou e aumentou de tamanho e profundidade. A seguir, surgiram outras feridas em volta das primeiras. Após duas semanas do início da doença, apareceu um caroço doloroso e avermelhado na virilha.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a conduta **CORRETA** respectivamente.

- A) Cancro duro e ceftriaxone.
- B) Cancro mole e benzetacil.
- C) Cancro duro e azitromicina.
- D) Cancro mole e azitromicina.

### Questão 37

Paciente de 23 anos, tabagista pesada, primigesta, apresenta um sangramento uterino significativo após um parto vaginal complicado pelo descolamento prematuro da placenta com 38 semanas. Houve necessidade de ressuscitação neonatal, mas o recém-nascido evolui bem. Observa-se que ela sangra em múltiplos locais de punção venosa.

Assinale a terapia **CORRETA**.

- A) Histerectomia imediata.
- B) Correção de coagulopatia.
- C) Tamponamento do útero.
- D) Ligadura da artéria hipogástrica.

### Questão 38

Paciente de 35 anos, primigesta, com gestação gemelar de 30 semanas queixa-se de sonolência, fadiga, cefaleia frequente, dispneia nos grandes esforços, pirose, edema em MMII e dor lombar. Previamente hígida. Ao exame físico: pressão arterial de 110x60 mmHg, pulso de 78bpm, hiperfonese de primeira bulha e sopro sistólico, grau II em foco pulmonar.

É **CORRETO** afirmar que esse quadro clínico é compatível com:

- A) alterações fisiológicas da gravidez.
- B) estenose pulmonar.
- C) batrioventricular.
- D) insuficiência tricúspide.

### Questão 39

Paciente tercigesta, de 34 anos de idade e com antecedente de diabetes gestacional está com 21 semanas de gestação e apresenta os seguintes resultados: glicemia de jejum de 102mg/dl com 16 semanas de gestação. Neste retorno, foi solicitada glicemia 2 horas após 75g de dextrosol e o resultado foi igual a 156mg/dl.

Considerando esse resultado assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao indicado no caso descrito.

- A) Iniciar conduta para controle glicêmico, pois se trata de diabetes gestacional.
- B) Repetir o teste após dextrosol para diagnóstico de diabetes entre 24 e 28 semanas de gestação.
- C) Solicitar teste oral de tolerância a glicose completo (glicemia de jejum, 1, 2 e 3hs após dextrosol).
- D) Repetir glicemia de jejum.

#### Questão 40

Paciente de 17 anos, primigesta, paternidade da criança desconhecida, trabalhadora com ambulante, gravidez não planejada, comparece a maternidade no dia 10/02/2014. Informa DUM = 10/12/2013. Encontra-se assintomática. Apresenta cartão de pré-natal com resultados de exames realizados em 21/01/2014: Grupo sanguíneo AB negativo, glicemia de jejum de 106mg/dl, teste de *coombs* indireto negativo, hemoglobina de 11,6g/dl, sorologia para toxoplasmose IgG positivo e IgM negativo, teste anti-HIV 1 e 2 Negativo, HbsAg não reator, VDRL não reator, urocultura positiva, acima de 100.000 unidades formadoras de colônias de *Escheria coli*.

A respeito da conduta médica adequada neste dia, a partir das informações fornecidas, está **CORRETO** afirmar que:

- A) o teste de *coombs* indireto foi corretamente solicitado, mas será preciso também solicitar o grupo sanguíneo com fator Rh e o *coombs* indireto paterno.
- B) está indicada a realização do teste de tolerância a glicose duas horas após ingestão de 75g de dextrosol.
- C) recomendam-se repetição mensal de sorologia para toxoplasmose e orientações sobre profilaxia.
- D) o HbsAg é compatível com susceptibilidade e justifica vacinação após o parto.



# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01  A  B  C  D

02  A  B  C  D

03  A  B  C  D

04  A  B  C  D

05  A  B  C  D

06  A  B  C  D

07  A  B  C  D

08  A  B  C  D

09  A  B  C  D

10  A  B  C  D

11  A  B  C  D

12  A  B  C  D

13  A  B  C  D

14  A  B  C  D

15  A  B  C  D

16  A  B  C  D

17  A  B  C  D

18  A  B  C  D

19  A  B  C  D

20  A  B  C  D

21  A  B  C  D

22  A  B  C  D

23  A  B  C  D

24  A  B  C  D

25  A  B  C  D

26  A  B  C  D

27  A  B  C  D

28  A  B  C  D

29  A  B  C  D

30  A  B  C  D

31  A  B  C  D

32  A  B  C  D

33  A  B  C  D

34  A  B  C  D

35  A  B  C  D

36  A  B  C  D

37  A  B  C  D

38  A  B  C  D

39  A  B  C  D

40  A  B  C  D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**