

## Cargo 859

### Médico – Ortopedia e Traumatologia

**Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 8h30**

#### INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
  - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
  - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

**A vida é um palco que não admite ensaios.**

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

#### INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: 

## QUESTÃO 41 \_\_\_\_\_

A linha traçada pelo longo eixo femoral e a linha traçada pelo longo eixo tibial chamam-se

- (A) eixo mecânico do membro inferior.
- (B) ângulo Q.
- (C) eixo anatômico do membro inferior.
- (D) ângulo de TRILLAT.
- (E) linha de KLEIN.

## QUESTÃO 42 \_\_\_\_\_

Na deformidade de Sprengel, é correto afirmar que

- (A) a escápula situa-se em posição inferior em relação à caixa torácica.
- (B) é comum a ausência total de um ou mais músculos escapulares.
- (C) a incapacidade funcional sempre é grave.
- (D) a cabeça do paciente frequentemente está desviada para o lado afetado.
- (E) um ossículo, o osso omovertebral, está presente praticamente em todos os casos.

## QUESTÃO 43 \_\_\_\_\_

No desvio ulnar grave das articulações metacarpofalangeanas na mão reumatoide, é correto afirmar que a principal força deformante é causada pelo

- (A) mecanismo extensor.
- (B) ligamento colateral ulnar.
- (C) encurtamento da musculatura interóssea.
- (D) ligamento transverso.
- (E) tendão flexor.

## QUESTÃO 44 \_\_\_\_\_

Quanto ao condrossarcoma primário, é correto afirmar que

- (A) é de abordagem estritamente cirúrgica, pois não responde bem à rádio e quimioterapia.
- (B) responde bem somente à quimioterapia adjuvante.
- (C) responde bem somente à radioterapia adjuvante.
- (D) responde bem à rádio e quimioterapia adjuvantes.
- (E) só responde bem à rádio e quimioterapia adjuvantes em tumores de baixa agressividade.

## QUESTÃO 45 \_\_\_\_\_

Na doença de Kienbock, é correto afirmar que o tratamento de escolha para os estágios I e II de Litchman associado à variante *ulna minus* é

- (A) alongamento da ulna.
- (B) encurtamento do rádio de 2 mm.
- (C) encurtamento do rádio de 4 mm.
- (D) encurtamento do rádio associado a alongamento da ulna.
- (E) artroplastia de ressecção do punho.

## QUESTÃO 46 \_\_\_\_\_

A fratura em crescente do anel pélvico ocorre por mecanismo

- (A) de compressão lateral.
- (B) de compressão anteroposterior.
- (C) combinado de compressão anteroposterior e cisalhamento vertical.
- (D) de cisalhamento vertical.
- (E) de distração.

## QUESTÃO 47 \_\_\_\_\_

Assinale a alternativa que apresenta uma indicação de mosaicoplastia ou transplante autólogo de condrocitos no joelho.

- (A) Idade acima de 45 anos.
- (B) Defeitos osteocondrais maiores que 4 cm<sup>2</sup>.
- (C) Lesão condral tipo II e III na classificação artroscópica de Outerbridge.
- (D) Lesão condral em pacientes com eixo mecânico alterado.
- (E) Defeito osteocondral bem definido e rodeado por cartilagem normal.

## QUESTÃO 48 \_\_\_\_\_

Quanto à osteoporose senil, é correto afirmar que

- (A) é mais frequente em homens.
- (B) caracteriza-se por perda acelerada de massa óssea.
- (C) apresenta cálcio sérico normal.
- (D) apresenta nível diminuído de PTH.
- (E) apresenta níveis de fósforo muito aumentados.

## QUESTÃO 49 \_\_\_\_\_

Acerca da fratura exposta da tíbia, assinale a alternativa correta.

- (A) A osteossíntese intramedular é o método de escolha para tratamento do tipo III B de Gustillo et al.
- (B) A osteossíntese com placas e parafusos é a melhor alternativa de tratamento.
- (C) Os aminoglicosídeos devem ser associados às cefalosporinas no tratamento dos tipos II e III de Gustillo et al.
- (D) A cobertura de partes moles deve ser obtida na primeira semana após o trauma, com rotação de retalhos, enxertia cutâneo ou fechamento primário tardio da ferida.
- (E) A fixação definitiva da fratura é sempre a melhor opção.

## QUESTÃO 50 \_\_\_\_\_

Na fratura do colo femoral da criança, o (a)

- (A) tipo I de Delbet corresponde a um traço de fratura transcervical.
- (B) fixação interna estável está indicada em todos os casos tipo II de Delbet.
- (C) trauma de baixa energia é responsável pela maioria dos casos.
- (D) tipo III de Delbet desviado, está indicado à redução incruenta e imobilização gessada.
- (E) tipo mais associado à pseudartrose é o I.