



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS

Cargo:
**Enfermeiro da Estratégia de Saúde
da Família**

CÓDIGO DA PROVA

S02T
TARDE

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas, de acordo com o edital, o candidato que fizer prova com código diferente será eliminado.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE
RESPOSTAS, A FRASE DE WALTER GRANDO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“Saibas que a felicidade estará em todos os momentos que permitires senti-la.”

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Sistema Único de Saúde – SUS	10	2
Conhecimentos Específicos	30	2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
Reserve os 30 minutos finais para marcar seu cartão de respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Texto para responder às questões de 01 a 10.

Casa de pensão

João Coqueiro, quando saiu do Hotel dos Príncipes na manhã do almoço, ia preocupado [...] e correu logo para casa.

Ao chegar foi direto à mulher [...]

– Sabes? disse ele, sem transição, assentando-se ao rebordo da cama. – É preciso arranjarmos cômodo para um rapaz que há de vir por aí domingo. [...]

– É um achado precioso! Ainda não há dois meses que chegou do Norte, anda às apalpadelas! Estivemos a conversar por muito tempo: - é filho único e tem a herdar uma fortuna! [...]

Mme. Brizard escutava, sem despregar os olhos de um ponto, os pés cruzados e com uma das mãos apoiando-se no espaldar da cama.

– Ora, continuou o outro gravemente. – Nós temos de pensar no futuro de Amelinha... ela entrou já nos vinte e três!... se não abirmos os olhos... adeus casamento!

– Mas daí... perguntou a mulher, fugindo a participar da confiança que o marido revelava naquele plano.

– Daí – é que tenho cá um palpite! explicou ele. – Não conheces o Amâncio!... A gente leva-o para onde quiser!... Um simplório, mas o que se pode chamar um simplório.

Mme. Brizard fez um gesto de dúvida.

– Afianço-te,olveu Coqueiro – que, se o metermos em casa e se conduzirmos o negócio com um certo jeito, não lhe dou três meses de solteiro!

[...]

– Negócio decidido! A questão é arranjar-lhe o cômodo, e já! Tu – fala com franqueza à Amelinha; a mim não fica bem... [...]

Nessa mesma tarde Mme. Brizard entendeu-se com a cunhada. Falou-lhe sutilmente no "futuro", disse-lhe que "uma menina pobre, fosse quanto fosse bonita, só com muita habilidade e alguma esperteza poderia apanhar um marido rico".

[...]

Amélia riu, concentrou-se um instante e prometeu fazer o que estivesse no seu alcance, para agradar ao tal sujeitinho.

Ardia, com efeito, por achar marido, por se tornar dona de casa. A posição subordinada de menina solteira não se compadecia com a sua idade e com as desenvolturas do seu espírito. Graças ao meio em que se desenvolveu, sabia perfeitamente o que era pão e o que era queijo; por conseguinte as precauções e as reservas, que o irmão tomava para com ela, faziam-na sorrir.

Às vezes tinha vontade de acabar com isso. "Que diabo significavam tais cautelas?... Se a

supunham uma toleirona, enganavam-se – ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo ouvido de uma agulha!"

– Agora, por exemplo, neste caso do tal Amâncio, que custava ao Coqueiro explicar-se com ela francamente?...[...] Mas, não senhor! – meteu-se nas encolhas e entregou tudo nas mãos da mulher!

[...]

E Amélia, quanto mais refletia no caso, tanto mais se revoltava contra a reserva do irmão.

– Ele já a devia conhecer melhor! pelo menos já devia saber que aquela que ali estava era incapaz de cair em qualquer asneira; aquela não "dava ponto sem nó". Outra, que fosse, quanto mais – ela, que conhecia os homens, como quem conhece a palma das próprias mãos! – Ela, que vira de perto, com os seus olhos de virgem, toda a sorte de tipos! – ela, que lhes conhecia as manhas, que sabia das lábias empregadas pelos velhacos para obter o que desejam e o modo pelo qual se portam [...!] – Ela! tinha graça!

AZEVEDO, Aluisio. *Casa de pensão*. São Paulo: Ática, 1992, p.71-73. (Fragmento).

Vocabulário:

Meteu-se nas encolhas: calou-se.

Questão 01

Mme. Brizard fica incumbida de falar com Amélia sobre o plano do casamento. Que argumento ela usa para convencer a cunhada?

- "Nós temos de pensar no futuro de Amelinha... ela entrou já nos vinte e três!..."
- A gente leva-o para onde quiser!... Um simplório, mas o que se pode chamar um simplório."
- Negócio decidido! A questão é arranjar-lhe o cômodo, e já!
- "uma menina pobre, fosse quanto fosse bonita, só com muita habilidade e alguma esperteza poderia apanhar um marido rico".
- "Estivemos a conversar por muito tempo: - é filho único e tem a herdar uma fortuna!"

Questão 02

Percebe-se, pelo fragmento em análise, que:

1. a moça se irritou com os cuidados do irmão que a imaginava uma tola, fria, calculista mas cheia de ilusões românticas.
2. ao apontar a reflexão de Amélia sobre o estratagema que lhe foi apresentado, o narrador oferece ao leitor uma caracterização bastante crua da personagem.
3. Amélia mantinha-se casta ainda, pois sabia que esse era o "bem mais precioso" que tinha para garantir um casamento.

Está correto o que apresenta em:

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 1, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

Questão 03

Sobre os elementos destacados do fragmento "Outra, que fosse, quanto mais – ela, que conhecia os homens", leia as afirmativas.

- I. O segundo QUE é uma conjunção adverbial.
- II. A palavra ELA é um pronome pessoal do caso oblíquo.
- III. OUTRA é um pronome adjetivo indefinido.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) III.
- B) I e III.
- C) II.
- D) I.
- E) I e II.

Questão 04

O segmento "Às vezes tinha vontade de acabar com isso. "Que diabo significavam tais cautelas?... Se a supunham uma toleirona, enganavam-se – ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo ouvido de uma agulha!" está substancialmente marcado pelo uso do:

- A) pretérito perfeito do indicativo, indicando o fato concluído em um intervalo de tempo anterior a um ponto de referência presente.
- B) presente do indicativo, representando o fato não concluído, no momento da enunciação.
- C) mais-que-perfeito do indicativo, representando o fato como concluído, situando-o em um intervalo de tempo anterior a um ponto de referência passado.
- D) pretérito imperfeito do indicativo, representando o fato como não concluído, situando-o em um espaço de tempo simultâneo a um ponto de referência passado.
- E) pretérito imperfeito do subjuntivo, representando o concluído em relação a um universo hipotético.

Questão 05

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) "ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo ouvido de uma agulha!" = ela era muito capaz de enfiá-los a todos pelo ouvido de uma agulha!
- B) "A posição subordinada de menina solteira não se compadecia com a sua idade" = A posição subordinada de menina solteira não compadecia-se com a sua idade.
- C) "Mme. Brizard fez um gesto de dúvida." = Mme. Brizard fez um gesto à dúvida.
- D) "– Ele já a devia conhecer melhor!" = – Ele já devia conhecer-lhe melhor!
- E) "Se a supunham uma toleirona, enganavam-se." = Se a supunham uma toleirona, se enganavam.

Questão 06

No fragmento "E Amélia, quanto mais refletia no caso, tanto mais se revoltava contra a reserva do irmão." as orações estabelecem entre si uma relação de:

- A) contraste
- B) adição e preterição.
- C) consequência e finalidade.
- D) quantificação e qualificação.
- E) causa e efeito

Questão 07

A primeira oração do segmento “se não abrimos os olhos... adeus casamento!”, como efeito expressivo, apresenta um(a):

- A) prosopopeia.
- B) hipérbole.
- C) metáfora.
- D) pleonasma.
- E) paradoxo.

Questão 08

Os termos destacados em “SE a supunham uma toleirona, enganavam-SE.”, no contexto, são, respectivamente:

- A) conjunção integrante e pronome reflexivo.
- B) pronome apassivador e pronome indefinido.
- C) pronome reflexivo e pronome reflexivo.
- D) conjunção adverbial e pronome reflexivo.
- E) partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito.

Questão 09

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção do texto:

- I. Na frase “– Ora, continuou o OUTRO gravemente.”, o termo destacado é um substantivo.
- II. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase, o A, em todas as ocorrências do trecho “Estivemos a conversar por muito tempo: - é filho único e tem a herdar uma fortuna!”, deveria ser acentuado.
- III. Na frase “Às vezes tinha vontade de acabar com ISSO.”, refere-se a “Que diabo significavam tais cautelas?”

Está correto o que se afirma apenas em:

- A) II.
- B) I e III.
- C) I e II.
- D) I.
- E) II e III.

Questão 10

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os verbos destacados em “Mme. Brizard ESCUTAVA, sem DESPREGAR os olhos de um ponto, os pés cruzados e com uma das mãos APOIANDO-se no espaldar da cama.”.

- I. As três formas verbais são núcleos do predicado das orações a que pertencem.
- II. Os três verbos indicam, basicamente, o estado das coisas.
- III. O terceiro verbo é significativo e necessita de complemento.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) I e III.
- E) II.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**Questão 11**

Considerando os fundamentos e diretrizes da atenção básica, analise as afirmativas a seguir.

- I. A atenção básica deve ter território adstrito, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais.
- II. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização do serviço de saúde que regule a entrada do usuário e reduza os serviços de porta aberta.
- III. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II.
- B) I e III.
- C) I.
- D) I e II.
- E) III.

Questão 12

Assinale a alternativa que corresponde a uma responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde em relação à atenção básica.

- A) Inserir a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como estratégia prioritária de organização da atenção básica.
- B) Verificar a qualidade e a consistência dos dados enviados pelos municípios por meio dos sistemas informatizados, retornando informações aos gestores municipais.
- C) Definir estratégias de articulação com as gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.
- D) Analisar os dados de interesse estadual, gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.
- E) Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite, as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

Questão 13

Conforme recomendação da Política Nacional da Atenção Básica a respeito das especificidades das Equipes de Saúde da Família – ESF analise as afirmativas a seguir.

- I. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável, no máximo, 3.500 pessoas, sendo a média recomendada de 2.000 pessoas.
- II. O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- III. Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em apenas uma equipe, com exceção do profissional médico que pode atuar em até 3 ESF.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) III.
- B) II e III.
- C) I.
- D) II.
- E) I e II.

Questão 14

O “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” corresponde à definição do seguinte princípio do SUS:

- A) Integralidade.
- B) equidade.
- C) descentralização.
- D) universalidade.
- E) hierarquização.

Questão 15

Marque a alternativa que corresponde a uma das prioridades do Pacto pela Vida.

- A) Redes de urgência
- B) Saúde do trabalhador
- C) Alta complexidade
- D) Saúde do homem
- E) Promoção da saúde

Questão 16

A Norma Operacional Básica – NOB 1/96 do SUS teve por finalidade primordial promover e consolidar o(a):

- A) Plano Diretor de Regionalização - PDR como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência.
- B) Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), como uma das condições de gestão dos sistemas municipais de saúde.
- C) conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência intermunicipal.
- D) processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- E) pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios.

Questão 17

De acordo com as disposições legais acerca da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os Estados e o Distrito Federal devem aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos previstos em lei.
- II. Os Planos Estaduais de Saúde deverão explicitar a metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de recursos aos Municípios.
- III. Os recursos da União destinados a investimentos nas ações públicas de saúde terão sua programação realizada semestralmente.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) I.
- C) II.
- D) I e II.
- E) III.

Questão 18

O Decreto nº 7.508/2011 define a Rede de Atenção à Saúde como:

- A) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais.
- B) serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- C) modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade.
- D) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência.
- E) foro de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde.

Questão 19

A Lei nº 8.080/1990 determina que os critérios e valores para a remuneração dos serviços prestados pela iniciativa privada devem ser estabelecidos pela direção nacional do SUS e aprovados pelo(a):

- A) Conselho Municipal de Saúde.
- B) Comissão Intergestores Bipartite.
- C) Comissão Intergestores Tripartite.
- D) Conselho Nacional de Saúde.
- E) Conselho Estadual de Saúde.

Questão 20

Analise as afirmativas a seguir em relação aos Conselhos de Saúde:

- I. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- II. Os Conselhos de Saúde são instâncias responsáveis por avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
- III. Os Conselhos de Saúde devem se reunir a cada dois anos com representação majoritária dos profissionais de saúde.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) I.
- C) I e II.
- D) III.
- E) II.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Conforme a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996 que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências, somente é permitida a esterilização voluntária na seguinte situação:

- A) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e sete anos de idade ou, pelo menos, com três filhos vivos, desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
- B) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.
- C) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e oito anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
- D) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de dezoito anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
- E) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.

Questão 22

Em todas as consultas de pré-natal, deve-se determinar o peso e calcular o índice de massa corporal (IMC), monitorando o ganho de peso corporal. A recomendação de ganho de peso (kg) total na gestação em uma gestante com IMC maior que 30 kg/m² é:

- A) 7,0-14
- B) 12,5-18,0
- C) 10-11,5
- D) 11,5-16
- E) 5,0-9,0

Questão 23

São fatores de risco que indicam o encaminhamento da gestante à urgência/emergência obstétrica:

- A) IG a partir de 41 semanas confirmadas e oligodrâmnio.
- B) edema e hipertensão arterial.
- C) infecção urinária de repetição e suspeita de pré-eclampsia.
- D) gemelaridade e diabetes mellitus gestacional
- E) hipertermia e antecedente de trombose venosa profunda.

Questão 24

A introdução de alimentos na dieta da criança deve complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno. Com qual idade e como se deve iniciar a alimentação complementar?

- A) Com seis meses; uma refeição pela manhã, uma refeição básica da família no final da manhã e uma refeição básica da família no final da tarde.
- B) Com doze meses; adicionando uma papa de frutas no meio da manhã, uma papa salgada no final da manhã e uma papa de fruta no meio da tarde.
- C) Com quatro meses; adicionando uma papa de frutas no meio da manhã, uma papa salgada no final da manhã, uma papa de fruta no meio da tarde e uma papa salgada no final da tarde.
- D) Com dois anos; uma refeição pela manhã, uma fruta, uma refeição básica da família no final da manhã, uma fruta e uma refeição básica da família no final da tarde.
- E) Com seis meses; adicionando uma papa de frutas no meio da manhã, uma papa salgada no final da manhã e uma papa de fruta no meio da tarde.

Questão 25

Apesar da acentuada diminuição da ocorrência de tracoma nas últimas décadas, o agravo persiste acometendo especialmente populações carentes de todas as regiões do país, sendo importante que a equipe de saúde conheça suas manifestações clínicas e formas de transmissão. Sabendo disso marque a alternativa que corresponde às suas formas de transmissão.

- A) Transmitida de pessoa a pessoa, principalmente, através do ar, por gotículas eliminadas pelo indivíduo infectado.
- B) Ingestão de oocisto e infecção transplacentária.
- C) Contato direto, pessoa a pessoa, ou contato indireto, por meio de objetos contaminados (toalhas, lenços, fronhas). As moscas podem contribuir para a disseminação da doença, por transporte mecânico.
- D) A transmissão ocorre pela introdução dos esporos em uma solução de continuidade da pele e mucosas (ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza).
- E) Pessoa a pessoa, pelo contato direto ou por secreções respiratórias (disseminação aérea de partículas virais/aerossóis) e, raramente, através de contato com lesões.

Questão 26

É uma doença que deve ser notificada ao setor de vigilância epidemiológica e investigada obrigatoriamente:

- A) estrogiloidiase.
- B) criptococose.
- C) enterobiase.
- D) cancro mole.
- E) coccidiodomicose.

Questão 27

Os procedimentos para a administração da vacina por via intradérmica são:

- A) higienizar as mãos; checar o imunobiológico a ser administrado; preparar a vacina conforme a sua apresentação; escolher o local para a administração da vacina; fazer a limpeza da pele com algodão e álcool a 70%, introduzir a seringa com bisel da agulha para cima; injetar a vacina; retirar a agulha e fazer compressão no local de administração.
- B) higienizar as mãos; checar o imunobiológico a ser administrado; preparar a vacina conforme a sua apresentação; escolher o local para a administração da vacina; fazer a limpeza da pele com algodão seco; introduzir a seringa com bisel da agulha para cima; injetar a vacina; retirar a agulha; não fazer compressão no local de administração da vacina e higienizar as mãos.
- C) checar o imunobiológico a ser administrado; preparar a vacina conforme a sua apresentação; escolher o local para a administração da vacina; colocar as luvas; fazer a limpeza da pele com algodão e álcool a 70%, introduzir a seringa com bisel da agulha para cima; injetar a vacina; retirar a agulha; não fazer compressão no local de administração e higienizar as mãos.
- D) higienizar as mãos; checar o imunobiológico a ser administrado; preparar a vacina conforme a sua apresentação; escolher o local para a administração da vacina; fazer a limpeza da pele com algodão e álcool a 70%, introduzir a seringa com bisel da agulha para baixo; injetar a vacina; retirar a agulha e fazer compressão no local de administração.
- E) higienizar as mãos; preparar a vacina conforme a sua apresentação; escolher o local para a administração da vacina; colocar as luvas; fazer a limpeza da pele com algodão seco, introduzir a seringa com bisel da agulha para cima; injetar a vacina; retirar a agulha; não fazer compressão no local de administração e higienizar as mãos.

Questão 28

O HIV apresenta um neurotropismo bastante acentuado, levando, frequentemente, ao aparecimento de síndromes neurológicas específicas, particularmente nas fases mais avançadas da infecção. São manifestações neurológicas mais frequentes:

- A) neuropatias periféricas e mielopatia vacuolar.
- B) dor de cabeça alta e delírio.
- C) distonia e mioclonias.
- D) parestesia e afasia.
- E) neurite óptica e encefalopatia crônica.

Questão 29

Se um indivíduo, ao ser diagnosticado com diabetes mellitus, não alcançar a meta glicêmica em até três meses com as medidas não farmacológicas, o tratamento preferencial é acrescentar a metformina no plano terapêutico, devido aos seus muitos benefícios. As contraindicações para o uso de metformina têm se reduzido com a maior experiência de uso, mas mantém-se a contraindicação em pacientes com:

- A) insuficiência hepática.
- B) câncer hepático.
- C) câncer pancreático.
- D) insuficiência cardíaca.
- E) insuficiência renal.

Questão 30

A insulina de ação intermediária ou NPH tem como início de ação e duração, respectivamente:

- A) 30 a 60 minutos e 8 - 10 horas.
- B) 2 - 4 horas e 10 - 12 horas.
- C) 1 - 3 horas e 8 - 10 horas.
- D) 2 - 4 horas e 12 - 18 horas.
- E) 2 - 3 horas e 9 - 15 horas.

Questão 31

Os anti-hipertensivos são geralmente bem tolerados, entretanto cerca de um terço dos doentes atribui sintomas a estes fármacos, quando em tratamento de longo prazo. O reconhecimento dessas queixas e adequada orientação são necessários, pois eventos indesejáveis são causa frequente de falta de adesão ao tratamento. Sabendo disso, marque a alternativa que apresenta alguns dos efeitos adversos dos antiadrenérgicos de ação central.

- A) Broncoespasmo, bradicardia e hipotensão postural
- B) Sonolência, boca seca e hipotensão postural
- C) Tosse seca, alteração de paladar e taquicardia reflexa
- D) Hipotassemia, hiperuricemia e intolerância à glicose
- E) Hipotensão postural, tosse seca e tontura

Questão 32

A maioria dos indivíduos com hipertensão possui a elevação persistente da pressão arterial como resultado de uma desregulação do mecanismo de controle homeostático da pressão, o que a define como essencial. Já a HAS secundária possui causa definida, que é potencialmente tratável e/ou curável, acometendo menos de 3% dos hipertensos. A correta avaliação destes pacientes é fundamental, visto que pode determinar a interrupção dos anti-hipertensivos. As causas mais comuns de HAS secundária são as:

- A) endócrinas (doença de Addison, hipocalcemia).
- B) infecciosas (sepsis, doença de Lyme).
- C) hematológicas (hemofilia, trombocitopenia).
- D) renais (rim policístico, doenças parenquimatosas).
- E) vasculares (fibrilação atrial, miocardite)

Questão 33

No estágio invasor do câncer do colo do útero as principais manifestações clínicas são:

- A) secreção uretral, epidídimo muito doloroso, ocasionalmente com edema ou tumefação.
- B) dismenorreia, disúria e hematúria.
- C) sangramento vaginal (espontâneo, após coito ou esforço), leucorreia e dor pélvica.
- D) dor à palpação da região suprapúbica e nódulos dolorosos nos ligamentos uterossacrais.
- E) hematúria e linfedema unilateral.

Questão 34

A mamografia e o exame clínico das mamas (ECM) são os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher. Marque a alternativa que apresenta a população-alvo e a periodicidade dos exames no rastreamento do câncer de mama corretas.

- A) Mulheres de 40 a 49 anos - ECM anual e, se alterado, mamografia.
- B) Mulheres de 25 a 35 anos - ECM e mamografia a cada 2 anos.
- C) Mulheres de 40 a 49 anos - ECM anual e mamografia a cada 2 anos.
- D) Mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado - ECM semestral e mamografia anual.
- E) Mulheres de 50 a 69 anos - ECM e mamografia anual.

Questão 35

O carcinoma de células renais representa mais de 90% dos processos malignos renais em adultos, sendo importante sua identificação precoce. Os sinais e sintomas clássicos são:

- A) febre, letargia e hipertensão arterial.
- B) proteinúria, oligúria e dor uretral.
- C) náusea/vômitos e diminuição de débito urinário.
- D) dor esquelética e anemia grave.
- E) hematúria, dor abdominal e massa em abdome ou flanco.

Questão 36

Um dos fatores de risco para a doença arterial coronária é:

- A) hiperlipidemia e hiperuricemia.
- B) dislipidemia e diabetes mellitus.
- C) pacientes jovem (idade menor que 45 anos).
- D) disfagia e alcoolismo.
- E) homocisteína e lipoproteínas baixas.

Questão 37

O exame de urina simples (EAS) avalia as características físicas da urina e revela através de sua interpretação a presença de possíveis doenças. A densidade da urina menor que 1,005 é típica em:

- A) síndrome nefrótica
- B) infecção renal.
- C) síndrome de Cushing
- D) diabetes insípido.
- E) glomerulonefrite aguda.

Questão 38

A gravidez é um período que provoca muitas alterações no corpo da mulher, este período vai desde a fecundação até o nascimento. As principais queixas das gestantes no segundo trimestre da gestação são:

- A) edema de membros inferiores, veias varicosas e sinais de pré-eclâmpsia.
- B) desmaios, fraqueza e estrias.
- C) sialorreia e constipação intestinal.
- D) sensibilidade das mamas e poliúria.
- E) lombalgia e secreção vaginal.

Questão 39

Considera-se ter ocorrido abortamento quando há interrupção da gestação:

- A) entre a 10ª e a 20ª semana de gestação.
- B) antes da 15ª semana de gestação.
- C) após a 8ª semana de gestação.
- D) até a 12ª semana de gestação.
- E) antes da 22ª semana de gestação.

Questão 40

O tempo de protrombina (TP) é um exame realizado com intuito de determinar o tempo necessário para que se forme um trombo de fibrina em uma amostra de plasma com citrato. O resultado normal esperado para o tempo de protrombina deve variar de:

- A) 5 a 10 segundos.
- B) 14 a 18 segundos.
- C) 8 a 12 segundos.
- D) 1 a 5 segundos
- E) 10 a 14 segundos.

Questão 41

Além de encaminhar a criança para consulta odontológica, toda a equipe de saúde deve estar apta a dar informações adequadas aos pais e aos cuidadores sobre a saúde bucal das crianças. A primeira informação importante é sobre a cronologia da erupção dentária. Com relação a isso marque a alternativa correta.

- A) Após os dois anos de idade da criança, se não ocorreu a erupção, é necessário investigar o caso, pois existe a possibilidade de ocorrer anadontia.
- B) Aos 20 meses de idade, deve estar completa a dentição decídua, que consta de 10 dentes superiores e 10 inferiores.
- C) Por volta dos 18 meses apareçam os molares decíduos.
- D) O mais comum é que os dentes decíduos comecem a erupcionar aos 9 meses de idade.
- E) É possível que haja retardo na erupção, o que não deve ser motivo de preocupação até os 15 meses de idade.

Questão 42

O desenvolvimento infantil se dá à medida que a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo de acordo com os meios onde vive e os estímulos deles recebido. A criança é capaz de sentar-se sem apoio:

- A) entre quatro e seis meses.
- B) entre seis e oito meses.
- C) a partir do sétimo mês de vida.
- D) em torno do décimo mês.
- E) entre nove meses e um ano.

Questão 43

As equipes de saúde da família (ESF) trabalham com uma população adscrita, ou seja, com um número fixo de famílias. De uma forma geral, recomenda-se que cada ESF assista de:

- A) 1.000 a 1.500 famílias, com o limite máximo de 4.800 habitantes.
- B) 500 a 1.000 famílias, com o limite máximo de 3.000 habitantes.
- C) 600 a 1.000 famílias, com o limite máximo de 4.500 habitantes.
- D) 400 a 700 famílias, com o limite máximo de 4.000 habitantes.
- E) 1.000 a 2.000 famílias, com o limite máximo de 5.000 habitantes.

Questão 44

A temperatura é um importante sinal vital e sua alteração pode indicar o acometimento por alguma doença. É considerado piroxia quando a temperatura estiver entre:

- A) 39 e 40 °C.
- B) 37,5 e 38 °C.
- C) 36,9 e 37,4 °C.
- D) 40 e 41 °C.
- E) 38 e 39 °C.

Questão 45

Um das atribuições do Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família no controle da doença de Chagas é:

- A) identificar e encaminhar os casos de febre à Unidade Básica de Saúde.
- B) gerenciar os insumos necessários para o diagnóstico e tratamento adequado dos casos agudos e crônicos.
- C) solicitar exames complementares conforme rotina e os adicionais quando forem necessários.
- D) enviar os boletins de notificação para digitação.
- E) auxiliar na coleta e encaminhamento de exames, se necessário.

Questão 46

A deficiência por vitamina A é responsável por uma série de problemas de saúde, podendo causar, principalmente:

- A) cegueira noturna.
- B) bócio.
- C) anemia
- D) cretinismo.
- E) retardo mental.

Questão 47

As formas de sofrimento mental puerperal devem ser diagnosticadas e assistidas precocemente, a fim de auxiliar em uma relação mãe-bebê satisfatória no âmbito familiar, social, físico e psicológico. Em geral, as alterações emocionais repercutem na interação mãe-filho de forma negativa e promovem um desgaste na relação com os familiares e na vida afetiva do casal. Com relação aos sofrimentos mentais marque a alternativa correta.

- A) O transtorno psicótico puerperal ocorre entre 10 a 15% das mulheres, Desenvolve-se lentamente em semanas ou meses, atingindo assim um limiar, após isso apresenta remissão espontânea até o 8º mês após o parto.
- B) A depressão puerperal ou depressão pós-parto ocorre entre 15 a 20% das mulheres, inicia-se de forma lenta entre o 1º e o 2º mês após o parto, o prognóstico depende da identificação precoce e das intervenções no quadro.
- C) A depressão puerperal ou depressão pós-parto ocorre entre 0,1 a 0,2% das mulheres, inicia-se da 1ª a 2ª semana após o parto, pode evoluir mais tarde para o transtorno psicótico puerperal.
- D) A tristeza puerperal ocorre entre 50 a 60% das mulheres, iniciando-se no 3º até o 4º dia do puerpério, apresentando remissão espontânea de uma semana a dez dias.
- E) A tristeza puerperal ocorre entre 20 a 30% das mulheres, iniciando-se no 1º até o 4º dia do puerpério, desenvolvendo-se lentamente, podendo evoluir mais tarde para uma depressão.

Questão 48

A dengue é uma doença única, sistêmica e dinâmica. Isso significa que a doença pode evoluir para remissão dos sintomas ou agravar-se exigindo constante reavaliação e observação, para que as intervenções sejam oportunas e que os óbitos não ocorram. Antes que ocorra o agravamento da dengue, alguns sinais de alarme podem surgir. Por meio destes sinais se tem conseguido identificar os pacientes que podem evoluir para uma forma grave da doença, com a intenção de prevenir gravidade e reduzir a mortalidade por dengue. Alguns desses sinais de alarme são:

- A) febre, mialgia e hipotensão postural.
- B) sangramento de mucosa, artralgia e exantema.
- C) anorexia, sangramento de mucosa e letargia.
- D) dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e aumento progressivo do hematócrito.
- E) extravasamento de plasma, derrame pleural e aumento progressivo de hematócrito.

Questão 49

No trabalho de parto o primeiro cuidado que o enfermeiro deve ter com o recém-nascido, é:

- A) aspirar as vias aéreas.
- B) realizar a profilaxia da oftalmia e da vulvovaginite gonocócica.
- C) manter as vias aéreas pérvias, posicionando a cabeça do RN com uma leve flexão do pescoço.
- D) realizar a profilaxia da doença hemorrágica do RN.
- E) prevenir a perda de calor.

Questão 50

A doença que tem como agente etiológico a *Bordetella pertussis*, é denominada:

- A) criptosporidíase.
- B) cancro mole.
- C) coqueluche.
- D) de Lyme.
- E) de Chagas.