

PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - QUADRO SAÚDE

MÉDICO CARDIOLOGISTA

Código da Prova

B14 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: 4 horas

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“Cuide-se bem e viva de bem com a vida.”



ATENÇÃO

Este caderno contém (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E – e uma questão discursiva.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas e da folha de respostas, conforme estabelecido nos próprios.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

Higiene bucal

A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Talvez você não saiba, mas os seus hábitos e estilo de vida impactam diretamente a saúde dos seus dentes.

A obesidade, por exemplo, pode aumentar o risco de doença periodontal. Outro fator é o cigarro. Estudos revelam que os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças periodontais avançadas do que quem não fuma. Além de aumentar as chances de desenvolver uma doença gengival, fumar também torna o tratamento muito mais demorado e complicado por dificultar o processo de recuperação.

Infecções bucais são comuns, mas elas também podem contribuir para dentes quebrados ou lascados. O uso de piercing na região bucal também pode causar uma retração da gengiva, que pode levar os dentes a amolecerem e caírem. Apesar desses dados, o grande vilão dos dentes é o açúcar, por promover o desenvolvimento de placas nos dentes. Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, causando cárie. Sem tratamento, a cárie pode penetrar fundo no dente provocando dor ou, em casos mais graves, a perda do dente.

(www.unimed.com.br)

Questão 1

De acordo com o texto, a causa que mais contribui para o malefício dos dentes provém de:

- (A) obesidade.
- (B) remédios.
- (C) fumo.
- (D) açúcar.
- (E) uso de piercings.

Questão 2

Sobre a higiene bucal, segundo o texto, é CORRETO afirmar que:

- I – As infecções bucais, embora raras, costumam danificar os dentes.
- II – O piercing, conquanto cause retração da gengiva, não oferece grande perigo aos dentes.
- III – É parte essencial do asseio corpóreo, pois abala a vitalidade dental.
- IV – A cárie pode provocar até a perda do dente, quando não tratada.

Está correto o que se afirma apenas em:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III.
- (D) III e IV
- (E) IV.

Questão 3

Em “O menino **machucou-se** ao sair da cadeira do dentista.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) A mãe queixou-se ao dentista.
- (B) Precisa-se de atendentes dentários.
- (C) Olhou-se no espelho antes de sair do consultório.
- (D) Crianças devem ser levadas ao dentista.
- (E) Os clientes cumprimentaram-se na antessala.

Questão 4

Considere as afirmações abaixo sobre aspectos da construção linguística:

- I- Em “Vossa Senhoria vos enganastes no tratamento daquela questão.”, o verbo e o pronome (vos)deveriam estar na terceira pessoa do singular, conforme recomenda a norma culta da língua.
- II- Em “Porque não queria ir ao dentista, o menino apanhou **de** chinelo.”, a preposição destacada expressa relação de *meio*.
- III- No segundo parágrafo do texto, (L 2), em “**Outro** fator é o cigarro.”, o elemento destacado exerce *função anafórica*.

Está correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) I.

Questão 5

No período “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos...” (L 7), o termo grifado classifica-se como:

- (A) conjunção integrante.
- (B) palavra expletiva.
- (C) pronome relativo.
- (D) pronome indefinido.
- (E) advérbio.

Questão 6

A frase “De tanto fumar, abotoou o paletó.” possui, como efeito expressivo, a seguinte figura de linguagem:

- (A) hipérbole.
- (B) prosopopeia.
- (C) perífrase.
- (D) eufemismo.
- (E) metonímia.

Questão 7

Em “...acúmulo de ácido que **desmineraliza...**”, a palavra destacada passou pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação prefixal e sufixal.
- (B) derivação parassintética.
- (C) derivação sufixal.
- (D) derivação prefixal.
- (E) aglutinação.

Questão 8

Em “Não fumo há anos, pois não quero adquirir doenças periodontais.”, o verbo HAVER foi empregado com o mesmo sentido que:

- (A) Há muitos assaltos no bairro onde moro.
- (B) Há anos que eles não vêm me visitar.
- (C) O trabalho há de ficar pronto no mês que vem.
- (D) Não há como infringir essa norma.
- (E) Há muito o que fazer para recuperar a saúde bucal.

Questão 9

No trecho “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças...” o termo grifado introduz uma oração:

- (A) subordinada adverbial conclusiva.
- (B) subordinada substantiva apositiva.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adjetiva restritiva.
- (E) subordinada substantiva subjetiva.

Questão 10

No trecho “Essas placas causam acúmulo de ácido, **que desmineraliza o esmalte do dente, ...**” (3º parágrafo), a oração destacada exerce a função sintática de:

- (A) aposto.
- (B) predicado.
- (C) complemento nominal.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) adjunto adnominal.

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

Questão 11

Paula está arrumando sua estante. Em uma das prateleiras ela tem dois livros de romance, quatro livros de filosofia e dois livros de suspense. Se Paula quer manter juntos os livros de mesmo tema, de quantas formas distintas ela pode arrumar os livros na prateleira?

- (A) 6
- (B) 96
- (C) 144
- (D) 576
- (E) 24

Questão 12

Três irmãs, Julia, Joana e Jessica, moram em cidades diferentes, são elas: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, não necessariamente nessa ordem. A irmã mais velha mora em Brasília e é a mais próxima de Jessica. A que mora em São Paulo é mais velha que Joana. Dessa forma, é necessariamente correto afirmar que:

- (A) Joana é a irmã mais velha.
- (B) Jessica mora em São Paulo.
- (C) Julia é a irmã do meio.
- (D) Joana mora em Brasília.
- (E) Jessica é a irmã caçula.

Questão 13

Em uma amostra de 300 pacientes de um hospital, verificou-se que:

- 60% dos pacientes da amostra tinham pressão alta.
- 70% dos que tem pressão alta são obesos.
- 24 pacientes apresentavam as três doenças.
- 30% dos pacientes da amostra eram diabéticos, dentre eles, apenas 20% apresentavam somente essa doença.
- A quantidade de pacientes que tem apenas obesidade e pressão alta é o triplo da quantidade de pacientes que tem apenas diabetes e pressão alta.
- 50 pacientes da amostra não apresentavam nenhuma das três doenças.

Quantos pacientes da amostra são obesos?

- (A) 38
- (B) 222
- (C) 78
- (D) 150
- (E) 178

Questão 14

A soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 60 e sua razão é -2 . Logo, o seu 15º termo é:

- (A) -10
- (B) 18
- (C) 28
- (D) 36
- (E) -8

Questão 15

Pedro pegou um empréstimo de R\$1.200,00 a juros compostos de 10% ao mês para finalizar a obra de sua casa. Dois meses depois ele pagou R\$852,00 e dois meses após esse pagamento ele liquidou o empréstimo. Qual foi o valor do último pagamento?

- (A) R\$600,00
- (B) R\$904,00
- (C) R\$726,00
- (D) R\$420,00
- (E) R\$1.756,00

CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Uma das diretrizes dessa política caracteriza-se como uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Estamos falando do(a):

- (A) acolhimento.
- (B) ambiência.
- (C) gestão participativa e cogestão.
- (D) clínica ampliada e compartilhada.
- (E) valorização do trabalhador.

Questão 17

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO:

- (A) realizar seleção de usuários de maior complexidade para o atendimento referenciado.
- (B) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (C) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- (D) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (E) ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

Questão 18

A respeito da Rede Cegonha, julgue as afirmações a seguir:

- I - um dos objetivos da rede cegonha é reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
- II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial, e o enfoque de gênero são princípios da rede cegonha.
- III - a rede cegonha garante a promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco, por meio do SAMU.
- IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a doze meses com qualidade e resolutividade é uma das diretrizes da rede cegonha.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) III e IV.

Questão 19

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir do acesso e a promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência dentro da sociedade. Os centros de atendimento oferecido pela Atenção Psicossocial são divididos por modalidade, de acordo com o público atendido. Um desses centros é denominado de CAPS III que atende pessoas:

- (A) adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos, com serviço com no máximo doze leitos para observação.
- (B) com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (C) com transtornos mentais graves e persistentes proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas.
- (D) adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (E) de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

Questão 20

A respeito da Portaria nº 3088/2011, julgue as afirmações a seguir:

- I - o SAMU é um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial na atenção de urgência e emergência.
II - dentro da atenção psicossocial, a unidade de acolhimento infanto-juvenil é destinada a adolescentes e jovens (de doze até dezessete anos completos).
III - a reabilitação psicossocial, da rede de atenção psicossocial é composta por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais.
IV - os serviços residenciais terapêuticos são pontos de atenção na rede de atenção psicossocial nas estratégias de desinstitucionalização.

Estão corretas apenas:

- (A) II e III.
(B) I, III e IV.
(C) II e IV.
(D) I, II e III.
(E) II, III e IV.

INFORMÁTICA BÁSICA**Questão 21**

Numa edição, utilizando o MS Word, você fez uma alteração indevida e quer voltar atrás, desfazendo a alteração. O atalho a ser utilizado é o seguinte:

- (A) Ctrl + P
(B) Ctrl + B
(C) Ctrl + A
(D) Ctrl + M
(E) Ctrl + Z

Questão 22

Em células de uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores:

A1=24, B1=6, C1= 12 e D1= 2

O valor que teremos na célula A2 se nela incluirmos a fórmula: =A1-\$C\$1/B1 + A1/C1 será de:

- (A) 24.
(B) 20.
(C) 26.
(D) 22.
(E) 18.

Questão 23

No Windows 7, ao premer a tecla "Prtn Scrn SysRq" você envia uma imagem da tela de seu computador para a/o:

- (A) Área de Transferência.
(B) Buffer da Impressora.
(C) CPU.
(D) Pen Drive.
(E) Servidor da Rede.

Questão 24

O programa utilizado para criação/edição e exibição de slides é:

- (A) Excel.
(B) Word.
(C) Photoshop.
(D) Power Point.
(E) Media Player.

Questão 25

No Windows 7, para verificar o percentual de utilização de um HD, de forma gráfica, deve-se clicar no ícone do dispositivo com o botão direito do mouse e selecionar:

- (A) Pesquisar.
- (B) Compartilhar.
- (C) Criar atalho.
- (D) Explorar.
- (E) Propriedades.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 26**

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Existe uma periodicidade da notificação que varia de acordo com a doença ou agravo, devendo ser imediata (em até 24 horas) ou semanal, por exemplo. São exemplos de doenças ou agravos, que seguindo o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS, a notificação pode ser semanal:

- (A) acidente de trabalho com exposição a material biológico, dengue – casos, doença de creutzfeldt-jakob (DCJ).
- (B) doença meningocócica e outras meningites, doença invasiva por *Haemophilus Influenz*, difteria, doença aguda pelo vírus zika.
- (C) febre amarela, febre tifoide, hantavirose.
- (D) leptospirose, peste, raiva humana.
- (E) varicela, violência sexual, tétano.

Questão 27

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O público beneficiário do PSE são, EXCETO:

- (A) estudantes da educação básica.
- (B) estudantes da rede estadual de educação profissional e tecnológica.
- (C) estudantes da rede federal de educação profissional e tecnológica.
- (D) estudantes de educação de jovens e adultos (EJA).
- (E) gestores e profissionais de educação e saúde.

Questão 28

A respeito da Portaria nº 77/2017 que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do SUS, julgue as informações a seguir:

- I - o acesso, a longitudinalidade e a integralidade são alguns dos princípios da atenção primária.
- II - a atenção primária à saúde é a porta de entrada e de contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.
- III - a equipe de saúde da família (ESF) é responsável por um território determinado de até 5000 pessoas, composta por um médico de família e comunidade, um enfermeiro, um dentista e técnicos de enfermagem.
- IV - o acolhimento, a classificação de risco e a resolutividade são algumas das diretrizes para realização da ESF.

Estão corretas apenas:

- (A) II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

Questão 29

As doenças e agravos não transmissíveis (DCNT) são multifatoriais, sejam eles sociais ou individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. A respeito das DCNT é correto afirmar que:

- (A) as doenças cardiovasculares, crônicas, diabetes mellitus, neoplasias, insuficiência hepática e renal aguda são exemplos de DCNT.
- (B) o instrumento norteador da vigilância de DCNT é o plano de controle dos agravos causados por DCNT no Brasil (2011-2020).
- (C) dentre as ações executadas pela vigilância de DCNT, a caracterização da tendência temporal não deverá ser realizada, evitando assim impedir ações de baixo espectro.
- (D) os três componentes essenciais da vigilância de DCNT são o monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade das DCNT, e da avaliação das ações de assistência e reabilitação da saúde.
- (E) a vigilância de DCNT se configura como um conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude e a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco no país.

Questão 30

Segundo a NOAS-SUS 01/2001 são conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no Plano Diretor de Regionalização:

- (A) Módulo assistencial.
- (B) Município-pólo.
- (C) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- (D) Região de saúde.

Definidos como:

- () base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado.
- () representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde (MS) e Comissão Intergestores Tripartite.
- () povoação, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresenta papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- () padrão territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência.

Após realizar a devida correspondência, usando as letras nos lugares corretos, a sequência que define os conceitos-chaves é:

- (A) A, B, C e D.
- (B) A, C, B e D.
- (C) D, B, C e A.
- (D) D, C, B e A.
- (E) B, D, A e C.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Em quais das situações clínicas abaixo a ressonância magnética cardíaca não é contraindicada conforme a II Diretriz de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada Cardiovascular?

- (A) Próteses valvares metálicas e stent coronariano
- (B) Implantes cocleares e sutura metálica de esterno
- (C) Sutura metálica de esterno e fragmentos metálicos oculares
- (D) Clipe de aneurisma cerebral e implantes cocleares
- (E) Stent coronariano e clipe de aneurisma cerebral

Questão 32

Paciente, sexo masculino, aposentado, 67 anos, diabético controlado, procura ambulatório de cardiologia para mostrar exames de rotina. Traz entre os exames solicitados na primeira consulta os seguintes: HDL 48 mg/dL; LDL 108 mg/dL; triglicerídeos 340 mg/dL; colesterol total 219 mg/dL; hemoglobina glicada 6,6%; glicemia de jejum 120 mg/dL. Com relação ao tratamento da dislipidemia, é CORRETO afirmar:

- (A) faz-se necessária a adição de estatina para o controle da dislipidemia neste momento, além de modificação no estilo de vida.
- (B) pode-se orientar apenas modificações do estilo de vida, além de ajustar o esquema hipoglicemiante.
- (C) a associação de ciprofibrato e ezetimibe está indicada em razão dos níveis altos de triglicerídeos e LDL.
- (D) o tratamento desse paciente deve incluir estatina e niacina, visando a melhora dos níveis de LDL e HDL.
- (E) a ezetimiba pode ser empregada neste paciente em vez da estatina, visto que este grupo de fármacos provoca mais efeitos adversos nesta faixa etária.

Questão 33

Assinale a alternativa CORRETA em relação aos sinais físicos e defeitos que possam estar associados com a hipercolesterolemia familiar, uma das formas genéticas mais frequentes e graves das dislipidemias de base genética.

- (A) Xantomas eruptivos, xantelasmas e defeito da Apo B
- (B) Xantomas tuberosos, lipemia retinalis e defeito da pré-proteína converta-se subtilisina kexina tipo 9
- (C) Xantoma planar, amígdalas proeminentes e alaranjadas, e opacidade de córnea
- (D) Xantomas eruptivos e defeito da proteína adaptadora do receptor da LDL
- (E) Xantomas tendinosos, xantelasmas, arco corneal e defeito do receptor de LDL

Questão 34

Na síndrome de Wolff-Parkinson-White, a localização da via acessória em região anteroseptal é caracterizada pela seguinte apresentação eletrocardiográfica:

- (A) onda delta e QRS negativos em V1, onda delta e QRS negativos em D2, D3 e aVF.
- (B) onda delta e QRS negativos em V1 e eixo inferior.
- (C) onda delta e QRS positivos em V1 e onda delta e QRS negativos em D2, D3 e aVF.
- (D) onda delta e QRS positivos em V1 e onda delta negativa ou isoelétrica em D1, aVL, V5 e V6.
- (E) onda delta e QRS negativos em V1 e eixo para a esquerda.

Questão 35

Entre os agentes quimioterápicos para tratamento do câncer, qual agente está associado à maior incidência de cardiotoxicidade e evolução para insuficiência cardíaca?

- (A) Paclitaxel
- (B) Sunitinibe
- (C) Ciclofosfamida
- (D) Bevacizumabe
- (E) Doxorubicina

Questão 36

Paciente iniciou quadro febril, com mialgia e sintomas de gastroenterite há três dias. Após o início desses sintomas, surgiu dor torácica de forte intensidade, ventilatória-dependente, irradiando para pescoço e membros superiores. Ao exame físico, o paciente apresentava febre e taquicardia. Na ausculta, sons rudes e irregulares, audíveis na borda esternal esquerda. Ao eletrocardiograma, apresentava inversão de onda T generalizada. Quais são o diagnóstico e a conduta?

- (A) Pericardite aguda, tratamento com corticoterapia
- (B) Pericardite constritiva, tratamento com pericardiectomia
- (C) Pericardite constritiva, tratamento com colchicina e anti-inflamatórios não esteroidais
- (D) Pericardite aguda, tratamento com colchicina e anti-inflamatórios não esteroidais
- (E) Pericardite crônica

Questão 37

Dentre os achados de exame físico abaixo, qual NÃO é característico de um episódio anginoso provocado por isquemia miocárdica.

- (A) Terceira bulha
- (B) Sopros diastólico aspirativo em foco aórtico acessório
- (C) Quarta bulha
- (D) Sopros de regurgitação mitral
- (E) Desdobramento paradoxal da segunda bulha

Questão 38

Dentre os pacientes abaixo, qual é o que NÃO teria indicação consensual para o tratamento etiológico da cardiopatia chagásica?

- (A) Estudante, 11 anos, com diagnóstico de doença de Chagas em sua forma arritmica
- (B) Professor, 64 anos, com diagnóstico de doença de Chagas há 11 anos, portador de cardiomiopatia dilatada, com piora dos sintomas congestivos nos últimos 5 meses
- (C) Patologista clínico, 43 anos, contaminado com material perfurocortante com amostra contaminado com T. cruzi
- (D) Feirante, 47 anos, portador crônico de doença de Chagas com reativação da doença após contaminação com HIV
- (E) Ex-militar, 38 anos, com quadro de insuficiência cardíaca aguda, secundária à infestação por T. cruzi por ingestão de um caldo de cana

Questão 39

Qual das situações abaixo é indicação para profilaxia da endocardite infecciosa, considerando pacientes de alto risco?

- (A) Intervenções no trato respiratório sem incisão ou biópsia
- (B) Intervenções no trato urinário sem lesão de mucosa
- (C) Colocação ou ajuste de aparelho dentário removível
- (D) Colocação de sonda naso-entérica
- (E) Manipulação do tecido gengival. Intervenções no trato gastrointestinal sem lesão de mucosa

Questão 40

Em pacientes com hiperaldosteronismo primário, a hiperplasia bilateral deve ser tratada com:

- (A) Cirurgia laparoscópica.
- (B) Hidroclorotiazida, 25 mg.
- (C) Espironolactona, 50 a 300 mg/dia.
- (D) Enalapril em doses maiores que 10 mg.
- (E) Furosemida 40 mg/dia.

Questão 41

A afirmativa CORRETA sobre hipertensão na gravidez é:

- (A) a suplementação de cálcio e o uso de ácido acetilsalicílico em doses baixas estão indicados para prevenção de pré-eclâmpsia a partir da 12ª semana de gestação em todas as mulheres.
- (B) na ausência de proteinúria, a pré-eclâmpsia é altamente suspeita quando o aumento da pressão arterial sistêmica se acompanha de cefaleia, visão borrada, dor abdominal, edema pulmonar.
- (C) sulfato de magnésio é indicado para prevenir eclâmpsia em pacientes com pré-eclâmpsia grave.
- (D) o tratamento definitivo da pré-eclâmpsia é a interrupção da gravidez, estando sempre indicada imediatamente após o diagnóstico.
- (E) os anti-hipertensivos usados na hipertensão da gravidez são os mesmos usados fora da gestação.

Questão 42

Homem, 35 anos, empresário, procura consultório de cardiologia, com quadro de emagrecimento, tremores e palpitações. PA = 160 x 80 mmHg. FC em torno de 130-140 bpm. ECG: fibrilação atrial. Dosagem de TSH abaixo e T4 livre acima dos valores de referência. A melhor conduta inicial é:

- (A) uso do betabloqueador já de início, conjuntamente com o metimazol.
- (B) uso de digoxina como primeira escolha para controlar a resposta ventricular.
- (C) uso de iodo radioativo antes de se iniciar o betabloqueador.
- (D) cardioversão elétrica.
- (E) uso do metimazol para controle da tireoide antes de se iniciar o betabloqueador.

Questão 43

Com relação às propriedades farmacológicas da ivabradina, assinale a alternativa CORRETA é.

- (A) Não atua na redução da frequência cardíaca durante o esforço físico
- (B) Favorece o controle da condução atrioventricular na fibrilação atrial
- (C) A posologia usual é de 7,5 mg de oito em oito horas
- (D) A melhora do fluxo sanguíneo coronário é decorrente do prolongamento da diástole
- (E) A ivabradina é um inibidor seletivo da corrente das células marca-passo cardíacas dos nós sinusal e atrioventricular

Questão 44

Mulher jovem, branca, estudante de direito, 22 anos, tem histórico de doença reumática e acometimento na valva mitral. Há oito dias teve contato com um primo que estava com faringite e começou a apresentar febre, dispneia (NYHA III/IV) e mal-estar. Foi avaliada pela equipe de cardiologia, que solicitou um eletrocardiograma, provas de inflamação e pesquisa do estreptococo. Para fechar o diagnóstico de recorrência de febre reumática neste caso são necessários, no mínimo:

- (A) um critério maior, um menor e a infecção estreptocócica comprovada.
- (B) não há necessidade de nenhum critério pela história prévia.
- (C) dois critérios maiores.
- (D) cinco critérios menores e a infecção estreptocócica comprovada.
- (E) dois critérios menores e a infecção estreptocócica comprovada.

Questão 45

O sopro de Austin-Flint é:

- (A) pré-sistólico.
- (B) holossistólico.
- (C) mesodiastólico.
- (D) sistólico precoce.
- (E) diastólico precoce.

Questão 46

Sobre o ciclo cardíaco, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A contração isovolumétrica se inicia com a abertura da valva aórtica e termina no fechamento das valvas atrioventriculares
- (B) A diástole é composta pelas fases denominadas: diástase, enchimento ventricular rápido, relaxamento isovolumétrico e sístole atrial, nesta ordem
- (C) B3 é uma bulha telediastólica
- (D) O relaxamento isovolumétrico ocorre entre o fechamento da valva aórtica e a abertura das valvas atrioventriculares
- (E) B4 pode estar presente em pacientes com fibrilação atrial

Questão 47

Assinale a alternativa que contém um exemplo típico de sopro contínuo, ou também conhecido como “sopro em maquinaria”:

- (A) persistência do canal arterial.
- (B) estenose mitral.
- (C) sopro de Austin-Flint.
- (D) sopro de Graham-Steel.
- (E) estenose subaórtica.

Questão 48

Marque a melhor resposta em relação as miocardites:

- (A) o diagnóstico da miocardite se faz inicialmente por meio da suspeita clínica, juntamente com métodos diagnósticos não invasivos, sendo a confirmação possível ao se utilizar a análise histológica obtida pela biópsia endomiocárdica.
- (B) o diagnóstico da miocardite se faz por meio da suspeita clínica, juntamente com métodos diagnósticos não invasivos, sendo a confirmação possível se utilizada a análise espectral obtida pelo ecocardiograma.
- (C) o diagnóstico da miocardite pela ressonância magnética do coração está indicado apenas na fase crônica para quantificação de fibrose.
- (D) a biópsia deverá ser o procedimento inicial.
- (E) a cintilografia miocárdica 67-gálio está indicada após 3 meses do início do quadro clínico.

Questão 49

Quanto ao tratamento da insuficiência cardíaca (IC) com fração de ejeção (FE) reduzida, assinalar a alternativa CORRETA:

- (A) a espironolactona é um inibidor do receptor do mineralocorticoide, que tem como efeito colateral frequente a ginecomastia.
- (B) alguns efeitos colaterais dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) são causados pela diminuição do nível sérico da bradicinina.
- (C) os bloqueadores dos receptores da angiotensina agem inibindo a ação da angiotensina II no receptor da angiotensina tipo I.
- (D) a toxicidade da digoxina é mais frequente quando está associada com hipercalemia, hipermagnesemia e hipocalcemia.
- (E) a ivabradina tem ação nos canais "f" do nó atrioventricular (AV), reduzindo a frequência cardíaca.

Questão 50

Gestante, 28 anos, arquiteta, múltipara (gesta 3/3), é encaminhada ao cardiologista por estar na 30ª semana de gestação e vir apresentando edema de membros inferiores e pressão arterial 140 x 80 mmHg. Em relação ao caso, é CORRETO afirmar :

- (A) edema é um dos critérios para pré-eclâmpsia.
- (B) proteinúria é um principal critério para diferenciar hipertensão arterial crônica de pré-eclâmpsia.
- (C) pré-eclâmpsia é quatro vezes menos frequente em mulheres portadoras de hipertensão arterial antes da gravidez.
- (D) se a paciente não está em uso de anti-hipertensivo, alfametildopa e ácido acetilsalicílico devem ser iniciados.
- (E) pré-eclâmpsia é mais frequente nas múltiparas.

DISCURSIVA**Questão 1**

Você deverá escolher uma das propostas para fazer a sua prova discursiva.

Proposta 1

Textos:

“A partir de 2000, é significativo o aumento de publicações da comunidade acadêmica voltadas para o trabalho em equipe na saúde. Alguns estudos apontam que essa discussão ganha força, sendo alavancada pela tendência internacional de apresentar este tipo de organização de trabalho como alternativa à necessidade de racionalização da assistência médica e ampliação do acesso da população aos serviços de saúde (Canoletti, 2008). Responde, ao mesmo tempo, à necessidade de "integração das disciplinas e das profissões entendida como imprescindível para o desenvolvimento das práticas de saúde a partir da nova concepção biopsicossocial do processo saúde-doença" (Peduzzi), 2009, p.421).”

Renata Cristina Arthou Pereira, Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann

<https://www.scielo.org/article/icse/2013.v17n45/327-340/>

“ A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

Art. 2º da Port. Nº 2436/2017

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Depois da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

A atual política de saúde pública e seu foco no trabalho equipe multidisciplinar na atenção secundária.

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da questão proposta, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, além de informações adquiridas.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.

- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

Proposta 2

Textos:

Segundo Martins (2001), a humanização é um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento, que sempre despertam insegurança. Os padrões conhecidos parecem mais seguros; além disso, os novos não estão prontos nem em decretos, nem em livros, não tendo características generalizáveis, pois cada profissional, cada equipe, cada instituição terá seu processo singular de humanização.

Com o passar dos anos, devido à necessidade de mudança nas políticas de saúde, muitos projetos de humanização vêm sendo desenvolvidos, há vários anos, em áreas específicas da assistência - por exemplo, na saúde da mulher, na humanização do parto e na saúde da criança com o projeto mãe-canguru, para recém-nascidos de baixo peso. Atualmente têm sido propostas diversas ações visando à implantação de programas de humanização na assistência pediátrica, vários projetos e ações desenvolvem atividades ligadas a artes plásticas, música, teatro, lazer, recreação.

(...)

Segundo a Política Humaniza SUS, a humanização supõe troca de saberes, incluindo os dos usuários e sua rede social, diálogo entre os profissionais e modos de trabalhar em equipe (Brasil, 2005).

(...)

Enfim, a humanização estabelece-se como construção de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos entre os profissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde (Freyre, 2004).

(...)

De acordo com Lepargneur (2003), humanizar é saber promover o bem comum acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo.

Para Pessini (2002) é possível e adequado para a humanização se constituir, sobretudo, na presença solidária do profissional, refletida na compreensão e no olhar sensível, aquele olhar de cuidado que desperta no ser humano sentimento de confiança e solidariedade.

Roberta Araújo Mota, Cileide Guedes de Melo Martins e Renata Meira Vêras

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci_arttext&tlng=pt

Após a leitura dos fragmentos de texto apresentados para motivação e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

A operacionalização do atendimento humanizado para pacientes com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de drogas no SUS.

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da proposta escolhida, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.
- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO