HUPAA-UFAL – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO Nº 010/ 2014



Médico - Medicina Nuclear



CARGO: MÉDICO – MEDICINA NUCLEAR

Texto para responder às questões de <u>01</u> a <u>05</u>.

O fumo em lugares fechados

Incrível como esse tema ainda gera discussões acaloradas. Como é possível considerar a proibição de fumar, nos lugares em que outras pessoas respiram, uma afronta à liberdade individual?

As evidências científicas de que o fumante passivo também fuma são tantas e tão contundentes, que os defensores do direito de encher de fumaça bares, restaurantes e demais espaços públicos só podem fazê-lo por duas razões: ignorância ou interesse financeiro. Sinceramente, não consigo imaginar terceira alternativa.

Vamos começar pela ignorância. Num país de baixos níveis de escolaridade como o nosso, nem todos têm acesso a conhecimentos básicos. A fumaça expelida dos pulmões fumantes contém, em média, um sétimo das substâncias voláteis e particuladas do total inalado. Já aquela liberada a partir da ponta acesa contém substâncias tóxicas em concentrações bem maiores: três vezes mais nicotina, três a oito vezes mais monóxido de carbono, 47 vezes mais amônia, quatro vezes mais benzopireno e 52 vezes mais DNPB (estes dois, cancerígenos potentes).

Por serem de tamanho menor, as partículas que se desprendem da ponta acesa, produzidas durante 96% do tempo em que um cigarro é consumido, penetram com mais facilidade nos alvéolos pulmonares.

Depois de uma manhã de trabalho num escritório em que várias pessoas fumam, a concentração de nicotina no sangue de um abstêmio pode atingir os níveis de quem tivesse fumado três a cinco cigarros. Empregados de bares e restaurantes, que passam seis horas em ambientes carregados de fumaça, chegam a ter concentrações sanguíneas de nicotina equivalentes a de quem fumou cinco ou mais cigarros.

Mulheres gestantes expostas à poluição do fumo, em casa ou no trabalho, apresentam nicotina não apenas na corrente sanguínea, mas no líquido amniótico e no cordão umbilical do bebê.

[...]

Agora, vamos ao interesse pessoal dos que entendem que proibir a poluição ambiental causada pelo fumo é uma interferência do Estado na liberdade individual. Se ainda não foi inventado um método de exaustão capaz de impedir que a fumaça se dissemine pelo ambiente inteiro, esses senhores defendem o indefensável. Liberdade para através de uma ação individual causar mal à coletividade? Não sejamos ridículos.

Os sindicatos dos empregados de bares e restaurantes, que sempre se levantaram contra a proibição, alegando risco de desemprego (fato que não ocorreu em nenhuma cidade do mundo), que medidas tomaram até hoje para proteger seus associados da poluição ambiental em que trabalham? Alguma vez lutaram para que eles recebessem adicional de insalubridade? Para que tivessem um plano de saúde decente?

Não é função do Estado proteger o cidadão do mal que ele causa a si mesmo. Mas é dever, sim, defendê-lo do mal que terceiros possam fazer contra ele.

(Dráuzio Varella. Disponível em: http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/tabagismo/o-fumo-em-lugares-fechados-3/. Adaptado.)

01

Considerando as estratégias discursivas escolhidas pelo autor, é correto afirmar que o texto tem por principal objetivo

- A) informar sobre a regulamentação da Lei Antifumo.
- B) explicar, através de dados científicos, os malefícios do tabaco.
- C) inserir práticas contrárias à prática do fumo em locais determinados.
- D) esclarecer a população, com menor escolaridade, acerca dos malefícios do fumo.
- E) argumentar favoravelmente acerca da lei que proíbe o fumo em determinados lugares.

02

De acordo com as ideias apresentadas no texto, é correto afirmar que o autor mostra-se, em relação à liberdade individual,

A) omisso.

B) contrário.

C) imparcial.

D) favorável.

E) implacável.

03

Em "[...] esses senhores defendem o indefensável." (7º§), o pronome de tratamento indica, do ponto de vista do discurso do autor na defesa de suas ideias,

A) ironia.

D) tratamento respeitoso.

B) erudição.

E) inadequação linguística.

C) admiração.

Assim como em "[...] uma afronta à liberdade individual?" (1º§), o uso do sinal indicativo de crase também é obrigatório em:

- A) Não vendemos à prazo.
- B) Os marujos não desceram à terra.
- C) Refiro-me à sua matrícula no curso.

- D) Não me refiro à secretária experiente.
- E) Fui à casa, mas regressei em pouco tempo.

05

Considerando que alguns elementos são indispensáveis para que a coesão e a coerência textuais sejam mantidas, em relação ao trecho "Mas é dever, sim, defendê-<u>lo</u> do mal que terceiros possam fazer contra <u>ele</u>." (9º§), é correto afirmar acerca dos termos destacados que

- A) têm um referente em comum.
- B) os dois fazem referência a "dever".
- C) fazem referência a termos diferentes.
- D) um poderia ser omitido em função do registro do outro.
- E) o primeiro é exemplo da linguagem culta e o segundo, da coloquial.

Texto para responder às questões de <u>06</u> a <u>10</u>.

Fumo em lugares fechados será vetado no Brasil

Ministério da Saúde regulamenta regras da Lei Antifumo; fumódromo está proibido.

O Ministério da Saúde anunciou ontem, em função das comemorações do "Dia Mundial sem Tabaco", as regras do decreto que vai regulamentar a Lei Antifumo, aprovada em 2011. As novas normas preveem a proibição do fumo em locais fechados e de uso coletivo em todo o país, extinguindo, inclusive, os fumódromos. Além disso, veta toda e qualquer propaganda comercial, até mesmo nos pontos de venda. Nesses locais, só será possível a exposição dos produtos acompanhada por mensagens sobre perigos do fumo. O decreto da presidente Dilma Rousseff deverá ser publicado amanhã no Diário Oficial e entrará em vigor 180 dias depois.

O consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos ligados ao fumo está proibido em locais de uso coletivo públicos e privados. Isso inclui *hall* e corredores de condomínios, restaurantes, clubes e até pontos de ônibus, não importa se o ambiente é apenas parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo. Em bares e restaurantes, o fumo só será permitido caso haja ambientes totalmente livres, como mesas na calçada. O consumo continuará livre em vias públicas, residências e áreas ao ar livre. As embalagens deverão ter, em 100% da face posterior e em uma de suas laterais, avisos sobre os danos provocados pelo tabaco. Em 2016, o mesmo deverá ser feito também em 30% da face frontal dos maços.

O Ministério da Saúde informou que os fumantes não serão alvo de fiscalização. Isso recairá sobre os estabelecimentos comerciais. Caso não cumpram a lei, eles podem ser advertidos, multados, interditados ou até ter a autorização para funcionamento cancelada. As multas vão de R\$ 2 mil a R\$ 1,5 milhão. A fiscalização ficará a cargo dos órgãos de vigilância sanitária de estados e municípios. Os responsáveis pelos estabelecimentos poderão, inclusive, chamar a polícia quando o cliente se recusar a apagar o cigarro.

Até hoje, não havia definição sobre o conceito de local coletivo fechado, onde o fumo é proibido. Além disso, atualmente ainda são permitidas a existência de fumódromos e a propaganda nos pontos de venda. A regulamentação iguala as normas para todo o Brasil, e extingue as variações no caso dos estados que possuem suas próprias legislações. No Rio, por exemplo, já existe uma lei rigorosa em vigor desde 2009, muito semelhante à estabelecida pelo governo federal. Há algumas diferenças, como os valores de multas, por exemplo. No estado, elas variam de R\$ 3.933 a R\$ 38 mil.

A Lei Antifumo é um grande avanço. O decreto é fundamental para que possamos continuar enfrentando o tabaco como problema de saúde pública – disse o ministro da Saúde, Arthur Chioro, acrescentando que o propósito não é criminalizar o fumante nem tornar sua vida um inferno. – O tabaco faz mal. Mas é uma droga legal e as pessoas têm direito de usar.
 (O Globo, 01 de junho de 2014.)

06

Acerca da construção linguística do título do texto, é correto afirmar que é um exemplo de

- A) voz passiva, com destaque para o agente da ação.
- B) voz passiva, com destaque para o sujeito paciente.
- C) voz ativa, em que o sujeito é também o agente da ação.
- D) <u>voz ativa</u>, pois o sujeito tem destaque na escolha discursiva.
- E) voz passiva sintética, em que o sujeito tem destaque no discurso.

Cargo: Médico - Medicina Nuclear (40)

De acordo com as ideias e informações do texto, analise as afirmativas.

- **I.** Dentre as ações que serão colocadas em prática, de acordo com a Lei Antifumo, estão a proibição de qualquer tipo de propaganda do fumo, assim como de seus perigos.
- **II.** A autonomia dos estados diante da Lei Antifumo permanece no sentido de que as adaptações deverão ser feitas desde que tenham por objetivo combater o fumo.
- **III.** O decreto que regulamenta a Lei Antifumo contribui para que os prejuízos causados à saúde pelo tabaco sejam vistos e combatidos como problema de saúde pública.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I.
- B) II.

- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

08

O trecho "Além disso, veta toda e qualquer propaganda comercial, até mesmo nos pontos de venda." (1º§) tem garantida a correção gramatical e preservado o sentido original na reescrita:

- A) Diante disso, a propaganda comercial será proibida, inclusive nos pontos de venda.
- B) Ademais, proíbe toda e qualquer propaganda comercial, inclusive nos pontos de venda.
- C) Para isso, será vetada qualquer propaganda comercial, até mesmo nos pontos de venda.
- D) Até mesmo nos pontos de venda toda e qualquer propaganda comercial será, portanto, vetada.
- E) Inclusive, nos pontos de venda, será vetada depois disso toda e qualquer propaganda comercial.

09

- I. "[...] que possuem suas próprias legislações." (4º§)
- II. "[...] que o propósito não é criminalizar o fumante [...]" (5º§)

Nos dois trechos em destaque, o termo "que" introduz as orações. Acerca desses trechos, assinale a afirmativa correta.

- A) No trecho I ocorre uma especificação; no trecho II, uma impessoalização.
- B) Nos dois trechos, o "que" é empregado como "pronome relativo", atuando como elemento de coesão textual.
- C) Enquanto no trecho I ocorre uma generalização, o trecho II tem o papel de aposto de um termo da oração principal.
- D) Nos dois trechos é possível verificar a impessoalidade própria do tipo textual apresentado, marcada pelo uso do "que".
- E) O trecho I amplia o sentido do termo antecedente, enquanto o trecho II tem a função de completar o verbo antecedente.

10

Apesar do texto apresentado possuir predominantemente uma linguagem denotativa, é possível identificar conotação em

- A) "Isso recairá sobre os estabelecimentos comerciais." (3º§)
- B) "[...] não é criminalizar o fumante nem tornar sua vida um inferno." (5º§)
- C) "O decreto da presidente Dilma Rousseff deverá ser publicado amanhã [...]" (1º§)
- D) "[...] a proibição do fumo em locais fechados e de uso coletivo em todo o país, [...]" (1º§)
- E) "O consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos ligados ao fumo está proibido [...]" (2º§)

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

11

Usando a lógica, complete a tabela numérica a seguir.

5	8		26
	12		42
		30	58
11	20	38	74

A soma dos números que completam corretamente a tabela é igual a

A) 52.

B) 59.

C) 65.

D) 68.

E) 73.

Um turista, ao chegar a uma determinada cidade, pretende escolher 5 atrações turísticas para visitar. Considere que dentre as 9 atrações disponíveis para visitação, 4 sejam gratuitas e as demais, pagas. De quantas maneiras esse turista poderá fazer a escolha das atrações, sendo que pelo menos 2 delas devam ser gratuitas?

- A) 105.
- B) 120.
- C) 148.
- D) 180.
- E) 225.

13

O segundo, o quarto e o sexto termos de uma progressão aritmética são, respectivamente: 2a + 5, 6a + 3 e 9a + 7. Sobre essa sequência, é correto afirmar que

A) a razão é 9.

D) o primeiro termo é 8.


B) o valor de a é ímpar.

E) a soma dos dois primeiros termos é 21.

C) o quinto termo é 50.

14

O quadrado no centro da figura tem lado cuja medida corresponde a dois terços da altura h de um dos triângulos.



A área de toda figura é dada por

- A) $\frac{8h^2}{3}$
- B) $\frac{13h^2}{4}$.
- c) $\frac{16h^2}{9}$
- D) $\frac{17h^2}{11}$.
- E) $\frac{19h^2}{12}$

15

Mário começou a praticar um novo jogo que adquiriu para seu vídeo-game. Considere que a cada partida ele conseguiu melhorar sua pontuação, equivalendo sempre a 15 pontos a menos que o dobro marcado na partida anterior. Se na quinta partida ele marcou 3.791 pontos, então, a soma dos algarismos da quantidade de pontos adquiridos na primeira partida foi igual a

- A) 4.
- B) 5.
- C) 7.
- D) 8.
- E) 10.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16

O Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSERH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade. Diante do exposto, analise.

- I. Os membros do Conselho Consultivo serão indicados, trimestralmente, pelos respectivos órgãos ou entidades, e designados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo sua investidura feita mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- **II.** A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função socialmente relevante, assegurada a indenização das despesas com locomoção, estadia e alimentação necessárias ao desempenho da função.
- **III.** O Conselho Consultivo reunir-se-á extraordinariamente pelo menos uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) I.

B) II.

- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH, é composto por três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação. Compete ao Conselho Fiscal, EXCETO:

- A) Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSERH.
- B) Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores da EBSERH e verificar o cumprimento de seus deveres legais, estatutários e regimentais.
- C) Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer outros documentos e requisitar informações para essa finalidade.
- D) Opinar a respeito das linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSERH, indicando propostas de melhoria ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva.
- E) Denunciar, por qualquer de seus membros, erros, fraudes ou crimes que identificarem no âmbito da EBSERH, e propor providências corretivas e saneadoras para o que for identificado.

18

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) é empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. Diante do exposto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A EBSERH fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- B) Os contratos temporários de emprego poderão ser prorrogados duas vezes, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse cinco anos.
- C) Fica a EBSERH, para fins de sua implantação, autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- D) A partir da assinatura do contrato entre a EBSERH e a instituição de ensino superior, a EBSERH disporá de prazo de até um ano para reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal.
- E) Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres autorizadas a ceder à EBSERH, no âmbito e durante a vigência do contrato, bens e direitos necessários à sua execução.

19

A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação. O Presidente e Diretores da EBSERH serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

- A) Brasileiros natos e maiores de trinta e cinco anos.
- B) Brasileiros natos com mais de guinze anos de exercício de função.
- C) Brasileiros maiores de trinta e cinco anos e idoneidade moral e reputação ilibada.
- D) Idoneidade moral e reputação ilibada e com mais de quinze anos de exercício de função.
- E) Idoneidade moral e reputação ilibada; notórios conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde; e, com mais de dez anos de exercício de função.

20

Sem prejuízo de outras que possam ser criadas, são comissões da EBSERH a Comissão de Ética e a Comissão de Controle Interno. Com base na afirmativa anterior, é correto afirmar que

- A) os membros da Comissão serão designados pelo Presidente para mandatos não coincidentes de dois anos.
- B) a Comissão, por ato próprio, aprovará seu regulamento interno, incluindo suas competências institucionais.
- C) o presidente da EBSERH poderá constituir Comissão de Controle Interno, composta por sete membros, sendo um representante da Presidência e um representante de cada Diretoria.
- D) a atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço privado.
- E) a Comissão de Ética da EBSERH será vinculada administrativamente à Diretoria, para cumprir plano de trabalho aprovado pela mesma, que proverá o apoio técnico e material para os trabalhos da Comissão.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21

São implicações organizativas do Sistema Único de Saúde, EXCETO:

B) Regionalização.

A) Equidade.

D) Descentralização.

E) Participação social.

C) Hierarquização.

Cargo: Médico – Medicina Nuclear (40)

Municípios limítrofes querem se organizar como "regiões de saúde", porém não apresentam serviços de vigilância em saúde. Dessa forma, é correto afirmar que os municípios

- A) não podem ser instituídos pelo estado.
- B) podem ser instituídos, pois atendem aos requisitos mínimos.
- C) podem ser instituídos pelo estado, visto que independem dos serviços de vigilância.
- D) podem ser instituídos, pois serviços de vigilância não são critérios para essa formação.
- E) não podem ser instituídos pelo estado, pois não há organização entre municípios para a denominação de regiões de saúde.

23

À direção nacional do Sistema Único de Saúde, compete participar na formulação de políticas de:

- I. saneamento básico;
- II. controle das agressões ambientais;
- III. controle das condições dos ambientes de trabalho.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

A) I, II e III.

B) I, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) II e III, apenas.

O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões 24 e 25.

"Determinantes sociais são fatores que impactam diretamente na incidência de diversas doenças. Doenças crônicas e infecciosas são ligadas a esse fator de forma veemente."

24

Sobre os fatores sociais que são considerados determinantes de doenças, analise.

- I. Renda.
- II. Educação.
- III. Desenvolvimento infantil.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

A) I, II e III.

B) I, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) II e III, apenas.

25

É considerada doença associada com maior relevância à determinação social implicada à falta de saneamento básico:

A) Obesidade.

D) Trauma ortopédico.

B) Ascaridíase.

E) Acidente automobilístico.

C) Cardiopatia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26

Em relação à asma, marque <u>V</u> para as afirmativas verdadeiras e <u>F</u> para as falsas.

- () A hiperreatividade brônquica não pode ser documentada pelo teste de broncoprovocação.
- () A espirometria permite comprovar a presença de redução do fluxo aéreo e a perda de função pulmonar.
- () A perda do controle, caracterizada pela recorrência ou piora dos sintomas que requer doses repetidas de broncodilatadores de alívio por mais de dois dias, indica a necessidade de ajustes no tratamento.

A sequência está correta em

A) V, V, F.

B) V, F, V.

C) F, V, V.

D) V, V, V.

E) F, V, F.

27

Diz-se haver pseudoanemia quando há diminuição das cifras do eritrograma por aumento da volemia plasmática. Sobre esse tema, marque <u>V</u> para as afirmativas verdadeiras e <u>F</u> para as falsas.

- () A pseudoanemia é fisiológica na gravidez e nos atletas em treinamento intensivo.
- () A anasarca da insuficiência cardíaca congestiva acompanha-se de redução da volemia plasmática.
- () No hiperesplenismo ocorre não só a retenção de hemácias, mas também a de leucócitos e plaquetas.

A sequência está correta em

A) F, V, V.

B) V, F, V.

C) V, V, F.

D) V, V, V.

E) V, F, F.

Acerca do tratamento da DPOC, analise as afirmativas.

- I. Anticolinérgicos bloqueiam os receptores muscarínicos, levando à broncoconstrição mediada pela acetilcolina, reduzindo o fluxo aéreo.
- **II.** Os principais efeitos adversos dos broncodilatadores são taquicardia e tremor, principalmente com apresentação oral e formulações de curta ação.
- **III.** Os glicocorticoides inalados têm mostrado, em pacientes com doenças mais graves e exacerbações frequentes, redução das exacerbações e melhora da qualidade de vida.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(a(s))
---	------	---

A) I.

B) III.

C) I e II.

D) I e III.

E) II e III.

29

Com base nos tipos de anemia, analise as afirmativas.

- I. Anemias microcíticas sempre possuem RDW baixo.
- II. Anemias macrocíticas são caracterizadas por possuírem VCM maior que 100 fL.
- III. A anemia ferropriva pode cursar com hemácias microcíticas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, II e III.

B) III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) I e III, apenas.

E) II e III, apenas.

30

Em relação à suspeita clínica de tireotoxicose, marque <u>V</u> para as afirmativas verdadeiras e <u>F</u> para as falsas.

- () A maioria dos pacientes com tireotoxicose apresenta TSH elevado.
- () Deve ser confirmada por meio da determinação concomitante dos níveis séricos do TSH e hormônios tireoidianos.
- () Níveis elevados da fração livre de tiroxina e/ou T3 confirmam o diagnóstico de tireotoxicose.

A sequência está correta em

A) V, V, F.

B) V, F, V.

C) F, V, V.

D) V, V, V.

E) F, V, F.

31

Acerca dos exames complementares utilizados no contexto de hipertireoidismo, analise as afirmativas.

- **I.** A captação de iodo radioativo pode ser útil para diferenciar estados de hipertireoidismo de condições em que há tireotoxicose sem hipertireoidismo.
- **II.** Nos casos de adenoma hipofisário secretor de TSH, estará presente hipertireoidismo com níveis de TSH normais ou ligeiramente aumentados.
- III. O T4 livre pode estar normal no hipertireoidismo subclínico.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, II e III.

B) II, apenas.

C) I e II, apenas.

D) I e III, apenas.

E) II e III, apenas.

32

Em relação ao diagnóstico do hipotireoidismo, marque <u>V</u> para as afirmativas verdadeiras e <u>F</u> para as falsas.

- () Os médicos não podem confiar exclusivamente no exame físico para confirmar ou descartar hipotiroidismo.
- () Se o paciente tem achados clínicos e uma probabilidade elevada de hipotireoidismo, são indicados a mensuração de T3, apenas.
- () Sugere-se a determinação de ATPO para definir a presença de autoimunidade da tireoide no hipotireoidismo primário.

A sequência está correta em

A) F, V, V.

B) V, F, V.

C) V, V, F.

D) V, V, V.

E) F, F, F.

33

"A úlcera péptica tem como causa principal a infecção pelo(a) ______, trata-se de uma bactéria ______ tratada primariamente com ______." Assinale a alternativa que completa correta

e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) H. pylori / Gram-positiva / amoxicilina
- B) *H. pylori* / Gram-negativa / amoxicilina C) *H. pylori* / Gram-negativa / clindamicina
- E).
- D) Escherichia coli / Gram-positiva / tetraciclina
- E) Staphylococcus aureus / Gram-negativa / tetraciclina

Cargo: Médico – Medicina Nuclear (40)

Hipertensão arterial sistêmica é causa de cardiopatia hipertensiva e fator de risco maior para doenças decorrentes de aterosclerose e trombose, as quais se exteriorizam por acometimento isquêmico cardíaco, cerebral, vascular periférico e renal. Em decorrência do comprometimento cardíaco, a hipertensão também leva à insuficiência cardíaca. Sobre o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica, o fármaco contraindicado como monoterapia é o(a)

A) Enalapril.

B) Losartan.

C) Hidralazina.

D) Clortalidona.

E) Alfametildopa.

35

Sobre a cefaleia em salvas, é INCORRETO afirmar que

- A) a dor é unilateral.
- B) dura entre 15 minutos a 2 horas, se não tratada.
- C) pode estar associada a edema palpebral ipsilateral.
- D) o tratamento inicial é feito com oxigênio a 100% em cateter nasal.
- E) deve-se usar triptanos para o tratamento agudo da cefaleia em salvas.

36

Para dor óssea decorrente de metástases de câncer de mama e próstata, a terapia paliativa, utilizando o samário-153, tem mostrado resposta satisfatória em cerca de 70% a 80% dos pacientes, com algum grau de melhora da dor por período que varia de 4 a 35 semanas. O efeito desta terapia em outros tipos de tumor está menos estabelecido; no entanto, casos de melhora da dor são descritos, frequentemente, na literatura médica. Qual o efeito colateral mais preocupante do tratamento paliativo com samário-153?

A) Vômito.

B) Náusea.

C) Alopércia.

D) Infertilidade.

E) Mielotoxicidade.

37

A cintilografia tomográfica da perfusão cerebral (SPECT) é útil na avaliação das demências, pois detecta alterações da perfusão sanguínea cerebral, inclusive na ausência de modificações anatômicas na ressonância magnética nuclear (RM) ou na tomografia computadorizada (TC). Apesar dos achados do SPECT não serem específicos, a localização das alterações perfusionais detectadas pelo método, frequentemente, permite caracterizar o tipo de demência. É correto afirmar que o achado cintilográfico mais comumente encontrado na demência de Alzheimer se refere à hipoperfusão

A) frontal bilateral.

D) têmporo-parietal posterior bilateral.

B) dos gânglios da base.

E) têmporo-parietal posterior bilateral e simétrico.

C) frontal ou frontotemporal bilateral.

38

"Radiofármaco de comportamento semelhante ao cloreto de potássio, na maioria dos sistemas biológicos e ação mediada pela bomba sódio-pótassio ATPase, tem papel importante no transporte transmembrana do íon potássio para dentro da célula intacta em alta concentração em relação ao espaço extracelular. Este radiofármaco, portanto, concentra-se na célula intacta de forma semelhante e pode ser utilizado para a avaliação de tumores cerebrais, identificando a sua viabilidade, recorrência e resposta a tratamentos quimio e radioterápicos." A descrição anterior se refere ao

A) SESTAMIBI-99mTa.

D) cloreto de tálio-301.

B) SESTAMIBI-99mTc.

E) cloreto de sódio-201.

C) cloreto de tálio-201.

39

A cintilografia hepática com enxofre coloidal marcado com tecnécio-99m tem boa sensibilidade na detecção de, aproximadamente, 90% das lesões que ocupam espaço, como os hepatomas, porém, apresenta baixa especificidade (51%). A associação com o estudo de gálio-67 aumenta a sensibilidade e especificidade na avaliação dos hepatomas. Uma cintilografia com gálio-67 (+) em uma região fotopênica no estudo com enxofre coloidal marcado com tecnécio-99m exclui alguns diagnósticos diferenciais. Entretanto, algumas condições não são distinguíveis do hepatoma. São condições não distinguíveis do hepatoma pelo método descrito anteriormente, EXCETO:

A) Linfoma.

D) Metástase de melanoma.

B) Abscesso.

E) Metástase de tumor pulmonar.

C) Infiltração gordurosa focal.

Na rotina clínica, a cintilografia com metilenodifosfonato marcado com tecnécio-99m (MDP-99mTc) tem se mostrado um método sensível, custo-efetivo e disponível na avaliação do comprometimento ósseo metastático por algumas patologias neoplásicas, podendo ser utilizada tanto no estadiamento da doença, quanto na avaliação de recorrência e da resposta à terapia. Com base no método descrito, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

-) No tumor de pulmão, conforme as metástases ósseas costumam ocorrer após um envolvimento de outras estruturas, como os hilos pulmonares e as suprarrenais, a cintilografia óssea não tem uma utilidade tão grande no estadiamento e muitos médicos não a utilizam nestes tipos de tumor.
- () Tanto o câncer de mama quanto o de próstata apresentam metástases ósseas predominantemente para o esqueleto axial, sendo que o câncer de próstata tem uma maior propensão para apresentar metástases em bacia.
- () Para pacientes com cânceres que, frequentemente, apresentam como sítio inicial de metástases os ossos, como o câncer de próstata e o de mama, de forma geral considera-se a cintilografia óssea muito útil no estadiamento, no entanto, esta utilidade dependerá do estágio do tumor.

A sequência está correta em

A) V, V, V.

B) V, V, F.

C) V, F, F.

D) F, F, V.

E) F, F, F.

41

Apesar do mecanismo de concentração do gálio-67 não estar completamente esclarecido, a sua importância já está febres de origem indeterminada, infecções pós-cirúrgicas, abscessos, infecções em imunodeprimidos e diagnóstico diferencial de tumores. Acerca do gálio-67, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Nas infecções, as bactérias e micro-organismos patogênicos podem captar o gálio-67 pela ação dos sideróforos.
- B) As áreas de inflamação concentram gálio-67 pela presença de proteínas mucopolissacárides que se ligam ao ferro e a outros metais.
- C) Os sideróforos são componentes de baixo peso molecular que se ligam aos íons férricos e facilitam a incorporação intracelular do gálio-67.
- D) As mudanças biológicas que ocorrem em 12 a 24 horas no sangue alteram a atividade do gálio-67 na lesão, e alguns tecidos não mantêm a fixação do gálio-67.
- E) O gálio-67 age biologicamente como um análogo de ferro e, quando administrado, liga-se à transferrina e se difunde pela junção endotelial dos capilares até os sítios de inflamação e entra no espaço extracelular.

42

A demência é uma doença mental caracterizada por prejuízo cognitivo que pode incluir alterações de memória, desorientação em relação ao tempo e ao espaço, raciocínio, concentração, aprendizado, realização de tarefas complexas, julgamento, linguagem e habilidades visuais-espaciais. Essas alterações podem ser acompanhadas por mudanças no comportamento ou na personalidade (sintomas neuropsiquiátricos). A cintilografia tomográfica da perfusão cerebral (SPECT) é útil na avaliação das demências, pois detecta alterações da perfusão sanguínea. É correto afirmar que o achado cintilográfico mais comumente encontrado na doença de *Pick* se refere à hipoperfusão

A) frontal bilateral.

D) têmporo-parietal posterior bilateral.

B) dos gânglios da base.

E) têmporo-parietal posterior bilateral e simétrico.

C) frontal ou frontotemporal bilateral.

43

No exame cintigráfico, a fratura de estresse usualmente apresenta-se com aumento do fluxo sanguíneo (de 3 a 4 semanas após o início da dor), aumento da concentração do traçador na fase de equilíbrio vascular (de 6 a 8 semanas) e uma hiperatividade focal nas imagens tardias, retornando à normalidade entre 3 e 6 meses. *Zwas et al* propuseram uma classificação das fraturas de estresse, de acordo com as anormalidades cintigráficas, sendo a mais utilizada atualmente. Assinale a alternativa INCORRETA acerca da classificação de *Zwas et al*.

- A) 1: lesão pequena, focal, bem definida e com médio aumento da atividade na cortical.
- B) III: grande, focal, fusiforme e alta atividade envolvendo a cortical e menos que a metade da medula óssea.
- C) II: maior que grau I, focal, bem definida, alongada e moderado aumento da atividade confinada ao córtex osseo.
- D) <u>V</u>: lesão que envolve menos de 50% da região transcorticomedular, sendo considerada uma fratura de estresse completa.
- E) <u>IV</u>: lesão extensa, grande, com intensa atividade na região corticomedular, envolvendo mais que a metade do diâmetro ósseo.

Cargo: Médico - Medicina Nuclear (40)

A doença de *Huntington* (DH) é uma doença genética neurodegenerativa, transmitida por herança autossômica dominante com penetrância completa. Sua gênese está na repetição exagerada do trinucleotídeo CAG no braço curto do cromossomo 4. Essa afecção caracteriza-se por sintomas psiquiátricos, motores e cognitivos progressivos. É correto afirmar que o achado cintilográfico mais comumente encontrado na doença de *Huntington* se refere à hipoperfusão

A) frontal bilateral.

D) têmporo-parietal posterior bilateral.

B) dos gânglios da base.

E) têmporo-parietal posterior bilateral e simétrico.

C) frontal ou frontotemporal bilateral.

45

Após o infarto do miocárdio, a área infartada pode necrosar e ser substituída por fibrose ou permanecer viável, apesar de metabolicamente alterada. Após um evento isquêmico agudo, esse miocárdio metabolicamente alterado é chamado de miocárdio stunned (atordoado). Se o miocárdio encontra-se cronicamente isquêmico, ocorre um fenômeno adaptativo, de modo que o tecido passa a metabolizar, quase que exclusivamente, glicose como substrato energético. Essa adaptação denomina-se "hibernação" miocárdica. O termo "viabilidade miocárdica", geralmente, se refere aos tecidos "stunned" e "hibernante". Qual o radiofármaco mais comumente utilizado na prática clínica para avaliação da viabilidade miocárdica?

A) FDG-18F.

D) Cloreto de gálio-201.

B) SESTAMIBI-99mTc.

E) Brometo de tálio-201.

C) Cloreto de tálio-201.

46

Apesar da ressonância magnética do encéfalo ser a técnica de neuroimagem de escolha na investigação de pacientes com crises epilépticas, fornecendo excelentes informações anatômicas com alta sensibilidade, técnicas de neuroimagem funcional como o estudo tomográfico de perfusão cerebral (SPECT – Single Photon Emission Computed Tomography – cerebral) e o estudo tomográfico de metabolismo cerebral (PET – Positron Emission Tomography – cerebral) têm se tornado instrumentos importantes na avaliação de pacientes com crises epilépticas. Estas técnicas funcionais permitem avaliação não invasiva do substrato epileptogênico, do estado funcional da atividade cerebral durante o período ictal, das alterações de fluxo sanguíneo cerebral regional, do metabolismo cerebral e, ainda, dos neuroreceptores, sendo que este tipo de investigação funcional permite um avanço na compreensão e no tratamento das crises. Qual o marcador metabólico mais utilizado para o estudo funcionais do cérebro?

A) Gálio-67.

D) Samário-153.

B) lodo-121.

E) Glicose marcada com flúor-18 (FDG-18F)

C) Iodo-131.

47

Os padrões observados nos estudos cintilográficos de perfusão cerebral durante as fases ictal, pós-ictal e interictal são diferentes, visto que o estudo perfusional reflete o estado funcional no momento da injeção, e o estado funcional metabólico/perfusional varia de acordo com as diferentes fases. O estudo é considerado interictal quando realizado no período de, pelo menos, 24 horas sem crises epilépticas. A sensibilidade do estudo interictal na epilepsia temporal é em torno de 55%, com uma taxa de falsa lateralização de 7%. O achado esperado é de hipofluxo, pois se trata do período interictal. Qual o local mais comumente acometido pelo hipofluxo?

A) Córtex frontal.

D) Córtex neocortical temporal.

B) Córtex parietal ipslateral.

E) Polo anterior e região mesial do lobo temporal.

C) Córtex parietal contralateral.

48

"Uma vez que o paciente apresente quadro clínico sugestivo de feocromocitoma e os exames laboratoriais apresentem aumento do ácido vanil-mandélico no sangue e das catecolaminas e metanefrinas urinárias, indica-se a cintilografia com _______, o qual permite identificar e localizar o feocromocitoma com alta sensibilidade e especificidade (85% e 95%, respectivamente)." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

A) meta-iodo-benzil-guanidina / tálio-131

D) diisopropyl iminodiacetic acid / tecnécio 99

B) meta-iodo-benzil-guanidina / gálio-131

E) meta-iodo-benzil-guanidina / iodo-131 ou iodo-123

C) diisopropyl iminodiacetic acid / iodo-131

A cintilografia mamária tem sido realizada na diferenciação de lesões mamárias palpáveis e mamas densas à mamografia, assim como de lesões cicatriciais e recidiva tumoral em pacientes já operadas. Devido a seus aspectos técnicos, lesões abaixo de 1 cm podem não ser identificadas. Desta forma, a mamografia continua sendo o método de escolha para triagem ou avaliação inicial das lesões mamárias. Acerca da cintilografia mamária, marque <u>V</u> para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A sensibilidade para lesões palpáveis da mama é, em média, de 90 a 95% e a especificidade, em torno de 85%.
- () Os valores da sensibilidade e especificidade são reduzidos nos casos de lesões não palpáveis, com sensibilidade e especificidade de 72% e 80%, respectivamente.
- () Além do tamanho do tumor, o tipo histológico tem um papel na sensibilidade do método. Maior sensibilidade na detecção dos carcinomas ductais, em relação aos tubulares ou mucinosos, devido a uma menor celularidade e índice mais baixo de crescimento.

A sequência está correta em

A) V, V, V.

B) V, V, F.

C) V, F, F.

D) F, F, V.

E) F, F, F.

50

A fratura de estresse é uma patologia relativamente frequente em atletas mal condicionados fisicamente, ou que se exercitam em excesso, cujo principal sintoma é a dor. O sítio da lesão irá depender da atividade exercida pelo paciente. Os métodos de imagem são essenciais no diagnóstico desta entidade, destacando-se a precocidade e a alta sensibilidade da medicina nuclear. Com base na atividade exercida pelo paciente e o sítio da lesão, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) <u>Tenistas</u>: úmero.B) <u>Acrobatas</u>: fíbula.C) Golfistas: costelas.
- D) Bailarinas: 1/3 médio da tíbia e fíbula.
- E) Maratonistas: 1/3 distal da fíbula, 1/3 distal da tíbia e 2º e 3º metatarsos.

INSTRUÇÕES

- 1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
- 2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
- 3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
- **4.** A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação que será feita no decorrer da prova e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
- **5.** Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
- **6.** O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
- 7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta.
- **8.** Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
- **9.** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- **10.** O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
- 11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na *Internet*, no *site* www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de **02 (dois) dias úteis**, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no *site* **www.idecan.org.br**.
- A interposição de recursos poderá ser feita via *Internet*, através do **Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos**, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao **IDECAN**, conforme disposições contidas no *site* <u>www.idecan.org.br</u>, no *link* correspondente ao Concurso Público.