



T0535019N

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019****NÍVEL SUPERIOR - TARDE****CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- () As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- () A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

Informática Básica

11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

Ética e Legislação na Administração Pública

16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.

III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.

IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.

17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO

- (A) licença à funcionária gestante.
- (B) suspensão, quando não convertida em multa.
- (C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
- (D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- () Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
- () A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
- () À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.

19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
- (B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
- (C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
- (D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.

- (A) Ultrasseceta: 20 (vinte) anos.
- (B) Reservada: 3 (três) anos.
- (C) Reservada: 5 (cinco) anos.
- (D) Secreta: 10 (dez) anos.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

- 21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?**
- (A) Atenção primária.
(B) Atenção secundária.
(C) Atenção terciária.
(D) Atenção domiciliar.
- 22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?**
- (A) Nível 1.
(B) Nível 3.
(C) Nível 2.
(D) Nível 4.
- 23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que**
- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
(B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
(C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
(D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- 24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que**
- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.
(B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.
(C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.
(D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.
- 25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de**
- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
(B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
(C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
(D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.
- 26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de**
- (A) quatro anos.
(B) três anos.
(C) cinco anos.
(D) dois anos.
- 27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a _____ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde**

envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a _____, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

Conhecimentos Específicos

31. Paciente masculino, 32 anos, comparece à clínica odontológica com indicação para extração dos 4 terceiros molares. Refere peso corporal de 60 kg e não apresenta problemas de saúde significativos. O anestésico de escolha é lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000. Entretanto, após a utilização de 4 tubetes, o profissional observou anestesia inadequada e decidiu mudar o anestésico para mepivacaína 2% com adrenalina 1:100.000. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta quanto ao número máximo de tubetes anestésicos contendo mepivacaína que o profissional poderá administrar nessa sessão.

- (A) Aproximadamente 7 tubetes.
- (B) Aproximadamente 6 tubetes.
- (C) Aproximadamente 5 tubetes.
- (D) Aproximadamente 4 tubetes.

32. A respeito da utilização de vasoconstritores em pacientes hipertensos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O maior objetivo no atendimento odontológico de pacientes com doença cardiovascular é reduzir a liberação endógena de catecolaminas. Durante uma situação de estresse, a secreção endógena de catecolaminas (epinefrina e norepinefrina) pelas adrenais aumenta em até 40 vezes, se comparada aos níveis basais (com o indivíduo em repouso), e atinge níveis sanguíneos muito maiores se comparados aos obtidos após a aplicação de um tubete de solução anestésica contendo epinefrina 1:100.000.
- II. A secreção endógena de epinefrina e norepinefrina para o sangue aumenta o trabalho cardiovascular e, conseqüentemente, a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Em pacientes com comprometimento das artérias coronárias, essa maior demanda de oxigênio pode não ser atendida. Como consequência, pode ocorrer angina do peito, arritmias ou até mesmo infarto do miocárdio.
- III. O emprego de soluções anestésicas com epinefrina pode ser benéfico aos pacientes hipertensos ou portadores da maioria das cardiopatias, com a doença controlada, na dose máxima de 40 mg por consulta.

- (A) Apenas I.
- (B) I, II e III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I e II.

33. A respeito da absorção dos fármacos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Os fármacos administrados por via oral podem ser absorvidos ao longo de todo o canal alimentar, mas o grau relativo de contato com a mucosa é que determina a quantidade de transferência em cada segmento. As variáveis que afetam a absorção incluem a duração da exposição, a concentração do fármaco e a área de contato disponível para absorção.

II. Um aspecto positivo da ingestão oral é a ativação dos fármacos antes que alcancem a circulação sistêmica. O ácido gástrico é uma das principais causas de ativação de fármacos no trato gastrointestinal.

III. As substâncias que são absorvidas com sucesso no trato gastrointestinal sofrem influência da drenagem venosa do estômago, do intestino delgado e do cólon que vai em direção ao fígado pelo sistema porta hepático. A primeira passagem de altas concentrações de fármaco através desse órgão repleto de enzimas sempre auxilia positivamente no aumento da concentração ativa dos medicamentos, o que auxilia no seu efeito terapêutico.

IV. A administração sublingual aproveita-se da permeabilidade do epitélio oral e é a via preferencial para a administração de alguns poucos fármacos lipofílicos potentes, como a nitroglicerina. Uma razão para a seleção da via sublingual é evitar a destruição do fármaco.

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas III e IV.

34. Paciente masculino, 62 anos, comparece ao serviço de cirurgia bucomaxilofacial com queixa de dor em mandíbula. Ao exame radiográfico, observavam-se múltiplas lesões radiolúcidas em “sacabocados” bem definidas e acometendo o corpo mandibular direito. Nos exames laboratoriais pré-operatórios, ficou evidente insuficiência renal com excesso de proteínas de Bence Jones. Com base nas informações clínicas, imaginológicas e laboratoriais qual é a hipótese diagnóstica mais adequada para esse caso?

- (A) Condrossarcoma.
- (B) Osteossarcoma.
- (C) Mieloma Múltiplo.
- (D) Linfoma de Burkitt.

- 35. A síndrome CREST é uma condição incomum que pode ser uma variante relativamente leve da esclerose sistêmica. São características dessa síndrome, EXCETO**
- (A) calcinose cutânea.
 - (B) fenômeno de Raynaud.
 - (C) disfunção esofágica.
 - (D) sindactilia.
- 36. A análise dos tecidos moles e os resultados estéticos associados à cirurgia ortognática são os componentes mais desafiadores e imprevisíveis no processo de planejamento do tratamento ortodôntico cirúrgico. A aparência estética facial final e o estabelecimento de uma oclusão funcional e estável são metas iguais e importantes na cirurgia ortognática. A respeito das mudanças originadas nos tecidos moles após a cirurgia ortognática, assinale a alternativa correta.**
- (A) Após o avanço maxilar, os efeitos nasais implicam na diminuição do ângulo nasolabial e estreitamento da base alar.
 - (B) Após a impactação maxilar, ocorre diminuição na quantidade do vermelhão do lábio superior visível e um estreitamento da base alar do nariz. Esses são os principais efeitos estéticos indesejáveis associados à diminuição da altura da face resultante desse procedimento.
 - (C) As principais mudanças que ocorrem após o avanço mandibular afetam o lábio inferior com uma redução global em espessura, comprimento e estreitamento, e uma diminuição na profundidade do sulco mentolabial.
 - (D) O recuo mandibular faz o lábio inferior adquirir um aspecto mais curto e invertido, com fechamento do sulco mentolabial.
- 37. Nem todos os dentes não irrompidos estão impactados. Um dente é considerado impactado quando não irrompeu totalmente para a cavidade bucal dentro do prazo de desenvolvimento. A respeito dos dentes impactados, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) Os terceiros molares superiores e inferiores são os dentes mais frequentes a se tornarem impactados, seguidos dos caninos superiores, pré-molares inferiores e pré-molares superiores.
 - (B) Dentre os procedimentos cirúrgicos para tratamento de dentes impactados estão: germectomia, ulectomia, exodontia de supranumerários, verticalização cirúrgica, exposição dentária associada ao tracionamento ortocirúrgico e a exodontia do dente impactado.
 - (C) Caninos superiores retidos por palatino, cujo tracionamento está contraindicado, devem ser extraídos. No entanto, para evitar formação de hematomas, é necessário manter um dispositivo para suportar o tecido mole por alguns dias.
 - (D) A verticalização de dentes tem sido usada mais comumente para segundos molares inferiores impactados, sendo que molares com raízes totalmente formadas possuem melhor prognóstico para essa técnica.

38. Um dente impactado é o dente que falha ao irromper. As causas da impacção podem ser dentes adjacentes retidos, osso de recobrimento denso, tecido mole excessivo, tamanho das arcadas dentárias reduzidos ou anormalidades genéticas. Existem sistemas de classificação para impacção de terceiros molares mandibulares que ajudam a avaliar o grau de dificuldade para exodontia de cada dente. Dessa forma, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A classificação de Pell e Gregory em A, B e C relaciona a posição do terceiro molar com a borda anterior do ramo ascendente da mandíbula, no qual, em A, o diâmetro mesiodistal da coroa está completamente anterior à borda anterior do ramo da mandíbula e, em C, o diâmetro mesiodistal do terceiro molar inferior está completamente dentro do ramo da mandíbula.**
- II. A classificação de Pell e Gregory em 1, 2 e 3 relaciona a posição do terceiro molar com a borda anterior do ramo ascendente da mandíbula, no qual, em 1, o diâmetro mesiodistal da coroa está completamente anterior à borda anterior do ramo da mandíbula e, em 3, o diâmetro mesiodistal do terceiro molar inferior está completamente dentro do ramo da mandíbula.**
- III. Nos casos em que há sugestão de contato entre canal mandibular/nervo alveolar inferior e ápice radicular de terceiros molares inferiores através das radiografias panorâmicas, devem ser solicitadas tomografias computadorizadas para ajudar a guiar a decisão cirúrgica e diminuir risco de déficit motor dos lábios inferiores.**

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I.
- (D) Apenas II e III.

39. Os tecidos humanos possuem propriedades geneticamente determinadas que tornam suas respostas às lesões geralmente previsíveis. Assim, os princípios de cirurgia foram desenvolvidos por meio de pesquisas básicas e clínicas com objetivo de aperfeiçoar o processo de cicatrização. Com base nos princípios de cirurgia, assinale a alternativa correta.

- (A) Dentre as manobras de hemostasia, a fricção com gaze é a mais frequentemente utilizada, sendo que vasos pequenos geralmente requerem 20 ou 30 segundos, enquanto vasos maiores requerem de 5 a 10 minutos de fricção contínua.
- (B) O espaço morto no interior de uma ferida geralmente é preenchido por sangue que é responsável pela formação do hematoma com grande potencial de infecção. Pode ser eliminado de 4 maneiras: curativos compressivos, suturas por planos, inserção de tampão no interior do espaço (material de vedação), ou através do uso de drenos.
- (C) No planejamento de retalhos cirúrgicos triangulares ou trapezoidais, a prevenção da necrose pode ser conseguida utilizando incisões relaxantes formando ângulos agudos com as incisões horizontais (cume do retalho), permitindo um suprimento sanguíneo axial.
- (D) A técnica cirúrgica deve ser asséptica, na tentativa de impedir que os micróbios tenham acesso à ferida cirúrgica. Dessa forma, a clorexidina aquosa 0,12% é utilizada como colutório bucal pré-operatório e clorexidina 2% ou 4% na desinfecção extrabucal. A esterilização dos materiais, realizada na forma de calor úmido, deve ter sua eficiência testada por testes biológicos contendo esporos de *Bacillus stearothermophilus*.

40. Cirurgias reconstrutivas, utilizando enxertos ou biomateriais, possuem diversos propósitos, dentre eles a finalidade de reabilitação protética sobre implantes dentários. A respeito desses procedimentos, assinale a alternativa correta.

- (A) A regeneração óssea guiada pode ser realizada simultaneamente à instalação do implante dentário, utilizando critérios, como o de o implante dever ser instalado em uma posição tridimensional adequada. Do ponto de vista estético e funcional, deve ser

- possível atingir uma estabilidade secundária nessa posição específica e o defeito ósseo deve ter uma morfologia favorável para permitir uma regeneração previsível do defeito.
- (B) Enxertos ósseos tipo *veneer* são compostos principalmente por osso medular, são mais delgados que os enxertos em bloco convencionais e podem ser coletados da região da tuberosidade da maxila, sendo, portanto, de fácil execução.
- (C) O conceito de três camadas para aumento do contorno na instalação dos implantes dentários consiste em uma primeira camada de osso autógeno em lascas, segunda camada de material para preenchimento com baixa taxa de substituição e na terceira camada, recobrimdo todo o conjunto, uma membrana de colágeno, usada como barreira temporária.
- (D) Os autoenxertos particulados têm liberação mais lenta de fatores de crescimento estimuladores do osso em comparação aos blocos, já os blocos de osso medular liberam mais rápido os fatores de crescimento quando comparados aos blocos de osso compacto.
- 41. Paciente do sexo masculino, 67 anos, é vítima de agressão física (soco) em face. Refere perda de consciência no momento do trauma, sendo atendido 5 horas após o evento. No exame físico, apresenta edema e equimose periorbitária direita significativa, sinais de epistaxe em narina direita e ausência de lacerações em face. Ao avaliar os movimentos extraoculares, observou-se limitação em todas as direções. Além disso, o paciente relata alterações de sensibilidade em pálpebra superior e região de supercílio/frontal direitos e amaurose em olho direito. No teste de fotorreatividade, o reflexo pupilar direto está presente em globo ocular esquerdo e ausente no globo ocular direito, já o reflexo consensual estava presente no globo ocular direito e ausente no globo ocular esquerdo. Considerando o caso clínico e a anatomia da cavidade orbitária e seus tecidos adjacentes, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) A glândula lacrimal mantém-se alojada em uma fossa ampla localizada anterolateralmente.
- (B) A fissura orbital inferior dá origem ao sulco infraorbital a partir da porção mediana, que se situa cerca de 2,5 a 3cm da rima infraorbital.
- (C) A tróclea situa-se no extremo medial da órbita, localizada cerca de 4mm atrás da rima orbitária e possui dupla inserção para o tendão do músculo reto medial.
- (D) O assoalho da órbita pode ser tão delgado que atinja 0,5mm de espessura, com sua porção mais frágil medialmente ao sulco e canal infraorbital.
- 42. Com base no caso clínico apresentado na questão anterior, nº 41, e no provável diagnóstico, assinale a alternativa correta.**
- (A) Síndrome do ápice orbitário.
- (B) Síndrome da fissura orbitária superior.
- (C) Fratura *Blow-out* de assoalho de órbita.
- (D) Fratura *Blow-out* de parede medial de órbita.
- 43. A Síndrome da Apneia ou Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) é um distúrbio caracterizado por respiração anormal no sono e fragmentação do sono. Pelo menos 30 episódios de apneia ocorrem durante as 7 h de sono noturno nesses pacientes. Referente ao diagnóstico e tratamento da SAHOS, assinale a alternativa correta.**
- (A) A apneia é definida como a interrupção do fluxo aéreo nas narinas e na boca por pelo menos 30s.
- (B) Os sintomas mais frequentes são sonolência noturna excessiva, fadiga, depressão, alterações de personalidade e impotência.
- (C) As possíveis formas de tratamento cirúrgico incluem avanço maxilomandibular, avanço mandibular, dispositivo de contenção de língua e uvulopalatofaringoplastia.
- (D) Retrognatismo, micrognatismo e macroglossia podem ser observados no exame de cavidade bucal. Além disso, na faringe, podem ser encontradas hipertrofia adenoamigdaliana, palato mole alongado, base da língua volumosa e excesso de mucosa faríngea como principais causas de obstrução.

44. Considerando o código de ética odontológica aprovado pela resolução CFO-118/2012, assinale a alternativa correta.

- (A) Quanto aos documentos odontológicos, os profissionais da odontologia deverão manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo esse prontuário preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica, com data, hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de Odontologia.
- (B) É permitido expedir documentos odontológicos: (atestados, declarações, relatórios, pareceres técnicos, laudos periciais, auditorias ou de verificação odontolegal) sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.
- (C) No exercício do magistério, é permitido aliciar pacientes ou alunos, oferecendo vantagens, benefícios ou gratuidades, para cursos de aperfeiçoamento, atualização ou especialização.
- (D) Referente à publicação científica, o profissional pode utilizar sua posição hierárquica para fazer constar seu nome na coautoria de obra científica.

45. As anomalias vasculares, neoplásicas ou não, recentemente, tiveram um grande progresso na sua classificação e entendimento. Assim, em relação às lesões de origem vascular, assinale a alternativa correta.

- (A) Os hemangiomas são considerados lesões benignas que apresentam crescimento lento, com proliferação de células endoteliais, e persistem ao longo da vida.
- (B) A malformação vascular é uma alteração estrutural do vaso sanguíneo, que apresenta taxa de renovação endotelial duplicada e anomalias estruturais e morfológicas devido a erros na embriogênese, no entanto, após o nascimento, sofre involução gradual.
- (C) Os hemangiomas são os tumores da infância mais comuns, geralmente aparecem nas primeiras semanas de vida, crescem rapidamente no primeiro ano de vida, devido à proliferação de células endoteliais, e depois involuem lentamente.

- (D) As malformações vasculares estão presentes ao nascimento e podem ser categorizadas de acordo com o tipo de vaso envolvido (capilares, linfática, venosa, arteriovenosa) e de acordo com as características hemodinâmicas (fluxo baixo, fluxo regular ou fluxo alto).

46. Em relação aos exames de imagem faciais e dentários, assinale a alternativa correta.

- (A) Na projeção extrabucal de townes reversa, o filme radiográfico é colocado em frente ao paciente, perpendicular ao plano mediosagital e paralelo ao plano axial. A cabeça do paciente é inclinada para baixo, com um ângulo de 25 a 30 graus entre a linha cantomeatal e o filme radiográfico. Para melhorar a visibilidade dos côndilos, a boca do paciente deve estar aberta, de modo que as cabeças dos côndilos fiquem localizadas inferiormente à eminência articular.
- (B) Para realizar uma Ressonância Magnética (RM), o paciente é colocado dentro de um grande ímã. Esse campo magnético faz com que os núcleos de muitos átomos no corpo, principalmente o de hidrogênio, se alinhem. O scanner direciona o pulso de radiofrequência para o paciente, absorvendo energia (ressoar). Quando o pulso de radiofrequência é desligado, a energia armazenada é liberada do corpo e detectada como um sinal em uma bobina, o qual é usado para reconstruir a imagem de RM (mapa da distribuição de hidrogênio).
- (C) Na projeção extrabucal de Waters, o filme radiográfico é colocado na frente do paciente e paralelo ao plano mediosagital. A cabeça do paciente é inclinada para cima, formando um ângulo de 37 graus entre a linha cantomeatal e o filme radiográfico. Se estiver de boca aberta, o seio esfenoide será visto sobreposto ao palato.
- (D) Em tomografias computadorizadas por feixe cônico (TCFC), as dimensões do campo de visão (FOV, inglês *field of view*) ou volume de digitalização dependem do tamanho e da forma do detector e são inversamente proporcionais. Assim, pequenas digitalizações de FOV fornecem imagens de todo o esqueleto craniofacial, digitalizações intermediárias do FOV da maxila ou mandíbula, ou de ambas. Além disso, grandes digitalizações de FOV fornecem imagens de alta resolução de regiões limitadas.

47. A síncope é uma perda da consciência transitória e abrupta associada à incapacidade de manter um tônus postural. O episódio geralmente ocorre devido a uma hipoperfusão para o córtex cerebral e para o sistema ativador reticular cerebral. Ambas as estruturas dependem do metabolismo cerebral e da disponibilidade de oxigênio e glicose para o seu bom funcionamento. As manifestações clínicas da síncope vasovagal podem ser agrupadas em três fases definidas: pré-síncope, síncope e pós-síncope (período de recuperação). Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta sinais e sintomas iniciais da pré-síncope.
- (A) Sensação de calor, perda da coloração de pele, pele pálida ou acinzentada, sudorese acentuada (diaforese), tontura e bradicardia
 - (B) Sensação de calor, perda da coloração de pele, sudorese acentuada (diaforese), náusea e taquicardia.
 - (C) Sensação de calor, dilatação da pupila, bocejo, perda da coloração de pele, sudorese acentuada (diaforese), náusea e taquicardia.
 - (D) Hiperpneia, mãos e pés frios, hipotensão, distúrbios visuais, tontura e perda de consciência.
48. Paciente feminina, 35 anos, compareceu ao serviço de cirurgia bucomaxilofacial referindo aumento de volume em mandíbula. Durante a anamnese, referiu que esse aumento foi ocorrendo lentamente. Ao exame físico, observou-se aumento de volume confinado à região posterior de mandíbula do lado direito e, ao exame de imagem, evidenciou-se lesão radiolúcida multilocular, com margens festonadas e limites bem definidos, que estava associada ao dente 48. Após biópsia incisional, o exame histológico evidenciou discretas ilhas e cordões de células epiteliais poliédricas em um estroma fibroso. Grandes áreas de material extracelular amorfo, eosinofílico, hialinizado (semelhante a amiloide) foram observadas e, dentro desse material amiloide, foram encontradas calcificações que formavam anéis concêntricos (calcificações do tipo anéis de Liesegang). Considerando as características clínicas, imagiológicas e histológicas, qual é o diagnóstico definitivo?
- (A) Ameloblastoma.
 - (B) Fibro-odontoma Ameloblástico.
 - (C) Cisto Odontogênico Calcificante.
 - (D) Tumor Odontogênico Epitelial Calcificante.
49. Paciente de 20 anos, sexo masculino, refere estar passando por período de estresse emocional devido às provas na universidade. Nega fazer uso de medicamentos. Sua queixa principal é “mandíbula pesada e limitação de abertura bucal ao acordar, além de sensação de dentes moles”. Relata estar dormindo pouco e com qualidade ruim. À palpação dos músculos, apresenta dor no músculo masseter e relata que essa dor se espalha e se direciona para região das têmporas. Além disso, refere cefaleias frequentes (dor em repouso). À palpação do músculo trapézio, observam-se regiões endurecidas e hipersensíveis (dolorosas) que desencadeiam dores reflexas nas regiões de têmporas e ângulo da mandíbula. No exame intrabucal, apresenta relação de molares em Classe I de Angle, sem giroversões, porém apresenta desgastes dentários. Com base nesse caso e nas disfunções temporomandibulares (DTM), assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.
- (A) Co-Contração protetora, que é uma resposta do sistema nervoso central às injúrias ou às ameaças de injúrias. Também denominada, no passado, como sendo uma Contratura Muscular.
 - (B) Dor miofascial, que é uma condição de dor miofascial regional caracterizada por áreas locais firmes hipersensíveis de tecidos musculares conhecidos como pontos de gatilho.
 - (C) Mioespaço (Mialgia de contração tônica), que é uma contração muscular tônica involuntária, induzida pelo sistema nervoso central.
 - (D) Sensibilidade dolorosa muscular local (Mialgia não inflamatória), desordem de dor miofascial, não inflamatória e primária. Frequentemente é a primeira resposta dos tecidos musculares à continuidade da co-contratação protetora.

50. Assinale a alternativa correta referente a características das neoplasias benignas de origem neural.

- (A) Os neuromas encapsulados em paliçada orais não são incomuns, embora muitos provavelmente sejam diagnosticados microscopicamente como neurofibromas ou neurilemomas. A lesão ocorre mais frequentemente no palato duro, gengiva e mucosa labial, embora possa ocorrer em outras localizações orais.
- (B) O neuroma traumático é uma neoplasia verdadeira, resultado de proliferação do tecido neural após uma transecção ou outro dano ao feixe nervoso.
- (C) O neurilemoma é uma neoplasia benigna neural com origem nas células de Schwann. É uma lesão relativamente incomum, embora 25% a 48% de todos os casos ocorram na região da cabeça e pescoço. Os neurilemomas bilaterais do nervo vestibuloauditivo são características de uma condição hereditária, a neurofibromatose tipo I.
- (D) O neurofibroma solitário é bem circunscrito, especialmente quando a proliferação ocorre no endoneuro do nervo envolvido. Os neurofibromas que proliferam fora do endoneuro podem não aparecer bem delimitados e tendem a se misturar ao tecido conjuntivo adjacente.

