



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T1439057N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (INFECTOLOGIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

01

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-dagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.

Acesso em: 04 jan. 2021.

1

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

2

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

3

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

4

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”.
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”.
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

5

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em interações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em interações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

6

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

7

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

8

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

9

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

10

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

Matemática

11

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{15}{4}$

(C) $\frac{1}{15}$

(D) $\frac{4}{5}$

(E) $\frac{4}{15}$

12

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

13

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

14

Se $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

15

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

Informática

16

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

17

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

18

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

19

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

20

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

Conhecimentos Específicos

21

Em relação à criptococose que acomete o sistema nervoso central, qual é o tempo de tratamento da fase de manutenção em casos de pacientes não HIV?

- (A) 1 a 3 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 6 a 12 meses.
- (D) 18 meses.
- (E) 24 meses.

22

A vacina tríplice viral é contraindicada para, EXCETO

- (A) gestantes.
- (B) crianças menores de 6 meses.
- (C) pessoas com sintomas de sarampo.
- (D) pessoas com sinais de sarampo.
- (E) pessoas com sintomas de varicela.

23

Em relação ao ciclo biológico da esquistossomose, qual é o nome da forma infectante para o homem?

- (A) Miracídio.
- (B) Cercárias.
- (C) Trematódeos.
- (D) Oocisto.
- (E) Esquistossômulos.

24

Em relação à Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de anticorpos IgM específicos para rubéola, no sangue do recém-nascido, é evidência de infecção congênita, uma vez que os anticorpos IgM maternos ultrapassam a barreira placentária.
- (B) A infecção pelo vírus da rubéola durante a gestação, principalmente no terceiro trimestre, pode comprometer o desenvolvimento do feto e causar aborto, morte fetal e anomalias congênitas, que caracterizam a síndrome SRC.
- (C) Não existe tratamento antiviral efetivo. Os cuidados devem ser direcionados às malformações congênitas e deficiências observadas.
- (D) Os anticorpos maternos, da classe IgG, não podem ser transferidos passivamente ao feto através da placenta.
- (E) O caso de SRC será classificado como descartado quando cumprir a seguinte condição: títulos de IgM e IgG presentes em crianças menores de 12 meses de vida.

25

Quais são as principais características do líquido de um paciente com meningite por tuberculose?

- (A) Aspecto límpido ou ligeiramente turvo, glicose diminuída, proteínas totais aumentadas.
- (B) Aspecto turvo, glicose aumentada e proteínas totais aumentadas.
- (C) Aspecto branco leitoso, glicose diminuída e ausência de proteínas totais.
- (D) Aspecto límpido ou ligeiramente turvo, glicose diminuída e ausência de proteínas totais.
- (E) Aspecto turvo, glicose diminuída e proteínas totais diminuídas.

26

Em relação aos princípios do tratamento da tuberculose, assinale a alternativa correta.

- (A) Em todos os esquemas de tratamento, os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente e de uma única vez.
- (B) O tratamento da TB em PVHIV tem a duração de 10 meses, independentemente da fase de evolução da infecção viral.
- (C) O tratamento de todas as formas extrapulmonares tem a duração de 10 meses.
- (D) Uma vez iniciado o tratamento, ele pode ser interrompido sempre que o paciente apresentar efeitos colaterais leves.
- (E) A hospitalização é recomendada em todos os pacientes para iniciar o tratamento.

27

Para o diagnóstico de endocardite infecciosa, deve-se utilizar os critérios de Duke, que combinam critérios maiores e menores. Assinale a alternativa que apresenta quais são os critérios Maiores de Duke para o diagnóstico de endocardite infecciosa.

- (A) Febre e 2 amostras de hemocultura positivas para agentes típicos de endocardite.
- (B) Aneurisma micótico e febre.
- (C) Massa intracardíaca móvel em valva e agentes típicos de endocardite em 2 amostras diferentes de hemocultura.
- (D) Febre e presença de infartos pulmonares sépticos.
- (E) Massa intracardíaca móvel em valva e lesões de Janeway.

28

Qual das seguintes doenças é manifestação de imunodeficiência avançada – doença definidora de AIDS?

- (A) Neurotoxoplasmose.
- (B) Tuberculose pulmonar.
- (C) Angiomatose bacilar.
- (D) Periodontite aguda necrosante.
- (E) Leucoplasia pilosa oral.

29

Paciente jovem, sexo feminino, procurou atendimento na UBS com quadro de febre alta, exantema maculopapular, coriza e conjuntivite. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Rubéola.
- (B) Sarampo.
- (C) Febre maculosa.
- (D) Herpes simples.
- (E) Dengue.

30

Paciente, 34 anos, sexo masculino, procurou atendimento no PS com quadro de febre, icterícia e dor abdominal com início há 7 dias. Morava em uma cidade no interior do Paraná, porém relatou viagem recente ao Pará. Negou comorbidades. Durante investigação laboratorial, foi diagnosticado com malária por *P. falciparum*. Quais drogas devem ser utilizadas nesse caso?

- (A) Artemeter, lumefantrina e primaquina.
- (B) Artemeter e mefloquina.
- (C) Cloroquina e primaquina.
- (D) Mefloquina, primaquina e cloroquina.
- (E) Cloroquina e artemeter.

31

Qual doença que cursa com exantema NÃO é de notificação compulsória?

- (A) Sarampo.
- (B) Eritema infeccioso.
- (C) Rubéola.
- (D) Dengue.
- (E) Doença meningocócica.

32

Paciente masculino, 64 anos, em pós-operatório tardio de transplante hepático, procurou atendimento com quadro de cefaleia, vômitos e relatou episódios de confusão mental. Foi realizada TC de crânio que estava sem alterações e coleta de líquido com os seguintes achados: aumento de proteínas, redução da glicose e predomínio de linfócitos. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Glioblastoma.
- (B) Meningite bacteriana.
- (C) Tumor de hipófise.
- (D) Ventriculite.
- (E) Meningite fúngica.

33

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial causada por leptospiros patogênicas do gênero *Leptospira*. A infecção humana geralmente evolui de maneira assintomática ou com quadro leve e autolimitado. Entretanto estima-se que 10 a 15% podem evoluir para formas graves, sendo uma delas a síndrome de Weil. Quais são as características dessa síndrome?

- (A) Icterícia, insuficiência renal e febre.
- (B) Icterícia, insuficiência renal e diátese hemorrágica.
- (C) Dispneia, icterícia e colúria.
- (D) Febre, diátese hemorrágica e dispneia.
- (E) Febre, esplenomegalia e colúria.

34

Assinale a alternativa que apresenta um protozoário responsável por causar meningite em adultos.

- (A) *Cryptococcus neoformans*.
- (B) *Angyostrongylus cantonensis*.
- (C) *Taenia solium* *Cysticercus*.
- (D) *Aspergillus fumigatus*.
- (E) *Toxoplasma gondii*.

35

Paciente masculino, 26 anos, pedreiro, natural de Alagoas, procurou atendimento na UBS com quadro de dor abdominal, “inchaço na barriga” e episódios esporádicos de diarreia. Foi realizada biópsia hepática que evidenciou a presença de ovos do *S. mansoni*. Qual é a opção terapêutica para esse paciente?

- (A) Mebendazol.
- (B) Albendazol.
- (C) Praziquantel.
- (D) Ivermectina.
- (E) Tiabendazol.

36

São manifestações clínicas e laboratoriais de um caso de malária grave e complicada, EXCETO

- (A) anemia grave.
- (B) dor abdominal intensa.
- (C) qualquer tipo de sangramento.
- (D) alcalose metabólica.
- (E) redução do débito urinário.

37

A perda parcial a total das sobrancelhas (madarose) e também dos cílios associada à pele avermelhada, seca, infiltrada, cujos poros apresentam-se dilatados (aspecto de “casca de laranja”) e o surgimento de hansenomas são típicos de qual forma da hanseníase?

- (A) Hanseníase virchowiana (paucibacilar).
- (B) Hanseníase indeterminada (paucibacilar).
- (C) Hanseníase virchowiana (multibacilar).
- (D) Hanseníase tuberculoide (paucibacilar).
- (E) Hanseníase dimorfa (multibacilar).

38

Qual das seguintes alternativas apresenta critérios definidores de infecção do sítio cirúrgico (infecção do sítio de inserção) para cirurgias endovasculares ?

- (A) Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e cultura positiva da secreção da ferida operatória coletada no centro cirúrgico ou com swab.
- (B) Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta drenagem purulenta da incisão superficial.
- (C) Ocorre nos primeiros 90 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta fístula para pele com sangramento persistente.
- (D) Ocorre nos primeiros 180 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta drenagem purulenta da incisão superficial.
- (E) Ocorre nos primeiros 180 dias após a cirurgia e ocorre rompimento da prótese endovascular.

39

Em relação à profilaxia do tétano acidental, qual alternativa apresenta um paciente que NÃO precisa receber a vacina contra tétano?

- (A) Paciente com situação vacinal incerta ou com menos de 3 doses + ferimento com alto risco para tétano.
- (B) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 20 anos + ferimento com risco mínimo para tétano.
- (C) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos + ferimento com risco mínimo para tétano.
- (D) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais 10 anos + ferimento com risco alto para tétano.
- (E) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos + ferimento com risco alto para tétano.

40

Em relação à hanseníase, quando se deve suspeitar de reação hansênica tipo 2 (eritema nodoso hansênico)?

- (A) No surgimento de manchas ou “caroços” na pele, quentes, dolorosos e avermelhados, às vezes ulcerados, e febre.
- (B) Se os nervos periféricos ficarem mais dolorosos associado à “dor nas juntas”.
- (C) Na presença de anemia severa aguda e no surgimento abrupto de novas lesões de pele até 5 anos após a alta medicamentosa.
- (D) Se houver piora dos sinais neurológicos de perda de sensibilidade ou perda de função muscular e febre.
- (E) Na presença de febre, “dor nas juntas” e se houver surgimento abrupto de novas lesões de pele até 5 anos após a alta medicamentosa.

41

Paciente de 50 anos, sexo masculino e sem comorbidades, foi diagnosticado com toxoplasmose ocular. Qual é o melhor esquema terapêutico indicado para esse paciente?

- (A) Sulfametoxazol + trimetropina (800 mg de sulfa + 160 mg trimetoprima) por 2 semanas.
- (B) Espiramicina (3g/dia) por 2 semanas.
- (C) Clindamicina (600mg) + ácido fólico (10 a 20 mg/dia) por 4 semanas.
- (D) Sulfadiazina (4 a 6g/dia) + pirimetamina (50 mg/dia em dias alternados) por 4 a 6 semanas.
- (E) Sulfametoxazol + trimetropina (800 mg de sulfa + 160 mg trimetoprima) por 4 a 6 semanas.

42

Todos os contatos próximos de um caso de doença meningocócica, independentemente do estado vacinal, deverão receber a quimioprofilaxia. É importante observar o cartão de vacina. As crianças e adolescentes que não são vacinados devem receber a quimioprofilaxia e atualizar o cartão vacinal. Quais medicamentos podem ser usados para a quimioprofilaxia?

- (A) Ciprofloxacino, levofloxacino ou azitromicina.
- (B) Rifampicina, ceftriaxone ou ciprofloxacino.
- (C) Rifampicina, ceftriaxone ou azitromicina.
- (D) Ceftriaxone, meropenem ou ciprofloxacino.
- (E) Rifampicina, etambutol ou ciprofloxacino.

43

Em relação à leishmaniose, assinale a alternativa correta.

- (A) As leishmanioses são infecções virais causadas pelo gênero *Leishmania*.
- (B) A forma amastigota é a forma flagelada que se multiplica no intestino médio do vetor (mosquito).
- (C) A forma promastigota é a forma aflagelada, encontrada no interior dos macrófagos humanos e dos mamíferos reservatórios na natureza.
- (D) A doença leishmaniótica mucosa ocorre vários meses ou anos após o quadro cutâneo primário, resultado, portanto, de recidiva da enfermidade, principalmente quando esta for causada por *L. brasiliensis*.
- (E) Na forma cutânea da leishmaniose tegumentar, a lesão inicial ocorre no local da picada do inseto vetor, surgindo no mínimo 1 ano após a inoculação do parasita.

44

Qual dos seguintes medicamentos NÃO é uma opção de escolha no tratamento da histoplasmose?

- (A) Anfotericina B desoxicolato.
- (B) Sulfametoxazol- trimetoprima.
- (C) Itraconazol.
- (D) Azitromicina.
- (E) Fluconazol.

45

Em relação à toxoplasmose na gestação, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O diagnóstico de toxoplasmose pós-natal pode ser estabelecido pela existência de anticorpos IgM e IgA, sendo a detecção de IgA mais sensível.
- (B) Para gestantes com IgM não reagente e IgG reagente, o risco de desenvolver toxoplasmose congênita é muito alto.
- (C) Gestantes com IgM reagente e IgG não reagente significam possível infecção aguda.
- (D) Mães suscetíveis à infecção, ou seja IgM e IgG negativas, devem ser sistematicamente orientadas quanto à prevenção do contato com o protozoário.
- (E) Transmissão vertical cujas mães se infectaram durante o primeiro trimestre causam graves repercussões fetais.

46

Qual é o vetor responsável pela doença Tripanossomíase americana?

- (A) Mosquito palha.
- (B) *Aedes aegypti*.
- (C) Bicho barbeiro.
- (D) Mosquito Anopheles.
- (E) Birigui.

47

Paciente de 64 anos, sexo masculino, agricultor, procurou atendimento na UBS com quadro de febre, dor pleural, dispneia e tosse produtiva. No exame físico, observou-se a presença de eritema nodoso e de algumas lesões exantemáticas. A imagem radiológica revelava adenomegalia hilar e infiltração pulmonar com derrame pleural. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Coccidioidomicose.
- (B) Pneumonia viral.
- (C) Asma.
- (D) Atelectasia.
- (E) Insuficiência cardíaca.

48**São sinais de alarme na dengue:**

- (A) dor abdominal intensa e contínua + hipotensão arterial.
- (B) desconforto respiratório + febre.
- (C) queda abrupta de plaquetas + artralgia.
- (D) melena + mialgia.
- (E) hematêmese + febre.

49**Qual é a primeira droga de escolha para o tratamento da manifestação linfocutânea da esporotricose?**

- (A) Fluconazol.
- (B) Itraconazol.
- (C) Azitromicina.
- (D) Anfoterecina B.
- (E) Anfoterecina lipossomal.

50**Com base na classificação dos casos confirmados de sarampo, de acordo com a fonte de infecção, assinale a alternativa que apresenta um caso secundário de sarampo.**

- (A) Caso novo, a partir do contato com o caso índice. A confirmação deve ser feita por laboratório ou por vínculo epidemiológico.
- (B) Primeiro caso ocorrido entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados, encontrando-se a fonte de infecção no território nacional. A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação viral realizada no primeiro contato com o paciente.
- (C) É o caso que introduz o surto no grupo e não necessariamente o primeiro diagnosticado, mas cumpre as condições de fonte de origem do surto. Não basta que seja o primeiro caso, cronologicamente, porque todos os casos podem ter se originado da mesma fonte comum.
- (D) Caso cuja infecção ocorreu fora do país durante os 7 a 21 dias prévios ao surgimento do exantema, de acordo com a análise dos dados epidemiológicos ou virológicos. A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação viral realizada no primeiro contato com o paciente.
- (E) Primeiro caso identificado após a confirmação da cadeia de transmissão sustentada (o vírus deve circular no país por mais de 12 meses, em uma mesma cadeia de transmissão).

51

Em relação à toxoplasmose gestacional e congênita, assinale a alternativa correta.

- (A) O IgM ou o IgA maternos atravessam a barreira transplacentária.
- (B) O IgG materno atravessa a barreira transplacentária.
- (C) O teste de avidéz de IgG é importante para determinar a época da infecção pelo toxoplasma na gestante, visto que alta avidéz indica que os anticorpos foram produzidos há menos de 12-16 semanas.
- (D) A presença de baixa avidéz de IgG, associada ao resultado positivo de IgM e IgG, indica uma infecção antiga.
- (E) Em crianças que receberam tratamento da toxoplasmose, a soronegativação só deve ser considerada definitiva após dois anos da suspensão das drogas antiparasitárias.

52

Paciente, 65 anos, sexo feminino, agricultora, procurou atendimento médico com queixa de lesões tipo mácula, de coloração avermelhada na perna, associadas à febre e mal-estar. Relata que notou presença de carrapatos em algumas roupas de cama. Com base no exposto, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Varicela.
- (B) Herpes zoster.
- (C) Doença de Lyme.
- (D) Rubéola.
- (E) Sarampo.

53

Em relação ao Papilomavírus Humano (HPV), quais são os sorotipos com maior poder de oncogenicidade?

- (A) 11, 12, 16 e 18.
- (B) 31, 33, 36 e 56.
- (C) 11, 16, 18 e 31.
- (D) 16, 18, 24 e 45.
- (E) 16, 18, 31 e 33.

54

Paciente masculino, 24 anos, realizou exames laboratoriais pré-admissionais de hepatite B e levou ao médico os seguintes resultados: HbsAg não reagente, Anti Hbs reagente e Anti HBc total reagente. Qual deve ser a interpretação correta do médico?

- (A) Fase aguda da doença.
- (B) Incubação.
- (C) Infecção passada/cura.
- (D) Hepatite B crônica.
- (E) Portador assintomático.

55

A terapia inicial para tratamento do HIV deve sempre incluir combinações de três ARV, sendo dois ITRN/ITRNt associados a uma outra classe de antirretrovirais (ITRNN, IP/r ou INI). O esquema inicial preferencial no Brasil é lamivudina, tenofovir e dolutegravir. Em casos de intolerância ou contraindicação ao dolutegravir, qual droga deve ser usada?

- (A) Ritonavir.
- (B) Abacavir.
- (C) Zidovudina.
- (D) Efavirenz.
- (E) Raltegravir.

56

Em qual doença a seguir deve ser realizada a notificação compulsória imediata (até 24 horas) para o ministério da saúde?

- (A) Esquistossomose.
- (B) Botulismo.
- (C) Hanseníase.
- (D) Hepatites virais.
- (E) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.

57

A presença de pontos esbranquiçados sobre base eritematosa na face interna das bochechas, próximos aos dentes molares inferiores, é patognomônica de qual doença exantemática?

- (A) Rubéola.
- (B) Sarampo.
- (C) Varicela zoster.
- (D) Eritema infeccioso.
- (E) Mononucleose infecciosa.

58

Em relação à hepatite B, assinale a alternativa correta.

- (A) HBsAg: sua presença por mais de 1 mês é indicativa de hepatite crônica.
- (B) Anti-HBs: é o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade. Está presente isoladamente em pessoas vacinadas.
- (C) HBV-DNA (quantitativo): surge após o desaparecimento do HbeAg e indica o fim da fase replicativa.
- (D) Anti-HBc IgG: marcador de infecção recente, que está no soro até seis meses após a infecção.
- (E) Anti-HBc IgG: indicador de replicação viral. Sua positividade indica alta infectividade.

59

Dentre as seguintes alternativas, qual é a melhor droga de escolha para tratamento da Doença de Lyme?

- (A) Cefalexina.
- (B) Meropenem.
- (C) Azitromicina.
- (D) Doxiciclina.
- (E) Ciprofloxacino.

60

Paciente do sexo masculino, 27 anos, tem diagnóstico de HIV, porém sem tratamento há mais de 5 anos. Procurou atendimento médico com queixa de escotomas e redução da acuidade visual no olho esquerdo. Após consulta com oftalmologista, foi diagnosticado com retinite por citomegalovírus. Qual é a melhor opção terapêutica?

- (A) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de aciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.
- (B) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de aciclovir 20 mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.
- (C) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 7 dias.
- (D) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 30mg/kg a cada doze horas, por 7 dias.
- (E) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.

Realização



instituto aocp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T2439057N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (INFECTOLOGIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

02

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.

Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

2

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

3

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

4

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]"

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

5

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

6

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

7

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

8

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

9

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

10

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

Matemática

11

Cinco pessoas, identificadas como P_1 , P_2 , P_3 , P_4 e P_5 , estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P_3 e P_4 irão fazer o mesmo tipo de exame, P_2 e P_5 irão fazer exames de tipos diferentes e P_2 e P_5 irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P_1 irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P_5 irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P_3 irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P_2 irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P_4 irá fazer o exame de Glicemia.

12

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

13

Se $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

14

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

15

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da

dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

Informática

16

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

17

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

18

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

19

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

20

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

Conhecimentos Específicos

21

A vacina tríplice viral é contraindicada para, EXCETO

- (A) gestantes.
- (B) crianças menores de 6 meses.
- (C) pessoas com sintomas de sarampo.
- (D) pessoas com sinais de sarampo.
- (E) pessoas com sintomas de varicela.

22

Em relação ao ciclo biológico da esquistossomose, qual é o nome da forma infectante para o homem?

- (A) Miracídio.
- (B) Cercárias.
- (C) Trematódeos.
- (D) Oocisto.
- (E) Esquistossômulos.

23

Em relação à Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de anticorpos IgM específicos para rubéola, no sangue do recém-nascido, é evidência de infecção congênita, uma vez que os anticorpos IgM maternos ultrapassam a barreira placentária.
- (B) A infecção pelo vírus da rubéola durante a gestação, principalmente no terceiro trimestre, pode comprometer o desenvolvimento do feto e causar aborto, morte fetal e anomalias congênitas, que caracterizam a síndrome SRC.
- (C) Não existe tratamento antiviral efetivo. Os cuidados devem ser direcionados às malformações congênitas e deficiências observadas.
- (D) Os anticorpos maternos, da classe IgG, não podem ser transferidos passivamente ao feto através da placenta.
- (E) O caso de SRC será classificado como descartado quando cumprir a seguinte condição: títulos de IgM e IgG presentes em crianças menores de 12 meses de vida.

24

Quais são as principais características do líquido de um paciente com meningite por tuberculose?

- (A) Aspecto límpido ou ligeiramente turvo, glicose diminuída, proteínas totais aumentadas.
- (B) Aspecto turvo, glicose aumentada e proteínas totais aumentadas.
- (C) Aspecto branco leitoso, glicose diminuída e ausência de proteínas totais.
- (D) Aspecto límpido ou ligeiramente turvo, glicose diminuída e ausência de proteínas totais.
- (E) Aspecto turvo, glicose diminuída e proteínas totais diminuídas.

25

Em relação aos princípios do tratamento da tuberculose, assinale a alternativa correta.

- (A) Em todos os esquemas de tratamento, os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente e de uma única vez.
- (B) O tratamento da TB em PVHIV tem a duração de 10 meses, independentemente da fase de evolução da infecção viral.
- (C) O tratamento de todas as formas extrapulmonares tem a duração de 10 meses.
- (D) Uma vez iniciado o tratamento, ele pode ser interrompido sempre que o paciente apresentar efeitos colaterais leves.
- (E) A hospitalização é recomendada em todos os pacientes para iniciar o tratamento.

26

Para o diagnóstico de endocardite infecciosa, deve-se utilizar os critérios de Duke, que combinam critérios maiores e menores. Assinale a alternativa que apresenta quais são os critérios Maiores de Duke para o diagnóstico de endocardite infecciosa.

- (A) Febre e 2 amostras de hemocultura positivas para agentes típicos de endocardite.
- (B) Aneurisma micótico e febre.
- (C) Massa intracardíaca móvel em valva e agentes típicos de endocardite em 2 amostras diferentes de hemocultura.
- (D) Febre e presença de infartos pulmonares sépticos.
- (E) Massa intracardíaca móvel em valva e lesões de Janeway.

27

Qual das seguintes doenças é manifestação de imunodeficiência avançada – doença definidora de AIDS?

- (A) Neurotoxoplasmose.
- (B) Tuberculose pulmonar.
- (C) Angiomatose bacilar.
- (D) Periodontite aguda necrosante.
- (E) Leucoplasia pilosa oral.

28

Paciente jovem, sexo feminino, procurou atendimento na UBS com quadro de febre alta, exantema maculopapular, coriza e conjuntivite. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Rubéola.
- (B) Sarampo.
- (C) Febre maculosa.
- (D) Herpes simples.
- (E) Dengue.

29

Paciente, 34 anos, sexo masculino, procurou atendimento no PS com quadro de febre, icterícia e dor abdominal com início há 7 dias. Morava em uma cidade no interior do Paraná, porém relatou viagem recente ao Pará. Negou comorbidades. Durante investigação laboratorial, foi diagnosticado com malária por *P. falciparum*. Quais drogas devem ser utilizadas nesse caso?

- (A) Artemeter, lumefantrina e primaquina.
- (B) Artemeter e mefloquina.
- (C) Cloroquina e primaquina.
- (D) Mefloquina, primaquina e cloroquina.
- (E) Cloroquina e artemeter.

30

Qual doença que cursa com exantema NÃO é de notificação compulsória?

- (A) Sarampo.
- (B) Eritema infeccioso.
- (C) Rubéola.
- (D) Dengue.
- (E) Doença meningocócica.

31

Paciente masculino, 64 anos, em pós-operatório tardio de transplante hepático, procurou atendimento com quadro de cefaleia, vômitos e relatou episódios de confusão mental. Foi realizada TC de crânio que estava sem alterações e coleta de líquido com os seguintes achados: aumento de proteínas, redução da glicose e predomínio de linfócitos. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Glioblastoma.
- (B) Meningite bacteriana.
- (C) Tumor de hipófise.
- (D) Ventriculite.
- (E) Meningite fúngica.

32

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial causada por leptospiros patogênicas do gênero *Leptospira*. A infecção humana geralmente evolui de maneira assintomática ou com quadro leve e autolimitado. Entretanto estima-se que 10 a 15% podem evoluir para formas graves, sendo uma delas a síndrome de Weil. Quais são as características dessa síndrome?

- (A) Icterícia, insuficiência renal e febre.
- (B) Icterícia, insuficiência renal e diátese hemorrágica.
- (C) Dispneia, icterícia e colúria.
- (D) Febre, diátese hemorrágica e dispneia.
- (E) Febre, esplenomegalia e colúria.

33

Assinale a alternativa que apresenta um protozoário responsável por causar meningite em adultos.

- (A) *Cryptococcus neoformans*.
- (B) *Angyostrongylus cantonensis*.
- (C) *Taenia solium* *Cysticercus*.
- (D) *Aspergillus fumigatus*.
- (E) *Toxoplasma gondii*.

34

Paciente masculino, 26 anos, pedreiro, natural de Alagoas, procurou atendimento na UBS com quadro de dor abdominal, “inchaço na barriga” e episódios esporádicos de diarreia. Foi realizada biópsia hepática que evidenciou a presença de ovos do *S. mansoni*. Qual é a opção terapêutica para esse paciente?

- (A) Mebendazol.
- (B) Albendazol.
- (C) Praziquantel.
- (D) Ivermectina.
- (E) Tiabendazol.

35

São manifestações clínicas e laboratoriais de um caso de malária grave e complicada, EXCETO

- (A) anemia grave.
- (B) dor abdominal intensa.
- (C) qualquer tipo de sangramento.
- (D) alcalose metabólica.
- (E) redução do débito urinário.

36

A perda parcial a total das sobrancelhas (madarose) e também dos cílios associada à pele avermelhada, seca, infiltrada, cujos poros apresentam-se dilatados (aspecto de “casca de laranja”) e o surgimento de hansenomas são típicos de qual forma da hanseníase?

- (A) Hanseníase virchowiana (paucibacilar).
- (B) Hanseníase indeterminada (paucibacilar).
- (C) Hanseníase virchowiana (multibacilar).
- (D) Hanseníase tuberculoide (paucibacilar).
- (E) Hanseníase dimorfa (multibacilar).

37

Qual das seguintes alternativas apresenta critérios definidores de infecção do sítio cirúrgico (infecção do sítio de inserção) para cirurgias endovasculares ?

- (A) Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e cultura positiva da secreção da ferida operatória coletada no centro cirúrgico ou com swab.
- (B) Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta drenagem purulenta da incisão superficial.
- (C) Ocorre nos primeiros 90 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta fístula para pele com sangramento persistente.
- (D) Ocorre nos primeiros 180 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta drenagem purulenta da incisão superficial.
- (E) Ocorre nos primeiros 180 dias após a cirurgia e ocorre rompimento da prótese endovascular.

38

Em relação à profilaxia do tétano acidental, qual alternativa apresenta um paciente que NÃO precisa receber a vacina contra tétano?

- (A) Paciente com situação vacinal incerta ou com menos de 3 doses + ferimento com alto risco para tétano.
- (B) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 20 anos + ferimento com risco mínimo para tétano.
- (C) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos + ferimento com risco mínimo para tétano.
- (D) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais 10 anos + ferimento com risco alto para tétano.
- (E) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos + ferimento com risco alto para tétano.

39

Em relação à hanseníase, quando se deve suspeitar de reação hansênica tipo 2 (eritema nodoso hansênico)?

- (A) No surgimento de manchas ou “caroços” na pele, quentes, dolorosos e avermelhados, às vezes ulcerados, e febre.
- (B) Se os nervos periféricos ficarem mais dolorosos associado à “dor nas juntas”.
- (C) Na presença de anemia severa aguda e no surgimento abrupto de novas lesões de pele até 5 anos após a alta medicamentosa.
- (D) Se houver piora dos sinais neurológicos de perda de sensibilidade ou perda de função muscular e febre.
- (E) Na presença de febre, “dor nas juntas” e se houver surgimento abrupto de novas lesões de pele até 5 anos após a alta medicamentosa.

40

Paciente de 50 anos, sexo masculino e sem comorbidades, foi diagnosticado com toxoplasmose ocular. Qual é o melhor esquema terapêutico indicado para esse paciente?

- (A) Sulfametoxazol + trimetropina (800 mg de sulfa + 160 mg trimetoprima) por 2 semanas.
- (B) Espiramicina (3g/dia) por 2 semanas.
- (C) Clindamicina (600mg) + ácido fólico (10 a 20 mg/dia) por 4 semanas.
- (D) Sulfadiazina (4 a 6g/dia) + pirimetamina (50 mg/dia em dias alternados) por 4 a 6 semanas.
- (E) Sulfametoxazol + trimetropina (800 mg de sulfa + 160 mg trimetoprima) por 4 a 6 semanas.

41

Todos os contatos próximos de um caso de doença meningocócica, independentemente do estado vacinal, deverão receber a quimioprofilaxia. É importante observar o cartão de vacina. As crianças e adolescentes que não são vacinados devem receber a quimioprofilaxia e atualizar o cartão vacinal. Quais medicamentos podem ser usados para a quimioprofilaxia?

- (A) Ciprofloxacino, levofloxacino ou azitromicina.
- (B) Rifampicina, ceftriaxone ou ciprofloxacino.
- (C) Rifampicina, ceftriaxone ou azitromicina.
- (D) Ceftriaxone, meropenem ou ciprofloxacino.
- (E) Rifampicina, etambutol ou ciprofloxacino.

42

Em relação à leishmaniose, assinale a alternativa correta.

- (A) As leishmanioses são infecções virais causadas pelo gênero *Leishmania*.
- (B) A forma amastigota é a forma flagelada que se multiplica no intestino médio do vetor (mosquito).
- (C) A forma promastigota é a forma aflagelada, encontrada no interior dos macrófagos humanos e dos mamíferos reservatórios na natureza.
- (D) A doença leishmaniótica mucosa ocorre vários meses ou anos após o quadro cutâneo primário, resultado, portanto, de recidiva da enfermidade, principalmente quando esta for causada por *L. brasiliensis*.
- (E) Na forma cutânea da leishmaniose tegumentar, a lesão inicial ocorre no local da picada do inseto vetor, surgindo no mínimo 1 ano após a inoculação do parasita.

43

Qual dos seguintes medicamentos NÃO é uma opção de escolha no tratamento da histoplasmose?

- (A) Anfotericina B desoxicolato.
- (B) Sulfametoxazol- trimetoprima.
- (C) Itraconazol.
- (D) Azitromicina.
- (E) Fluconazol.

44

Em relação à toxoplasmose na gestação, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O diagnóstico de toxoplasmose pós-natal pode ser estabelecido pela existência de anticorpos IgM e IgA, sendo a detecção de IgA mais sensível.
- (B) Para gestantes com IgM não reagente e IgG reagente, o risco de desenvolver toxoplasmose congênita é muito alto.
- (C) Gestantes com IgM reagente e IgG não reagente significam possível infecção aguda.
- (D) Mães suscetíveis à infecção, ou seja IgM e IgG negativas, devem ser sistematicamente orientadas quanto à prevenção do contato com o protozoário.
- (E) Transmissão vertical cujas mães se infectaram durante o primeiro trimestre causam graves repercussões fetais.

45

Qual é o vetor responsável pela doença Tripanossomíase americana?

- (A) Mosquito palha.
- (B) *Aedes aegypti*.
- (C) Bicho barbeiro.
- (D) Mosquito Anopheles.
- (E) Birigui.

46

Paciente de 64 anos, sexo masculino, agricultor, procurou atendimento na UBS com quadro de febre, dor pleural, dispneia e tosse produtiva. No exame físico, observou-se a presença de eritema nodoso e de algumas lesões exantemáticas. A imagem radiológica revelava adenomegalia hilar e infiltração pulmonar com derrame pleural. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Coccidioidomicose.
- (B) Pneumonia viral.
- (C) Asma.
- (D) Atelectasia.
- (E) Insuficiência cardíaca.

47

São sinais de alarme na dengue:

- (A) dor abdominal intensa e contínua + hipotensão arterial.
- (B) desconforto respiratório + febre.
- (C) queda abrupta de plaquetas + artralgia.
- (D) melena + mialgia.
- (E) hematêmese + febre.

48

Qual é a primeira droga de escolha para o tratamento da manifestação linfocutânea da esporotricose?

- (A) Fluconazol.
- (B) Itraconazol.
- (C) Azitromicina.
- (D) Anfoterecina B.
- (E) Anfoterecina lipossomal.

49

Com base na classificação dos casos confirmados de sarampo, de acordo com a fonte de infecção, assinale a alternativa que apresenta um caso secundário de sarampo.

- (A) Caso novo, a partir do contato com o caso índice. A confirmação deve ser feita por laboratório ou por vínculo epidemiológico.
- (B) Primeiro caso ocorrido entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados, encontrando-se a fonte de infecção no território nacional. A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação viral realizada no primeiro contato com o paciente.
- (C) É o caso que introduz o surto no grupo e não necessariamente o primeiro diagnosticado, mas cumpre as condições de fonte de origem do surto. Não basta que seja o primeiro caso, cronologicamente, porque todos os casos podem ter se originado da mesma fonte comum.
- (D) Caso cuja infecção ocorreu fora do país durante os 7 a 21 dias prévios ao surgimento do exantema, de acordo com a análise dos dados epidemiológicos ou virológicos. A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação viral realizada no primeiro contato com o paciente.
- (E) Primeiro caso identificado após a confirmação da cadeia de transmissão sustentada (o vírus deve circular no país por mais de 12 meses, em uma mesma cadeia de transmissão).

50

Em relação à criptococose que acomete o sistema nervoso central, qual é o tempo de tratamento da fase de manutenção em casos de pacientes não HIV?

- (A) 1 a 3 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 6 a 12 meses.
- (D) 18 meses.
- (E) 24 meses.

51

Paciente, 65 anos, sexo feminino, agricultora, procurou atendimento médico com queixa de lesões tipo mácula, de coloração avermelhada na perna, associadas à febre e mal-estar. Relata que notou presença de carrapatos em algumas roupas de cama. Com base no exposto, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Varicela.
- (B) Herpes zoster.
- (C) Doença de Lyme.
- (D) Rubéola.
- (E) Sarampo.

52

Em relação ao Papilomavírus Humano (HPV), quais são os sorotipos com maior poder de oncogenicidade?

- (A) 11, 12, 16 e 18.
- (B) 31, 33, 36 e 56.
- (C) 11, 16, 18 e 31.
- (D) 16, 18, 24 e 45.
- (E) 16, 18, 31 e 33.

53

Paciente masculino, 24 anos, realizou exames laboratoriais pré-admissionais de hepatite B e levou ao médico os seguintes resultados: HbsAg não reagente, Anti Hbs reagente e Anti HBc total reagente. Qual deve ser a interpretação correta do médico?

- (A) Fase aguda da doença.
- (B) Incubação.
- (C) Infecção passada/cura.
- (D) Hepatite B crônica.
- (E) Portador assintomático.

54

A terapia inicial para tratamento do HIV deve sempre incluir combinações de três ARV, sendo dois ITRN/ITRNt associados a uma outra classe de antirretrovirais (ITRNN, IP/r ou INI). O esquema inicial preferencial no Brasil é lamivudina, tenofovir e dolutegravir. Em casos de intolerância ou contraindicação ao dolutegravir, qual droga deve ser usada?

- (A) Ritonavir.
- (B) Abacavir.
- (C) Zidovudina.
- (D) Efavirenz.
- (E) Raltegravir.

55

Em qual doença a seguir deve ser realizada a notificação compulsória imediata (até 24 horas) para o ministério da saúde?

- (A) Esquistossomose.
- (B) Botulismo.
- (C) Hanseníase.
- (D) Hepatites virais.
- (E) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.

56

A presença de pontos esbranquiçados sobre base eritematosa na face interna das bochechas, próximos aos dentes molares inferiores, é patognomônica de qual doença exantemática?

- (A) Rubéola.
- (B) Sarampo.
- (C) Varicela zoster.
- (D) Eritema infeccioso.
- (E) Mononucleose infecciosa.

57**Em relação à hepatite B, assinale a alternativa correta.**

- (A) HBsAg: sua presença por mais de 1 mês é indicativa de hepatite crônica.
- (B) Anti-HBs: é o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade. Está presente isoladamente em pessoas vacinadas.
- (C) HBV-DNA (quantitativo): surge após o desaparecimento do HbeAg e indica o fim da fase replicativa.
- (D) Anti-HBc IgG: marcador de infecção recente, que está no soro até seis meses após a infecção.
- (E) Anti-HBc IgG: indicador de replicação viral. Sua positividade indica alta infectividade.

58**Dentre as seguintes alternativas, qual é a melhor droga de escolha para tratamento da Doença de Lyme?**

- (A) Cefalexina.
- (B) Meropenem.
- (C) Azitromicina.
- (D) Doxiciclina.
- (E) Ciprofloxacino.

59**Paciente do sexo masculino, 27 anos, tem diagnóstico de HIV, porém sem tratamento há mais de 5 anos. Procurou atendimento médico com queixa de escotomas e redução da acuidade visual no olho esquerdo. Após consulta com oftalmologista, foi diagnosticado com retinite por citomegalovírus. Qual é a melhor opção terapêutica?**

- (A) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de aciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.
- (B) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de aciclovir 20 mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.
- (C) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 7 dias.
- (D) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 30mg/kg a cada doze horas, por 7 dias.
- (E) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.

60**Em relação à toxoplasmose gestacional e congênita, assinale a alternativa correta.**

- (A) O IgM ou o IgA maternos atravessam a barreira transplacentária.
- (B) O IgG materno atravessa a barreira transplacentária.
- (C) O teste de avidéz de IgG é importante para determinar a época da infecção pelo toxoplasma na gestante, visto que alta avidéz indica que os anticorpos foram produzidos há menos de 12-16 semanas.
- (D) A presença de baixa avidéz de IgG, associada ao resultado positivo de IgM e IgG, indica uma infecção antiga.
- (E) Em crianças que receberam tratamento da toxoplasmose, a soronegativação só deve ser considerada definitiva após dois anos da suspensão das drogas antiparasitárias.

Realização



instituto aacp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T3439057N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (INFECTOLOGIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

03

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico www.institutoaacp.org.br

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

2

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”

3

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

4

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

5

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

6

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

7

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

8

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

9

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

10

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

Matemática

11

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

12

Seja $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

13

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

14

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

15

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

Informática

16

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

17

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

18

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

19

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

20

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

Conhecimentos Específicos

21

Em relação ao ciclo biológico da esquistossomose, qual é o nome da forma infectante para o homem?

- (A) Miracídio.
- (B) Cercárias.
- (C) Trematódeos.
- (D) Oocisto.
- (E) Esquistossômulos.

22**Em relação à Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), assinale a alternativa correta.**

- (A) A presença de anticorpos IgM específicos para rubéola, no sangue do recém-nascido, é evidência de infecção congênita, uma vez que os anticorpos IgM maternos ultrapassam a barreira placentária.
- (B) A infecção pelo vírus da rubéola durante a gestação, principalmente no terceiro trimestre, pode comprometer o desenvolvimento do feto e causar aborto, morte fetal e anomalias congênitas, que caracterizam a síndrome SRC.
- (C) Não existe tratamento antiviral efetivo. Os cuidados devem ser direcionados às malformações congênitas e deficiências observadas.
- (D) Os anticorpos maternos, da classe IgG, não podem ser transferidos passivamente ao feto através da placenta.
- (E) O caso de SRC será classificado como descartado quando cumprir a seguinte condição: títulos de IgM e IgG presentes em crianças menores de 12 meses de vida.

23**Quais são as principais características do líquido de um paciente com meningite por tuberculose?**

- (A) Aspecto límpido ou ligeiramente turvo, glicose diminuída, proteínas totais aumentadas.
- (B) Aspecto turvo, glicose aumentada e proteínas totais aumentadas.
- (C) Aspecto branco leitoso, glicose diminuída e ausência de proteínas totais.
- (D) Aspecto límpido ou ligeiramente turvo, glicose diminuída e ausência de proteínas totais.
- (E) Aspecto turvo, glicose diminuída e proteínas totais diminuídas.

24**Em relação aos princípios do tratamento da tuberculose, assinale a alternativa correta.**

- (A) Em todos os esquemas de tratamento, os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente e de uma única vez.
- (B) O tratamento da TB em PVHIV tem a duração de 10 meses, independentemente da fase de evolução da infecção viral.
- (C) O tratamento de todas as formas extrapulmonares tem a duração de 10 meses.
- (D) Uma vez iniciado o tratamento, ele pode ser interrompido sempre que o paciente apresentar efeitos colaterais leves.
- (E) A hospitalização é recomendada em todos os pacientes para iniciar o tratamento.

25**Para o diagnóstico de endocardite infecciosa, deve-se utilizar os critérios de Duke, que combinam critérios maiores e menores. Assinale a alternativa que apresenta quais são os critérios Maiores de Duke para o diagnóstico de endocardite infecciosa.**

- (A) Febre e 2 amostras de hemocultura positivas para agentes típicos de endocardite.
- (B) Aneurisma micótico e febre.
- (C) Massa intracardíaca móvel em valva e agentes típicos de endocardite em 2 amostras diferentes de hemocultura.
- (D) Febre e presença de infartos pulmonares sépticos.
- (E) Massa intracardíaca móvel em valva e lesões de Janeway.

26**Qual das seguintes doenças é manifestação de imunodeficiência avançada – doença definidora de AIDS?**

- (A) Neurotoxoplasmose.
- (B) Tuberculose pulmonar.
- (C) Angiomatose bacilar.
- (D) Periodontite aguda necrosante.
- (E) Leucoplasia pilosa oral.

27

Paciente jovem, sexo feminino, procurou atendimento na UBS com quadro de febre alta, exantema maculopapular, coriza e conjuntivite. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Rubéola.
- (B) Sarampo.
- (C) Febre maculosa.
- (D) Herpes simples.
- (E) Dengue.

28

Paciente, 34 anos, sexo masculino, procurou atendimento no PS com quadro de febre, icterícia e dor abdominal com início há 7 dias. Morava em uma cidade no interior do Paraná, porém relatou viagem recente ao Pará. Negou comorbidades. Durante investigação laboratorial, foi diagnosticado com malária por *P. falciparum*. Quais drogas devem ser utilizadas nesse caso?

- (A) Artemeter, lumefantrina e primaquina.
- (B) Artemeter e mefloquina.
- (C) Cloroquina e primaquina.
- (D) Mefloquina, primaquina e cloroquina.
- (E) Cloroquina e artemeter.

29

Qual doença que cursa com exantema NÃO é de notificação compulsória?

- (A) Sarampo.
- (B) Eritema infeccioso.
- (C) Rubéola.
- (D) Dengue.
- (E) Doença meningocócica.

30

Paciente masculino, 64 anos, em pós-operatório tardio de transplante hepático, procurou atendimento com quadro de cefaleia, vômitos e relatou episódios de confusão mental. Foi realizada TC de crânio que estava sem alterações e coleta de líquido com os seguintes achados: aumento de proteínas, redução da glicose e predomínio de linfócitos. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Glioblastoma.
- (B) Meningite bacteriana.
- (C) Tumor de hipófise.
- (D) Ventriculite.
- (E) Meningite fúngica.

31

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial causada por leptospiros patogênicas do gênero *Leptospira*. A infecção humana geralmente evolui de maneira assintomática ou com quadro leve e autolimitado. Entretanto estima-se que 10 a 15% podem evoluir para formas graves, sendo uma delas a síndrome de Weil. Quais são as características dessa síndrome?

- (A) Icterícia, insuficiência renal e febre.
- (B) Icterícia, insuficiência renal e diátese hemorrágica.
- (C) Dispneia, icterícia e colúria.
- (D) Febre, diátese hemorrágica e dispneia.
- (E) Febre, esplenomegalia e colúria.

32

Assinale a alternativa que apresenta um protozoário responsável por causar meningite em adultos.

- (A) *Cryptococcus neoformans*.
- (B) *Angyostrongylus cantonensis*.
- (C) *Taenia solium Cysticercus*.
- (D) *Aspergillus fumigatus*.
- (E) *Toxoplasma gondii*.

33

Paciente masculino, 26 anos, pedreiro, natural de Alagoas, procurou atendimento na UBS com quadro de dor abdominal, “inchaço na barriga” e episódios esporádicos de diarreia. Foi realizada biópsia hepática que evidenciou a presença de ovos do *S. mansoni*. Qual é a opção terapêutica para esse paciente?

- (A) Mebendazol.
- (B) Albendazol.
- (C) Praziquantel.
- (D) Ivermectina.
- (E) Tiabendazol.

34

São manifestações clínicas e laboratoriais de um caso de malária grave e complicada, EXCETO

- (A) anemia grave.
- (B) dor abdominal intensa.
- (C) qualquer tipo de sangramento.
- (D) alcalose metabólica.
- (E) redução do débito urinário.

35

A perda parcial a total das sobrancelhas (madarose) e também dos cílios associada à pele avermelhada, seca, infiltrada, cujos poros apresentam-se dilatados (aspecto de “casca de laranja”) e o surgimento de hansenomas são típicos de qual forma da hanseníase?

- (A) Hanseníase virchowiana (paucibacilar).
- (B) Hanseníase indeterminada (paucibacilar).
- (C) Hanseníase virchowiana (multibacilar).
- (D) Hanseníase tuberculoide (paucibacilar).
- (E) Hanseníase dimorfa (multibacilar).

36

Qual das seguintes alternativas apresenta critérios definidores de infecção do sítio cirúrgico (infecção do sítio de inserção) para cirurgias endovasculares ?

- (A) Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e cultura positiva da secreção da ferida operatória coletada no centro cirúrgico ou com swab.
- (B) Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta drenagem purulenta da incisão superficial.
- (C) Ocorre nos primeiros 90 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta fístula para pele com sangramento persistente.
- (D) Ocorre nos primeiros 180 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta drenagem purulenta da incisão superficial.
- (E) Ocorre nos primeiros 180 dias após a cirurgia e ocorre rompimento da prótese endovascular.

37

Em relação à profilaxia do tétano acidental, qual alternativa apresenta um paciente que NÃO precisa receber a vacina contra tétano?

- (A) Paciente com situação vacinal incerta ou com menos de 3 doses + ferimento com alto risco para tétano.
- (B) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 20 anos + ferimento com risco mínimo para tétano.
- (C) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos + ferimento com risco mínimo para tétano.
- (D) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais 10 anos + ferimento com risco alto para tétano.
- (E) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos + ferimento com risco alto para tétano.

38

Em relação à hanseníase, quando se deve suspeitar de reação hansênica tipo 2 (eritema nodoso hansênico)?

- (A) No surgimento de manchas ou “caroços” na pele, quentes, dolorosos e avermelhados, às vezes ulcerados, e febre.
- (B) Se os nervos periféricos ficarem mais dolorosos associado à “dor nas juntas”.
- (C) Na presença de anemia severa aguda e no surgimento abrupto de novas lesões de pele até 5 anos após a alta medicamentosa.
- (D) Se houver piora dos sinais neurológicos de perda de sensibilidade ou perda de função muscular e febre.
- (E) Na presença de febre, “dor nas juntas” e se houver surgimento abrupto de novas lesões de pele até 5 anos após a alta medicamentosa.

39

Paciente de 50 anos, sexo masculino e sem comorbidades, foi diagnosticado com toxoplasmose ocular. Qual é o melhor esquema terapêutico indicado para esse paciente?

- (A) Sulfametoxazol + trimetropina (800 mg de sulfa + 160 mg trimetoprima) por 2 semanas.
- (B) Espiramicina (3g/dia) por 2 semanas.
- (C) Clindamicina (600mg) + ácido fólico (10 a 20 mg/dia) por 4 semanas.
- (D) Sulfadiazina (4 a 6g/dia) + pirimetamina (50 mg/dia em dias alternados) por 4 a 6 semanas.
- (E) Sulfametoxazol + trimetropina (800 mg de sulfa + 160 mg trimetoprima) por 4 a 6 semanas.

40

Todos os contatos próximos de um caso de doença meningocócica, independentemente do estado vacinal, deverão receber a quimioprofilaxia. É importante observar o cartão de vacina. As crianças e adolescentes que não são vacinados devem receber a quimioprofilaxia e atualizar o cartão vacinal. Quais medicamentos podem ser usados para a quimioprofilaxia?

- (A) Ciprofloxacino, levofloxacino ou azitromicina.
- (B) Rifampicina, ceftriaxone ou ciprofloxacino.
- (C) Rifampicina, ceftriaxone ou azitromicina.
- (D) Ceftriaxone, meropenem ou ciprofloxacino.
- (E) Rifampicina, etambutol ou ciprofloxacino.

41

Em relação à leishmaniose, assinale a alternativa correta.

- (A) As leishmanioses são infecções virais causadas pelo gênero *Leishmania*.
- (B) A forma amastigota é a forma flagelada que se multiplica no intestino médio do vetor (mosquito).
- (C) A forma promastigota é a forma aflagelada, encontrada no interior dos macrófagos humanos e dos mamíferos reservatórios na natureza.
- (D) A doença leishmaniótica mucosa ocorre vários meses ou anos após o quadro cutâneo primário, resultado, portanto, de recidiva da enfermidade, principalmente quando esta for causada por *L. brasiliensis*.
- (E) Na forma cutânea da leishmaniose tegumentar, a lesão inicial ocorre no local da picada do inseto vetor, surgindo no mínimo 1 ano após a inoculação do parasita.

42

Qual dos seguintes medicamentos NÃO é uma opção de escolha no tratamento da histoplasmosse?

- (A) Anfoterecina B desoxicolato.
- (B) Sulfametoxazol- trimetoprima.
- (C) Itraconazol.
- (D) Azitromicina.
- (E) Fluconazol.

43**Em relação à toxoplasmose na gestação, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O diagnóstico de toxoplasmose pós-natal pode ser estabelecido pela existência de anticorpos IgM e IgA, sendo a detecção de IgA mais sensível.
- (B) Para gestantes com IgM não reagente e IgG reagente, o risco de desenvolver toxoplasmose congênita é muito alto.
- (C) Gestantes com IgM reagente e IgG não reagente significam possível infecção aguda.
- (D) Mães suscetíveis à infecção, ou seja IgM e IgG negativas, devem ser sistematicamente orientadas quanto à prevenção do contato com o protozoário.
- (E) Transmissão vertical cujas mães se infectaram durante o primeiro trimestre causam graves repercussões fetais.

44**Qual é o vetor responsável pela doença Tripanossomíase americana?**

- (A) Mosquito palha.
- (B) Aedes aegypti.
- (C) Bicho barbeiro.
- (D) Mosquito Anopheles.
- (E) Birigui.

45**Paciente de 64 anos, sexo masculino, agricultor, procurou atendimento na UBS com quadro de febre, dor pleural, dispneia e tosse produtiva. No exame físico, observou-se a presença de eritema nodoso e de algumas lesões exantemáticas. A imagem radiológica revelava adenomegalia hilar e infiltração pulmonar com derrame pleural. Qual é a principal hipótese diagnóstica?**

- (A) Coccidioomicose.
- (B) Pneumonia viral.
- (C) Asma.
- (D) Atelectasia.
- (E) Insuficiência cardíaca.

46**São sinais de alarme na dengue:**

- (A) dor abdominal intensa e contínua + hipotensão arterial.
- (B) desconforto respiratório + febre.
- (C) queda abrupta de plaquetas + artralgia.
- (D) melena + mialgia.
- (E) hematêmese + febre.

47**Qual é a primeira droga de escolha para o tratamento da manifestação linfocutânea da esporotricose?**

- (A) Fluconazol.
- (B) Itraconazol.
- (C) Azitromicina.
- (D) Anfotericina B.
- (E) Anfotericina lipossomal.

48

Com base na classificação dos casos confirmados de sarampo, de acordo com a fonte de infecção, assinale a alternativa que apresenta um caso secundário de sarampo.

- (A) Caso novo, a partir do contato com o caso índice. A confirmação deve ser feita por laboratório ou por vínculo epidemiológico.
- (B) Primeiro caso ocorrido entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados, encontrando-se a fonte de infecção no território nacional. A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação viral realizada no primeiro contato com o paciente.
- (C) É o caso que introduz o surto no grupo e não necessariamente o primeiro diagnosticado, mas cumpre as condições de fonte de origem do surto. Não basta que seja o primeiro caso, cronologicamente, porque todos os casos podem ter se originado da mesma fonte comum.
- (D) Caso cuja infecção ocorreu fora do país durante os 7 a 21 dias prévios ao surgimento do exantema, de acordo com a análise dos dados epidemiológicos ou virológicos. A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação viral realizada no primeiro contato com o paciente.
- (E) Primeiro caso identificado após a confirmação da cadeia de transmissão sustentada (o vírus deve circular no país por mais de 12 meses, em uma mesma cadeia de transmissão).

49

Em relação à criptococose que acomete o sistema nervoso central, qual é o tempo de tratamento da fase de manutenção em casos de pacientes não HIV?

- (A) 1 a 3 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 6 a 12 meses.
- (D) 18 meses.
- (E) 24 meses.

50

A vacina tríplice viral é contraindicada para, EXCETO

- (A) gestantes.
- (B) crianças menores de 6 meses.
- (C) pessoas com sintomas de sarampo.
- (D) pessoas com sinais de sarampo.
- (E) pessoas com sintomas de varicela.

51

Em relação ao Papilomavírus Humano (HPV), quais são os sorotipos com maior poder de oncogenicidade?

- (A) 11, 12, 16 e 18.
- (B) 31, 33, 36 e 56.
- (C) 11, 16, 18 e 31.
- (D) 16, 18, 24 e 45.
- (E) 16, 18, 31 e 33.

52

Paciente masculino, 24 anos, realizou exames laboratoriais pré-admissionais de hepatite B e levou ao médico os seguintes resultados: HbsAg não reagente, Anti Hbs reagente e Anti HBc total reagente. Qual deve ser a interpretação correta do médico?

- (A) Fase aguda da doença.
- (B) Incubação.
- (C) Infecção passada/cura.
- (D) Hepatite B crônica.
- (E) Portador assintomático.

53

A terapia inicial para tratamento do HIV deve sempre incluir combinações de três ARV, sendo dois ITRN/ITRNt associados a uma outra classe de antirretrovirais (ITRNN, IP/r ou INI). O esquema inicial preferencial no Brasil é lamivudina, tenofovir e dolutegravir. Em casos de intolerância ou contraindicação ao dolutegravir, qual droga deve ser usada?

- (A) Ritonavir.
- (B) Abacavir.
- (C) Zidovudina.
- (D) Efavirenz.
- (E) Raltegravir.

54

Em qual doença a seguir deve ser realizada a notificação compulsória imediata (até 24 horas) para o ministério da saúde?

- (A) Esquistossomose.
- (B) Botulismo.
- (C) Hanseníase.
- (D) Hepatites virais.
- (E) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.

55

A presença de pontos esbranquiçados sobre base eritematosa na face interna das bochechas, próximos aos dentes molares inferiores, é patognomônica de qual doença exantemática?

- (A) Rubéola.
- (B) Sarampo.
- (C) Varicela zoster.
- (D) Eritema infeccioso.
- (E) Mononucleose infecciosa.

56

Em relação à hepatite B, assinale a alternativa correta.

- (A) HBsAg: sua presença por mais de 1 mês é indicativa de hepatite crônica.
- (B) Anti-HBs: é o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade. Está presente isoladamente em pessoas vacinadas.
- (C) HBV-DNA (quantitativo): surge após o desaparecimento do HbeAg e indica o fim da fase replicativa.
- (D) Anti-HBc IgG: marcador de infecção recente, que está no soro até seis meses após a infecção.
- (E) Anti-HBc IgG: indicador de replicação viral. Sua positividade indica alta infectividade.

57

Dentre as seguintes alternativas, qual é a melhor droga de escolha para tratamento da Doença de Lyme?

- (A) Cefalexina.
- (B) Meropenem.
- (C) Azitromicina.
- (D) Doxiciclina.
- (E) Ciprofloxacino.

58

Paciente do sexo masculino, 27 anos, tem diagnóstico de HIV, porém sem tratamento há mais de 5 anos. Procurou atendimento médico com queixa de escotomas e redução da acuidade visual no olho esquerdo. Após consulta com oftalmologista, foi diagnosticado com retinite por citomegalovírus. Qual é a melhor opção terapêutica?

- (A) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de aciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.
- (B) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de aciclovir 20 mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.
- (C) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 7 dias.
- (D) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 30mg/kg a cada doze horas, por 7 dias.
- (E) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.

59**Em relação à toxoplasmose gestacional e congênita, assinale a alternativa correta.**

- (A) O IgM ou o IgA maternos atravessam a barreira transplacentária.
- (B) O IgG materno atravessa a barreira transplacentária.
- (C) O teste de avididade de IgG é importante para determinar a época da infecção pelo toxoplasma na gestante, visto que alta avididade indica que os anticorpos foram produzidos há menos de 12-16 semanas.
- (D) A presença de baixa avididade de IgG, associada ao resultado positivo de IgM e IgG, indica uma infecção antiga.
- (E) Em crianças que receberam tratamento da toxoplasmose, a soronegativação só deve ser considerada definitiva após dois anos da suspensão das drogas antiparasitárias.

60**Paciente, 65 anos, sexo feminino, agricultora, procurou atendimento médico com queixa de lesões tipo mácula, de coloração avermelhada na perna, associadas à febre e mal-estar. Relata que notou presença de carrapatos em algumas roupas de cama. Com base no exposto, qual é a principal hipótese diagnóstica?**

- (A) Varicela.
- (B) Herpes zoster.
- (C) Doença de Lyme.
- (D) Rubéola.
- (E) Sarampo.

Realização



instituto aocp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T4439057N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (INFECTOLOGIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

04

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico www.institutoaacp.org.br

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:
<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.
 Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

2

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

3

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

4

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

5

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

6

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

7

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

8

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“limítrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

9

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

10

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

Matemática

11

Sendo $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

12

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, __).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

13

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

14

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

15

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

Informática

16

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CHARACTERUNICODE
- (E) CONCATENAR

17

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

18

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

19

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

20

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

Conhecimentos Específicos

21

Em relação à Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de anticorpos IgM específicos para rubéola, no sangue do recém-nascido, é evidência de infecção congênita, uma vez que os anticorpos IgM maternos ultrapassam a barreira placentária.
- (B) A infecção pelo vírus da rubéola durante a gestação, principalmente no terceiro trimestre, pode comprometer o desenvolvimento do feto e causar aborto, morte fetal e anomalias congênitas, que caracterizam a síndrome SRC.
- (C) Não existe tratamento antiviral efetivo. Os cuidados devem ser direcionados às malformações congênitas e deficiências observadas.
- (D) Os anticorpos maternos, da classe IgG, não podem ser transferidos passivamente ao feto através da placenta.
- (E) O caso de SRC será classificado como descartado quando cumprir a seguinte condição: títulos de IgM e IgG presentes em crianças menores de 12 meses de vida.

22

Quais são as principais características do líquido de um paciente com meningite por tuberculose?

- (A) Aspecto límpido ou ligeiramente turvo, glicose diminuída, proteínas totais aumentadas.
- (B) Aspecto turvo, glicose aumentada e proteínas totais aumentadas.
- (C) Aspecto branco leitoso, glicose diminuída e ausência de proteínas totais.
- (D) Aspecto límpido ou ligeiramente turvo, glicose diminuída e ausência de proteínas totais.
- (E) Aspecto turvo, glicose diminuída e proteínas totais diminuídas.

23

Em relação aos princípios do tratamento da tuberculose, assinale a alternativa correta.

- (A) Em todos os esquemas de tratamento, os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente e de uma única vez.
- (B) O tratamento da TB em PVHIV tem a duração de 10 meses, independentemente da fase de evolução da infecção viral.
- (C) O tratamento de todas as formas extrapulmonares tem a duração de 10 meses.
- (D) Uma vez iniciado o tratamento, ele pode ser interrompido sempre que o paciente apresentar efeitos colaterais leves.
- (E) A hospitalização é recomendada em todos os pacientes para iniciar o tratamento.

24

Para o diagnóstico de endocardite infecciosa, deve-se utilizar os critérios de Duke, que combinam critérios maiores e menores. Assinale a alternativa que apresenta quais são os critérios Maiores de Duke para o diagnóstico de endocardite infecciosa.

- (A) Febre e 2 amostras de hemocultura positivas para agentes típicos de endocardite.
- (B) Aneurisma micótico e febre.
- (C) Massa intracardíaca móvel em valva e agentes típicos de endocardite em 2 amostras diferentes de hemocultura.
- (D) Febre e presença de infartos pulmonares sépticos.
- (E) Massa intracardíaca móvel em valva e lesões de Janeway.

25

Qual das seguintes doenças é manifestação de imunodeficiência avançada – doença definidora de AIDS?

- (A) Neurotoxoplasmose.
- (B) Tuberculose pulmonar.
- (C) Angiomatose bacilar.
- (D) Periodontite aguda necrosante.
- (E) Leucoplasia pilosa oral.

26

Paciente jovem, sexo feminino, procurou atendimento na UBS com quadro de febre alta, exantema maculopapular, coriza e conjuntivite. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Rubéola.
- (B) Sarampo.
- (C) Febre maculosa.
- (D) Herpes simples.
- (E) Dengue.

27

Paciente, 34 anos, sexo masculino, procurou atendimento no PS com quadro de febre, icterícia e dor abdominal com início há 7 dias. Morava em uma cidade no interior do Paraná, porém relatou viagem recente ao Pará. Negou comorbidades. Durante investigação laboratorial, foi diagnosticado com malária por *P. falciparum*. Quais drogas devem ser utilizadas nesse caso?

- (A) Artemeter, lumefantrina e primaquina.
- (B) Artemeter e mefloquina.
- (C) Cloroquina e primaquina.
- (D) Mefloquina, primaquina e cloroquina.
- (E) Cloroquina e artemeter.

28

Qual doença que cursa com exantema NÃO é de notificação compulsória?

- (A) Sarampo.
- (B) Eritema infeccioso.
- (C) Rubéola.
- (D) Dengue.
- (E) Doença meningocócica.

29

Paciente masculino, 64 anos, em pós-operatório tardio de transplante hepático, procurou atendimento com quadro de cefaleia, vômitos e relatou episódios de confusão mental. Foi realizada TC de crânio que estava sem alterações e coleta de líquido com os seguintes achados: aumento de proteínas, redução da glicose e predomínio de linfócitos. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Glioblastoma.
- (B) Meningite bacteriana.
- (C) Tumor de hipófise.
- (D) Ventriculite.
- (E) Meningite fúngica.

30

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial causada por leptospiros patogênicas do gênero *Leptospira*. A infecção humana geralmente evolui de maneira assintomática ou com quadro leve e autolimitado. Entretanto estima-se que 10 a 15% podem evoluir para formas graves, sendo uma delas a síndrome de Weil. Quais são as características dessa síndrome?

- (A) Icterícia, insuficiência renal e febre.
- (B) Icterícia, insuficiência renal e diátese hemorrágica.
- (C) Dispneia, icterícia e colúria.
- (D) Febre, diátese hemorrágica e dispneia.
- (E) Febre, esplenomegalia e colúria.

31

Assinale a alternativa que apresenta um protozoário responsável por causar meningite em adultos.

- (A) *Cryptococcus neoformans*.
- (B) *Angyostrongylus cantonensis*.
- (C) *Taenia solium* *Cysticercus*.
- (D) *Aspergillus fumigatus*.
- (E) *Toxoplasma gondii*.

32

Paciente masculino, 26 anos, pedreiro, natural de Alagoas, procurou atendimento na UBS com quadro de dor abdominal, “inchaço na barriga” e episódios esporádicos de diarreia. Foi realizada biópsia hepática que evidenciou a presença de ovos do *S. mansoni*. Qual é a opção terapêutica para esse paciente?

- (A) Mebendazol.
- (B) Albendazol.
- (C) Praziquantel.
- (D) Ivermectina.
- (E) Tiabendazol.

33

São manifestações clínicas e laboratoriais de um caso de malária grave e complicada, EXCETO

- (A) anemia grave.
- (B) dor abdominal intensa.
- (C) qualquer tipo de sangramento.
- (D) alcalose metabólica.
- (E) redução do débito urinário.

34

A perda parcial a total das sobrancelhas (madarose) e também dos cílios associada à pele avermelhada, seca, infiltrada, cujos poros apresentam-se dilatados (aspecto de “casca de laranja”) e o surgimento de hansenomas são típicos de qual forma da hanseníase?

- (A) Hanseníase virchowiana (paucibacilar).
- (B) Hanseníase indeterminada (paucibacilar).
- (C) Hanseníase virchowiana (multibacilar).
- (D) Hanseníase tuberculoide (paucibacilar).
- (E) Hanseníase dimorfa (multibacilar).

35

Qual das seguintes alternativas apresenta critérios definidores de infecção do sítio cirúrgico (infecção do sítio de inserção) para cirurgias endovasculares ?

- (A) Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e cultura positiva da secreção da ferida operatória coletada no centro cirúrgico ou com swab.
- (B) Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta drenagem purulenta da incisão superficial.
- (C) Ocorre nos primeiros 90 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta fístula para pele com sangramento persistente.
- (D) Ocorre nos primeiros 180 dias após a cirurgia, envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular e apresenta drenagem purulenta da incisão superficial.
- (E) Ocorre nos primeiros 180 dias após a cirurgia e ocorre rompimento da prótese endovascular.

36

Em relação à profilaxia do tétano acidental, qual alternativa apresenta um paciente que NÃO precisa receber a vacina contra tétano?

- (A) Paciente com situação vacinal incerta ou com menos de 3 doses + ferimento com alto risco para tétano.
- (B) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 20 anos + ferimento com risco mínimo para tétano.
- (C) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos + ferimento com risco mínimo para tétano.
- (D) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais 10 anos + ferimento com risco alto para tétano.
- (E) Paciente com 3 doses ou mais da vacina, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos + ferimento com risco alto para tétano.

37

Em relação à hanseníase, quando se deve suspeitar de reação hansênica tipo 2 (eritema nodoso hansênico)?

- (A) No surgimento de manchas ou “caroços” na pele, quentes, dolorosos e avermelhados, às vezes ulcerados, e febre.
- (B) Se os nervos periféricos ficarem mais dolorosos associado à “dor nas juntas”.
- (C) Na presença de anemia severa aguda e no surgimento abrupto de novas lesões de pele até 5 anos após a alta medicamentosa.
- (D) Se houver piora dos sinais neurológicos de perda de sensibilidade ou perda de função muscular e febre.
- (E) Na presença de febre, “dor nas juntas” e se houver surgimento abrupto de novas lesões de pele até 5 anos após a alta medicamentosa.

38

Paciente de 50 anos, sexo masculino e sem comorbidades, foi diagnosticado com toxoplasmose ocular. Qual é o melhor esquema terapêutico indicado para esse paciente?

- (A) Sulfametoxazol + trimetropina (800 mg de sulfa + 160 mg trimetoprima) por 2 semanas.
- (B) Espiramicina (3g/dia) por 2 semanas.
- (C) Clindamicina (600mg) + ácido fólico (10 a 20 mg/dia) por 4 semanas.
- (D) Sulfadiazina (4 a 6g/dia) + pirimetamina (50 mg/dia em dias alternados) por 4 a 6 semanas.
- (E) Sulfametoxazol + trimetropina (800 mg de sulfa + 160 mg trimetoprima) por 4 a 6 semanas.

39

Todos os contatos próximos de um caso de doença meningocócica, independentemente do estado vacinal, deverão receber a quimioprofilaxia. É importante observar o cartão de vacina. As crianças e adolescentes que não são vacinados devem receber a quimioprofilaxia e atualizar o cartão vacinal. Quais medicamentos podem ser usados para a quimioprofilaxia?

- (A) Ciprofloxacino, levofloxacino ou azitromicina.
- (B) Rifampicina, ceftriaxone ou ciprofloxacino.
- (C) Rifampicina, ceftriaxone ou azitromicina.
- (D) Ceftriaxone, meropenem ou ciprofloxacino.
- (E) Rifampicina, etambutol ou ciprofloxacino.

40

Em relação à leishmaniose, assinale a alternativa correta.

- (A) As leishmanioses são infecções virais causadas pelo gênero *Leishmania*.
- (B) A forma amastigota é a forma flagelada que se multiplica no intestino médio do vetor (mosquito).
- (C) A forma promastigota é a forma aflagelada, encontrada no interior dos macrófagos humanos e dos mamíferos reservatórios na natureza.
- (D) A doença leishmaniótica mucosa ocorre vários meses ou anos após o quadro cutâneo primário, resultado, portanto, de recidiva da enfermidade, principalmente quando esta for causada por *L. brasiliensis*.
- (E) Na forma cutânea da leishmaniose tegumentar, a lesão inicial ocorre no local da picada do inseto vetor, surgindo no mínimo 1 ano após a inoculação do parasita.

41

Qual dos seguintes medicamentos NÃO é uma opção de escolha no tratamento da histoplasmose?

- (A) Anfotericina B desoxicolato.
- (B) Sulfametoxazol- trimetoprima.
- (C) Itraconazol.
- (D) Azitromicina.
- (E) Fluconazol.

42

Em relação à toxoplasmose na gestação, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O diagnóstico de toxoplasmose pós-natal pode ser estabelecido pela existência de anticorpos IgM e IgA, sendo a detecção de IgA mais sensível.
- (B) Para gestantes com IgM não reagente e IgG reagente, o risco de desenvolver toxoplasmose congênita é muito alto.
- (C) Gestantes com IgM reagente e IgG não reagente significam possível infecção aguda.
- (D) Mães suscetíveis à infecção, ou seja IgM e IgG negativas, devem ser sistematicamente orientadas quanto à prevenção do contato com o protozoário.
- (E) Transmissão vertical cujas mães se infectaram durante o primeiro trimestre causam graves repercussões fetais.

43

Qual é o vetor responsável pela doença Tripanossomíase americana?

- (A) Mosquito palha.
- (B) *Aedes aegypti*.
- (C) Bicho barbeiro.
- (D) Mosquito Anopheles.
- (E) Birigui.

44

Paciente de 64 anos, sexo masculino, agricultor, procurou atendimento na UBS com quadro de febre, dor pleural, dispneia e tosse produtiva. No exame físico, observou-se a presença de eritema nodoso e de algumas lesões exantemáticas. A imagem radiológica revelava adenomegalia hilar e infiltração pulmonar com derrame pleural. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Coccidioomicose.
- (B) Pneumonia viral.
- (C) Asma.
- (D) Atelectasia.
- (E) Insuficiência cardíaca.

45**São sinais de alarme na dengue:**

- (A) dor abdominal intensa e contínua + hipotensão arterial.
- (B) desconforto respiratório + febre.
- (C) queda abrupta de plaquetas + artralgia.
- (D) melena + mialgia.
- (E) hematêmese + febre.

46**Qual é a primeira droga de escolha para o tratamento da manifestação linfocutânea da esporotricose?**

- (A) Fluconazol.
- (B) Itraconazol.
- (C) Azitromicina.
- (D) Anfoterecina B.
- (E) Anfoterecina lipossomal.

47**Com base na classificação dos casos confirmados de sarampo, de acordo com a fonte de infecção, assinale a alternativa que apresenta um caso secundário de sarampo.**

- (A) Caso novo, a partir do contato com o caso índice. A confirmação deve ser feita por laboratório ou por vínculo epidemiológico.
- (B) Primeiro caso ocorrido entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados, encontrando-se a fonte de infecção no território nacional. A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação viral realizada no primeiro contato com o paciente.
- (C) É o caso que introduz o surto no grupo e não necessariamente o primeiro diagnosticado, mas cumpre as condições de fonte de origem do surto. Não basta que seja o primeiro caso, cronologicamente, porque todos os casos podem ter se originado da mesma fonte comum.
- (D) Caso cuja infecção ocorreu fora do país durante os 7 a 21 dias prévios ao surgimento do exantema, de acordo com a análise dos dados epidemiológicos ou virológicos. A confirmação deve ser laboratorial e a coleta de espécimes clínicos para a identificação viral realizada no primeiro contato com o paciente.
- (E) Primeiro caso identificado após a confirmação da cadeia de transmissão sustentada (o vírus deve circular no país por mais de 12 meses, em uma mesma cadeia de transmissão).

48**Em relação à criptococose que acomete o sistema nervoso central, qual é o tempo de tratamento da fase de manutenção em casos de pacientes não HIV?**

- (A) 1 a 3 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 6 a 12 meses.
- (D) 18 meses.
- (E) 24 meses.

49

A vacina tríplice viral é contraindicada para, EXCETO

- (A) gestantes.
- (B) crianças menores de 6 meses.
- (C) pessoas com sintomas de sarampo.
- (D) pessoas com sinais de sarampo.
- (E) pessoas com sintomas de varicela.

50

Em relação ao ciclo biológico da esquistossomose, qual é o nome da forma infectante para o homem?

- (A) Miracídio.
- (B) Cercárias.
- (C) Trematódeos.
- (D) Oocisto.
- (E) Esquistossômulos.

51

Paciente masculino, 24 anos, realizou exames laboratoriais pré-admissionais de hepatite B e levou ao médico os seguintes resultados: HbsAg não reagente, Anti Hbs reagente e Anti HBc total reagente. Qual deve ser a interpretação correta do médico?

- (A) Fase aguda da doença.
- (B) Incubação.
- (C) Infecção passada/cura.
- (D) Hepatite B crônica.
- (E) Portador assintomático.

52

A terapia inicial para tratamento do HIV deve sempre incluir combinações de três ARV, sendo dois ITRN/ITRNT associados a uma outra classe de antirretrovirais (ITRNN, IP/r ou INI). O esquema inicial preferencial no Brasil é lamivudina, tenofovir e dolutegravir. Em casos de intolerância ou contraindicação ao dolutegravir, qual droga deve ser usada?

- (A) Ritonavir.
- (B) Abacavir.
- (C) Zidovudina.
- (D) Efavirenz.
- (E) Raltegravir.

53

Em qual doença a seguir deve ser realizada a notificação compulsória imediata (até 24 horas) para o ministério da saúde?

- (A) Esquistossomose.
- (B) Botulismo.
- (C) Hanseníase.
- (D) Hepatites virais.
- (E) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.

54

A presença de pontos esbranquiçados sobre base eritematosa na face interna das bochechas, próximos aos dentes molares inferiores, é patognomônica de qual doença exantemática?

- (A) Rubéola.
- (B) Sarampo.
- (C) Varicela zoster.
- (D) Eritema infeccioso.
- (E) Mononucleose infecciosa.

55

Em relação à hepatite B, assinale a alternativa correta.

- (A) HBsAg: sua presença por mais de 1 mês é indicativa de hepatite crônica.
- (B) Anti-HBs: é o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade. Está presente isoladamente em pessoas vacinadas.
- (C) HBV-DNA (quantitativo): surge após o desaparecimento do HbeAg e indica o fim da fase replicativa.
- (D) Anti-HBc IgG: marcador de infecção recente, que está no soro até seis meses após a infecção.
- (E) Anti-HBc IgG: indicador de replicação viral. Sua positividade indica alta infectividade.

56

Dentre as seguintes alternativas, qual é a melhor droga de escolha para tratamento da Doença de Lyme?

- (A) Cefalexina.
- (B) Meropenem.
- (C) Azitromicina.
- (D) Doxiciclina.
- (E) Ciprofloxacino.

57

Paciente do sexo masculino, 27 anos, tem diagnóstico de HIV, porém sem tratamento há mais de 5 anos. Procurou atendimento médico com queixa de escotomas e redução da acuidade visual no olho esquerdo. Após consulta com oftalmologista, foi diagnosticado com retinite por citomegalovírus. Qual é a melhor opção terapêutica?

- (A) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de aciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.
- (B) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de aciclovir 20 mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.
- (C) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 7 dias.
- (D) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 30mg/kg a cada doze horas, por 7 dias.
- (E) O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 5mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.

58

Em relação à toxoplasmose gestacional e congênita, assinale a alternativa correta.

- (A) O IgM ou o IgA maternos atravessam a barreira transplacentária.
- (B) O IgG materno atravessa a barreira transplacentária.
- (C) O teste de avidéz de IgG é importante para determinar a época da infecção pelo toxoplasma na gestante, visto que alta avidéz indica que os anticorpos foram produzidos há menos de 12-16 semanas.
- (D) A presença de baixa avidéz de IgG, associada ao resultado positivo de IgM e IgG, indica uma infecção antiga.
- (E) Em crianças que receberam tratamento da toxoplasmose, a soronegativação só deve ser considerada definitiva após dois anos da suspensão das drogas antiparasitárias.

59

Paciente, 65 anos, sexo feminino, agricultora, procurou atendimento médico com queixa de lesões tipo mácula, de coloração avermelhada na perna, associadas à febre e mal-estar. Relata que notou presença de carrapatos em algumas roupas de cama. Com base no exposto, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Varicela.
- (B) Herpes zoster.
- (C) Doença de Lyme.
- (D) Rubéola.
- (E) Sarampo.

60

Em relação ao Papilomavírus Humano (HPV), quais são os sorotipos com maior poder de oncogenicidade?

- (A) 11, 12, 16 e 18.
- (B) 31, 33, 36 e 56.
- (C) 11, 16, 18 e 31.
- (D) 16, 18, 24 e 45.
- (E) 16, 18, 31 e 33.

Realização



instituto aacp