



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T1443061N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (OBSTETRÍCIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

01

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-dagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

2

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

3

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

4

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**”.
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

5

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em interações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em interações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

6

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

7

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

8

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

9

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

10

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

Matemática

11

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{15}{4}$

(C) $\frac{1}{15}$

(D) $\frac{4}{5}$

(E) $\frac{4}{15}$

12

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

13

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

14

Sendo $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

15

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

Informática

16

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

17

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

18

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

19

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

20

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

Conhecimentos Específicos


21

A drenagem linfática de ovários, tubas uterinas e parte superior do corpo uterino é realizada para qual grupo de linfonodos?

- (A) Aórtico/para-aórtico.
- (B) Inguinal profundo.
- (C) Inguinal superficial.
- (D) Obturatório.
- (E) Para-uterino.

22

A figura a seguir representa uma malformação do sistema geniturinário classificada como



- (A) útero bicorno.
- (B) útero didelfo.
- (C) útero rudimentar.
- (D) útero septado.
- (E) útero unicorno.

23

A formação médica cada vez mais especializada e a disponibilidade da tecnologia que cada vez mais substitui os achados clínicos podem influenciar a construção da relação médico-paciente. Assinale a alternativa que é considerada como fator negativo nessa relação.

- (A) A assistência humanizada, considerando o impacto psíquico da doença.
- (B) Chamar pelo nome e ser centrada no problema de saúde.
- (C) A conduta baseada na experiência pessoal.
- (D) A empatia e a afetividade médica.
- (E) A inteligência emocional do médico para lidar com cada paciente em específico.

24

Uma adolescente de 13 anos vai à consulta médica na UBS, junto com parceiro de 15 anos, relatando início da atividade sexual com dúvidas sobre métodos de anticoncepção. Ela refere uma relação consensual com consentimento familiar de ambos. Nesse caso,

- (A) a adolescente, desde que identificada como capaz de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios, tem o direito de ser atendida sem a presença dos pais ou responsáveis.
- (B) o médico, ao tomar conhecimento de que a paciente tem menos de 14 anos e tem vida sexual ativa, tem obrigação de protegê-la e não pode guardar silêncio em nome do sigilo médico.
- (C) o médico deve reconhecer a adolescente como indivíduo progressivamente capaz e atendê-la de forma diferenciada.
- (D) o médico deve respeitar a individualidade de cada adolescente, mantendo postura de acolhimento, centrada em valores de saúde e bem-estar do jovem.
- (E) os pais ou responsáveis somente serão informados sobre o conteúdo das consultas, nas questões relacionadas à sexualidade e prescrição de métodos contraceptivos, com o expresso consentimento da adolescente.

25

Nas áreas não endêmicas, os esquemas de vacinação direcionados para mulheres com 60 anos ou mais incluem como recomendação (pacientes sem doses prévias)

- (A) dengue.
- (B) febre amarela.
- (C) herpes-zóster.
- (D) HPV.
- (E) meningocócica B.

26

Uma paciente de 43 anos vai à consulta em ambulatório especializado em patologia genital do trato inferior. Durante exame colposcópico, foram observados achados anormais. Dentre as seguintes alternativas, assinale aquela que indica um achado com suspeita de invasão.

- (A) Epitélio acetobranco denso.
- (B) Mosaico fino.
- (C) Mosaico grosseiro.
- (D) Pontilhado fino.
- (E) Vasos atípicos.

27

O tratamento das cervicites deve estar voltado preferencialmente para o patógeno envolvido no processo. No caso da *Chlamydia trachomatis*, assinale a alternativa que apresenta uma medicação efetiva para o tratamento recomendado.

- (A) Amoxicilina 500 mg, VO, de 8 em 8 horas, por sete dias.
- (B) Ampicilina 3,5 g, em dose única.
- (C) Ciprofloxacino, 500 mg em dose única.
- (D) Eritromicina, 500 mg VO, de 6 em 6 horas, por sete dias.
- (E) Levofloxacino, 500 mg por dia, por sete dias.

28

O câncer de colo do útero é a quarta neoplasia maligna mais frequente em mulheres. É uma doença potencialmente evitável, seja com a vacinação em idade precoce contra HPVs de alto risco oncogênico, seja com os programas de rastreamento. Segundo as Diretrizes Brasileiras, assinale a alternativa que apresenta o exame de escolha para o rastreamento do câncer do colo do útero.

- (A) Biópsia de fragmento.
- (B) Colpocitologia.
- (C) Colposcopia.
- (D) Detecção e genotipagem de HPV.
- (E) Excisão da zona de transformação com alça.


29

Atualmente qual é o patógeno mais comumente encontrado como agente etiológico da doença inflamatória pélvica?

- (A) *Chlamydia trachomatis*.
- (B) *Mycoplasma hominis*.
- (C) *Mycoplasma genitalium*.
- (D) *Ureaplasma urealyticum*.
- (E) *Neisseria gonorrhoeae*.

30

Uma paciente de 82 anos, hipertensa, G6N6, sem outras comorbidades, apresenta a distopia da figura a seguir. Ela relata ser viúva e sem desejo de relação sexual posterior. Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a melhor abordagem cirúrgica.



- (A) Colpoplastia anterior.
- (B) Colpoplastia posterior.
- (C) Colpocleise.
- (D) Cirurgia de Burch.
- (E) Sling de uretra média.

31

Em meninas com caracteres sexuais secundários presentes, a ausência da primeira menstruação espontânea deve ser investigada quando a menarca não ocorreu aos

- (A) 10 anos.
- (B) 11 anos.
- (C) 12 anos.
- (D) 13 anos.
- (E) 15 anos.

32

Assinale a alternativa que apresenta uma medicação que NÃO tem relação com disfunções sexuais.

- (A) Anticoncepcionais hormonais.
- (B) Benzodiazepínicos.
- (C) Betabloqueadores.
- (D) Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (E) Inibidores seletivos da recaptção da serotonina.

33

Segundo a classificação para a hiperplasia endometrial, aquela com maior taxa de transformação maligna é a hiperplasia

- (A) simples sem atipia.
- (B) simples com atipia.
- (C) complexa sem atipia.
- (D) complexa com atipia.
- (E) glandular com dilatação cística.

34

Uma mamografia com laudo mostrando “necessária avaliação complementar dos achados, por outro método de imagem ou por incidências especiais na mamografia” é classificada como BI-RADS® (Breast Image Reporting and Data System)

- (A) zero.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

35

É uma causa NÃO estrutural do sangramento uterino anormal

- (A) pólipos.
- (B) malignidade.
- (C) leiomioma.
- (D) iatrogenia.
- (E) adenomiose.

36

A Terapêutica Hormonal (TH) da menopausa tem sua associação com risco de desenvolver alguns cânceres. Entre os cânceres, o que tem seguramente uma clara associação de aumento é o câncer

- (A) de colo do útero.
- (B) de cólon.
- (C) de endométrio.
- (D) gástrico.
- (E) de mama.

37

A primeira opção terapêutica diante de um caso de dismenorrea em mulher adulta jovem deve ser a utilização de

- (A) agonistas do hormônio liberador de gonadotrofina.
- (B) anticoncepcionais hormonais combinados.
- (C) danazol.
- (D) implante de etonogestrel.
- (E) implante de levonorgestrel.

38

Incluída no grupo dos achados vulvo/colposcópicos anormais, a adenose vaginal caracteriza-se por

- (A) epitélio pavimentoso na espessura da parede vaginal.
- (B) foco de tecido muscular liso.
- (C) lesão epitelial de células endometriais.
- (D) resíduos embrionários dos ductos mesonéfricos.
- (E) tecido glandular ectópico na espessura da parede vaginal.

39

Uma paciente recebe indicação de histerectomia, não havendo contra-indicação em relação à via cirúrgica. Nesse caso, a via que apresenta estatisticamente menor tempo de internação hospitalar, recuperação pós-operatória mais rápida e menor morbidade febril é a via

- (A) videolaparoscópica.
- (B) vaginal assistida por videolaparoscopia.
- (C) vaginal.
- (D) robótica.
- (E) abdominal.

40

Assinale a alternativa que corresponde ao tratamento de primeira linha terapêutica da incontinência urinária.

- (A) Anticolinérgica.
- (B) Comportamental e fisioterapia.
- (C) Estrogênios tópicos.
- (D) Neuromodulação sacral.
- (E) Toxina botulínica.

41

Uma paciente de 62 anos, menopausada, com vida sexual ativa, apresenta sensação de bola na vagina. O exame ginecológico mostra prolapso uterino total com cistocele e retocele acentuadas. A paciente não tem comorbidades que contraindiquem cirurgia. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais adequado nesse caso.

- (A) Colpoplastia associada à tela de uretra média.
- (B) Histerectomia associada à colpocleise.
- (C) Histerectomia associada à correção dos compartimentos anterior e posterior.
- (D) Inserção de pessário vaginal e fisioterapia pélvica.
- (E) Mudança de estilo de vida e fisioterapia pélvica.

42

Nem sempre a mulher está aguardando a confirmação da gravidez como um motivo de comemoração, pois, em algumas situações, ela não desejaria estar grávida. Em caso de teste de gravidez positivo e que a mulher não deseja a gravidez, é dever do médico

- (A) ofertar medicação para interrupção da gravidez.
- (B) espaçar as consultas de pré-natal para evitar a experiência negativa do acompanhamento.
- (C) afastar, na presença de conflito familiar, o acompanhante do pré-natal.
- (D) orientar sobre possibilidades de adoção, caso ela opte pela continuidade da gestação e não haja desejo de permanecer com a criança.
- (E) informar que a gestante poderá solicitar a interrupção conforme legislação, mas que precisará relatar que houve violência sexual.

43

Gestante, G3N2, 28 semanas, chega ao pronto atendimento após consulta de rotina de pré-natal com pressão arterial aferida de 150 x 90 mmHg, assintomática. Paciente não fazia uso de medicações prévias e os níveis pressóricos durante o período gestacional eram normais. Após estabilização do quadro clínico, a paciente recebe alta com medicamento anti-hipertensivo para uso contínuo. Dessas medicações, assinale aquela que é contraindicada como anti-hipertensivo na gestação.

- (A) Vasodilatador periférico.
- (B) Bloqueador de canais de cálcio.
- (C) Diuréticos tiazídicos.
- (D) Simpatolíticos de ação central.
- (E) Inibidores diretos da renina.

44

Qual das alternativas a seguir corresponde a um teste de tolerância à glicose (75 g com medidas de jejum/1h/2h após) que confirma um diagnóstico de diabetes mellitus gestacional em situação de viabilidade financeira e disponibilidade técnica total?

- (A) 89/176/135.
- (B) 89/176/144.
- (C) 89/178/150.
- (D) 91/178/144.
- (E) 91/183/157.


45

Na UBS, uma paciente retorna após diagnóstico de mola hidatiforme e tratamento hospitalar com esvaziamento uterino. Apresenta exames subsequentes com elevação seriada de beta-HCG. A conduta adequada nesse momento é

- (A) encaminhar para o serviço hospitalar para novo esvaziamento.
- (B) solicitar TC de tórax e pelve.
- (C) referenciar para serviço de oncologia para estadiamento.
- (D) esclarecer e orientar necessidade de histerectomia.
- (E) orientar sobre acompanhamento rigoroso de sangramento vaginal e retorno oportuno para exames de rotina.

46

Assinale a alternativa que descreve a situação, a apresentação e a posição do feto.



- (A) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-esquerda-anterior.
- (B) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-direita-anterior.
- (C) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-direita-posterior.
- (D) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de frente e posição nasodireita-anterior.
- (E) Situação oblíqua, apresentação cefálica e posição occípito-esquerda-anterior.

47

Na primeira consulta de pré-natal, uma primigesta refere data da última menstruação em 10 de novembro de 2020. Pela regra de Nägele, a data provável do parto é

- (A) 10/08/2021.
- (B) 17/08/2021.
- (C) 03/08/2021.
- (D) 13/10/2021.
- (E) 07/07/2021.

48

Nas pacientes sem fator de risco prévio, sem histórico de abortamento tardio ou prematuridade, com diagnóstico de colo curto (≤ 25 mm) na ultrassonografia de segundo trimestre, a conduta preconizada é

- (A) cerclagem.
- (B) cerclagem + progesterona via vaginal.
- (C) pessário.
- (D) pessário + progesterona via vaginal.
- (E) somente progesterona via vaginal.

49

Uma paciente em trabalho de parto teve seu registro de evolução de parto conforme o seguinte partograma. Para a correção da distocia apresentada, pode-se

Partograma		Nome	RG	De Lee
Dilatação (cm)	10	⊗	▲	-AM
	9	⊗	▲	-3
	8		▲	-2
	7	▲	▲	-1
	6	⊗	▲	0
	5	▲	▲	+1
	4		▲	+2
	3		▲	+3
	2		▲	+4
	1		▲	Vulva
Dia de início				
Hora real				
Hora do registro		1	2	3
		4	5	6
		7	8	9
		10		

- (A) estimular as contrações.
- (B) realizar manobra de Kristeller.
- (C) aplicar fórceps de Simpson.
- (D) realizar amnioinfusão.
- (E) estimular mudança de posição materna.

50

Das seguintes medicações, a amamentação é permitida quando a mãe faz uso de

- (A) amiodarona.
- (B) cloranfenicol.
- (C) contraceptivos hormonais combinados.
- (D) propiltiouracila.
- (E) tetraciclina.

51

O tratamento clínico, não cirúrgico, da gestação ectópica está indicado em

- (A) atividade cardíaca embrionária.
- (B) choque hipovolêmico.
- (C) localização não tubária (cervical, abdominal).
- (D) valores iniciais baixos da β -hCG.
- (E) massas anexiais grandes > 5,0 cm.

52

Uma vez constatada a gravidez e em casos de aborto previsto por Lei, a primeira providência a ser realizada, caso haja interesse de interrupção, é providenciar documentação para registro no prontuário médico. Dentre esses documentos, é fundamental a presença do

- (A) termo de responsabilidade sobre veracidade das informações nos casos de violência sexual.
- (B) termo de autorização policial nos casos de violência sexual.
- (C) termo de autorização judicial nos casos de anencefalia.
- (D) laudo do Instituto Médico Legal nos casos de violência sexual.
- (E) boletim de ocorrência nos casos de violência sexual.

53

A inclusão do parceiro na assistência ao pré-natal traz significativos avanços na saúde do homem, da mulher e na saúde perinatal. Nesse contexto, assinale a alternativa que condiz com essa conduta.

- (A) Aferir glicemia capilar durante a consulta para rastreamento de diabetes.
- (B) Exclui o parceiro das reuniões de pré-natal se não houver adesão por parte dele.
- (C) Fornecer atestado para o parceiro.
- (D) Solicitar sorologias de toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus.
- (E) Solicitar tipagem sanguínea para confirmação de paternidade.

54

Uma paciente secundigesta, com um parto cesariano anterior, com 37 semanas, dá entrada no pronto atendimento em trabalho de parto. Durante a evolução eutócica, a paciente apresentou dor abdominal repentina, com diminuição da atividade uterina. O toque vaginal mostrava apresentação fetal não mais detectável ao toque vaginal. Nesse caso, o diagnóstico clínico-obstétrico é

- (A) rotura uterina.
- (B) rotura de vasa prévia.
- (C) rotura de hematoma hepático.
- (D) prolapso de cordão.
- (E) descolamento prematuro de placenta.

55

Assinale a alternativa NÃO corresponde a um critério laboratorial da Síndrome HELLP.

- (A) Creatinina.
- (B) Contagem de plaquetas.
- (C) Bilirrubina total.
- (D) Desidrogenase láctica.
- (E) Transaminases.

56

Como uma doença multifatorial e multissistêmica, qual é a definição da pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica?

- (A) Manifestação de hipertensão arterial associada à proteinúria em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (B) Piora da proteinúria detectada na primeira metade da gestação e/ou disfunção de órgão-alvo após a 20ª semana de gestação.
- (C) Aparecimento de hipertensão arterial sem proteinúria, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (D) Manifestação de hipertensão arterial associada à disfunção de órgão-alvo, mesmo sem proteinúria, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (E) Manifestação de sinais/sintomas de pré-eclâmpsia, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.

57

Diante do diagnóstico de pré-eclâmpsia, assinale a alternativa que apresenta uma das diretrizes de tratamento.

- (A) Dieta com restrição significativa de sal.
- (B) Redução brusca e acentuada da pressão arterial.
- (C) Priorização do uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- (D) Suplementação de cálcio.
- (E) Suplementação de iodo.

58

Uma gestante realizou perfil biofísico fetal com índice = 8 com ILA normal. Nesse caso, quais são a interpretação e a conduta adequada respectivamente?

- (A) Baixo risco para asfixia crônica e aguda/ conduta conservadora.
- (B) Possível asfixia aguda/ considerar repetir o exame em 6 horas.
- (C) Provável asfixia aguda/ interrupção na viabilidade fetal.
- (D) Provável asfixia crônica/ interrupção quando o feto for maduro.
- (E) Provável asfixia crônica/ resolução de acordo com IG e maturidade.

59

Assinale a alternativa na qual NÃO há indicação de aplicação da imunoglobulina anti-D na profilaxia da aloimunização na gestação, com 28 semanas.

- (A) Gestante Rh negativa com parceiro Rh negativo.
- (B) Gestante Rh positiva com parceiro Rh negativo.
- (C) Gestante Rh positiva com parceiro Rh indeterminado.
- (D) Presença de anticorpos anti-D.
- (E) Ausência de anticorpos anti-D.

60

O SUS deve prestar atendimento emergencial visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual. No primeiro atendimento da mulher vítima de violência sexual, deve-se

- (A) realizar profilaxia da gravidez, se for o desejo da paciente e do parceiro.
- (B) condicionar registro da ocorrência em delegacias especializadas para acompanhamento subsequente.
- (C) evitar sutura das lesões físicas no aparelho genital para comprovação da violência.
- (D) fornecer informações sobre direitos legais de abortamento se a violência resultar em gestação.
- (E) coletar material oral, vaginal e anal em todos os casos.

Realização



instituto aocp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T2443061N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (OBSTETRÍCIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

02

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.

Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

2

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

3

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’.”.
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”.
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

4

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

5

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

6

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

7

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

8

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

9

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

10

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

Matemática

11

Cinco pessoas, identificadas como P_1 , P_2 , P_3 , P_4 e P_5 , estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P_3 e P_4 irão fazer o mesmo tipo de exame, P_2 e P_5 irão fazer exames de tipos diferentes e P_2 e P_5 irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P_1 irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P_5 irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P_3 irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P_2 irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P_4 irá fazer o exame de Glicemia.

12

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

13

Se $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

14

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

15

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da

dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

Informática

16

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

17

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

18

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

19

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

20


Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

Conhecimentos Específicos

21

A figura a seguir representa uma malformação do sistema geniturinário classificada como



- (A) útero bicorno.
- (B) útero didelfo.
- (C) útero rudimentar.
- (D) útero septado.
- (E) útero unicorno.

22

A formação médica cada vez mais especializada e a disponibilidade da tecnologia que cada vez mais substitui os achados clínicos podem influenciar a construção da relação médico-paciente. Assinale a alternativa que é considerada como fator negativo nessa relação.

- (A) A assistência humanizada, considerando o impacto psíquico da doença.
- (B) Chamar pelo nome e ser centrada no problema de saúde.
- (C) A conduta baseada na experiência pessoal.
- (D) A empatia e a afetividade médica.
- (E) A inteligência emocional do médico para lidar com cada paciente em específico.

23

Uma adolescente de 13 anos vai à consulta médica na UBS, junto com parceiro de 15 anos, relatando início da atividade sexual com dúvidas sobre métodos de anticoncepção. Ela refere uma relação consensual com consentimento familiar de ambos. Nesse caso,

- (A) a adolescente, desde que identificada como capaz de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios, tem o direito de ser atendida sem a presença dos pais ou responsáveis.
- (B) o médico, ao tomar conhecimento de que a paciente tem menos de 14 anos e tem vida sexual ativa, tem obrigação de protegê-la e não pode guardar silêncio em nome do sigilo médico.
- (C) o médico deve reconhecer a adolescente como indivíduo progressivamente capaz e atendê-la de forma diferenciada.
- (D) o médico deve respeitar a individualidade de cada adolescente, mantendo postura de acolhimento, centrada em valores de saúde e bem-estar do jovem.
- (E) os pais ou responsáveis somente serão informados sobre o conteúdo das consultas, nas questões relacionadas à sexualidade e prescrição de métodos contraceptivos, com o expresso consentimento da adolescente.

24

Nas áreas não endêmicas, os esquemas de vacinação direcionados para mulheres com 60 anos ou mais incluem como recomendação (pacientes sem doses prévias)

- (A) dengue.
- (B) febre amarela.
- (C) herpes-zóster.
- (D) HPV.
- (E) meningocócica B.

25

Uma paciente de 43 anos vai à consulta em ambulatório especializado em patologia genital do trato inferior. Durante exame colposcópico, foram observados achados anormais. Dentre as seguintes alternativas, assinale aquela que indica um achado com suspeita de invasão.

- (A) Epitélio acetobranco denso.
- (B) Mosaico fino.
- (C) Mosaico grosseiro.
- (D) Pontilhado fino.
- (E) Vasos atípicos.

26

O tratamento das cervicites deve estar voltado preferencialmente para o patógeno envolvido no processo. No caso da *Chlamydia trachomatis*, assinale a alternativa que apresenta uma medicação efetiva para o tratamento recomendado.

- (A) Amoxicilina 500 mg, VO, de 8 em 8 horas, por sete dias.
- (B) Ampicilina 3,5 g, em dose única.
- (C) Ciprofloxacino, 500 mg em dose única.
- (D) Eritromicina, 500 mg VO, de 6 em 6 horas, por sete dias.
- (E) Levofloxacino, 500 mg por dia, por sete dias.

27

O câncer de colo do útero é a quarta neoplasia maligna mais frequente em mulheres. É uma doença potencialmente evitável, seja com a vacinação em idade precoce contra HPVs de alto risco oncogênico, seja com os programas de rastreamento. Segundo as Diretrizes Brasileiras, assinale a alternativa que apresenta o exame de escolha para o rastreamento do câncer do colo do útero.

- (A) Biópsia de fragmento.
- (B) Colpocitologia.
- (C) Colposcopia.
- (D) Detecção e genotipagem de HPV.
- (E) Excisão da zona de transformação com alça.


28

Atualmente qual é o patógeno mais comumente encontrado como agente etiológico da doença inflamatória pélvica?

- (A) *Chlamydia trachomatis*.
- (B) *Mycoplasma hominis*.
- (C) *Mycoplasma genitalium*.
- (D) *Ureaplasma urealyticum*.
- (E) *Neisseria gonorrhoeae*.

29

Uma paciente de 82 anos, hipertensa, G6N6, sem outras comorbidades, apresenta a distopia da figura a seguir. Ela relata ser viúva e sem desejo de relação sexual posterior. Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a melhor abordagem cirúrgica.



- (A) Colpoplastia anterior.
- (B) Colpoplastia posterior.
- (C) Colpocleise.
- (D) Cirurgia de Burch.
- (E) Sling de uretra média.

30

Em meninas com caracteres sexuais secundários presentes, a ausência da primeira menstruação espontânea deve ser investigada quando a menarca não ocorreu aos

- (A) 10 anos.
- (B) 11 anos.
- (C) 12 anos.
- (D) 13 anos.
- (E) 15 anos.

31

Assinale a alternativa que apresenta uma medicação que NÃO tem relação com disfunções sexuais.

- (A) Anticoncepcionais hormonais.
- (B) Benzodiazepínicos.
- (C) Betabloqueadores.
- (D) Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (E) Inibidores seletivos da recaptção da serotonina.

32

Segundo a classificação para a hiperplasia endometrial, aquela com maior taxa de transformação maligna é a hiperplasia

- (A) simples sem atipia.
- (B) simples com atipia.
- (C) complexa sem atipia.
- (D) complexa com atipia.
- (E) glandular com dilatação cística.

33

Uma mamografia com laudo mostrando “necessária avaliação complementar dos achados, por outro método de imagem ou por incidências especiais na mamografia” é classificada como BI-RADS® (Breast Image Reporting and Data System)

- (A) zero.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

34

É uma causa NÃO estrutural do sangramento uterino anormal

- (A) pólipos.
- (B) malignidade.
- (C) leiomioma.
- (D) iatrogenia.
- (E) adenomiose.

35

A Terapêutica Hormonal (TH) da menopausa tem sua associação com risco de desenvolver alguns cânceres. Entre os cânceres, o que tem seguramente uma clara associação de aumento é o câncer

- (A) de colo do útero.
- (B) de cólon.
- (C) de endométrio.
- (D) gástrico.
- (E) de mama.

36

A primeira opção terapêutica diante de um caso de dismenorrea em mulher adulta jovem deve ser a utilização de

- (A) agonistas do hormônio liberador de gonadotrofina.
- (B) anticoncepcionais hormonais combinados.
- (C) danazol.
- (D) implante de etonogestrel.
- (E) implante de levonorgestrel.

37

Incluída no grupo dos achados vulvo/colposcópicos anormais, a adenose vaginal caracteriza-se por

- (A) epitélio pavimentoso na espessura da parede vaginal.
- (B) foco de tecido muscular liso.
- (C) lesão epitelial de células endometriais.
- (D) resíduos embrionários dos ductos mesonéfricos.
- (E) tecido glandular ectópico na espessura da parede vaginal.

38

Uma paciente recebe indicação de histerectomia, não havendo contraindicação em relação à via cirúrgica. Nesse caso, a via que apresenta estatisticamente menor tempo de internação hospitalar, recuperação pós-operatória mais rápida e menor morbidade febril é a via

- (A) videolaparoscópica.
- (B) vaginal assistida por videolaparoscopia.
- (C) vaginal.
- (D) robótica.
- (E) abdominal.

39

Assinale a alternativa que corresponde ao tratamento de primeira linha terapêutica da incontinência urinária.

- (A) Anticolinérgica.
- (B) Comportamental e fisioterapia.
- (C) Estrogênios tópicos.
- (D) Neuromodulação sacral.
- (E) Toxina botulínica.

40

Uma paciente de 62 anos, menopausada, com vida sexual ativa, apresenta sensação de bola na vagina. O exame ginecológico mostra prolapso uterino total com cistocele e retocele acentuadas. A paciente não tem comorbidades que contraindiquem cirurgia. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais adequado nesse caso.

- (A) Colpoplastia associada à tela de uretra média.
- (B) Histerectomia associada à colpocleise.
- (C) Histerectomia associada à correção dos compartimentos anterior e posterior.
- (D) Inserção de pessário vaginal e fisioterapia pélvica.
- (E) Mudança de estilo de vida e fisioterapia pélvica.

41

Nem sempre a mulher está aguardando a confirmação da gravidez como um motivo de comemoração, pois, em algumas situações, ela não desejaria estar grávida. Em caso de teste de gravidez positivo e que a mulher não deseja a gravidez, é dever do médico

- (A) ofertar medicação para interrupção da gravidez.
- (B) espaçar as consultas de pré-natal para evitar a experiência negativa do acompanhamento.
- (C) afastar, na presença de conflito familiar, o acompanhante do pré-natal.
- (D) orientar sobre possibilidades de adoção, caso ela opte pela continuidade da gestação e não haja desejo de permanecer com a criança.
- (E) informar que a gestante poderá solicitar a interrupção conforme legislação, mas que precisará relatar que houve violência sexual.

42

Gestante, G3N2, 28 semanas, chega ao pronto atendimento após consulta de rotina de pré-natal com pressão arterial aferida de 150 x 90 mmHg, assintomática. Paciente não fazia uso de medicações prévias e os níveis pressóricos durante o período gestacional eram normais. Após estabilização do quadro clínico, a paciente recebe alta com medicamento anti-hipertensivo para uso contínuo. Dessas medicações, assinale aquela que é contraindicada como anti-hipertensivo na gestação.

- (A) Vasodilatador periférico.
- (B) Bloqueador de canais de cálcio.
- (C) Diuréticos tiazídicos.
- (D) Simpatolíticos de ação central.
- (E) Inibidores diretos da renina.

43

Qual das alternativas a seguir corresponde a um teste de tolerância à glicose (75 g com medidas de jejum/1h/2h após) que confirma um diagnóstico de diabetes mellitus gestacional em situação de viabilidade financeira e disponibilidade técnica total?

- (A) 89/176/135.
- (B) 89/176/144.
- (C) 89/178/150.
- (D) 91/178/144.
- (E) 91/183/157.


44

Na UBS, uma paciente retorna após diagnóstico de mola hidatiforme e tratamento hospitalar com esvaziamento uterino. Apresenta exames subsequentes com elevação seriada de beta-HCG. A conduta adequada nesse momento é

- (A) encaminhar para o serviço hospitalar para novo esvaziamento.
- (B) solicitar TC de tórax e pelve.
- (C) referenciar para serviço de oncologia para estadiamento.
- (D) esclarecer e orientar necessidade de histerectomia.
- (E) orientar sobre acompanhamento rigoroso de sangramento vaginal e retorno oportuno para exames de rotina.

45

Assinale a alternativa que descreve a situação, a apresentação e a posição do feto.



- (A) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-esquerda-anterior.
- (B) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-direita-anterior.
- (C) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-direita-posterior.
- (D) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de frente e posição nasodireita-anterior.
- (E) Situação oblíqua, apresentação cefálica e posição occípito-esquerda-anterior.

46

Na primeira consulta de pré-natal, uma primigesta refere data da última menstruação em 10 de novembro de 2020. Pela regra de Nägele, a data provável do parto é

- (A) 10/08/2021.
- (B) 17/08/2021.
- (C) 03/08/2021.
- (D) 13/10/2021.
- (E) 07/07/2021.

47

Nas pacientes sem fator de risco prévio, sem histórico de abortamento tardio ou prematuridade, com diagnóstico de colo curto (≤ 25 mm) na ultrassonografia de segundo trimestre, a conduta preconizada é

- (A) cerclagem.
- (B) cerclagem + progesterona via vaginal.
- (C) pessário.
- (D) pessário + progesterona via vaginal.
- (E) somente progesterona via vaginal.

48

Uma paciente em trabalho de parto teve seu registro de evolução de parto conforme o seguinte partograma. Para a correção da distocia apresentada, pode-se

Partograma		Nome	RG	De Lee									
Dilatação (cm)	10	⊗	▲	-AM									
	9	⊗	▲	-3									
	8	▲	▲	-2									
	7	▲	▲	-1									
	6	⊗	▲	0									
	5	▲	▲	+1									
	4		⊗	+2									
	3		⊗	+3									
	2		⊗	+4									
	1			Vulva									
Dia de início													
Hora real													
Hora do registro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

- (A) estimular as contrações.
- (B) realizar manobra de Kristeller.
- (C) aplicar fórceps de Simpson.
- (D) realizar amnioinfusão.
- (E) estimular mudança de posição materna.

49

Das seguintes medicações, a amamentação é permitida quando a mãe faz uso de

- (A) amiodarona.
- (B) cloranfenicol.
- (C) contraceptivos hormonais combinados.
- (D) propiltiouracila.
- (E) tetraciclina.

50

O tratamento clínico, não cirúrgico, da gestação ectópica está indicado em

- (A) atividade cardíaca embrionária.
- (B) choque hipovolêmico.
- (C) localização não tubária (cervical, abdominal).
- (D) valores iniciais baixos da β -hCG.
- (E) massas anexiais grandes > 5,0 cm.

51

Uma vez constatada a gravidez e em casos de aborto previsto por Lei, a primeira providência a ser realizada, caso haja interesse de interrupção, é providenciar documentação para registro no prontuário médico. Dentre esses documentos, é fundamental a presença do

- (A) termo de responsabilidade sobre veracidade das informações nos casos de violência sexual.
- (B) termo de autorização policial nos casos de violência sexual.
- (C) termo de autorização judicial nos casos de anencefalia.
- (D) laudo do Instituto Médico Legal nos casos de violência sexual.
- (E) boletim de ocorrência nos casos de violência sexual.

52

A inclusão do parceiro na assistência ao pré-natal traz significativos avanços na saúde do homem, da mulher e na saúde perinatal. Nesse contexto, assinale a alternativa que condiz com essa conduta.

- (A) Aferir glicemia capilar durante a consulta para rastreamento de diabetes.
- (B) Exclui o parceiro das reuniões de pré-natal se não houver adesão por parte dele.
- (C) Fornecer atestado para o parceiro.
- (D) Solicitar sorologias de toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus.
- (E) Solicitar tipagem sanguínea para confirmação de paternidade.

53

Uma paciente secundigesta, com um parto cesariano anterior, com 37 semanas, dá entrada no pronto atendimento em trabalho de parto. Durante a evolução eutócica, a paciente apresentou dor abdominal repentina, com diminuição da atividade uterina. O toque vaginal mostrava apresentação fetal não mais detectável ao toque vaginal. Nesse caso, o diagnóstico clínico-obstétrico é

- (A) rotura uterina.
- (B) rotura de vasa prévia.
- (C) rotura de hematoma hepático.
- (D) prolapso de cordão.
- (E) descolamento prematuro de placenta.

54

Assinale a alternativa NÃO corresponde a um critério laboratorial da Síndrome HELLP.

- (A) Creatinina.
- (B) Contagem de plaquetas.
- (C) Bilirrubina total.
- (D) Desidrogenase láctica.
- (E) Transaminases.

55

Como uma doença multifatorial e multissistêmica, qual é a definição da pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica?

- (A) Manifestação de hipertensão arterial associada à proteinúria em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (B) Piora da proteinúria detectada na primeira metade da gestação e/ou disfunção de órgão-alvo após a 20ª semana de gestação.
- (C) Aparecimento de hipertensão arterial sem proteinúria, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (D) Manifestação de hipertensão arterial associada à disfunção de órgão-alvo, mesmo sem proteinúria, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (E) Manifestação de sinais/sintomas de pré-eclâmpsia, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.

56

Diante do diagnóstico de pré-eclâmpsia, assinale a alternativa que apresenta uma das diretrizes de tratamento.

- (A) Dieta com restrição significativa de sal.
- (B) Redução brusca e acentuada da pressão arterial.
- (C) Priorização do uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- (D) Suplementação de cálcio.
- (E) Suplementação de iodo.

57

Uma gestante realizou perfil biofísico fetal com índice = 8 com ILA normal. Nesse caso, quais são a interpretação e a conduta adequada respectivamente?

- (A) Baixo risco para asfixia crônica e aguda/ conduta conservadora.
- (B) Possível asfixia aguda/ considerar repetir o exame em 6 horas.
- (C) Provável asfixia aguda/ interrupção na viabilidade fetal.
- (D) Provável asfixia crônica/ interrupção quando o feto for maduro.
- (E) Provável asfixia crônica/ resolução de acordo com IG e maturidade.

58

Assinale a alternativa na qual NÃO há indicação de aplicação da imunoglobulina anti-D na profilaxia da aloimunização na gestação, com 28 semanas.

- (A) Gestante Rh negativa com parceiro Rh negativo.
- (B) Gestante Rh positiva com parceiro Rh negativo.
- (C) Gestante Rh positiva com parceiro Rh indeterminado.
- (D) Presença de anticorpos anti-D.
- (E) Ausência de anticorpos anti-D.

59

O SUS deve prestar atendimento emergencial visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual. No primeiro atendimento da mulher vítima de violência sexual, deve-se

- (A) realizar profilaxia da gravidez, se for o desejo da paciente e do parceiro.
- (B) condicionar registro da ocorrência em delegacias especializadas para acompanhamento subsequente.
- (C) evitar sutura das lesões físicas no aparelho genital para comprovação da violência.
- (D) fornecer informações sobre direitos legais de abortamento se a violência resultar em gestação.
- (E) coletar material oral, vaginal e anal em todos os casos.

60

A drenagem linfática de ovários, tubas uterinas e parte superior do corpo uterino é realizada para qual grupo de linfonodos?

- (A) Aórtico/para-aórtico.
- (B) Inguinal profundo.
- (C) Inguinal superficial.
- (D) Obturatório.
- (E) Para-uterino.

Realização



instituto aacp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T3443061N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (OBSTETRÍCIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

03

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:
<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.
 Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

2

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”

3

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

4

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

5

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

6

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

7

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

8

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

9

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

10

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

Matemática

11

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

12

Se $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

13

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

14

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

15

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

Informática

16

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

17

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

18

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

19

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

20

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

Conhecimentos Específicos

21

A formação médica cada vez mais especializada e a disponibilidade da tecnologia que cada vez mais substitui os achados clínicos podem influenciar a construção da relação médico-paciente. Assinale a alternativa que é considerada como fator negativo nessa relação.

- (A) A assistência humanizada, considerando o impacto psíquico da doença.
- (B) Chamar pelo nome e ser centrada no problema de saúde.
- (C) A conduta baseada na experiência pessoal.
- (D) A empatia e a afetividade médica.
- (E) A inteligência emocional do médico para lidar com cada paciente em específico.

22

Uma adolescente de 13 anos vai à consulta médica na UBS, junto com parceiro de 15 anos, relatando início da atividade sexual com dúvidas sobre métodos de anticoncepção. Ela refere uma relação consensual com consentimento familiar de ambos. Nesse caso,

- (A) a adolescente, desde que identificada como capaz de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios, tem o direito de ser atendida sem a presença dos pais ou responsáveis.
- (B) o médico, ao tomar conhecimento de que a paciente tem menos de 14 anos e tem vida sexual ativa, tem obrigação de protegê-la e não pode guardar silêncio em nome do sigilo médico.
- (C) o médico deve reconhecer a adolescente como indivíduo progressivamente capaz e atendê-la de forma diferenciada.
- (D) o médico deve respeitar a individualidade de cada adolescente, mantendo postura de acolhimento, centrada em valores de saúde e bem-estar do jovem.
- (E) os pais ou responsáveis somente serão informados sobre o conteúdo das consultas, nas questões relacionadas à sexualidade e prescrição de métodos contraceptivos, com o expresse consentimento da adolescente.

23

Nas áreas não endêmicas, os esquemas de vacinação direcionados para mulheres com 60 anos ou mais incluem como recomendação (pacientes sem doses prévias)

- (A) dengue.
- (B) febre amarela.
- (C) herpes-zóster.
- (D) HPV.
- (E) meningocócica B.

24

Uma paciente de 43 anos vai à consulta em ambulatório especializado em patologia genital do trato inferior. Durante exame colposcópico, foram observados achados anormais. Dentre as seguintes alternativas, assinale aquela que indica um achado com suspeita de invasão.

- (A) Epitélio acetobranco denso.
- (B) Mosaico fino.
- (C) Mosaico grosseiro.
- (D) Pontilhado fino.
- (E) Vasos atípicos.

25

O tratamento das cervicites deve estar voltado preferencialmente para o patógeno envolvido no processo. No caso da *Chlamydia trachomatis*, assinale a alternativa que apresenta uma medicação efetiva para o tratamento recomendado.

- (A) Amoxicilina 500 mg, VO, de 8 em 8 horas, por sete dias.
- (B) Ampicilina 3,5 g, em dose única.
- (C) Ciprofloxacino, 500 mg em dose única.
- (D) Eritromicina, 500 mg VO, de 6 em 6 horas, por sete dias.
- (E) Levofloxacino, 500 mg por dia, por sete dias.

26

O câncer de colo do útero é a quarta neoplasia maligna mais frequente em mulheres. É uma doença potencialmente evitável, seja com a vacinação em idade precoce contra HPVs de alto risco oncogênico, seja com os programas de rastreamento. Segundo as Diretrizes Brasileiras, assinale a alternativa que apresenta o exame de escolha para o rastreamento do câncer do colo do útero.

- (A) Biópsia de fragmento.
- (B) Colpocitologia.
- (C) Colposcopia.
- (D) Detecção e genotipagem de HPV.
- (E) Excisão da zona de transformação com alça.


27

Atualmente qual é o patógeno mais comumente encontrado como agente etiológico da doença inflamatória pélvica?

- (A) *Chlamydia trachomatis*.
- (B) *Mycoplasma hominis*.
- (C) *Mycoplasma genitalium*.
- (D) *Ureaplasma urealyticum*.
- (E) *Neisseria gonorrhoeae*.

28

Uma paciente de 82 anos, hipertensa, G6N6, sem outras comorbidades, apresenta a distopia da figura a seguir. Ela relata ser viúva e sem desejo de relação sexual posterior. Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a melhor abordagem cirúrgica.



- (A) Colpoplastia anterior.
- (B) Colpoplastia posterior.
- (C) Colpocleise.
- (D) Cirurgia de Burch.
- (E) Sling de uretra média.

29

Em meninas com caracteres sexuais secundários presentes, a ausência da primeira menstruação espontânea deve ser investigada quando a menarca não ocorreu aos

- (A) 10 anos.
- (B) 11 anos.
- (C) 12 anos.
- (D) 13 anos.
- (E) 15 anos.

30

Assinale a alternativa que apresenta uma medicação que NÃO tem relação com disfunções sexuais.

- (A) Anticoncepcionais hormonais.
- (B) Benzodiazepínicos.
- (C) Betabloqueadores.
- (D) Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (E) Inibidores seletivos da recaptção da serotonina.

31

Segundo a classificação para a hiperplasia endometrial, aquela com maior taxa de transformação maligna é a hiperplasia

- (A) simples sem atipia.
- (B) simples com atipia.
- (C) complexa sem atipia.
- (D) complexa com atipia.
- (E) glandular com dilatação cística.

32

Uma mamografia com laudo mostrando “necessária avaliação complementar dos achados, por outro método de imagem ou por incidências especiais na mamografia” é classificada como BI-RADS® (Breast Image Reporting and Data System)

- (A) zero.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

33

É uma causa NÃO estrutural do sangramento uterino anormal

- (A) pólipos.
- (B) malignidade.
- (C) leiomioma.
- (D) iatrogenia.
- (E) adenomiose.

34

A Terapêutica Hormonal (TH) da menopausa tem sua associação com risco de desenvolver alguns cânceres. Entre os cânceres, o que tem seguramente uma clara associação de aumento é o câncer

- (A) de colo do útero.
- (B) de cólon.
- (C) de endométrio.
- (D) gástrico.
- (E) de mama.

35

A primeira opção terapêutica diante de um caso de dismenorrea em mulher adulta jovem deve ser a utilização de

- (A) agonistas do hormônio liberador de gonadotrofina.
- (B) anticoncepcionais hormonais combinados.
- (C) danazol.
- (D) implante de etonogestrel.
- (E) implante de levonorgestrel.

36

Incluída no grupo dos achados vulvo/colposcópicos anormais, a adenose vaginal caracteriza-se por

- (A) epitélio pavimentoso na espessura da parede vaginal.
- (B) foco de tecido muscular liso.
- (C) lesão epitelial de células endometriais.
- (D) resíduos embrionários dos ductos mesonéfricos.
- (E) tecido glandular ectópico na espessura da parede vaginal.

37

Uma paciente recebe indicação de histerectomia, não havendo contra-indicação em relação à via cirúrgica. Nesse caso, a via que apresenta estatisticamente menor tempo de internação hospitalar, recuperação pós-operatória mais rápida e menor morbidade febril é a via

- (A) videolaparoscópica.
- (B) vaginal assistida por videolaparoscopia.
- (C) vaginal.
- (D) robótica.
- (E) abdominal.

38

Assinale a alternativa que corresponde ao tratamento de primeira linha terapêutica da incontinência urinária.

- (A) Anticolinérgica.
- (B) Comportamental e fisioterapia.
- (C) Estrogênios tópicos.
- (D) Neuromodulação sacral.
- (E) Toxina botulínica.

39

Uma paciente de 62 anos, menopausada, com vida sexual ativa, apresenta sensação de bola na vagina. O exame ginecológico mostra prolapso uterino total com cistocele e retocele acentuadas. A paciente não tem comorbidades que contraindiquem cirurgia. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais adequado nesse caso.

- (A) Colpoplastia associada à tela de uretra média.
- (B) Histerectomia associada à colpocleise.
- (C) Histerectomia associada à correção dos compartimentos anterior e posterior.
- (D) Inserção de pessário vaginal e fisioterapia pélvica.
- (E) Mudança de estilo de vida e fisioterapia pélvica.

40

Nem sempre a mulher está aguardando a confirmação da gravidez como um motivo de comemoração, pois, em algumas situações, ela não desejaria estar grávida. Em caso de teste de gravidez positivo e que a mulher não deseja a gravidez, é dever do médico

- (A) ofertar medicação para interrupção da gravidez.
- (B) espaçar as consultas de pré-natal para evitar a experiência negativa do acompanhamento.
- (C) afastar, na presença de conflito familiar, o acompanhante do pré-natal.
- (D) orientar sobre possibilidades de adoção, caso ela opte pela continuidade da gestação e não haja desejo de permanecer com a criança.
- (E) informar que a gestante poderá solicitar a interrupção conforme legislação, mas que precisará relatar que houve violência sexual.

41

Gestante, G3N2, 28 semanas, chega ao pronto atendimento após consulta de rotina de pré-natal com pressão arterial aferida de 150 x 90 mmHg, assintomática. Paciente não fazia uso de medicações prévias e os níveis pressóricos durante o período gestacional eram normais. Após estabilização do quadro clínico, a paciente recebe alta com medicamento anti-hipertensivo para uso contínuo. Dessas medicações, assinale aquela que é contraindicada como anti-hipertensivo na gestação.

- (A) Vasodilatador periférico.
- (B) Bloqueador de canais de cálcio.
- (C) Diuréticos tiazídicos.
- (D) Simpatolíticos de ação central.
- (E) Inibidores diretos da renina.

42

Qual das alternativas a seguir corresponde a um teste de tolerância à glicose (75 g com medidas de jejum/1h/2h após) que confirma um diagnóstico de diabetes mellitus gestacional em situação de viabilidade financeira e disponibilidade técnica total?

- (A) 89/176/135.
- (B) 89/176/144.
- (C) 89/178/150.
- (D) 91/178/144.
- (E) 91/183/157.


43

Na UBS, uma paciente retorna após diagnóstico de mola hidatiforme e tratamento hospitalar com esvaziamento uterino. Apresenta exames subsequentes com elevação seriada de beta-HCG. A conduta adequada nesse momento é

- (A) encaminhar para o serviço hospitalar para novo esvaziamento.
- (B) solicitar TC de tórax e pelve.
- (C) referenciar para serviço de oncologia para estadiamento.
- (D) esclarecer e orientar necessidade de histerectomia.
- (E) orientar sobre acompanhamento rigoroso de sangramento vaginal e retorno oportuno para exames de rotina.

44

Assinale a alternativa que descreve a situação, a apresentação e a posição do feto.



- (A) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-esquerda-anterior.
- (B) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-direita-anterior.
- (C) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-direita-posterior.
- (D) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de frente e posição nasodireita-anterior.
- (E) Situação oblíqua, apresentação cefálica e posição occípito-esquerda-anterior.

45

Na primeira consulta de pré-natal, uma primigesta refere data da última menstruação em 10 de novembro de 2020. Pela regra de Nägele, a data provável do parto é

- (A) 10/08/2021.
- (B) 17/08/2021.
- (C) 03/08/2021.
- (D) 13/10/2021.
- (E) 07/07/2021.

46

Nas pacientes sem fator de risco prévio, sem histórico de abortamento tardio ou prematuridade, com diagnóstico de colo curto (≤ 25 mm) na ultrassonografia de segundo trimestre, a conduta preconizada é

- (A) cerclagem.
- (B) cerclagem + progesterona via vaginal.
- (C) pessário.
- (D) pessário + progesterona via vaginal.
- (E) somente progesterona via vaginal.

47

Uma paciente em trabalho de parto teve seu registro de evolução de parto conforme o seguinte partograma. Para a correção da distocia apresentada, pode-se

Partograma		Nome	RG	De Lee										
Dilatação (cm)	10	⊗		-AM										
	9	⊗		-3										
	8			-2										
	7	▲		-1										
	6	⊗		0										
	5	▲		+1										
	4			+2										
	3			+3										
	2			+4										
	1			Vulva										
Dia de início														
Hora real														
Hora do registro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

- (A) estimular as contrações.
- (B) realizar manobra de Kristeller.
- (C) aplicar fórceps de Simpson.
- (D) realizar amnioinfusão.
- (E) estimular mudança de posição materna.

48

Das seguintes medicações, a amamentação é permitida quando a mãe faz uso de

- (A) amiodarona.
- (B) cloranfenicol.
- (C) contraceptivos hormonais combinados.
- (D) propiltiouracila.
- (E) tetraciclina.

49

O tratamento clínico, não cirúrgico, da gestação ectópica está indicado em

- (A) atividade cardíaca embrionária.
- (B) choque hipovolêmico.
- (C) localização não tubária (cervical, abdominal).
- (D) valores iniciais baixos da β -hCG.
- (E) massas anexiais grandes > 5,0 cm.

50

Uma vez constatada a gravidez e em casos de aborto previsto por Lei, a primeira providência a ser realizada, caso haja interesse de interrupção, é providenciar documentação para registro no prontuário médico. Dentre esses documentos, é fundamental a presença do

- (A) termo de responsabilidade sobre veracidade das informações nos casos de violência sexual.
- (B) termo de autorização policial nos casos de violência sexual.
- (C) termo de autorização judicial nos casos de anencefalia.
- (D) laudo do Instituto Médico Legal nos casos de violência sexual.
- (E) boletim de ocorrência nos casos de violência sexual.

51

A inclusão do parceiro na assistência ao pré-natal traz significativos avanços na saúde do homem, da mulher e na saúde perinatal. Nesse contexto, assinale a alternativa que condiz com essa conduta.

- (A) Aferir glicemia capilar durante a consulta para rastreamento de diabetes.
- (B) Exclui o parceiro das reuniões de pré-natal se não houver adesão por parte dele.
- (C) Fornecer atestado para o parceiro.
- (D) Solicitar sorologias de toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus.
- (E) Solicitar tipagem sanguínea para confirmação de paternidade.

52

Uma paciente secundigesta, com um parto cesariano anterior, com 37 semanas, dá entrada no pronto atendimento em trabalho de parto. Durante a evolução eutócica, a paciente apresentou dor abdominal repentina, com diminuição da atividade uterina. O toque vaginal mostrava apresentação fetal não mais detectável ao toque vaginal. Nesse caso, o diagnóstico clínico-obstétrico é

- (A) rotura uterina.
- (B) rotura de vasa prévia.
- (C) rotura de hematoma hepático.
- (D) prolapso de cordão.
- (E) descolamento prematuro de placenta.

53

Assinale a alternativa NÃO corresponde a um critério laboratorial da Síndrome HELLP.

- (A) Creatinina.
- (B) Contagem de plaquetas.
- (C) Bilirrubina total.
- (D) Desidrogenase láctica.
- (E) Transaminases.

54

Como uma doença multifatorial e multissistêmica, qual é a definição da pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica?

- (A) Manifestação de hipertensão arterial associada à proteinúria em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (B) Piora da proteinúria detectada na primeira metade da gestação e/ou disfunção de órgão-alvo após a 20ª semana de gestação.
- (C) Aparecimento de hipertensão arterial sem proteinúria, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (D) Manifestação de hipertensão arterial associada à disfunção de órgão-alvo, mesmo sem proteinúria, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (E) Manifestação de sinais/sintomas de pré-eclâmpsia, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.

55

Diante do diagnóstico de pré-eclâmpsia, assinale a alternativa que apresenta uma das diretrizes de tratamento.

- (A) Dieta com restrição significativa de sal.
- (B) Redução brusca e acentuada da pressão arterial.
- (C) Priorização do uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- (D) Suplementação de cálcio.
- (E) Suplementação de iodo.

56

Uma gestante realizou perfil biofísico fetal com índice = 8 com ILA normal. Nesse caso, quais são a interpretação e a conduta adequada respectivamente?

- (A) Baixo risco para asfixia crônica e aguda/ conduta conservadora.
- (B) Possível asfixia aguda/ considerar repetir o exame em 6 horas.
- (C) Provável asfixia aguda/ interrupção na viabilidade fetal.
- (D) Provável asfixia crônica/ interrupção quando o feto for maduro.
- (E) Provável asfixia crônica/ resolução de acordo com IG e maturidade.

57

Assinale a alternativa na qual NÃO há indicação de aplicação da imunoglobulina anti-D na profilaxia da aloimunização na gestação, com 28 semanas.

- (A) Gestante Rh negativa com parceiro Rh negativo.
- (B) Gestante Rh positiva com parceiro Rh negativo.
- (C) Gestante Rh positiva com parceiro Rh indeterminado.
- (D) Presença de anticorpos anti-D.
- (E) Ausência de anticorpos anti-D.

58

O SUS deve prestar atendimento emergencial visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual. No primeiro atendimento da mulher vítima de violência sexual, deve-se

- (A) realizar profilaxia da gravidez, se for o desejo da paciente e do parceiro.
- (B) condicionar registro da ocorrência em delegacias especializadas para acompanhamento subsequente.
- (C) evitar sutura das lesões físicas no aparelho genital para comprovação da violência.
- (D) fornecer informações sobre direitos legais de abortamento se a violência resultar em gestação.
- (E) coletar material oral, vaginal e anal em todos os casos.


59

A drenagem linfática de ovários, tubas uterinas e parte superior do corpo uterino é realizada para qual grupo de linfonodos?

- (A) Aórtico/para-aórtico.
- (B) Inguinal profundo.
- (C) Inguinal superficial.
- (D) Obturatório.
- (E) Para-uterino.

60

A figura a seguir representa uma malformação do sistema geniturinário classificada como



- (A) útero bicorno.
- (B) útero didelfo.
- (C) útero rudimentar.
- (D) útero septado.
- (E) útero unicorno.

Realização



instituto aocp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T4443061N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (OBSTETRÍCIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

04

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

2

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos “borders” melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos “borders” melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

3

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos “borders” melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

4

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

5

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

6

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

7

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

8

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

9

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

10

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

Matemática

11

Sendo $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

12

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, __).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

13

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{15}{4}$

(C) $\frac{1}{15}$

(D) $\frac{4}{5}$

(E) $\frac{4}{15}$

14

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

15

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

Informática

16

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

17

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

18

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

19

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

20

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

Conhecimentos Específicos

21

Uma adolescente de 13 anos vai à consulta médica na UBS, junto com parceiro de 15 anos, relatando início da atividade sexual com dúvidas sobre métodos de anticoncepção. Ela refere uma relação consensual com consentimento familiar de ambos. Nesse caso,

- (A) a adolescente, desde que identificada como capaz de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios, tem o direito de ser atendida sem a presença dos pais ou responsáveis.
- (B) o médico, ao tomar conhecimento de que a paciente tem menos de 14 anos e tem vida sexual ativa, tem obrigação de protegê-la e não pode guardar silêncio em nome do sigilo médico.
- (C) o médico deve reconhecer a adolescente como indivíduo progressivamente capaz e atendê-la de forma diferenciada.
- (D) o médico deve respeitar a individualidade de cada adolescente, mantendo postura de acolhimento, centrada em valores de saúde e bem-estar do jovem.
- (E) os pais ou responsáveis somente serão informados sobre o conteúdo das consultas, nas questões relacionadas à sexualidade e prescrição de métodos contraceptivos, com o expresso consentimento da adolescente.

22

Nas áreas não endêmicas, os esquemas de vacinação direcionados para mulheres com 60 anos ou mais incluem como recomendação (pacientes sem doses prévias)

- (A) dengue.
- (B) febre amarela.
- (C) herpes-zóster.
- (D) HPV.
- (E) meningocócica B.

23

Uma paciente de 43 anos vai à consulta em ambulatório especializado em patologia genital do trato inferior. Durante exame colposcópico, foram observados achados anormais. Dentre as seguintes alternativas, assinale aquela que indica um achado com suspeita de invasão.

- (A) Epitélio acetobranco denso.
- (B) Mosaico fino.
- (C) Mosaico grosseiro.
- (D) Pontilhado fino.
- (E) Vasos atípicos.

24

O tratamento das cervicites deve estar voltado preferencialmente para o patógeno envolvido no processo. No caso da *Chlamydia trachomatis*, assinale a alternativa que apresenta uma medicação efetiva para o tratamento recomendado.

- (A) Amoxicilina 500 mg, VO, de 8 em 8 horas, por sete dias.
- (B) Ampicilina 3,5 g, em dose única.
- (C) Ciprofloxacino, 500 mg em dose única.
- (D) Eritromicina, 500 mg VO, de 6 em 6 horas, por sete dias.
- (E) Levofloxacino, 500 mg por dia, por sete dias.

25

O câncer de colo do útero é a quarta neoplasia maligna mais frequente em mulheres. É uma doença potencialmente evitável, seja com a vacinação em idade precoce contra HPVs de alto risco oncogênico, seja com os programas de rastreamento. Segundo as Diretrizes Brasileiras, assinale a alternativa que apresenta o exame de escolha para o rastreamento do câncer do colo do útero.

- (A) Biópsia de fragmento.
- (B) Colpocitologia.
- (C) Colposcopia.
- (D) Detecção e genotipagem de HPV.
- (E) Excisão da zona de transformação com alça.


26

Atualmente qual é o patógeno mais comumente encontrado como agente etiológico da doença inflamatória pélvica?

- (A) *Chlamydia trachomatis*.
- (B) *Mycoplasma hominis*.
- (C) *Mycoplasma genitalium*.
- (D) *Ureaplasma urealyticum*.
- (E) *Neisseria gonorrhoeae*.

27

Uma paciente de 82 anos, hipertensa, G6N6, sem outras comorbidades, apresenta a distopia da figura a seguir. Ela relata ser viúva e sem desejo de relação sexual posterior. Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a melhor abordagem cirúrgica.



- (A) Colpoplastia anterior.
- (B) Colpoplastia posterior.
- (C) Colpocleise.
- (D) Cirurgia de Burch.
- (E) Sling de uretra média.

28

Em meninas com caracteres sexuais secundários presentes, a ausência da primeira menstruação espontânea deve ser investigada quando a menarca não ocorreu aos

- (A) 10 anos.
- (B) 11 anos.
- (C) 12 anos.
- (D) 13 anos.
- (E) 15 anos.

29

Assinale a alternativa que apresenta uma medicação que NÃO tem relação com disfunções sexuais.

- (A) Anticoncepcionais hormonais.
- (B) Benzodiazepínicos.
- (C) Betabloqueadores.
- (D) Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (E) Inibidores seletivos da recaptção da serotonina.

30

Segundo a classificação para a hiperplasia endometrial, aquela com maior taxa de transformação maligna é a hiperplasia

- (A) simples sem atipia.
- (B) simples com atipia.
- (C) complexa sem atipia.
- (D) complexa com atipia.
- (E) glandular com dilatação cística.

31

Uma mamografia com laudo mostrando “necessária avaliação complementar dos achados, por outro método de imagem ou por incidências especiais na mamografia” é classificada como BI-RADS® (Breast Image Reporting and Data System)

- (A) zero.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

32

É uma causa NÃO estrutural do sangramento uterino anormal

- (A) pólipo.
- (B) malignidade.
- (C) leiomioma.
- (D) iatrogenia.
- (E) adenomiose.

33

A Terapêutica Hormonal (TH) da menopausa tem sua associação com risco de desenvolver alguns cânceres. Entre os cânceres, o que tem seguramente uma clara associação de aumento é o câncer

- (A) de colo do útero.
- (B) de cólon.
- (C) de endométrio.
- (D) gástrico.
- (E) de mama.

34

A primeira opção terapêutica diante de um caso de dismenorrea em mulher adulta jovem deve ser a utilização de

- (A) agonistas do hormônio liberador de gonadotrofina.
- (B) anticoncepcionais hormonais combinados.
- (C) danazol.
- (D) implante de etonogestrel.
- (E) implante de levonorgestrel.

35

Incluída no grupo dos achados vulvo/colposcópicos anormais, a adenose vaginal caracteriza-se por

- (A) epitélio pavimentoso na espessura da parede vaginal.
- (B) foco de tecido muscular liso.
- (C) lesão epitelial de células endometriais.
- (D) resíduos embrionários dos ductos mesonéfricos.
- (E) tecido glandular ectópico na espessura da parede vaginal.

36

Uma paciente recebe indicação de histerectomia, não havendo contra-indicação em relação à via cirúrgica. Nesse caso, a via que apresenta estatisticamente menor tempo de internação hospitalar, recuperação pós-operatória mais rápida e menor morbidade febril é a via

- (A) videolaparoscópica.
- (B) vaginal assistida por videolaparoscopia.
- (C) vaginal.
- (D) robótica.
- (E) abdominal.

37

Assinale a alternativa que corresponde ao tratamento de primeira linha terapêutica da incontinência urinária.

- (A) Anticolinérgica.
- (B) Comportamental e fisioterapia.
- (C) Estrogênios tópicos.
- (D) Neuromodulação sacral.
- (E) Toxina botulínica.

38

Uma paciente de 62 anos, menopausada, com vida sexual ativa, apresenta sensação de bola na vagina. O exame ginecológico mostra prolapso uterino total com cistocele e retocele acentuadas. A paciente não tem comorbidades que contraindiquem cirurgia. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais adequado nesse caso.

- (A) Colpoplastia associada à tela de uretra média.
- (B) Histerectomia associada à colpocleise.
- (C) Histerectomia associada à correção dos compartimentos anterior e posterior.
- (D) Inserção de pessário vaginal e fisioterapia pélvica.
- (E) Mudança de estilo de vida e fisioterapia pélvica.

39

Nem sempre a mulher está aguardando a confirmação da gravidez como um motivo de comemoração, pois, em algumas situações, ela não desejaria estar grávida. Em caso de teste de gravidez positivo e que a mulher não deseja a gravidez, é dever do médico

- (A) ofertar medicação para interrupção da gravidez.
- (B) espaçar as consultas de pré-natal para evitar a experiência negativa do acompanhamento.
- (C) afastar, na presença de conflito familiar, o acompanhante do pré-natal.
- (D) orientar sobre possibilidades de adoção, caso ela opte pela continuidade da gestação e não haja desejo de permanecer com a criança.
- (E) informar que a gestante poderá solicitar a interrupção conforme legislação, mas que precisará relatar que houve violência sexual.

40

Gestante, G3N2, 28 semanas, chega ao pronto atendimento após consulta de rotina de pré-natal com pressão arterial aferida de 150 x 90 mmHg, assintomática. Paciente não fazia uso de medicações prévias e os níveis pressóricos durante o período gestacional eram normais. Após estabilização do quadro clínico, a paciente recebe alta com medicamento anti-hipertensivo para uso contínuo. Dessas medicações, assinale aquela que é contraindicada como anti-hipertensivo na gestação.

- (A) Vasodilatador periférico.
- (B) Bloqueador de canais de cálcio.
- (C) Diuréticos tiazídicos.
- (D) Simpatolíticos de ação central.
- (E) Inibidores diretos da renina.

41

Qual das alternativas a seguir corresponde a um teste de tolerância à glicose (75 g com medidas de jejum/1h/2h após) que confirma um diagnóstico de diabetes mellitus gestacional em situação de viabilidade financeira e disponibilidade técnica total?

- (A) 89/176/135.
- (B) 89/176/144.
- (C) 89/178/150.
- (D) 91/178/144.
- (E) 91/183/157.


42

Na UBS, uma paciente retorna após diagnóstico de mola hidatiforme e tratamento hospitalar com esvaziamento uterino. Apresenta exames subsequentes com elevação seriada de beta-HCG. A conduta adequada nesse momento é

- (A) encaminhar para o serviço hospitalar para novo esvaziamento.
- (B) solicitar TC de tórax e pelve.
- (C) referenciar para serviço de oncologia para estadiamento.
- (D) esclarecer e orientar necessidade de histerectomia.
- (E) orientar sobre acompanhamento rigoroso de sangramento vaginal e retorno oportuno para exames de rotina.

43

Assinale a alternativa que descreve a situação, a apresentação e a posição do feto.



- (A) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-esquerda-anterior.
- (B) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-direita-anterior.
- (C) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de vértice e posição occípito-direita-posterior.
- (D) Situação longitudinal, apresentação cefálica, de frente e posição nasodireita-anterior.
- (E) Situação oblíqua, apresentação cefálica e posição occípito-esquerda-anterior.

44

Na primeira consulta de pré-natal, uma primigesta refere data da última menstruação em 10 de novembro de 2020. Pela regra de Nägele, a data provável do parto é

- (A) 10/08/2021.
- (B) 17/08/2021.
- (C) 03/08/2021.
- (D) 13/10/2021.
- (E) 07/07/2021.

45

Nas pacientes sem fator de risco prévio, sem histórico de abortamento tardio ou prematuridade, com diagnóstico de colo curto (≤ 25 mm) na ultrassonografia de segundo trimestre, a conduta preconizada é

- (A) cerclagem.
- (B) cerclagem + progesterona via vaginal.
- (C) pessário.
- (D) pessário + progesterona via vaginal.
- (E) somente progesterona via vaginal.

46

Uma paciente em trabalho de parto teve seu registro de evolução de parto conforme o seguinte partograma. Para a correção da distocia apresentada, pode-se

Partograma		Nome	RG	De Lee										
Dilatação (cm)	10	▲		-AM										
	9	●		-3										
	8			-2										
	7	▲		-1										
	6	●		0										
	5	▲		+1										
	4			+2										
	3			+3										
	2			+4										
	1			Vulva										
Dia de início														
Hora real														
Hora do registro		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

- (A) estimular as contrações.
- (B) realizar manobra de Kristeller.
- (C) aplicar fórceps de Simpson.
- (D) realizar amnioinfusão.
- (E) estimular mudança de posição materna.

47

Das seguintes medicações, a amamentação é permitida quando a mãe faz uso de

- (A) amiodarona.
- (B) cloranfenicol.
- (C) contraceptivos hormonais combinados.
- (D) propiltiouracila.
- (E) tetraciclina.

48

O tratamento clínico, não cirúrgico, da gestação ectópica está indicado em

- (A) atividade cardíaca embrionária.
- (B) choque hipovolêmico.
- (C) localização não tubária (cervical, abdominal).
- (D) valores iniciais baixos da β -hCG.
- (E) massas anexiais grandes > 5,0 cm.

49

Uma vez constatada a gravidez e em casos de aborto previsto por Lei, a primeira providência a ser realizada, caso haja interesse de interrupção, é providenciar documentação para registro no prontuário médico. Dentre esses documentos, é fundamental a presença do

- (A) termo de responsabilidade sobre veracidade das informações nos casos de violência sexual.
- (B) termo de autorização policial nos casos de violência sexual.
- (C) termo de autorização judicial nos casos de anencefalia.
- (D) laudo do Instituto Médico Legal nos casos de violência sexual.
- (E) boletim de ocorrência nos casos de violência sexual.

50

A inclusão do parceiro na assistência ao pré-natal traz significativos avanços na saúde do homem, da mulher e na saúde perinatal. Nesse contexto, assinale a alternativa que condiz com essa conduta.

- (A) Aferir glicemia capilar durante a consulta para rastreamento de diabetes.
- (B) Exclui o parceiro das reuniões de pré-natal se não houver adesão por parte dele.
- (C) Fornecer atestado para o parceiro.
- (D) Solicitar sorologias de toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus.
- (E) Solicitar tipagem sanguínea para confirmação de paternidade.

51

Uma paciente secundigesta, com um parto cesariano anterior, com 37 semanas, dá entrada no pronto atendimento em trabalho de parto. Durante a evolução eutócica, a paciente apresentou dor abdominal repentina, com diminuição da atividade uterina. O toque vaginal mostrava apresentação fetal não mais detectável ao toque vaginal. Nesse caso, o diagnóstico clínico-obstétrico é

- (A) rotura uterina.
- (B) rotura de vasa prévia.
- (C) rotura de hematoma hepático.
- (D) prolapso de cordão.
- (E) descolamento prematuro de placenta.

52

Assinale a alternativa NÃO corresponde a um critério laboratorial da Síndrome HELLP.

- (A) Creatinina.
- (B) Contagem de plaquetas.
- (C) Bilirrubina total.
- (D) Desidrogenase láctica.
- (E) Transaminases.

53

Como uma doença multifatorial e multissistêmica, qual é a definição da pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica?

- (A) Manifestação de hipertensão arterial associada à proteinúria em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (B) Piora da proteinúria detectada na primeira metade da gestação e/ou disfunção de órgão-alvo após a 20ª semana de gestação.
- (C) Aparecimento de hipertensão arterial sem proteinúria, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (D) Manifestação de hipertensão arterial associada à disfunção de órgão-alvo, mesmo sem proteinúria, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.
- (E) Manifestação de sinais/sintomas de pré-eclâmpsia, em gestante previamente normotensa, após a 20ª semana de gestação.

54

Diante do diagnóstico de pré-eclâmpsia, assinale a alternativa que apresenta uma das diretrizes de tratamento.

- (A) Dieta com restrição significativa de sal.
- (B) Redução brusca e acentuada da pressão arterial.
- (C) Priorização do uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- (D) Suplementação de cálcio.
- (E) Suplementação de iodo.

55

Uma gestante realizou perfil biofísico fetal com índice = 8 com ILA normal. Nesse caso, quais são a interpretação e a conduta adequada respectivamente?

- (A) Baixo risco para asfixia crônica e aguda/ conduta conservadora.
- (B) Possível asfixia aguda/ considerar repetir o exame em 6 horas.
- (C) Provável asfixia aguda/ interrupção na viabilidade fetal.
- (D) Provável asfixia crônica/ interrupção quando o feto for maduro.
- (E) Provável asfixia crônica/ resolução de acordo com IG e maturidade.

56

Assinale a alternativa na qual NÃO há indicação de aplicação da imunoglobulina anti-D na profilaxia da aloimunização na gestação, com 28 semanas.

- (A) Gestante Rh negativa com parceiro Rh negativo.
- (B) Gestante Rh positiva com parceiro Rh negativo.
- (C) Gestante Rh positiva com parceiro Rh indeterminado.
- (D) Presença de anticorpos anti-D.
- (E) Ausência de anticorpos anti-D.

57

O SUS deve prestar atendimento emergencial visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual. No primeiro atendimento da mulher vítima de violência sexual, deve-se

- (A) realizar profilaxia da gravidez, se for o desejo da paciente e do parceiro.
- (B) condicionar registro da ocorrência em delegacias especializadas para acompanhamento subsequente.
- (C) evitar sutura das lesões físicas no aparelho genital para comprovação da violência.
- (D) fornecer informações sobre direitos legais de abortamento se a violência resultar em gestação.
- (E) coletar material oral, vaginal e anal em todos os casos.


58

A drenagem linfática de ovários, tubas uterinas e parte superior do corpo uterino é realizada para qual grupo de linfonodos?

- (A) Aórtico/para-aórtico.
- (B) Inguinal profundo.
- (C) Inguinal superficial.
- (D) Obturatório.
- (E) Para-uterino.

59

A figura a seguir representa uma malformação do sistema geniturinário classificada como



- (A) útero bicorno.
- (B) útero didelfo.
- (C) útero rudimentar.
- (D) útero septado.
- (E) útero unicorno.

60

A formação médica cada vez mais especializada e a disponibilidade da tecnologia que cada vez mais substitui os achados clínicos podem influenciar a construção da relação médico-paciente. Assinale a alternativa que é considerada como fator negativo nessa relação.

- (A) A assistência humanizada, considerando o impacto psíquico da doença.
- (B) Chamar pelo nome e ser centrada no problema de saúde.
- (C) A conduta baseada na experiência pessoal.
- (D) A empatia e a afetividade médica.
- (E) A inteligência emocional do médico para lidar com cada paciente em específico.

Realização



instituto aacp