



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T1445063N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (PEDIATRIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

01

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-dagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

2

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

3

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

4

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’”.
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

5

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

6

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

7

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

8

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

9

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

10

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

Matemática

11

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{15}{4}$

(C) $\frac{1}{15}$

(D) $\frac{4}{5}$

(E) $\frac{4}{15}$

12

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

13

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

14

Sendo $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

15

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

Informática

16

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

17

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

18

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

19

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

20

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

Conhecimentos Específicos

21

Um paciente de 10 anos, com histórico de anemia falciforme, é atendido em pronto-socorro com priapismo há cerca de 2 horas. Quanto às condutas para esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Transfusão de concentrado de hemácias e avaliação de urologista.
- (B) Hidratação vigorosa, analgesia e avaliação de urologista apenas se refratário ao tratamento inicial.
- (C) Analgesia, concentrado de hemácias e avaliação de urologista apenas se não houve resposta satisfatória.
- (D) Apenas analgesia. Se não houver melhora em 4 horas, está indicada exsanguineotransfusão.
- (E) Encaminhamento imediato para urologista para irrigação de corpo cavernoso com epinefrina.

22

Paciente de 3 anos é atendido no pronto-socorro com tosse, prostração e febre há dois dias. Houve piora do quadro, com dispneia e vômitos. Ao exame, apresentava taquidispneia e saturação de 91% em ar ambiente. Ausculta pulmonar com murmúrio diminuído à direita. Realizada radiografia de tórax com presença de opacificação em lobo inferior de pulmão direito. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A indicação inicial é de antibiótico com cobertura para estafilococo, por ser o agente mais comum da doença.
- (B) A coleta de hemocultura é indicada devido a sua alta especificidade e sua positividade em cerca de 50% dos casos.
- (C) O quadro sugere pneumonia atípica, com tratamento direcionado contra bactérias gram-negativas entéricas.
- (D) O antibiótico de primeira escolha para tratamento ambulatorial de quadros como esse é a azitromicina.
- (E) Havendo indicação de tratamento endovenoso, a primeira escolha nesse caso é a penicilina G cristalina.

23

Em relação ao diagnóstico clínico de hipotireoidismo na infância e na adolescência, é correto afirmar que

- (A) ganho de peso é a queixa mais comum.
- (B) o hipotireoidismo na adolescência pode ocasionar puberdade precoce.
- (C) queixa de baixa estatura, sinais de anemia e taquicardia ao exame físico são indicativos da doença.
- (D) aumento de volume tireoidiano não é frequente, devendo-se investigar outras causas.
- (E) pode haver desaceleração do crescimento sem comprometimento da estatura final, mesmo sem tratamento.

24

As helmintíases transmitidas pelo solo são causadas por um grupo de parasitas intestinais, transmitidas ao homem após contaminação fecal do solo. Em relação a essas parasitoses, assinale a alternativa correta.

- (A) A ancilostomíase é causada pelo helminto mais prevalente no mundo, de coloração leitosa e que possui o macho e a fêmea.
- (B) O *Ascaris lumbricoides* causa infestação no intestino grosso, principalmente no colón descendente.
- (C) A trichiuríase ou tricocefalíase geralmente é assintomática ou com manifestações leves, na presença de poucos vermes e crianças saudáveis.
- (D) Pamoato de pirantel é o tratamento de primeira linha contra tricuriíase.
- (E) Ivermectina tem sido considerada a droga de primeira escolha no tratamento da ancilostomíase.

25

O aleitamento materno apresenta vantagens amplamente conhecidas tanto na saúde materno-infantil quanto para a saúde global. A respeito da amamentação, é correto afirmar que

- (A) algumas mães podem demorar para iniciar a produção de colostro. Nesse caso, se for observada baixa produção no primeiro dia de vida, iniciar 30 ml de complemento com fórmula até melhora.
- (B) o RN utiliza o tecido adiposo como fonte energética nos primeiros dias, o que impacta na perda ponderal observada nos primeiros dias de vida.
- (C) alguns estudos têm demonstrado que a administração de ocitocina durante o parto poderia contribuir com a amamentação por estimular a sucção do RN.
- (D) perda de peso nos primeiros dias de vida acima de 10% indica o início de complementação com fórmulas artificiais.
- (E) atualmente, para a introdução de leite materno via oral para RN prematuros, é recomendado ofertá-lo no copinho, devendo evitar uso de sonda-peito.

26

Na suspeita de uma intoxicação por overdose de opioides, em uma criança com pulsos, mas sem respiração adequada ou com “gasping”, é aconselhada a administração de

- (A) adrenalina.
- (B) flumazenil.
- (C) adenosina.
- (D) naloxona.
- (E) amiodarona.

27

RN prematuro, gestação interrompida com idade gestacional de 28 semanas por doença hipertensiva da gestação, foi surfactado e permaneceu em jejum por 72 horas devido à instabilidade hemodinâmica. Após, foi iniciada dieta com leite materno e fórmula infantil para prematuro. Foi extubado com 18 dias de vida. Com 20 dias de vida, evoluiu com distensão abdominal, sangue nas fezes e alguns episódios de apneia. Foi solicitada radiografia abdominal, com presença de pneumatoses e distensão de alças. Diante do exposto, a hipótese diagnóstica é

- (A) sepse por megacólon congênito.
- (B) alergia à proteína do leite de vaca.
- (C) obstrução intestinal por volvo.
- (D) enterocolite necrosante.
- (E) intolerância à lactose.

28

A icterícia é frequente no período neonatal, sendo que se manifesta através de aumento dos níveis de bilirrubinas. Em relação à icterícia neonatal, é correto afirmar que

- (A) apenas aumentos na bilirrubina indireta acima de 10mg/dl são capazes de produzir a icterícia no RN.
- (B) valores acima de 16mg/dl da bilirrubina transcutânea (bilirrubinômetros) devem ser confirmados através da dosagem sérica da bilirrubina total.
- (C) a maior parte das icterícias no período neonatal é causada por uma adaptação ao metabolismo da bilirrubina e é denominada de icterícia fisiológica.
- (D) a vantagem dos aparelhos de fototerapia que usam lâmpada de LED é que eles possuem maior emissão de luz infravermelha.
- (E) no tratamento da icterícia prolongada, causada pela síndrome da icterícia do leite materno, o aleitamento materno nunca deve ser suspenso.

29

São recomendadas para a alta hospitalar dos recém-nascidos a termo, potencialmente saudáveis, algumas práticas clínicas pré-alta e a continuidade do cuidado ambulatorial. Em relação a essas recomendações e práticas, assinale a alternativa correta.

- (A) Orienta-se a realização do teste de triagem neonatal biológica (teste do pezinho) entre 24 horas a sete dias de vida e após, no mínimo, quatro alimentações plenas.
- (B) Garantir a administração da Vitamina K e a vacina anti-hepatite A.
- (C) Na prevenção de síndrome da morte súbita, orientar o posicionamento lateral (direita ou esquerda) para dormir.
- (D) Observação e avaliação da amamentação e aplicação do protocolo de Bristol para avaliar o frênulo lingual.
- (E) O RN deve dormir próximo dos pais, podendo ou não compartilhar a mesma cama.

30

Um RNT nascido de parto normal com 38 semanas, peso de 2890g, apresentou perímetro cefálico (PC) de 31 cm. Foi realizado pré-natal com ultrassom de 32 semanas que sugeriu PC reduzido. Coletaram-se exames para avaliação de infecções congênitas que vieram normais. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Na investigação, se houver diminuição do volume cerebral e disgenesia de corpo caloso, a hipótese mais provável é de microcefalia vera.
- (B) A microcefalia pode causar déficit cognitivo e epilepsia, porém não afeta fala, visão e audição.
- (C) Exposição a drogas ou substâncias tóxicas pode ser causas de microcefalia.
- (D) Na investigação etiológica, o exame de escolha é a tomografia de crânio, mostrando-se superior à ressonância nuclear magnética para esse fim.
- (E) Se houver presença de calcificações subcorticais, deve-se investigar causas genéticas como as síndromes de Agelman e Rett.

31

A bronquiolite viral aguda é uma doença de elevada morbidade em todo o mundo, principalmente nos meses de inverno. Sobre essa patologia, é correto afirmar que

- (A) a febre não é muito comum na fase prodômica, manifestando-se com maior intensidade no estado de doença.
- (B) os principais achados radiológicos são: hiperinsuflação torácica focal e hipotransparência.
- (C) pacientes com histórico de prematuridade, ausência de aleitamento materno e tabagismo passivo apresentam risco de apresentações mais graves.
- (D) o tratamento farmacológico de primeira linha é a oxigenoterapia, beta-2 agonista e corticoide sistêmico.
- (E) apresenta gravidade variável e, em geral, manifesta-se através de formas moderadas que podem evoluir para apresentações graves.

32

Diante de um paciente com obstrução de vias aéreas superiores, o exame físico é essencial para avaliação da gravidade da obstrução e condução do tratamento. Em relação ao manejo das obstruções, assinale a alternativa correta.

- (A) O exame endoscópio de via aérea pode ser necessário e sempre é realizado com aparelho flexível.
- (B) O tratamento da laringite viral aguda é feito com adrenalina intramuscular, seguida de nebulização com adrenalina.
- (C) A supraglotoplastia é um procedimento no manejo da laringomalácia.
- (D) Em relação à laringomalácia, a conduta inicial é a realização de traqueostomia.
- (E) No caso de hemangioma de via aérea, o tratamento de escolha é a exérese com laser.

33

A pitíriase versicolor é uma infecção fúngica superficial frequente. Em relação a essa infecção, é correto afirmar que

- (A) os fatores de risco para desenvolvimento incluem temperaturas quentes, alta umidade, imunossupressão, pele oleosa e uso de corticoterapia.
- (B) é mais comum em crianças abaixo dos 5 anos e em clima temperado.
- (C) o fungo causador não é encontrado na pele normal, apenas na vigência de infecção.
- (D) o diagnóstico é através de biópsia e as lesões são sempre hipopigmentadas.
- (E) se após 4 semanas de tratamento a hipopigmentação persistir, está indicado novo tratamento por falha terapêutica.

34

O quadro de dor abdominal associada à alteração do hábito intestinal pode corresponder à síndrome do intestino irritável. Qual das alternativas apresenta critérios diagnósticos dessa síndrome?

- (A) São, ao todo, 5 critérios, sendo necessária a ocorrência de pelo menos 3.
- (B) Todos os critérios devem ocorrer por pelo menos 4 meses antes do diagnóstico.
- (C) Em uma criança constipada, um dos critérios é a melhora da dor, após a resolução da constipação.
- (D) A dor abdominal deve ocorrer pelo menos 10 dias por mês associada com outros sintomas.
- (E) Faz parte dos critérios dor abdominal associada com alteração na frequência das fezes.

35

Em relação à toxoplasmose congênita, é correto afirmar que

- (A) o grau de comprometimento do concepto é menor quando a infecção ocorre no início da gestação.
- (B) o risco de transmissão materno-fetal é em torno de 40%, e vai diminuindo com o avançar da gestação.
- (C) a doença sistêmica pode, eventualmente, estar associada à miocardite e/ou a hidropisia fetal.
- (D) no líquido, em casos de meningoencefalite, ocorre pleocitose mononuclear com valores de proteína e glicose normais.
- (E) os anticorpos IgM, por atravessarem a placenta, podem estar presentes na circulação sanguínea fetal mesmo sem infecção congênita.

36

Um paciente de 3 anos é atendido no pronto-socorro com quadro de 5 dias de febre. Mãe refere que o paciente vem apresentando dor abdominal e vômitos persistentes. Refere também o surgimento de exantema em todo o corpo. O pediatra suspeitou de dengue. Em relação à classificação de risco e às condutas nesse paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem classificação de risco C, com internamento hospitalar e hidratação venosa com reavaliação clínica periódica.
- (B) Tem classificação de risco B, com internamento hospitalar e hidratação venosa e quantificação da diurese.
- (C) Tem classificação de risco C, com internação em leito de UTI para melhor monitorização.
- (D) Tem classificação de risco A, alta com orientações de manter hidratação oral e buscar atendimento se houver piora.
- (E) Tem classificação de risco B. Manter em observação hospitalar e hidratação oral.

37

A artrite idiopática juvenil é a doença reumática crônica mais comum da infância e uma causa frequente de incapacidade física. Em relação a essa patologia, é correto afirmar que

- (A) a doença poliarticular, também chamada de doença de Still, é mais comum na adolescência.
- (B) o subtipo mais comum é o oligoarticular ou pauciarticular, que acomete crianças em idade mais jovem.
- (C) a forma oligoarticular pode apresentar sintomas como febre baixa, fadiga e mal-estar.
- (D) a forma poliarticular apresenta sempre o fator reumatoide positivo.
- (E) classificam-se como de início juvenil os quadros que começam antes dos 14 anos de idade.

38

O esforço do trabalho de parto pode, ocasionalmente, traumatizar fisicamente o recém-nascido. Dentre esses traumas, encontra-se a lesão do plexo braquial. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- (A) A paralisia de Erb-Duchenne envolve as raízes de C7/C8 a T1.
- (B) Fisioterapia só pode ser iniciada com 1 mês de vida, com uso de talas tipo "Estátua da Liberdade".
- (C) No exame físico, na paralisia de Klumpke, o reflexo de preensão palmar está presente e o reflexo de Moro ausente.
- (D) Se as raízes nervosas estiverem intactas, o prognóstico para recuperação completa é em torno de 90%.
- (E) A cirurgia tem sido recomendada quando existe perda da função do bíceps com 1 ano de idade.

39

Um RNT nasceu em apneia. Realizados os passos iniciais, foi constatada FC de 50 bpm. Foram realizados 30 segundos de Ventilação com Pressão Positiva (VPP) em ar ambiente, sem melhora. A técnica foi corrigida e mais 30 segundos de VPP em ar ambiente foram realizados, com FC 80 bpm e apneia. Qual é a conduta na sequência?

- (A) Realizar mais 30 segundos de VPP com oxigênio a 100%.
- (B) Iniciar compressões cardíacas e adrenalina a cada 3 a 5 minutos.
- (C) Realizar VPP com oxigênio a 30%, reavaliando após 30 segundos.
- (D) Compressões cardíacas e considerar intubação orotraqueal.
- (E) Proceder a intubação orotraqueal.

40

Paciente de 8 anos evoluiu com quadro de palidez e cansaço com piora progressiva, com início há 15 dias. Observada anemia (Hb 5,2 g/dl), foram solicitados outros exames, com aumento da desidrogenase láctica, da bilirrubina total e dos reticulócitos, com Coombs direto positivo. Qual é a hipótese diagnóstica?

- (A) Anemia ferropriva.
- (B) Anemia de doença aguda.
- (C) Aplasia de medula.
- (D) Anemia hemolítica autoimune.
- (E) Deficiência de G6PD.

41

As vítimas de queimaduras graves devem ser tratadas seguindo protocolo de trauma, com cuidados intensivos. A respeito desse tipo de acidente, é correto afirmar que

- (A) nas primeiras 24 horas da queimadura, ocorre diminuição importante da liberação do hormônio adrenocorticotrófico.
- (B) a intoxicação por monóxido de carbono é a causa mais frequente de morte após inalação de fumaça.
- (C) a retirada precoce das áreas com queimadura de 3º grau está associada a aumento do risco de sepse.
- (D) na presença de hipertermia, é necessária investigação de foco infeccioso e, se ausente, está indicado o início de antibióticos.
- (E) a presença de edema generalizado é causada por excesso de hidratação, o que deve ser evitado.

42

As taquicardias supraventriculares causam aumentos súbitos dos batimentos cardíacos e se originam nos átrios. Em relação ao diagnóstico e tratamento dessa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Na indicação de cardioversão sincronizada, é indicado iniciar com 0,5 a 1 J/kg.
- (B) Na avaliação do ritmo durante o ECG, é possível notar a presença de ondas P com QRS alargado.
- (C) No ECG, o intervalo RR é variável.
- (D) Na indicação de adenosina, a dose inicial é de 0,2 mg/kg.
- (E) Manobras vagais estão contraindicadas em casos de taquicardia supraventriculares.

43

Sobre a osteomielite hematogênica aguda, é correto afirmar que

- (A) os membros superiores são mais afetados que os membros inferiores.
- (B) a radiografia é o melhor exame para se fazer o diagnóstico precoce.
- (C) a ultrassonografia não é um exame bom para avaliar complicações como derrame articular.
- (D) o diagnóstico diferencial deve incluir leucemia e tumores ósseos.
- (E) o tratamento é eminentemente clínico, com procedimentos cirúrgicos contraindicados pelo risco de sequelas.

44

Uma gestante de 39 semanas é internada em trabalho de parto. Pelo ultrassom, observa-se que o feto tem hérnia diafragmática congênita. Em relação ao caso, é correto afirmar que

- (A) esses pacientes costumam ter deficiência de surfactante, e sua administração é indicada, com bons resultados.
- (B) a cardiopatia associada mais comum, encontrada nesses pacientes, é a tetralogia de Fallot.
- (C) esses pacientes costumam precisar de intubação imediata em sala de parto.
- (D) o tratamento cirúrgico é uma emergência médica, devendo ser realizado o mais precocemente possível.
- (E) é comum associação com hipoplasia pulmonar e não há indícios de associação com hipertensão pulmonar.

45

Quanto à localização dos tumores de sistema nervoso central em pediatria, assinale a alternativa correta.

- (A) Em menores de 2 anos, predominam os tumores supratentoriais.
- (B) Menos da metade se encontra na fossa posterior.
- (C) O meduloblastoma é um tumor supratentorial.
- (D) O craniofaringioma só é encontrado na região anterior do cérebro.
- (E) O ependimoma é comumente encontrado na região supratentorial.

46

Os surtos inflamatórios da dermatite atópica podem ser controlados pelo uso correto dos medicamentos tópicos. Sobre o controle das crises, é correto afirmar que

- (A) o tracolimus pomada só está indicado em maiores de 2 anos.
- (B) a mometasona é considerada um corticoide tópico de baixa potência.
- (C) os inibidores tópicos da calcineurina estão contraindicados na faixa etária pediátrica.
- (D) associar um curativo oclusivo em áreas de liquenificação aumenta a absorção do medicamento.
- (E) apenas os corticoides tópicos de baixa potência estão indicados em crianças.

47

Na reanimação neonatal, em sala de parto, havendo necessidade de administração de adrenalina, é correto afirmar que

- (A) no máximo duas doses de adrenalina em tubo orotraqueal (TOT) podem ser realizadas.
- (B) a dose de adrenalina em TOT é no máximo de 1ml/kg da solução 1:1.000.
- (C) a dose da adrenalina endovenosa é de 0,1 a 0,3 ml/kg da solução 1:10.000.
- (D) obtém-se a solução 1:10.000 ao misturar 1ml de adrenalina 1:1.000 com 10 ml de solução fisiológica.
- (E) a adrenalina deve ser repetida a cada 2 minutos.

48

Em relação à prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR), assinale a alternativa correta.

- (A) O palivizumabe deve ser aplicado na dose de 20mg/kg, no período de maior circulação do vírus.
- (B) A prevenção pode ser feita com a administração da vacina, porém no momento não está liberada para uso em nosso país.
- (C) A imunização passiva com o anticorpo monoclonal humanizado (palivizumabe) ajuda a prevenir infecções pelo vírus influenza.
- (D) É recomendado o uso de palivizumabe para crianças prematuras até 1 ano de idade que nasceram com idade gestacional menor de 27 semanas.
- (E) O palivizumabe deve ser aplicado por via intramuscular em até cinco doses mensais consecutivas.

49

Em qual(is) das seguintes situações, durante uma consulta com adolescente, o sigilo deve ser interrompido?

- (A) Diagnóstico de doenças graves, quadros depressivos e outros transtornos do campo mental.
- (B) Prescrição de contraceptivos.
- (C) Experimentação de psicoativos (sem sinais de dependência).
- (D) Orientação sexual, conflitos com identidade de gênero.
- (E) Iniciação sexual (excluída violência por sedução ou imposição explícita).

50

O treinamento esfinteriano é um marco importante do desenvolvimento das crianças. A literatura enfatiza a importância de a criança apresentar os sinais de prontidão, ou seja, habilidades físicas e psicológicas específicas antes de iniciar o treinamento. Os principais sinais de prontidão estão relacionados à capacidade da criança de, **EXCETO**

- (A) saber puxar as roupas para cima e para baixo.
- (B) possuir um vocabulário simples referente ao treinamento esfinteriano.
- (C) entender e responder a instruções e seguir comandos simples.
- (D) dizer “não” como sinal de independência.
- (E) ficar seco por 4 horas ou mais durante o dia.

51

Em relação ao crescimento durante a gestação e após o nascimento, assinale a alternativa correta.

- (A) Em recém-nascido com estatura adequada, porém com peso comprometido, provavelmente, houve comprometimento intrauterino em quase toda a gestação.
- (B) Em algumas crianças, é observado um pequeno estirão de crescimento ao redor dos 4 aos 5 anos.
- (C) Durante a puberdade, as meninas apresentam o estirão em média 2 anos depois que os meninos.
- (D) No estirão puberal, o pico de velocidade de crescimento das meninas é de 8,5 cm/ano.
- (E) No estirão puberal, o pico de velocidade de crescimento dos meninos é de 7,5 cm/ano.

52

A Persistência do Canal Arterial (PCA) é um problema que acomete recém-nascidos pré-termos. Uma das medidas terapêuticas seria o fechamento farmacológico, com alguma das seguintes medicações:

- (A) ibuprofeno, paracetamol ou prostaglandina.
- (B) paracetamol, indometacina ou ibuprofeno.
- (C) indometacina, ibuprofeno ou citrato de cafeína.
- (D) indometacina, paracetamol ou citrato de cafeína.
- (E) prostaglandina, indometacina ou paracetamol.

53

Uma paciente de 11 anos estava hospitalizada devido à artrite em cotovelo direito muito dolorosa. Foram prescritos apenas antibiótico endovenoso e prednisolona. Foi realizada punção articular com secreção serossanguinolenta, com cultura negativa. A paciente evoluiu com dor em outras articulações. Foi solicitada avaliação de hematologista, realizada punção de medula óssea e diagnosticada leucemia. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de corticosteroides previamente não interfere na análise do mielograma.
- (B) Está contraindicado o uso de acetaminofeno no controle da dor. Deve-se usar apenas codeína.
- (C) A dor óssea que acompanha a leucemia é semelhante à dor do crescimento (vespertina e melhora com repouso).
- (D) Durante o tratamento, pode-se usar alopurinol e furosemida na prevenção da síndrome de lise tumoral.
- (E) Crianças com leucemia que receberam corticosteroides previamente são de baixo risco e possuem menor risco de complicações.

54

Lactente de 7 meses é atendido com quadro de tosse, coriza e obstrução nasal. Mãe refere que evoluiu com febre baixa e cansaço. Está com boa aceitação alimentar e irmão mais velho está com sintomas de resfriado. Ao exame, está em bom estado geral, ausculta com sibilos difusos, tiragem subcostal leve e discreta taquipneia, com frequência cardíaca normal. Em relação ao caso, o diagnóstico mais provável é de

- (A) pneumonia atípica, e o tratamento é ambulatorial com amoxicilina.
- (B) bronquiolite viral, e o tratamento deve ser realizado com corticosteroides orais e azitromicina.
- (C) pneumonia, e o tratamento é hospitalar com ampicilina e gentamicina
- (D) bronquiolite viral, e o tratamento pode ser apenas de suporte e sintomáticos.
- (E) tuberculose, e o tratamento é ambulatorial com pirazinamida e ácido fólico.

55

Em relação à Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU), é correto afirmar que

- (A) é caracterizada pela tríade: anemia, uremia e hematúria.
- (B) a SHU típica ou pós-diarreica é causada por infecção pela *Escherichia coli*.
- (C) ocorre hemólise por degradação das hemácias pela toxina liberada pelas bactérias.
- (D) é comum, nos exames, a presença de alterações da função renal e aumento do número de plaquetas.
- (E) o teste de Coombs direto é positivo.

56

Recém-nascido, filho de pais primos de primeiro grau e hígidos, apresenta algumas alterações como: microcefalia, microftalmia, malformação do ouvido, rim em ferradura e criptorquidia. Ele tem uma irmã de 7 anos que tem baixa estatura e comprometimento da medula óssea (linfopenia e plaquetopenia) e está investigando pancitopenia de Fanconi. É possível observar os seguintes conceitos nesse caso:

- (A) consanguinidade, padrão de herança autossômico recessivo e expressividade variável.
- (B) consanguinidade, penetrância incompleta e padrão de herança autossômico dominante.
- (C) expressividade variável e padrão de herança autossômico dominante.
- (D) consanguinidade, padrão de herança autossômico dominante e expressividade variável.
- (E) expressividade variável, padrão de herança autossômico recessivo e mutação nova.

57

Durante o acompanhamento de crianças nascidas a termo, qual é o ganho de peso estimado?

- (A) 26 a 31 g/dia entre 3-6 meses.
- (B) 12 a 13 g/dia entre 0-6 meses.
- (C) 7 a 9 g/dia entre 3-6 meses.
- (D) 26 a 31 g/dia entre 0-3 meses.
- (E) 12 a 13 g/dia entre 9-12 meses.

58

O RN filho de mãe diabética apresenta risco de hipoglicemia neonatal. Referente a essa hipoglicemia, é correto afirmar que

- (A) costuma ser ocasionada por baixos níveis de insulina.
- (B) está acompanhada de níveis aumentados de corpos cetônicos.
- (C) é uma hipoglicemia prolongada em função do hiperinsulinismo.
- (D) ocorre juntamente com aumento da lipólise e da produção hepática de glicose.
- (E) o excesso de insulina nesse período inibe a adipogênese.

59

Quanto aos distúrbios do potássio (hipocalemia e hipercalemia), assinale a alternativa correta.

- (A) O excesso de insulina pode causar hipercalemia.
- (B) Na síndrome de lise tumoral, além de hipercalemia e hiperfosfatemia, ocorre hipocalemia.
- (C) A nebulização com salbutamol pode causar aumento dos níveis de potássio.
- (D) O uso de inibidores da ECA pode causar hipercalemia.
- (E) São causa de hipocalemia o hipoaldosteronismo e o uso de diuréticos.

60

Considerando a apendicite aguda na criança, assinale a alternativa correta.

- (A) A tomografia de abdome deve ser realizada no início dos sintomas para diagnóstico precoce.
- (B) Presença de febre alta (acima de 38,5°C) ocorre desde o início do quadro.
- (C) Podem ocorrer diarreia e sintomas urinários associados.
- (D) Nas crianças abaixo de 4 anos, a clínica é mais clássica, o que facilita o diagnóstico mais precoce.
- (E) Clinicamente, a criança se apresenta muito agitada, com dor tipo cólica.

Realização



instituto aacp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T2445063N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (PEDIATRIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

02

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.

Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

2

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

3

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

4

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

5

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

6

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

7

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

8

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepam, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

9

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

10

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

Matemática

11

Cinco pessoas, identificadas como P_1 , P_2 , P_3 , P_4 e P_5 , estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P_3 e P_4 irão fazer o mesmo tipo de exame, P_2 e P_5 irão fazer exames de tipos diferentes e P_2 e P_5 irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P_1 irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P_5 irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P_3 irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P_2 irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P_4 irá fazer o exame de Glicemia.

12

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

13

Se $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

14

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

15

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da

dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

Informática

16

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

17

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

18

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

19

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

20

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

Conhecimentos Específicos

21

Paciente de 3 anos é atendido no pronto-socorro com tosse, prostração e febre há dois dias. Houve piora do quadro, com dispneia e vômitos. Ao exame, apresentava taquidispneia e saturação de 91% em ar ambiente. Ausculta pulmonar com murmúrio diminuído à direita. Realizada radiografia de tórax com presença de opacificação em lobo inferior de pulmão direito. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A indicação inicial é de antibiótico com cobertura para estafilococo, por ser o agente mais comum da doença.
- (B) A coleta de hemocultura é indicada devido a sua alta especificidade e sua positividade em cerca de 50% dos casos.
- (C) O quadro sugere pneumonia atípica, com tratamento direcionado contra bactérias gram-negativas entéricas.
- (D) O antibiótico de primeira escolha para tratamento ambulatorial de quadros como esse é a azitromicina.
- (E) Havendo indicação de tratamento endovenoso, a primeira escolha nesse caso é a penicilina G cristalina.

22

Em relação ao diagnóstico clínico de hipotireoidismo na infância e na adolescência, é correto afirmar que

- (A) ganho de peso é a queixa mais comum.
- (B) o hipotireoidismo na adolescência pode ocasionar puberdade precoce.
- (C) queixa de baixa estatura, sinais de anemia e taquicardia ao exame físico são indicativos da doença.
- (D) aumento de volume tireoidiano não é frequente, devendo-se investigar outras causas.
- (E) pode haver desaceleração do crescimento sem comprometimento da estatura final, mesmo sem tratamento.

23

As helmintíases transmitidas pelo solo são causadas por um grupo de parasitas intestinais, transmitidas ao homem após contaminação fecal do solo. Em relação a essas parasitoses, assinale a alternativa correta.

- (A) A ancilostomíase é causada pelo helminto mais prevalente no mundo, de coloração leitosa e que possui o macho e a fêmea.
- (B) O *Ascaris lumbricoides* causa infestação no intestino grosso, principalmente no colón descendente.
- (C) A trichiuríase ou tricocefalíase geralmente é assintomática ou com manifestações leves, na presença de poucos vermes e crianças saudáveis.
- (D) Pamoato de pirantel é o tratamento de primeira linha contra tricuriase.
- (E) Ivermectina tem sido considerada a droga de primeira escolha no tratamento da ancilostomíase.

24

O aleitamento materno apresenta vantagens amplamente conhecidas tanto na saúde materno-infantil quanto para a saúde global. A respeito da amamentação, é correto afirmar que

- (A) algumas mães podem demorar para iniciar a produção de colostro. Nesse caso, se for observada baixa produção no primeiro dia de vida, iniciar 30 ml de complemento com fórmula até melhora.
- (B) o RN utiliza o tecido adiposo como fonte energética nos primeiros dias, o que impacta na perda ponderal observada nos primeiros dias de vida.
- (C) alguns estudos têm demonstrado que a administração de ocitocina durante o parto poderia contribuir com a amamentação por estimular a sucção do RN.
- (D) perda de peso nos primeiros dias de vida acima de 10% indica o início de complementação com fórmulas artificiais.
- (E) atualmente, para a introdução de leite materno via oral para RN prematuros, é recomendado ofertá-lo no copinho, devendo evitar uso de sonda-peito.

25

Na suspeita de uma intoxicação por overdose de opioides, em uma criança com pulsos, mas sem respiração adequada ou com “gasping”, é aconselhada a administração de

- (A) adrenalina.
- (B) flumazenil.
- (C) adenosina.
- (D) naloxona.
- (E) amiodarona.

26

RN prematuro, gestação interrompida com idade gestacional de 28 semanas por doença hipertensiva da gestação, foi surfactado e permaneceu em jejum por 72 horas devido à instabilidade hemodinâmica. Após, foi iniciada dieta com leite materno e fórmula infantil para prematuro. Foi extubado com 18 dias de vida. Com 20 dias de vida, evoluiu com distensão abdominal, sangue nas fezes e alguns episódios de apneia. Foi solicitada radiografia abdominal, com presença de pneumatoses e distensão de alças. Diante do exposto, a hipótese diagnóstica é

- (A) sepse por megacólon congênito.
- (B) alergia à proteína do leite de vaca.
- (C) obstrução intestinal por volvo.
- (D) enterocolite necrosante.
- (E) intolerância à lactose.

27

A icterícia é frequente no período neonatal, sendo que se manifesta através de aumento dos níveis de bilirrubinas. Em relação à icterícia neonatal, é correto afirmar que

- (A) apenas aumentos na bilirrubina indireta acima de 10mg/dl são capazes de produzir a icterícia no RN.
- (B) valores acima de 16mg/dl da bilirrubina transcutânea (bilirrubinômetros) devem ser confirmados através da dosagem sérica da bilirrubina total.
- (C) a maior parte das icterícias no período neonatal é causada por uma adaptação ao metabolismo da bilirrubina e é denominada de icterícia fisiológica.
- (D) a vantagem dos aparelhos de fototerapia que usam lâmpada de LED é que eles possuem maior emissão de luz infravermelha.
- (E) no tratamento da icterícia prolongada, causada pela síndrome da icterícia do leite materno, o aleitamento materno nunca deve ser suspenso.

28

São recomendadas para a alta hospitalar dos recém-nascidos a termo, potencialmente saudáveis, algumas práticas clínicas pré-alta e a continuidade do cuidado ambulatorial. Em relação a essas recomendações e práticas, assinale a alternativa correta.

- (A) Orienta-se a realização do teste de triagem neonatal biológica (teste do pezinho) entre 24 horas a sete dias de vida e após, no mínimo, quatro alimentações plenas.
- (B) Garantir a administração da Vitamina K e a vacina anti-hepatite A.
- (C) Na prevenção de síndrome da morte súbita, orientar o posicionamento lateral (direita ou esquerda) para dormir.
- (D) Observação e avaliação da amamentação e aplicação do protocolo de Bristol para avaliar o frênulo lingual.
- (E) O RN deve dormir próximo dos pais, podendo ou não compartilhar a mesma cama.

29

Um RNT nascido de parto normal com 38 semanas, peso de 2890g, apresentou perímetro cefálico (PC) de 31 cm. Foi realizado pré-natal com ultrassom de 32 semanas que sugeriu PC reduzido. Coletaram-se exames para avaliação de infecções congênitas que vieram normais. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Na investigação, se houver diminuição do volume cerebral e disgenesia de corpo caloso, a hipótese mais provável é de microcefalia vera.
- (B) A microcefalia pode causar déficit cognitivo e epilepsia, porém não afeta fala, visão e audição.
- (C) Exposição a drogas ou substâncias tóxicas pode ser causas de microcefalia.
- (D) Na investigação etiológica, o exame de escolha é a tomografia de crânio, mostrando-se superior à ressonância nuclear magnética para esse fim.
- (E) Se houver presença de calcificações subcorticais, deve-se investigar causas genéticas como as síndromes de Agelman e Rett.

30

A bronquiolite viral aguda é uma doença de elevada morbidade em todo o mundo, principalmente nos meses de inverno. Sobre essa patologia, é correto afirmar que

- (A) a febre não é muito comum na fase prodômica, manifestando-se com maior intensidade no estado de doença.
- (B) os principais achados radiológicos são: hiperinsuflação torácica focal e hipotransparência.
- (C) pacientes com histórico de prematuridade, ausência de aleitamento materno e tabagismo passivo apresentam risco de apresentações mais graves.
- (D) o tratamento farmacológico de primeira linha é a oxigenoterapia, beta-2 agonista e corticoide sistêmico.
- (E) apresenta gravidade variável e, em geral, manifesta-se através de formas moderadas que podem evoluir para apresentações graves.

31

Diante de um paciente com obstrução de vias aéreas superiores, o exame físico é essencial para avaliação da gravidade da obstrução e condução do tratamento. Em relação ao manejo das obstruções, assinale a alternativa correta.

- (A) O exame endoscópio de via aérea pode ser necessário e sempre é realizado com aparelho flexível.
- (B) O tratamento da laringite viral aguda é feito com adrenalina intramuscular, seguida de nebulização com adrenalina.
- (C) A supraglotoplastia é um procedimento no manejo da laringomalácia.
- (D) Em relação à laringomalácia, a conduta inicial é a realização de traqueostomia.
- (E) No caso de hemangioma de via aérea, o tratamento de escolha é a exérese com laser.

32

A pitíriase versicolor é uma infecção fúngica superficial frequente. Em relação a essa infecção, é correto afirmar que

- (A) os fatores de risco para desenvolvimento incluem temperaturas quentes, alta umidade, imunossupressão, pele oleosa e uso de corticoterapia.
- (B) é mais comum em crianças abaixo dos 5 anos e em clima temperado.
- (C) o fungo causador não é encontrado na pele normal, apenas na vigência de infecção.
- (D) o diagnóstico é através de biópsia e as lesões são sempre hipopigmentadas.
- (E) se após 4 semanas de tratamento a hipopigmentação persistir, está indicado novo tratamento por falha terapêutica.

33

O quadro de dor abdominal associada à alteração do hábito intestinal pode corresponder à síndrome do intestino irritável. Qual das alternativas apresenta critérios diagnósticos dessa síndrome?

- (A) São, ao todo, 5 critérios, sendo necessária a ocorrência de pelo menos 3.
- (B) Todos os critérios devem ocorrer por pelo menos 4 meses antes do diagnóstico.
- (C) Em uma criança constipada, um dos critérios é a melhora da dor, após a resolução da constipação.
- (D) A dor abdominal deve ocorrer pelo menos 10 dias por mês associada com outros sintomas.
- (E) Faz parte dos critérios dor abdominal associada com alteração na frequência das fezes.

34

Em relação à toxoplasmose congênita, é correto afirmar que

- (A) o grau de comprometimento do concepto é menor quando a infecção ocorre no início da gestação.
- (B) o risco de transmissão materno-fetal é em torno de 40%, e vai diminuindo com o avançar da gestação.
- (C) a doença sistêmica pode, eventualmente, estar associada à miocardite e/ou a hidropisia fetal.
- (D) no líquido, em casos de meningoencefalite, ocorre pleocitose mononuclear com valores de proteína e glicose normais.
- (E) os anticorpos IgM, por atravessarem a placenta, podem estar presentes na circulação sanguínea fetal mesmo sem infecção congênita.

35

Um paciente de 3 anos é atendido no pronto-socorro com quadro de 5 dias de febre. Mãe refere que o paciente vem apresentando dor abdominal e vômitos persistentes. Refere também o surgimento de exantema em todo o corpo. O pediatra suspeitou de dengue. Em relação à classificação de risco e às condutas nesse paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem classificação de risco C, com internamento hospitalar e hidratação venosa com reavaliação clínica periódica.
- (B) Tem classificação de risco B, com internamento hospitalar e hidratação venosa e quantificação da diurese.
- (C) Tem classificação de risco C, com internação em leito de UTI para melhor monitorização.
- (D) Tem classificação de risco A, alta com orientações de manter hidratação oral e buscar atendimento se houver piora.
- (E) Tem classificação de risco B. Manter em observação hospitalar e hidratação oral.

36

A artrite idiopática juvenil é a doença reumática crônica mais comum da infância e uma causa frequente de incapacidade física. Em relação a essa patologia, é correto afirmar que

- (A) a doença poliarticular, também chamada de doença de Still, é mais comum na adolescência.
- (B) o subtipo mais comum é o oligoarticular ou pauciarticular, que acomete crianças em idade mais jovem.
- (C) a forma oligoarticular pode apresentar sintomas como febre baixa, fadiga e mal-estar.
- (D) a forma poliarticular apresenta sempre o fator reumatoide positivo.
- (E) classificam-se como de início juvenil os quadros que começam antes dos 14 anos de idade.

37

O esforço do trabalho de parto pode, ocasionalmente, traumatizar fisicamente o recém-nascido. Dentre esses traumas, encontra-se a lesão do plexo braquial. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- (A) A paralisia de Erb-Duchenne envolve as raízes de C7/C8 a T1.
- (B) Fisioterapia só pode ser iniciada com 1 mês de vida, com uso de talas tipo "Estátua da Liberdade".
- (C) No exame físico, na paralisia de Klumpke, o reflexo de preensão palmar está presente e o reflexo de Moro ausente.
- (D) Se as raízes nervosas estiverem intactas, o prognóstico para recuperação completa é em torno de 90%.
- (E) A cirurgia tem sido recomendada quando existe perda da função do bíceps com 1 ano de idade.

38

Um RNT nasceu em apneia. Realizados os passos iniciais, foi constatada FC de 50 bpm. Foram realizados 30 segundos de Ventilação com Pressão Positiva (VPP) em ar ambiente, sem melhora. A técnica foi corrigida e mais 30 segundos de VPP em ar ambiente foram realizados, com FC 80 bpm e apneia. Qual é a conduta na sequência?

- (A) Realizar mais 30 segundos de VPP com oxigênio a 100%.
- (B) Iniciar compressões cardíacas e adrenalina a cada 3 a 5 minutos.
- (C) Realizar VPP com oxigênio a 30%, reavaliando após 30 segundos.
- (D) Compressões cardíacas e considerar intubação orotraqueal.
- (E) Proceder a intubação orotraqueal.

39

Paciente de 8 anos evoluiu com quadro de palidez e cansaço com piora progressiva, com início há 15 dias. Observada anemia (Hb 5,2 g/dl), foram solicitados outros exames, com aumento da desidrogenase láctica, da bilirrubina total e dos reticulócitos, com Coombs direto positivo. Qual é a hipótese diagnóstica?

- (A) Anemia ferropriva.
- (B) Anemia de doença aguda.
- (C) Aplasia de medula.
- (D) Anemia hemolítica autoimune.
- (E) Deficiência de G6PD.

40

As vítimas de queimaduras graves devem ser tratadas seguindo protocolo de trauma, com cuidados intensivos. A respeito desse tipo de acidente, é correto afirmar que

- (A) nas primeiras 24 horas da queimadura, ocorre diminuição importante da liberação do hormônio adrenocorticotrófico.
- (B) a intoxicação por monóxido de carbono é a causa mais frequente de morte após inalação de fumaça.
- (C) a retirada precoce das áreas com queimadura de 3º grau está associada a aumento do risco de sepse.
- (D) na presença de hipertermia, é necessária investigação de foco infeccioso e, se ausente, está indicado o início de antibióticos.
- (E) a presença de edema generalizado é causada por excesso de hidratação, o que deve ser evitado.

41

As taquicardias supraventriculares causam aumentos súbitos dos batimentos cardíacos e se originam nos átrios. Em relação ao diagnóstico e tratamento dessa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Na indicação de cardioversão sincronizada, é indicado iniciar com 0,5 a 1 J/kg.
- (B) Na avaliação do ritmo durante o ECG, é possível notar a presença de ondas P com QRS alargado.
- (C) No ECG, o intervalo RR é variável.
- (D) Na indicação de adenosina, a dose inicial é de 0,2 mg/kg.
- (E) Manobras vagais estão contraindicadas em casos de taquicardia supraventriculares.

42

Sobre a osteomielite hematogênica aguda, é correto afirmar que

- (A) os membros superiores são mais afetados que os membros inferiores.
- (B) a radiografia é o melhor exame para se fazer o diagnóstico precoce.
- (C) a ultrassonografia não é um exame bom para avaliar complicações como derrame articular.
- (D) o diagnóstico diferencial deve incluir leucemia e tumores ósseos.
- (E) o tratamento é eminentemente clínico, com procedimentos cirúrgicos contraindicados pelo risco de sequelas.

43

Uma gestante de 39 semanas é internada em trabalho de parto. Pelo ultrassom, observa-se que o feto tem hérnia diafragmática congênita. Em relação ao caso, é correto afirmar que

- (A) esses pacientes costumam ter deficiência de surfactante, e sua administração é indicada, com bons resultados.
- (B) a cardiopatia associada mais comum, encontrada nesses pacientes, é a tetralogia de Fallot.
- (C) esses pacientes costumam precisar de intubação imediata em sala de parto.
- (D) o tratamento cirúrgico é uma emergência médica, devendo ser realizado o mais precocemente possível.
- (E) é comum associação com hipoplasia pulmonar e não há indícios de associação com hipertensão pulmonar.

44

Quanto à localização dos tumores de sistema nervoso central em pediatria, assinale a alternativa correta.

- (A) Em menores de 2 anos, predominam os tumores supratentoriais.
- (B) Menos da metade se encontra na fossa posterior.
- (C) O meduloblastoma é um tumor supratentorial.
- (D) O craniofaringioma só é encontrado na região anterior do cérebro.
- (E) O ependimoma é comumente encontrado na região supresselar.

45

Os surtos inflamatórios da dermatite atópica podem ser controlados pelo uso correto dos medicamentos tópicos. Sobre o controle das crises, é correto afirmar que

- (A) o tracolimus pomada só está indicado em maiores de 2 anos.
- (B) a mometasona é considerada um corticoide tópico de baixa potência.
- (C) os inibidores tópicos da calcineurina estão contraindicados na faixa etária pediátrica.
- (D) associar um curativo oclusivo em áreas de liquenificação aumenta a absorção do medicamento.
- (E) apenas os corticoides tópicos de baixa potência estão indicados em crianças.

46

Na reanimação neonatal, em sala de parto, havendo necessidade de administração de adrenalina, é correto afirmar que

- (A) no máximo duas doses de adrenalina em tubo orotraqueal (TOT) podem ser realizadas.
- (B) a dose de adrenalina em TOT é no máximo de 1ml/kg da solução 1:1.000.
- (C) a dose da adrenalina endovenosa é de 0,1 a 0,3 ml/kg da solução 1:10.000.
- (D) obtém-se a solução 1:10.000 ao misturar 1ml de adrenalina 1:1.000 com 10 ml de solução fisiológica.
- (E) a adrenalina deve ser repetida a cada 2 minutos.

47

Em relação à prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR), assinale a alternativa correta.

- (A) O palivizumabe deve ser aplicado na dose de 20mg/kg, no período de maior circulação do vírus.
- (B) A prevenção pode ser feita com a administração da vacina, porém no momento não está liberada para uso em nosso país.
- (C) A imunização passiva com o anticorpo monoclonal humanizado (palivizumabe) ajuda a prevenir infecções pelo vírus influenza.
- (D) É recomendado o uso de palivizumabe para crianças prematuras até 1 ano de idade que nasceram com idade gestacional menor de 27 semanas.
- (E) O palivizumabe deve ser aplicado por via intramuscular em até cinco doses mensais consecutivas.

48

Em qual(is) das seguintes situações, durante uma consulta com adolescente, o sigilo deve ser interrompido?

- (A) Diagnóstico de doenças graves, quadros depressivos e outros transtornos do campo mental.
- (B) Prescrição de contraceptivos.
- (C) Experimentação de psicoativos (sem sinais de dependência).
- (D) Orientação sexual, conflitos com identidade de gênero.
- (E) Iniciação sexual (excluída violência por sedução ou imposição explícita).

49

O treinamento esfincteriano é um marco importante do desenvolvimento das crianças. A literatura enfatiza a importância de a criança apresentar os sinais de prontidão, ou seja, habilidades físicas e psicológicas específicas antes de iniciar o treinamento. Os principais sinais de prontidão estão relacionados à capacidade da criança de, EXCETO

- (A) saber puxar as roupas para cima e para baixo.
- (B) possuir um vocabulário simples referente ao treinamento esfincteriano.
- (C) entender e responder a instruções e seguir comandos simples.
- (D) dizer “não” como sinal de independência.
- (E) ficar seco por 4 horas ou mais durante o dia.

50

Um paciente de 10 anos, com histórico de anemia falciforme, é atendido em pronto-socorro com priapismo há cerca de 2 horas. Quanto às condutas para esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Transfusão de concentrado de hemácias e avaliação de urologista.
- (B) Hidratação vigorosa, analgesia e avaliação de urologista apenas se refratário ao tratamento inicial.
- (C) Analgesia, concentrado de hemácias e avaliação de urologista apenas se não houve resposta satisfatória.
- (D) Apenas analgesia. Se não houver melhora em 4 horas, está indicada exsanguineotransfusão.
- (E) Encaminhamento imediato para urologista para irrigação de corpo cavernoso com epinefrina.

51

A Persistência do Canal Arterial (PCA) é um problema que acomete recém-nascidos pré-termos. Uma das medidas terapêuticas seria o fechamento farmacológico, com alguma das seguintes medicações:

- (A) ibuprofeno, paracetamol ou prostaglandina.
- (B) paracetamol, indometacina ou ibuprofeno.
- (C) indometacina, ibuprofeno ou citrato de cafeína.
- (D) indometacina, paracetamol ou citrato de cafeína.
- (E) prostaglandina, indometacina ou paracetamol.

52

Uma paciente de 11 anos estava hospitalizada devido à artrite em cotovelo direito muito dolorosa. Foram prescritos apenas antibiótico endovenoso e prednisolona. Foi realizada punção articular com secreção serossanguinolenta, com cultura negativa. A paciente evoluiu com dor em outras articulações. Foi solicitada avaliação de hematologista, realizada punção de medula óssea e diagnosticada leucemia. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de corticosteroides previamente não interfere na análise do mielograma.
- (B) Está contraindicado o uso de acetaminofeno no controle da dor. Deve-se usar apenas codeína.
- (C) A dor óssea que acompanha a leucemia é semelhante à dor do crescimento (vespertina e melhora com repouso).
- (D) Durante o tratamento, pode-se usar alopurinol e furosemida na prevenção da síndrome de lise tumoral.
- (E) Crianças com leucemia que receberam corticosteroides previamente são de baixo risco e possuem menor risco de complicações.

53

Lactente de 7 meses é atendido com quadro de tosse, coriza e obstrução nasal. Mãe refere que evoluiu com febre baixa e cansaço. Está com boa aceitação alimentar e irmão mais velho está com sintomas de resfriado. Ao exame, está em bom estado geral, ausculta com sibilos difusos, tiragem subcostal leve e discreta taquipneia, com frequência cardíaca normal. Em relação ao caso, o diagnóstico mais provável é de

- (A) pneumonia atípica, e o tratamento é ambulatorial com amoxicilina.
- (B) bronquiolite viral, e o tratamento deve ser realizado com corticosteroides orais e azitromicina.
- (C) pneumonia, e o tratamento é hospitalar com ampicilina e gentamicina
- (D) bronquiolite viral, e o tratamento pode ser apenas de suporte e sintomáticos.
- (E) tuberculose, e o tratamento é ambulatorial com pirazinamida e ácido fólico.

54

Em relação à Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU), é correto afirmar que

- (A) é caracterizada pela tríade: anemia, uremia e hematúria.
- (B) a SHU típica ou pós-diarreica é causada por infecção pela *Escherichia coli*.
- (C) ocorre hemólise por degradação das hemácias pela toxina liberada pelas bactérias.
- (D) é comum, nos exames, a presença de alterações da função renal e aumento do número de plaquetas.
- (E) o teste de Coombs direto é positivo.

55

Recém-nascido, filho de pais primos de primeiro grau e hígidos, apresenta algumas alterações como: microcefalia, microftalmia, malformação do ouvido, rim em ferradura e criptorquidia. Ele tem uma irmã de 7 anos que tem baixa estatura e comprometimento da medula óssea (linfopenia e plaquetopenia) e está investigando pancitopenia de Fanconi. É possível observar os seguintes conceitos nesse caso:

- (A) consanguinidade, padrão de herança autossômico recessivo e expressividade variável.
- (B) consanguinidade, penetrância incompleta e padrão de herança autossômico dominante.
- (C) expressividade variável e padrão de herança autossômico dominante.
- (D) consanguinidade, padrão de herança autossômico dominante e expressividade variável.
- (E) expressividade variável, padrão de herança autossômico recessivo e mutação nova.

56

Durante o acompanhamento de crianças nascidas a termo, qual é o ganho de peso estimado?

- (A) 26 a 31 g/dia entre 3-6 meses.
- (B) 12 a 13 g/dia entre 0-6 meses.
- (C) 7 a 9 g/dia entre 3-6 meses.
- (D) 26 a 31 g/dia entre 0-3 meses.
- (E) 12 a 13 g/dia entre 9-12 meses.

57

O RN filho de mãe diabética apresenta risco de hipoglicemia neonatal. Referente a essa hipoglicemia, é correto afirmar que

- (A) costuma ser ocasionada por baixos níveis de insulina.
- (B) está acompanhada de níveis aumentados de corpos cetônicos.
- (C) é uma hipoglicemia prolongada em função do hiperinsulinismo.
- (D) ocorre juntamente com aumento da lipólise e da produção hepática de glicose.
- (E) o excesso de insulina nesse período inibe a adipogênese.

58

Quanto aos distúrbios do potássio (hipocalemia e hipercalemia), assinale a alternativa correta.

- (A) O excesso de insulina pode causar hipercalemia.
- (B) Na síndrome de lise tumoral, além de hipercalemia e hiperfosfatemia, ocorre hipocalemia.
- (C) A nebulização com salbutamol pode causar aumento dos níveis de potássio.
- (D) O uso de inibidores da ECA pode causar hipercalemia.
- (E) São causa de hipocalemia o hipoaldosteronismo e o uso de diuréticos.

59

Considerando a apendicite aguda na criança, assinale a alternativa correta.

- (A) A tomografia de abdome deve ser realizada no início dos sintomas para diagnóstico precoce.
- (B) Presença de febre alta (acima de 38,5°C) ocorre desde o início do quadro.
- (C) Podem ocorrer diarreia e sintomas urinários associados.
- (D) Nas crianças abaixo de 4 anos, a clínica é mais clássica, o que facilita o diagnóstico mais precoce.
- (E) Clinicamente, a criança se apresenta muito agitada, com dor tipo cólica.

60

Em relação ao crescimento durante a gestação e após o nascimento, assinale a alternativa correta.

- (A) Em recém-nascido com estatura adequada, porém com peso comprometido, provavelmente, houve comprometimento intrauterino em quase toda a gestação.
- (B) Em algumas crianças, é observado um pequeno estirão de crescimento ao redor dos 4 aos 5 anos.
- (C) Durante a puberdade, as meninas apresentam o estirão em média 2 anos depois que os meninos.
- (D) No estirão puberal, o pico de velocidade de crescimento das meninas é de 8,5 cm/ano.
- (E) No estirão puberal, o pico de velocidade de crescimento dos meninos é de 7,5 cm/ano.

Realização



instituto aocp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T3445063N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (PEDIATRIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

03

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

2

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”

3

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

4

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

5

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

6

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

7

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepam, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

8

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

9

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

10

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

Matemática

11

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

12

Seja $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

13

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, ___).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

14

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

15

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

Informática

16

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

17

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

18

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

19

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

20

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

Conhecimentos Específicos

21

Em relação ao diagnóstico clínico de hipotireoidismo na infância e na adolescência, é correto afirmar que

- (A) ganho de peso é a queixa mais comum.
- (B) o hipotireoidismo na adolescência pode ocasionar puberdade precoce.
- (C) queixa de baixa estatura, sinais de anemia e taquicardia ao exame físico são indicativos da doença.
- (D) aumento de volume tireoidiano não é frequente, devendo-se investigar outras causas.
- (E) pode haver desaceleração do crescimento sem comprometimento da estatura final, mesmo sem tratamento.

22

As helmintíases transmitidas pelo solo são causadas por um grupo de parasitas intestinais, transmitidas ao homem após contaminação fecal do solo. Em relação a essas parasitoses, assinale a alternativa correta.

- (A) A ancilostomíase é causada pelo helminto mais prevalente no mundo, de coloração leitosa e que possui o macho e a fêmea.
- (B) O *Ascaris lumbricoides* causa infestação no intestino grosso, principalmente no colón descendente.
- (C) A trichiuríase ou tricocefalíase geralmente é assintomática ou com manifestações leves, na presença de poucos vermes e crianças saudáveis.
- (D) Pamoato de pirantel é o tratamento de primeira linha contra tricuriase.
- (E) Ivermectina tem sido considerada a droga de primeira escolha no tratamento da ancilostomíase.

23

O aleitamento materno apresenta vantagens amplamente conhecidas tanto na saúde materno-infantil quanto para a saúde global. A respeito da amamentação, é correto afirmar que

- (A) algumas mães podem demorar para iniciar a produção de colostro. Nesse caso, se for observada baixa produção no primeiro dia de vida, iniciar 30 ml de complemento com fórmula até melhora.
- (B) o RN utiliza o tecido adiposo como fonte energética nos primeiros dias, o que impacta na perda ponderal observada nos primeiros dias de vida.
- (C) alguns estudos têm demonstrado que a administração de ocitocina durante o parto poderia contribuir com a amamentação por estimular a sucção do RN.
- (D) perda de peso nos primeiros dias de vida acima de 10% indica o início de complementação com fórmulas artificiais.
- (E) atualmente, para a introdução de leite materno via oral para RN prematuros, é recomendado ofertá-lo no copinho, devendo evitar uso de sonda-peito.

24

Na suspeita de uma intoxicação por overdose de opioides, em uma criança com pulsos, mas sem respiração adequada ou com “gasping”, é aconselhada a administração de

- (A) adrenalina.
- (B) flumazenil.
- (C) adenosina.
- (D) naloxona.
- (E) amiodarona.

25

RN prematuro, gestação interrompida com idade gestacional de 28 semanas por doença hipertensiva da gestação, foi surfactado e permaneceu em jejum por 72 horas devido à instabilidade hemodinâmica. Após, foi iniciada dieta com leite materno e fórmula infantil para prematuro. Foi extubado com 18 dias de vida. Com 20 dias de vida, evoluiu com distensão abdominal, sangue nas fezes e alguns episódios de apneia. Foi solicitada radiografia abdominal, com presença de pneumatoses e distensão de alças. Diante do exposto, a hipótese diagnóstica é

- (A) sepse por megacólon congênito.
- (B) alergia à proteína do leite de vaca.
- (C) obstrução intestinal por volvo.
- (D) enterocolite necrosante.
- (E) intolerância à lactose.

26

A icterícia é frequente no período neonatal, sendo que se manifesta através de aumento dos níveis de bilirrubinas. Em relação à icterícia neonatal, é correto afirmar que

- (A) apenas aumentos na bilirrubina indireta acima de 10mg/dl são capazes de produzir a icterícia no RN.
- (B) valores acima de 16mg/dl da bilirrubina transcutânea (bilirrubinômetros) devem ser confirmados através da dosagem sérica da bilirrubina total.
- (C) a maior parte das icterícias no período neonatal é causada por uma adaptação ao metabolismo da bilirrubina e é denominada de icterícia fisiológica.
- (D) a vantagem dos aparelhos de fototerapia que usam lâmpada de LED é que eles possuem maior emissão de luz infravermelha.
- (E) no tratamento da icterícia prolongada, causada pela síndrome da icterícia do leite materno, o aleitamento materno nunca deve ser suspenso.

27

São recomendadas para a alta hospitalar dos recém-nascidos a termo, potencialmente saudáveis, algumas práticas clínicas pré-alta e a continuidade do cuidado ambulatorial. Em relação a essas recomendações e práticas, assinale a alternativa correta.

- (A) Orienta-se a realização do teste de triagem neonatal biológica (teste do pezinho) entre 24 horas a sete dias de vida e após, no mínimo, quatro alimentações plenas.
- (B) Garantir a administração da Vitamina K e a vacina anti-hepatite A.
- (C) Na prevenção de síndrome da morte súbita, orientar o posicionamento lateral (direita ou esquerda) para dormir.
- (D) Observação e avaliação da amamentação e aplicação do protocolo de Bristol para avaliar o frênulo lingual.
- (E) O RN deve dormir próximo dos pais, podendo ou não compartilhar a mesma cama.

28

Um RNT nascido de parto normal com 38 semanas, peso de 2890g, apresentou perímetro cefálico (PC) de 31 cm. Foi realizado pré-natal com ultrassom de 32 semanas que sugeriu PC reduzido. Coletaram-se exames para avaliação de infecções congênitas que vieram normais. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Na investigação, se houver diminuição do volume cerebral e disgenesia de corpo caloso, a hipótese mais provável é de microcefalia vera.
- (B) A microcefalia pode causar déficit cognitivo e epilepsia, porém não afeta fala, visão e audição.
- (C) Exposição a drogas ou substâncias tóxicas pode ser causas de microcefalia.
- (D) Na investigação etiológica, o exame de escolha é a tomografia de crânio, mostrando-se superior à ressonância nuclear magnética para esse fim.
- (E) Se houver presença de calcificações subcorticais, deve-se investigar causas genéticas como as síndromes de Agelman e Rett.

29

A bronquiolite viral aguda é uma doença de elevada morbidade em todo o mundo, principalmente nos meses de inverno. Sobre essa patologia, é correto afirmar que

- (A) a febre não é muito comum na fase prodômica, manifestando-se com maior intensidade no estado de doença.
- (B) os principais achados radiológicos são: hiperinsuflação torácica focal e hipotransparência.
- (C) pacientes com histórico de prematuridade, ausência de aleitamento materno e tabagismo passivo apresentam risco de apresentações mais graves.
- (D) o tratamento farmacológico de primeira linha é a oxigenoterapia, beta-2 agonista e corticoide sistêmico.
- (E) apresenta gravidade variável e, em geral, manifesta-se através de formas moderadas que podem evoluir para apresentações graves.

30

Diante de um paciente com obstrução de vias aéreas superiores, o exame físico é essencial para avaliação da gravidade da obstrução e condução do tratamento. Em relação ao manejo das obstruções, assinale a alternativa correta.

- (A) O exame endoscópio de via aérea pode ser necessário e sempre é realizado com aparelho flexível.
- (B) O tratamento da laringite viral aguda é feito com adrenalina intramuscular, seguida de nebulização com adrenalina.
- (C) A supraglotoplastia é um procedimento no manejo da laringomalácia.
- (D) Em relação à laringomalácia, a conduta inicial é a realização de traqueostomia.
- (E) No caso de hemangioma de via aérea, o tratamento de escolha é a exérese com laser.

31

A pitíriase versicolor é uma infecção fúngica superficial frequente. Em relação a essa infecção, é correto afirmar que

- (A) os fatores de risco para desenvolvimento incluem temperaturas quentes, alta umidade, imunossupressão, pele oleosa e uso de corticoterapia.
- (B) é mais comum em crianças abaixo dos 5 anos e em clima temperado.
- (C) o fungo causador não é encontrado na pele normal, apenas na vigência de infecção.
- (D) o diagnóstico é através de biópsia e as lesões são sempre hipopigmentadas.
- (E) se após 4 semanas de tratamento a hipopigmentação persistir, está indicado novo tratamento por falha terapêutica.

32

O quadro de dor abdominal associada à alteração do hábito intestinal pode corresponder à síndrome do intestino irritável. Qual das alternativas apresenta critérios diagnósticos dessa síndrome?

- (A) São, ao todo, 5 critérios, sendo necessária a ocorrência de pelo menos 3.
- (B) Todos os critérios devem ocorrer por pelo menos 4 meses antes do diagnóstico.
- (C) Em uma criança constipada, um dos critérios é a melhora da dor, após a resolução da constipação.
- (D) A dor abdominal deve ocorrer pelo menos 10 dias por mês associada com outros sintomas.
- (E) Faz parte dos critérios dor abdominal associada com alteração na frequência das fezes.

33

Em relação à toxoplasmose congênita, é correto afirmar que

- (A) o grau de comprometimento do conceito é menor quando a infecção ocorre no início da gestação.
- (B) o risco de transmissão materno-fetal é em torno de 40%, e vai diminuindo com o avançar da gestação.
- (C) a doença sistêmica pode, eventualmente, estar associada à miocardite e/ou a hidropisia fetal.
- (D) no líquido, em casos de meningoencefalite, ocorre pleocitose mononuclear com valores de proteína e glicose normais.
- (E) os anticorpos IgM, por atravessarem a placenta, podem estar presentes na circulação sanguínea fetal mesmo sem infecção congênita.

34

Um paciente de 3 anos é atendido no pronto-socorro com quadro de 5 dias de febre. Mãe refere que o paciente vem apresentando dor abdominal e vômitos persistentes. Refere também o surgimento de exantema em todo o corpo. O pediatra suspeitou de dengue. Em relação à classificação de risco e às condutas nesse paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem classificação de risco C, com internamento hospitalar e hidratação venosa com reavaliação clínica periódica.
- (B) Tem classificação de risco B, com internamento hospitalar e hidratação venosa e quantificação da diurese.
- (C) Tem classificação de risco C, com internação em leito de UTI para melhor monitorização.
- (D) Tem classificação de risco A, alta com orientações de manter hidratação oral e buscar atendimento se houver piora.
- (E) Tem classificação de risco B. Manter em observação hospitalar e hidratação oral.

35

A artrite idiopática juvenil é a doença reumática crônica mais comum da infância e uma causa frequente de incapacidade física. Em relação a essa patologia, é correto afirmar que

- (A) a doença poliarticular, também chamada de doença de Still, é mais comum na adolescência.
- (B) o subtipo mais comum é o oligoarticular ou pauciarticular, que acomete crianças em idade mais jovem.
- (C) a forma oligoarticular pode apresentar sintomas como febre baixa, fadiga e mal-estar.
- (D) a forma poliarticular apresenta sempre o fator reumatoide positivo.
- (E) classificam-se como de início juvenil os quadros que começam antes dos 14 anos de idade.

36

O esforço do trabalho de parto pode, ocasionalmente, traumatizar fisicamente o recém-nascido. Dentre esses traumas, encontra-se a lesão do plexo braquial. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- (A) A paralisia de Erb-Duchenne envolve as raízes de C7/C8 a T1.
- (B) Fisioterapia só pode ser iniciada com 1 mês de vida, com uso de talas tipo “Estátua da Liberdade”.
- (C) No exame físico, na paralisia de Klumpke, o reflexo de preensão palmar está presente e o reflexo de Moro ausente.
- (D) Se as raízes nervosas estiverem intactas, o prognóstico para recuperação completa é em torno de 90%.
- (E) A cirurgia tem sido recomendada quando existe perda da função do bíceps com 1 ano de idade.

37

Um RNT nasceu em apneia. Realizados os passos iniciais, foi constatada FC de 50 bpm. Foram realizados 30 segundos de Ventilação com Pressão Positiva (VPP) em ar ambiente, sem melhora. A técnica foi corrigida e mais 30 segundos de VPP em ar ambiente foram realizados, com FC 80 bpm e apneia. Qual é a conduta na sequência?

- (A) Realizar mais 30 segundos de VPP com oxigênio a 100%.
- (B) Iniciar compressões cardíacas e adrenalina a cada 3 a 5 minutos.
- (C) Realizar VPP com oxigênio a 30%, reavaliando após 30 segundos.
- (D) Compressões cardíacas e considerar intubação orotraqueal.
- (E) Proceder a intubação orotraqueal.

38

Paciente de 8 anos evoluiu com quadro de palidez e cansaço com piora progressiva, com início há 15 dias. Observada anemia (Hb 5,2 g/dl), foram solicitados outros exames, com aumento da desidrogenase láctica, da bilirrubina total e dos reticulócitos, com Coombs direto positivo. Qual é a hipótese diagnóstica?

- (A) Anemia ferropriva.
- (B) Anemia de doença aguda.
- (C) Aplasia de medula.
- (D) Anemia hemolítica autoimune.
- (E) Deficiência de G6PD.

39

As vítimas de queimaduras graves devem ser tratadas seguindo protocolo de trauma, com cuidados intensivos. A respeito desse tipo de acidente, é correto afirmar que

- (A) nas primeiras 24 horas da queimadura, ocorre diminuição importante da liberação do hormônio adrenocorticotrófico.
- (B) a intoxicação por monóxido de carbono é a causa mais frequente de morte após inalação de fumaça.
- (C) a retirada precoce das áreas com queimadura de 3º grau está associada a aumento do risco de sepse.
- (D) na presença de hipertermia, é necessária investigação de foco infeccioso e, se ausente, está indicado o início de antibióticos.
- (E) a presença de edema generalizado é causada por excesso de hidratação, o que deve ser evitado.

40

As taquicardias supraventriculares causam aumentos súbitos dos batimentos cardíacos e se originam nos átrios. Em relação ao diagnóstico e tratamento dessa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Na indicação de cardioversão sincronizada, é indicado iniciar com 0,5 a 1 J/kg.
- (B) Na avaliação do ritmo durante o ECG, é possível notar a presença de ondas P com QRS alargado.
- (C) No ECG, o intervalo RR é variável.
- (D) Na indicação de adenosina, a dose inicial é de 0,2 mg/kg.
- (E) Manobras vagais estão contraindicadas em casos de taquicardia supraventriculares.

41

Sobre a osteomielite hematogênica aguda, é correto afirmar que

- (A) os membros superiores são mais afetados que os membros inferiores.
- (B) a radiografia é o melhor exame para se fazer o diagnóstico precoce.
- (C) a ultrassonografia não é um exame bom para avaliar complicações como derrame articular.
- (D) o diagnóstico diferencial deve incluir leucemia e tumores ósseos.
- (E) o tratamento é eminentemente clínico, com procedimentos cirúrgicos contraindicados pelo risco de sequelas.

42

Uma gestante de 39 semanas é internada em trabalho de parto. Pelo ultrassom, observa-se que o feto tem hérnia diafragmática congênita. Em relação ao caso, é correto afirmar que

- (A) esses pacientes costumam ter deficiência de surfactante, e sua administração é indicada, com bons resultados.
- (B) a cardiopatia associada mais comum, encontrada nesses pacientes, é a tetralogia de Fallot.
- (C) esses pacientes costumam precisar de intubação imediata em sala de parto.
- (D) o tratamento cirúrgico é uma emergência médica, devendo ser realizado o mais precocemente possível.
- (E) é comum associação com hipoplasia pulmonar e não há indícios de associação com hipertensão pulmonar.

43

Quanto à localização dos tumores de sistema nervoso central em pediatria, assinale a alternativa correta.

- (A) Em menores de 2 anos, predominam os tumores supratentoriais.
- (B) Menos da metade se encontra na fossa posterior.
- (C) O meduloblastoma é um tumor supratentorial.
- (D) O craniofaringioma só é encontrado na região anterior do cérebro.
- (E) O ependimoma é comumente encontrado na região supresselar.

44

Os surtos inflamatórios da dermatite atópica podem ser controlados pelo uso correto dos medicamentos tópicos. Sobre o controle das crises, é correto afirmar que

- (A) o tracolimus pomada só está indicado em maiores de 2 anos.
- (B) a mometasona é considerada um corticoide tópico de baixa potência.
- (C) os inibidores tópicos da calcineurina estão contraindicados na faixa etária pediátrica.
- (D) associar um curativo oclusivo em áreas de liquenificação aumenta a absorção do medicamento.
- (E) apenas os corticoides tópicos de baixa potência estão indicados em crianças.

45

Na reanimação neonatal, em sala de parto, havendo necessidade de administração de adrenalina, é correto afirmar que

- (A) no máximo duas doses de adrenalina em tubo orotraqueal (TOT) podem ser realizadas.
- (B) a dose de adrenalina em TOT é no máximo de 1ml/kg da solução 1:1.000.
- (C) a dose da adrenalina endovenosa é de 0,1 a 0,3 ml/kg da solução 1:10.000.
- (D) obtém-se a solução 1:10.000 ao misturar 1ml de adrenalina 1:1.000 com 10 ml de solução fisiológica.
- (E) a adrenalina deve ser repetida a cada 2 minutos.

46

Em relação à prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR), assinale a alternativa correta.

- (A) O palivizumabe deve ser aplicado na dose de 20mg/kg, no período de maior circulação do vírus.
- (B) A prevenção pode ser feita com a administração da vacina, porém no momento não está liberada para uso em nosso país.
- (C) A imunização passiva com o anticorpo monoclonal humanizado (palivizumabe) ajuda a prevenir infecções pelo vírus influenza.
- (D) É recomendado o uso de palivizumabe para crianças prematuras até 1 ano de idade que nasceram com idade gestacional menor de 27 semanas.
- (E) O palivizumabe deve ser aplicado por via intramuscular em até cinco doses mensais consecutivas.

47

Em qual(is) das seguintes situações, durante uma consulta com adolescente, o sigilo deve ser interrompido?

- (A) Diagnóstico de doenças graves, quadros depressivos e outros transtornos do campo mental.
- (B) Prescrição de contraceptivos.
- (C) Experimentação de psicoativos (sem sinais de dependência).
- (D) Orientação sexual, conflitos com identidade de gênero.
- (E) Iniciação sexual (excluída violência por sedução ou imposição explícita).

48

O treinamento esfincteriano é um marco importante do desenvolvimento das crianças. A literatura enfatiza a importância de a criança apresentar os sinais de prontidão, ou seja, habilidades físicas e psicológicas específicas antes de iniciar o treinamento. Os principais sinais de prontidão estão relacionados à capacidade da criança de, EXCETO

- (A) saber puxar as roupas para cima e para baixo.
- (B) possuir um vocabulário simples referente ao treinamento esfincteriano.
- (C) entender e responder a instruções e seguir comandos simples.
- (D) dizer “não” como sinal de independência.
- (E) ficar seco por 4 horas ou mais durante o dia.

49

Um paciente de 10 anos, com histórico de anemia falciforme, é atendido em pronto-socorro com priapismo há cerca de 2 horas. Quanto às condutas para esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Transfusão de concentrado de hemácias e avaliação de urologista.
- (B) Hidratação vigorosa, analgesia e avaliação de urologista apenas se refratário ao tratamento inicial.
- (C) Analgesia, concentrado de hemácias e avaliação de urologista apenas se não houve resposta satisfatória.
- (D) Apenas analgesia. Se não houver melhora em 4 horas, está indicada exsanguineotransfusão.
- (E) Encaminhamento imediato para urologista para irrigação de corpo cavernoso com epinefrina.

50

Paciente de 3 anos é atendido no pronto-socorro com tosse, prostração e febre há dois dias. Houve piora do quadro, com dispneia e vômitos. Ao exame, apresentava taquidispneia e saturação de 91% em ar ambiente. Ausculta pulmonar com murmúrio diminuído à direita. Realizada radiografia de tórax com presença de opacificação em lobo inferior de pulmão direito. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A indicação inicial é de antibiótico com cobertura para estafilococo, por ser o agente mais comum da doença.
- (B) A coleta de hemocultura é indicada devido a sua alta especificidade e sua positividade em cerca de 50% dos casos.
- (C) O quadro sugere pneumonia atípica, com tratamento direcionado contra bactérias gram-negativas entéricas.
- (D) O antibiótico de primeira escolha para tratamento ambulatorial de quadros como esse é a azitromicina.
- (E) Havendo indicação de tratamento endovenoso, a primeira escolha nesse caso é a penicilina G cristalina.

51

Uma paciente de 11 anos estava hospitalizada devido à artrite em cotovelo direito muito dolorosa. Foram prescritos apenas antibiótico endovenoso e prednisolona. Foi realizada punção articular com secreção serossanguinolenta, com cultura negativa. A paciente evoluiu com dor em outras articulações. Foi solicitada avaliação de hematologista, realizada punção de medula óssea e diagnosticada leucemia. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de corticosteroides previamente não interfere na análise do mielograma.
- (B) Está contraindicado o uso de acetaminofeno no controle da dor. Deve-se usar apenas codeína.
- (C) A dor óssea que acompanha a leucemia é semelhante à dor do crescimento (vespertina e melhora com repouso).
- (D) Durante o tratamento, pode-se usar alopurinol e furosemida na prevenção da síndrome de lise tumoral.
- (E) Crianças com leucemia que receberam corticosteroides previamente são de baixo risco e possuem menor risco de complicações.

52

Lactente de 7 meses é atendido com quadro de tosse, coriza e obstrução nasal. Mãe refere que evoluiu com febre baixa e cansaço. Está com boa aceitação alimentar e irmão mais velho está com sintomas de resfriado. Ao exame, está em bom estado geral, ausculta com sibilos difusos, tiragem subcostal leve e discreta taquipneia, com frequência cardíaca normal. Em relação ao caso, o diagnóstico mais provável é de

- (A) pneumonia atípica, e o tratamento é ambulatorial com amoxicilina.
- (B) bronquiolite viral, e o tratamento deve ser realizado com corticosteroides orais e azitromicina.
- (C) pneumonia, e o tratamento é hospitalar com ampicilina e gentamicina
- (D) bronquiolite viral, e o tratamento pode ser apenas de suporte e sintomáticos.
- (E) tuberculose, e o tratamento é ambulatorial com pirazinamida e ácido folínico.

53

Em relação à Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU), é correto afirmar que

- (A) é caracterizada pela tríade: anemia, uremia e hematúria.
- (B) a SHU típica ou pós-diarreica é causada por infecção pela *Escherichia coli*.
- (C) ocorre hemólise por degradação das hemácias pela toxina liberada pelas bactérias.
- (D) é comum, nos exames, a presença de alterações da função renal e aumento do número de plaquetas.
- (E) o teste de Coombs direto é positivo.

54

Recém-nascido, filho de pais primos de primeiro grau e hígidos, apresenta algumas alterações como: microcefalia, microftalmia, malformação do ouvido, rim em ferradura e criptorquidia. Ele tem uma irmã de 7 anos que tem baixa estatura e comprometimento da medula óssea (linfopenia e plaquetopenia) e está investigando pancitopenia de Fanconi. É possível observar os seguintes conceitos nesse caso:

- (A) consanguinidade, padrão de herança autossômico recessivo e expressividade variável.
- (B) consanguinidade, penetrância incompleta e padrão de herança autossômico dominante.
- (C) expressividade variável e padrão de herança autossômico dominante.
- (D) consanguinidade, padrão de herança autossômico dominante e expressividade variável.
- (E) expressividade variável, padrão de herança autossômico recessivo e mutação nova.

55

Durante o acompanhamento de crianças nascidas a termo, qual é o ganho de peso estimado?

- (A) 26 a 31 g/dia entre 3-6 meses.
- (B) 12 a 13 g/dia entre 0-6 meses.
- (C) 7 a 9 g/dia entre 3-6 meses.
- (D) 26 a 31 g/dia entre 0-3 meses.
- (E) 12 a 13 g/dia entre 9-12 meses.

56

O RN filho de mãe diabética apresenta risco de hipoglicemia neonatal. Referente a essa hipoglicemia, é correto afirmar que

- (A) costuma ser ocasionada por baixos níveis de insulina.
- (B) está acompanhada de níveis aumentados de corpos cetônicos.
- (C) é uma hipoglicemia prolongada em função do hiperinsulinismo.
- (D) ocorre juntamente com aumento da lipólise e da produção hepática de glicose.
- (E) o excesso de insulina nesse período inibe a adipogênese.

57

Quanto aos distúrbios do potássio (hipocalemia e hipercalemia), assinale a alternativa correta.

- (A) O excesso de insulina pode causar hipercalemia.
- (B) Na síndrome de lise tumoral, além de hipercalemia e hiperfosfatemia, ocorre hipocalemia.
- (C) A nebulização com salbutamol pode causar aumento dos níveis de potássio.
- (D) O uso de inibidores da ECA pode causar hipercalemia.
- (E) São causa de hipocalemia o hipoadosteronismo e o uso de diuréticos.

58

Considerando a apendicite aguda na criança, assinale a alternativa correta.

- (A) A tomografia de abdome deve ser realizada no início dos sintomas para diagnóstico precoce.
- (B) Presença de febre alta (acima de 38,5°C) ocorre desde o início do quadro.
- (C) Podem ocorrer diarreia e sintomas urinários associados.
- (D) Nas crianças abaixo de 4 anos, a clínica é mais clássica, o que facilita o diagnóstico mais precoce.
- (E) Clinicamente, a criança se apresenta muito agitada, com dor tipo cólica.

59

Em relação ao crescimento durante a gestação e após o nascimento, assinale a alternativa correta.

- (A) Em recém-nascido com estatura adequada, porém com peso comprometido, provavelmente, houve comprometimento intrauterino em quase toda a gestação.
- (B) Em algumas crianças, é observado um pequeno estirão de crescimento ao redor dos 4 aos 5 anos.
- (C) Durante a puberdade, as meninas apresentam o estirão em média 2 anos depois que os meninos.
- (D) No estirão puberal, o pico de velocidade de crescimento das meninas é de 8,5 cm/ano.
- (E) No estirão puberal, o pico de velocidade de crescimento dos meninos é de 7,5 cm/ano.

60

A Persistência do Canal Arterial (PCA) é um problema que acomete recém-nascidos pré-termos. Uma das medidas terapêuticas seria o fechamento farmacológico, com alguma das seguintes medicações:

- (A) ibuprofeno, paracetamol ou prostaglandina.
- (B) paracetamol, indometacina ou ibuprofeno.
- (C) indometacina, ibuprofeno ou citrato de cafeína.
- (D) indometacina, paracetamol ou citrato de cafeína.
- (E) prostaglandina, indometacina ou paracetamol.

Realização



instituto aocp



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T4445063N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA SAÚDE

MÉDICO (PEDIATRIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

PROVA

04

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!



**instituto
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar
Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do
Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

Língua Portuguesa

Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>. Acesso em: 04 jan. 2021.

1

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

2

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

3

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

4

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

5

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- () Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- () No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- () O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- () As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- () O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

6

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

7

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

8

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

9

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

10

Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

Matemática

11

Sendo $p = \frac{7}{10}$, $q = \frac{1}{50}$ e $r = \frac{6}{7}$, então o valor de $\frac{2.p.r}{6.q}$ é igual a

- (A) 10
- (B) $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) 5

12

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, __).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

13

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que $\frac{3}{4}$ da dosagem total é da solução H, $\frac{1}{5}$ da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A) $\frac{1}{4}$
- (B) $\frac{15}{4}$
- (C) $\frac{1}{15}$
- (D) $\frac{4}{5}$
- (E) $\frac{4}{15}$

14

Cinco pessoas, identificadas como P₁, P₂, P₃, P₄ e P₅, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P₃ e P₄ irão fazer o mesmo tipo de exame, P₂ e P₄ irão fazer exames de tipos diferentes e P₂ e P₅ irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P₁ irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P₅ irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P₃ irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P₂ irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P₄ irá fazer o exame de Glicemia.

15

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

Informática

16

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CHARACTERUNICODE
- (E) CONCATENAR

17

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

18

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

19

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

20

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

Conhecimentos Específicos

21

As helmintíases transmitidas pelo solo são causadas por um grupo de parasitas intestinais, transmitidas ao homem após contaminação fecal do solo. Em relação a essas parasitoses, assinale a alternativa correta.

- (A) A ancilostomíase é causada pelo helminto mais prevalente no mundo, de coloração leitosa e que possui o macho e a fêmea.
- (B) O *Ascaris lumbricoides* causa infestação no intestino grosso, principalmente no colón descendente.
- (C) A trichiuríase ou tricocefalíase geralmente é assintomática ou com manifestações leves, na presença de poucos vermes e crianças saudáveis.
- (D) Pamoato de pirantel é o tratamento de primeira linha contra tricuriase.
- (E) Ivermectina tem sido considerada a droga de primeira escolha no tratamento da ancilostomíase.

22

O aleitamento materno apresenta vantagens amplamente conhecidas tanto na saúde materno-infantil quanto para a saúde global. A respeito da amamentação, é correto afirmar que

- (A) algumas mães podem demorar para iniciar a produção de colostro. Nesse caso, se for observada baixa produção no primeiro dia de vida, iniciar 30 ml de complemento com fórmula até melhora.
- (B) o RN utiliza o tecido adiposo como fonte energética nos primeiros dias, o que impacta na perda ponderal observada nos primeiros dias de vida.
- (C) alguns estudos têm demonstrado que a administração de ocitocina durante o parto poderia contribuir com a amamentação por estimular a sucção do RN.
- (D) perda de peso nos primeiros dias de vida acima de 10% indica o início de complementação com fórmulas artificiais.
- (E) atualmente, para a introdução de leite materno via oral para RN prematuros, é recomendado ofertá-lo no copinho, devendo evitar uso de sonda-peito.

23

Na suspeita de uma intoxicação por overdose de opioides, em uma criança com pulsos, mas sem respiração adequada ou com “gasping”, é aconselhada a administração de

- (A) adrenalina.
- (B) flumazenil.
- (C) adenosina.
- (D) naloxona.
- (E) amiodarona.

24

RN prematuro, gestação interrompida com idade gestacional de 28 semanas por doença hipertensiva da gestação, foi surfactado e permaneceu em jejum por 72 horas devido à instabilidade hemodinâmica. Após, foi iniciada dieta com leite materno e fórmula infantil para prematuro. Foi extubado com 18 dias de vida. Com 20 dias de vida, evoluiu com distensão abdominal, sangue nas fezes e alguns episódios de apneia. Foi solicitada radiografia abdominal, com presença de pneumatoses e distensão de alças. Diante do exposto, a hipótese diagnóstica é

- (A) sepse por megacólon congênito.
- (B) alergia à proteína do leite de vaca.
- (C) obstrução intestinal por volvo.
- (D) enterocolite necrosante.
- (E) intolerância à lactose.

25

A icterícia é frequente no período neonatal, sendo que se manifesta através de aumento dos níveis de bilirrubinas. Em relação à icterícia neonatal, é correto afirmar que

- (A) apenas aumentos na bilirrubina indireta acima de 10mg/dl são capazes de produzir a icterícia no RN.
- (B) valores acima de 16mg/dl da bilirrubina transcutânea (bilirrubinômetros) devem ser confirmados através da dosagem sérica da bilirrubina total.
- (C) a maior parte das icterícias no período neonatal é causada por uma adaptação ao metabolismo da bilirrubina e é denominada de icterícia fisiológica.
- (D) a vantagem dos aparelhos de fototerapia que usam lâmpada de LED é que eles possuem maior emissão de luz infravermelha.
- (E) no tratamento da icterícia prolongada, causada pela síndrome da icterícia do leite materno, o aleitamento materno nunca deve ser suspenso.

26

São recomendadas para a alta hospitalar dos recém-nascidos a termo, potencialmente saudáveis, algumas práticas clínicas pré-alta e a continuidade do cuidado ambulatorial. Em relação a essas recomendações e práticas, assinale a alternativa correta.

- (A) Orienta-se a realização do teste de triagem neonatal biológica (teste do pezinho) entre 24 horas a sete dias de vida e após, no mínimo, quatro alimentações plenas.
- (B) Garantir a administração da Vitamina K e a vacina anti-hepatite A.
- (C) Na prevenção de síndrome da morte súbita, orientar o posicionamento lateral (direita ou esquerda) para dormir.
- (D) Observação e avaliação da amamentação e aplicação do protocolo de Bristol para avaliar o frênulo lingual.
- (E) O RN deve dormir próximo dos pais, podendo ou não compartilhar a mesma cama.

27

Um RNT nascido de parto normal com 38 semanas, peso de 2890g, apresentou perímetro cefálico (PC) de 31 cm. Foi realizado pré-natal com ultrassom de 32 semanas que sugeriu PC reduzido. Coletaram-se exames para avaliação de infecções congênicas que vieram normais. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Na investigação, se houver diminuição do volume cerebral e disgenesia de corpo caloso, a hipótese mais provável é de microcefalia vera.
- (B) A microcefalia pode causar déficit cognitivo e epilepsia, porém não afeta fala, visão e audição.
- (C) Exposição a drogas ou substâncias tóxicas pode ser causas de microcefalia.
- (D) Na investigação etiológica, o exame de escolha é a tomografia de crânio, mostrando-se superior à ressonância nuclear magnética para esse fim.
- (E) Se houver presença de calcificações subcorticais, deve-se investigar causas genéticas como as síndromes de Agelman e Rett.

28

A bronquiolite viral aguda é uma doença de elevada morbidade em todo o mundo, principalmente nos meses de inverno. Sobre essa patologia, é correto afirmar que

- (A) a febre não é muito comum na fase prodômica, manifestando-se com maior intensidade no estado de doença.
- (B) os principais achados radiológicos são: hiperinsuflação torácica focal e hipotransparência.
- (C) pacientes com histórico de prematuridade, ausência de aleitamento materno e tabagismo passivo apresentam risco de apresentações mais graves.
- (D) o tratamento farmacológico de primeira linha é a oxigenoterapia, beta-2 agonista e corticoide sistêmico.
- (E) apresenta gravidade variável e, em geral, manifesta-se através de formas moderadas que podem evoluir para apresentações graves.

29

Diante de um paciente com obstrução de vias aéreas superiores, o exame físico é essencial para avaliação da gravidade da obstrução e condução do tratamento. Em relação ao manejo das obstruções, assinale a alternativa correta.

- (A) O exame endoscópio de via aérea pode ser necessário e sempre é realizado com aparelho flexível.
- (B) O tratamento da laringite viral aguda é feito com adrenalina intramuscular, seguida de nebulização com adrenalina.
- (C) A supraglotoplastia é um procedimento no manejo da laringomalácia.
- (D) Em relação à laringomalácia, a conduta inicial é a realização de traqueostomia.
- (E) No caso de hemangioma de via aérea, o tratamento de escolha é a exérese com laser.

30

A pitiríase versicolor é uma infecção fúngica superficial frequente. Em relação a essa infecção, é correto afirmar que

- (A) os fatores de risco para desenvolvimento incluem temperaturas quentes, alta umidade, imunossupressão, pele oleosa e uso de corticoterapia.
- (B) é mais comum em crianças abaixo dos 5 anos e em clima temperado.
- (C) o fungo causador não é encontrado na pele normal, apenas na vigência de infecção.
- (D) o diagnóstico é através de biópsia e as lesões são sempre hipopigmentadas.
- (E) se após 4 semanas de tratamento a hipopigmentação persistir, está indicado novo tratamento por falha terapêutica.

31

O quadro de dor abdominal associada à alteração do hábito intestinal pode corresponder à síndrome do intestino irritável. Qual das alternativas apresenta critérios diagnósticos dessa síndrome?

- (A) São, ao todo, 5 critérios, sendo necessária a ocorrência de pelo menos 3.
- (B) Todos os critérios devem ocorrer por pelo menos 4 meses antes do diagnóstico.
- (C) Em uma criança constipada, um dos critérios é a melhora da dor, após a resolução da constipação.
- (D) A dor abdominal deve ocorrer pelo menos 10 dias por mês associada com outros sintomas.
- (E) Faz parte dos critérios dor abdominal associada com alteração na frequência das fezes.

32

Em relação à toxoplasmose congênita, é correto afirmar que

- (A) o grau de comprometimento do concepto é menor quando a infecção ocorre no início da gestação.
- (B) o risco de transmissão materno-fetal é em torno de 40%, e vai diminuindo com o avançar da gestação.
- (C) a doença sistêmica pode, eventualmente, estar associada à miocardite e/ou a hidropisia fetal.
- (D) no líquor, em casos de meningoencefalite, ocorre pleocitose mononuclear com valores de proteína e glicose normais.
- (E) os anticorpos IgM, por atravessarem a placenta, podem estar presentes na circulação sanguínea fetal mesmo sem infecção congênita.

33

Um paciente de 3 anos é atendido no pronto-socorro com quadro de 5 dias de febre. Mãe refere que o paciente vem apresentando dor abdominal e vômitos persistentes. Refere também o surgimento de exantema em todo o corpo. O pediatra suspeitou de dengue. Em relação à classificação de risco e às condutas nesse paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem classificação de risco C, com internamento hospitalar e hidratação venosa com reavaliação clínica periódica.
- (B) Tem classificação de risco B, com internamento hospitalar e hidratação venosa e quantificação da diurese.
- (C) Tem classificação de risco C, com internação em leito de UTI para melhor monitorização.
- (D) Tem classificação de risco A, alta com orientações de manter hidratação oral e buscar atendimento se houver piora.
- (E) Tem classificação de risco B. Manter em observação hospitalar e hidratação oral.

34

A artrite idiopática juvenil é a doença reumática crônica mais comum da infância e uma causa frequente de incapacidade física. Em relação a essa patologia, é correto afirmar que

- (A) a doença poliarticular, também chamada de doença de Still, é mais comum na adolescência.
- (B) o subtipo mais comum é o oligoarticular ou pauciarticular, que acomete crianças em idade mais jovem.
- (C) a forma oligoarticular pode apresentar sintomas como febre baixa, fadiga e mal-estar.
- (D) a forma poliarticular apresenta sempre o fator reumatoide positivo.
- (E) classificam-se como de início juvenil os quadros que começam antes dos 14 anos de idade.

35

O esforço do trabalho de parto pode, ocasionalmente, traumatizar fisicamente o recém-nascido. Dentre esses traumas, encontra-se a lesão do plexo braquial. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- (A) A paralisia de Erb-Duchenne envolve as raízes de C7/C8 a T1.
- (B) Fisioterapia só pode ser iniciada com 1 mês de vida, com uso de talas tipo "Estátua da Liberdade".
- (C) No exame físico, na paralisia de Klumpke, o reflexo de preensão palmar está presente e o reflexo de Moro ausente.
- (D) Se as raízes nervosas estiverem intactas, o prognóstico para recuperação completa é em torno de 90%.
- (E) A cirurgia tem sido recomendada quando existe perda da função do bíceps com 1 ano de idade.

36

Um RNT nasceu em apneia. Realizados os passos iniciais, foi constatada FC de 50 bpm. Foram realizados 30 segundos de Ventilação com Pressão Positiva (VPP) em ar ambiente, sem melhora. A técnica foi corrigida e mais 30 segundos de VPP em ar ambiente foram realizados, com FC 80 bpm e apneia. Qual é a conduta na sequência?

- (A) Realizar mais 30 segundos de VPP com oxigênio a 100%.
- (B) Iniciar compressões cardíacas e adrenalina a cada 3 a 5 minutos.
- (C) Realizar VPP com oxigênio a 30%, reavaliando após 30 segundos.
- (D) Compressões cardíacas e considerar intubação orotraqueal.
- (E) Proceder a intubação orotraqueal.

37

Paciente de 8 anos evoluiu com quadro de palidez e cansaço com piora progressiva, com início há 15 dias. Observada anemia (Hb 5,2 g/dl), foram solicitados outros exames, com aumento da desidrogenase láctica, da bilirrubina total e dos reticulócitos, com Coombs direto positivo. Qual é a hipótese diagnóstica?

- (A) Anemia ferropriva.
- (B) Anemia de doença aguda.
- (C) Aplasia de medula.
- (D) Anemia hemolítica autoimune.
- (E) Deficiência de G6PD.

38

As vítimas de queimaduras graves devem ser tratadas seguindo protocolo de trauma, com cuidados intensivos. A respeito desse tipo de acidente, é correto afirmar que

- (A) nas primeiras 24 horas da queimadura, ocorre diminuição importante da liberação do hormônio adrenocorticotrófico.
- (B) a intoxicação por monóxido de carbono é a causa mais frequente de morte após inalação de fumaça.
- (C) a retirada precoce das áreas com queimadura de 3º grau está associada a aumento do risco de sepse.
- (D) na presença de hipertermia, é necessária investigação de foco infeccioso e, se ausente, está indicado o início de antibióticos.
- (E) a presença de edema generalizado é causada por excesso de hidratação, o que deve ser evitado.

39

As taquicardias supraventriculares causam aumentos súbitos dos batimentos cardíacos e se originam nos átrios. Em relação ao diagnóstico e tratamento dessa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Na indicação de cardioversão sincronizada, é indicado iniciar com 0,5 a 1 J/kg.
- (B) Na avaliação do ritmo durante o ECG, é possível notar a presença de ondas P com QRS alargado.
- (C) No ECG, o intervalo RR é variável.
- (D) Na indicação de adenosina, a dose inicial é de 0,2 mg/kg.
- (E) Manobras vagais estão contraindicadas em casos de taquicardia supraventriculares.

40**Sobre a osteomielite hematogênica aguda, é correto afirmar que**

- (A) os membros superiores são mais afetados que os membros inferiores.
- (B) a radiografia é o melhor exame para se fazer o diagnóstico precoce.
- (C) a ultrassonografia não é um exame bom para avaliar complicações como derrame articular.
- (D) o diagnóstico diferencial deve incluir leucemia e tumores ósseos.
- (E) o tratamento é eminentemente clínico, com procedimentos cirúrgicos contraindicados pelo risco de sequelas.

41**Uma gestante de 39 semanas é internada em trabalho de parto. Pelo ultrassom, observa-se que o feto tem hérnia diafragmática congênita. Em relação ao caso, é correto afirmar que**

- (A) esses pacientes costumam ter deficiência de surfactante, e sua administração é indicada, com bons resultados.
- (B) a cardiopatia associada mais comum, encontrada nesses pacientes, é a tetralogia de Fallot.
- (C) esses pacientes costumam precisar de intubação imediata em sala de parto.
- (D) o tratamento cirúrgico é uma emergência médica, devendo ser realizado o mais precocemente possível.
- (E) é comum associação com hipoplasia pulmonar e não há indícios de associação com hipertensão pulmonar.

42**Quanto à localização dos tumores de sistema nervoso central em pediatria, assinale a alternativa correta.**

- (A) Em menores de 2 anos, predominam os tumores supratentoriais.
- (B) Menos da metade se encontra na fossa posterior.
- (C) O meduloblastoma é um tumor supratentorial.
- (D) O craniofaringioma só é encontrado na região anterior do cérebro.
- (E) O ependimoma é comumente encontrado na região supratentorial.

43**Os surtos inflamatórios da dermatite atópica podem ser controlados pelo uso correto dos medicamentos tópicos. Sobre o controle das crises, é correto afirmar que**

- (A) o tracolimus pomada só está indicado em maiores de 2 anos.
- (B) a mometasona é considerada um corticoide tópico de baixa potência.
- (C) os inibidores tópicos da calcineurina estão contraindicados na faixa etária pediátrica.
- (D) associar um curativo oclusivo em áreas de liquenificação aumenta a absorção do medicamento.
- (E) apenas os corticoides tópicos de baixa potência estão indicados em crianças.

44**Na reanimação neonatal, em sala de parto, havendo necessidade de administração de adrenalina, é correto afirmar que**

- (A) no máximo duas doses de adrenalina em tubo orotraqueal (TOT) podem ser realizadas.
- (B) a dose de adrenalina em TOT é no máximo de 1ml/kg da solução 1:1.000.
- (C) a dose da adrenalina endovenosa é de 0,1 a 0,3 ml/kg da solução 1:10.000.
- (D) obtém-se a solução 1:10.000 ao misturar 1ml de adrenalina 1:1.000 com 10 ml de solução fisiológica.
- (E) a adrenalina deve ser repetida a cada 2 minutos.

45

Em relação à prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR), assinale a alternativa correta.

- (A) O palivizumabe deve ser aplicado na dose de 20mg/kg, no período de maior circulação do vírus.
- (B) A prevenção pode ser feita com a administração da vacina, porém no momento não está liberada para uso em nosso país.
- (C) A imunização passiva com o anticorpo monoclonal humanizado (palivizumabe) ajuda a prevenir infecções pelo vírus influenza.
- (D) É recomendado o uso de palivizumabe para crianças prematuras até 1 ano de idade que nasceram com idade gestacional menor de 27 semanas.
- (E) O palivizumabe deve ser aplicado por via intramuscular em até cinco doses mensais consecutivas.

46

Em qual(is) das seguintes situações, durante uma consulta com adolescente, o sigilo deve ser interrompido?

- (A) Diagnóstico de doenças graves, quadros depressivos e outros transtornos do campo mental.
- (B) Prescrição de contraceptivos.
- (C) Experimentação de psicoativos (sem sinais de dependência).
- (D) Orientação sexual, conflitos com identidade de gênero.
- (E) Iniciação sexual (excluída violência por sedução ou imposição explícita).

47

O treinamento esfincteriano é um marco importante do desenvolvimento das crianças. A literatura enfatiza a importância de a criança apresentar os sinais de prontidão, ou seja, habilidades físicas e psicológicas específicas antes de iniciar o treinamento. Os principais sinais de prontidão estão relacionados à capacidade da criança de, EXCETO

- (A) saber puxar as roupas para cima e para baixo.
- (B) possuir um vocabulário simples referente ao treinamento esfincteriano.
- (C) entender e responder a instruções e seguir comandos simples.
- (D) dizer “não” como sinal de independência.
- (E) ficar seco por 4 horas ou mais durante o dia.

48

Um paciente de 10 anos, com histórico de anemia falciforme, é atendido em pronto-socorro com priapismo há cerca de 2 horas. Quanto às condutas para esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Transfusão de concentrado de hemácias e avaliação de urologista.
- (B) Hidratação vigorosa, analgesia e avaliação de urologista apenas se refratário ao tratamento inicial.
- (C) Analgesia, concentrado de hemácias e avaliação de urologista apenas se não houve resposta satisfatória.
- (D) Apenas analgesia. Se não houver melhora em 4 horas, está indicada exsanguineotransfusão.
- (E) Encaminhamento imediato para urologista para irrigação de corpo cavernoso com epinefrina.

49

Paciente de 3 anos é atendido no pronto-socorro com tosse, prostração e febre há dois dias. Houve piora do quadro, com dispneia e vômitos. Ao exame, apresentava taquidispneia e saturação de 91% em ar ambiente. Ausculta pulmonar com murmúrio diminuído à direita. Realizada radiografia de tórax com presença de opacificação em lobo inferior de pulmão direito. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A indicação inicial é de antibiótico com cobertura para estafilococo, por ser o agente mais comum da doença.
- (B) A coleta de hemocultura é indicada devido a sua alta especificidade e sua positividade em cerca de 50% dos casos.
- (C) O quadro sugere pneumonia atípica, com tratamento direcionado contra bactérias gram-negativas entéricas.
- (D) O antibiótico de primeira escolha para tratamento ambulatorial de quadros como esse é a azitromicina.
- (E) Havendo indicação de tratamento endovenoso, a primeira escolha nesse caso é a penicilina G cristalina.

50

Em relação ao diagnóstico clínico de hipotireoidismo na infância e na adolescência, é correto afirmar que

- (A) ganho de peso é a queixa mais comum.
- (B) o hipotireoidismo na adolescência pode ocasionar puberdade precoce.
- (C) queixa de baixa estatura, sinais de anemia e taquicardia ao exame físico são indicativos da doença.
- (D) aumento de volume tireoidiano não é frequente, devendo-se investigar outras causas.
- (E) pode haver desaceleração do crescimento sem comprometimento da estatura final, mesmo sem tratamento.

51

Lactente de 7 meses é atendido com quadro de tosse, coriza e obstrução nasal. Mãe refere que evoluiu com febre baixa e cansaço. Está com boa aceitação alimentar e irmão mais velho está com sintomas de resfriado. Ao exame, está em bom estado geral, ausculta com sibilos difusos, tiragem subcostal leve e discreta taquipneia, com frequência cardíaca normal. Em relação ao caso, o diagnóstico mais provável é de

- (A) pneumonia atípica, e o tratamento é ambulatorial com amoxicilina.
- (B) bronquiolite viral, e o tratamento deve ser realizado com corticosteroides orais e azitromicina.
- (C) pneumonia, e o tratamento é hospitalar com ampicilina e gentamicina
- (D) bronquiolite viral, e o tratamento pode ser apenas de suporte e sintomáticos.
- (E) tuberculose, e o tratamento é ambulatorial com pirazinamida e ácido fólico.

52

Em relação à Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU), é correto afirmar que

- (A) é caracterizada pela tríade: anemia, uremia e hematuria.
- (B) a SHU típica ou pós-diarreica é causada por infecção pela *Escherichia coli*.
- (C) ocorre hemólise por degradação das hemácias pela toxina liberada pelas bactérias.
- (D) é comum, nos exames, a presença de alterações da função renal e aumento do número de plaquetas.
- (E) o teste de Coombs direto é positivo.

53

Recém-nascido, filho de pais primos de primeiro grau e hígidos, apresenta algumas alterações como: microcefalia, microftalmia, malformação do ouvido, rim em ferradura e criptorquidia. Ele tem uma irmã de 7 anos que tem baixa estatura e comprometimento da medula óssea (linfopenia e plaquetopenia) e está investigando pancitopenia de Fanconi. É possível observar os seguintes conceitos nesse caso:

- (A) consanguinidade, padrão de herança autossômico recessivo e expressividade variável.
- (B) consanguinidade, penetrância incompleta e padrão de herança autossômico dominante.
- (C) expressividade variável e padrão de herança autossômico dominante.
- (D) consanguinidade, padrão de herança autossômico dominante e expressividade variável.
- (E) expressividade variável, padrão de herança autossômico recessivo e mutação nova.

54

Durante o acompanhamento de crianças nascidas a termo, qual é o ganho de peso estimado?

- (A) 26 a 31 g/dia entre 3-6 meses.
- (B) 12 a 13 g/dia entre 0-6 meses.
- (C) 7 a 9 g/dia entre 3-6 meses.
- (D) 26 a 31 g/dia entre 0-3 meses.
- (E) 12 a 13 g/dia entre 9-12 meses.

55

O RN filho de mãe diabética apresenta risco de hipoglicemia neonatal. Referente a essa hipoglicemia, é correto afirmar que

- (A) costuma ser ocasionada por baixos níveis de insulina.
- (B) está acompanhada de níveis aumentados de corpos cetônicos.
- (C) é uma hipoglicemia prolongada em função do hiperinsulinismo.
- (D) ocorre juntamente com aumento da lipólise e da produção hepática de glicose.
- (E) o excesso de insulina nesse período inibe a adipogênese.

56

Quanto aos distúrbios do potássio (hipocalemia e hipercalemia), assinale a alternativa correta.

- (A) O excesso de insulina pode causar hipercalemia.
- (B) Na síndrome de lise tumoral, além de hipercalemia e hiperfosfatemia, ocorre hipocalemia.
- (C) A nebulização com salbutamol pode causar aumento dos níveis de potássio.
- (D) O uso de inibidores da ECA pode causar hipercalemia.
- (E) São causa de hipocalemia o hipoaldosteronismo e o uso de diuréticos.

57

Considerando a apendicite aguda na criança, assinale a alternativa correta.

- (A) A tomografia de abdome deve ser realizada no início dos sintomas para diagnóstico precoce.
- (B) Presença de febre alta (acima de 38,5°C) ocorre desde o início do quadro.
- (C) Podem ocorrer diarreia e sintomas urinários associados.
- (D) Nas crianças abaixo de 4 anos, a clínica é mais clássica, o que facilita o diagnóstico mais precoce.
- (E) Clinicamente, a criança se apresenta muito agitada, com dor tipo cólica.

58

Em relação ao crescimento durante a gestação e após o nascimento, assinale a alternativa correta.

- (A) Em recém-nascido com estatura adequada, porém com peso comprometido, provavelmente, houve comprometimento intrauterino em quase toda a gestação.
- (B) Em algumas crianças, é observado um pequeno estirão de crescimento ao redor dos 4 aos 5 anos.
- (C) Durante a puberdade, as meninas apresentam o estirão em média 2 anos depois que os meninos.
- (D) No estirão puberal, o pico de velocidade de crescimento das meninas é de 8,5 cm/ano.
- (E) No estirão puberal, o pico de velocidade de crescimento dos meninos é de 7,5 cm/ano.

59

A Persistência do Canal Arterial (PCA) é um problema que acomete recém-nascidos pré-termos. Uma das medidas terapêuticas seria o fechamento farmacológico, com alguma das seguintes medicações:

- (A) ibuprofeno, paracetamol ou prostaglandina.
- (B) paracetamol, indometacina ou ibuprofeno.
- (C) indometacina, ibuprofeno ou citrato de cafeína.
- (D) indometacina, paracetamol ou citrato de cafeína.
- (E) prostaglandina, indometacina ou paracetamol.

60

Uma paciente de 11 anos estava hospitalizada devido à artrite em cotovelo direito muito dolorosa. Foram prescritos apenas antibiótico endovenoso e prednisolona. Foi realizada punção articular com secreção serossanguinolenta, com cultura negativa. A paciente evoluiu com dor em outras articulações. Foi solicitada avaliação de hematologista, realizada punção de medula óssea e diagnosticada leucemia. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de corticosteroides previamente não interfere na análise do mielograma.
- (B) Está contraindicado o uso de acetaminofeno no controle da dor. Deve-se usar apenas codeína.
- (C) A dor óssea que acompanha a leucemia é semelhante à dor do crescimento (vespertina e melhora com repouso).
- (D) Durante o tratamento, pode-se usar alopurinol e furosemida na prevenção da síndrome de lise tumoral.
- (E) Crianças com leucemia que receberam corticosteroides previamente são de baixo risco e possuem menor risco de complicações.

Realização



instituto aocp