



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T1447065N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

## MÉDICO (PSIQUIATRIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**SUPERIOR**

Turno

**TARDE**

**PROVA**

**01**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

### Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

### Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

### Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

### Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

## Língua Portuguesa

### **Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas**

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.

Acesso em: 04 jan. 2021.

**1**

**De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

**2**

**Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.**

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

**3**

**Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.**

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

4

Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”.
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”.
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

5

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

6

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

7

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

8

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- ( ) Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- ( ) No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- ( ) O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- ( ) As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- ( ) O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

9

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

10

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

## Matemática

11

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que  $\frac{3}{4}$  da dosagem total é da solução H,  $\frac{1}{5}$  da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

(A)  $\frac{1}{4}$

(B)  $\frac{15}{4}$

(C)  $\frac{1}{15}$

(D)  $\frac{4}{5}$

(E)  $\frac{4}{15}$

12

Cinco pessoas, identificadas como P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub> e P<sub>5</sub>, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P<sub>3</sub> e P<sub>4</sub> irão fazer o mesmo tipo de exame, P<sub>2</sub> e P<sub>5</sub> irão fazer exames de tipos diferentes e P<sub>2</sub> e P<sub>5</sub> irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P<sub>1</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P<sub>5</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P<sub>3</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P<sub>2</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P<sub>4</sub> irá fazer o exame de Glicemia.

13

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

14

Sendo  $p = \frac{7}{10}$ ,  $q = \frac{1}{50}$  e  $r = \frac{6}{7}$ , então o valor de  $\frac{2.p.r}{6.q}$  é igual a

- (A) 10
- (B)  $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D)  $\frac{1}{5}$
- (E) 5

15

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, \_\_\_).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

## Informática

16

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

17

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

18

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

19

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

20

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl



## Conhecimentos Específicos

21

De acordo com as diretrizes do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª Edição (DSM-5), assinale a alternativa correta a respeito do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).

- (A) Se o indivíduo testemunha pessoalmente um evento traumático ocorrido com outra pessoa, ele pode receber o diagnóstico de TEPT, caso preencha os critérios diagnósticos devidos.
- (B) É considerado TEPT de expressão tardia se todos os critérios diagnósticos não forem atendidos até, pelo menos, um ano depois do evento.
- (C) Para receber esse diagnóstico, a pessoa deve ter, pelo menos, 12 anos de idade completos.
- (D) O diagnóstico em homens corresponde a cerca de 60% de todos os casos de TEPT.
- (E) *Status* socioeconômico mais baixo é um fator protetor contra TEPT, devido à habituação a situações mais desfavoráveis.

22

Uma mulher de 32 anos está em tratamento psiquiátrico e, na sua prescrição, há psicofármacos de 3 classes medicamentosas: um Benzodiazepínico, um Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina e Norepinefrina e um Antipsicótico Atípico. Qual das alternativas a seguir corresponde à prescrição dessa paciente?

- (A) Clonazepam, Desvenlafaxina e Flufenazina.
- (B) Alprazolam, Agomelatina e Risperidona.
- (C) Lorazepam, Duloxetine e Lurasidona.
- (D) Piracetam, Venlafaxina e Olanzapina.
- (E) Diazepam, Fluvoxamina e Quetiapina.

23

O DSM-5 reúne os Transtornos da Personalidade em três grupos, com base em aspectos que eles têm em comum. Um desses grupos é formado por Transtorno da Personalidade Esquizoide, Transtorno da Personalidade Esquizotípica e

- (A) Transtorno da Personalidade Paranoide.
- (B) Transtorno da Personalidade Antissocial.
- (C) Transtorno da Personalidade Histriônica.
- (D) Transtorno da Personalidade Dependente.
- (E) Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva.

24

De acordo com a definição do DSM-5, um Episódio Hipomaníaco deve ter a duração de, pelo menos,

- (A) dois dias consecutivos.
- (B) três dias consecutivos.
- (C) quatro dias consecutivos.
- (D) cinco dias consecutivos.
- (E) seis dias consecutivos.

25

O Exame do Estado Mental (EEM) é um elemento essencial para uma boa consulta psiquiátrica. Em relação a isso, assinale a alternativa que apresenta corretamente três alterações da sensopercepção possíveis de serem observadas no EEM.

- (A) Despersonalização, alucinação visual e perseveração.
- (B) Alucinação tátil, desrealização e descarrilamento.
- (C) Associações por assonância, despersonalização e delírio erotomaníaco.
- (D) Alucinação gustativa, ilusão e alucinação olfativa.
- (E) Alucinação auditiva, alucinação visual e circunstancialidade.

26

Um homem de 63 anos diz que passou por tratamentos psiquiátricos em dois momentos da sua vida, por episódios depressivos, quando era mais jovem e morava fora do Brasil. Relata que, em ambos os tratamentos, usou medicações antidepressivas pertencentes à classe medicamentosa dos Inibidores da Monoaminoxidase. Qual das seguintes alternativas apresenta as medicações usadas por esse homem nos seus tratamentos psiquiátricos?

- (A) Tranilcipromina e Rivastigmina.
- (B) Vortioxetina e Rasagilina.
- (C) Isocarboxazida e Donepezila.
- (D) Selegilina e Fenelzina.
- (E) Moclobemida e Tacrina.

27

Dentre as seguintes alternativas, são sintomas relacionados ao Transtorno de Ansiedade Generalizada, segundo os critérios diagnósticos do DSM-5, EXCETO

- (A) sensação de estar com os nervos à flor da pele.
- (B) taquicardia.
- (C) sensações de “branco” na mente.
- (D) tensão muscular.
- (E) irritabilidade.

28

No Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor, ocorrem explosões de raiva recorrentes e graves manifestadas pela linguagem e/ou pelo comportamento que são consideravelmente desproporcionais em intensidade ou em duração à situação ou provocação. Para o correto diagnóstico desse transtorno, segundo o DSM-5, as explosões de raiva devem ocorrer, em média,

- (A) duas ou mais vezes por semana.
- (B) três ou mais vezes por mês.
- (C) cinco ou mais vezes por mês.
- (D) cinco ou mais vezes por semana.
- (E) três ou mais vezes por semana.

29

Sobre os Transtornos de Tique, assinale a alternativa correta, segundo o DSM-5.

- (A) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Motor ou Vocal Persistente, o início dos tiques deve ocorrer após os 6 anos de idade.
- (B) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tourette, o início dos tiques deve ocorrer antes dos 12 anos de idade.
- (C) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Transitório, o início dos tiques deve ocorrer após os 5 anos de idade.
- (D) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Motor ou Vocal Persistente, o início dos tiques deve ocorrer antes dos 18 anos de idade.
- (E) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tourette, o início dos tiques deve ocorrer após os 12 anos de idade.

30

Segundo o DSM-5, quais dos seguintes transtornos são mais prevalentes no sexo masculino do que no sexo feminino?

- (A) Transtorno de Estresse Agudo e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
- (B) Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtorno de Estresse.
- (C) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e Transtorno do Espectro Autista.
- (D) Transtorno de Estresse Agudo e Transtorno do Espectro Autista.
- (E) Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtorno do Espectro Autista.

31

Em relação à idade mínima que um indivíduo precisa ter para receber o diagnóstico de Transtorno da Personalidade Antissocial, segundo o DSM-5, assinale a alternativa correta.

- (A) A idade mínima é 12 anos.
- (B) A idade mínima é 15 anos.
- (C) A idade mínima é 18 anos.
- (D) A idade mínima é 21 anos.
- (E) Não há restrição de idade para o diagnóstico desse transtorno.

**32**

**Sobre a Amnésia Dissociativa, segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) O início desse transtorno costuma ser súbito.
- ( ) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa ter, pelo menos, 12 anos de idade.
- ( ) Nesse transtorno, a duração dos eventos esquecidos pode ir desde minutos até décadas.

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – V
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – V.

**33**

**Na primeira consulta com um novo Psiquiatra, uma mulher de 52 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno Conversivo Persistente, de acordo com os sintomas apresentados. Levando em consideração que o Psiquiatra tomou como base as diretrizes do DSM-5 para especificar o quadro da paciente como “Persistente”, é correto afirmar que os sintomas estão ocorrendo há, pelo menos,**

- (A) um ano.
- (B) três meses.
- (C) um mês.
- (D) seis meses.
- (E) dois anos.

**34**

**Sobre o Transtorno do Espectro Autista, assinale a alternativa INCORRETA, segundo o DSM-5.**

- (A) Segundo o DSM-5, há 4 níveis de gravidade para esse transtorno ser especificado.
- (B) Os sintomas costumam ser reconhecidos durante o segundo ano de vida (12 a 24 meses).
- (C) Uma pequena proporção de indivíduos apresenta deterioração comportamental na adolescência, enquanto a maioria dos outros melhora.
- (D) Esse transtorno é diagnosticado mais frequentemente em homens do que em mulheres
- (E) O Transtorno do Espectro Autista engloba transtornos antes chamados de Autismo Infantil Precoce, Autismo Infantil, Autismo de Kanner, Autismo de Alto Funcionamento, Autismo Atípico, Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação, Transtorno Desintegrativo da Infância e Transtorno de Asperger.

**35**

**Qual das alternativas a seguir apresenta uma informação INCORRETA sobre o Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve com Corpos de Lewy, conforme o DSM-5?**

- (A) Esse transtorno é mais prevalente no sexo masculino, em comparação ao sexo feminino.
- (B) Esse transtorno tem surgimento insidioso.
- (C) É uma das características diagnósticas centrais desse transtorno a presença de alucinações auditivas recorrentes, bem formadas e detalhadas.
- (D) O aparecimento de sintomas costuma ser observado a partir da sexta até a nona década de vida, com a maior parte dos casos surgindo quando as pessoas afetadas estão na metade da sétima década de vida.
- (E) Esse transtorno tem progressão gradual.

**36**

Um rapaz de 20 anos busca ajuda psiquiátrica pela primeira vez. Relata que tem tido um comportamento, há mais de 1 ano, de observar repetidamente sua prima, de 18 anos, pela fechadura da porta, enquanto ela troca de roupa no seu quarto. Esse comportamento traz muita excitação ao rapaz e ele diz que não consegue parar de fazê-lo, mesmo sofrendo por saber que não é algo adequado. Diante desse quadro, qual é o diagnóstico mais provável para o caso desse rapaz?

- (A) Transtorno Exibicionista.
- (B) Transtorno Frotteurista.
- (C) Transtorno Pedofílico.
- (D) Transtorno Voyeurista.
- (E) Transtorno do Masoquismo Sexual.

**37**

Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Uma pessoa que começou a apresentar vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade, com 14 anos, pode receber o diagnóstico de TDAH, segundo o DSM-5.
- ( ) Quando vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em um ambiente (por exemplo: em casa), o diagnóstico já pode ser realizado.
- ( ) O TDAH é cerca de 3 vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens, tanto na infância quanto na idade adulta.

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – F.

**38**

Dentre as alternativas a seguir, são sintomas relacionados a Ataques de Pânico, EXCETO

- (A) medo de “enlouquecer”.
- (B) náusea.
- (C) parestesias.
- (D) irritabilidade.
- (E) tremores.

**39**

Referente ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O sexo feminino é mais afetado, tanto na infância quanto na idade adulta.
- ( ) As mulheres têm idade mais precoce de início do que os homens.
- ( ) O início dos sintomas nesse transtorno é, geralmente, gradual.

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – V.

**40**

Sobre a Enurese, assinale a alternativa INCORRETA, segundo o DSM-5.

- (A) O subtipo exclusivamente noturno da Enurese envolve incontinência apenas durante o sono noturno, geralmente durante o último terço da noite.
- (B) A idade cronológica mínima para o diagnóstico de Enurese é de 5 anos (ou nível de desenvolvimento equivalente).
- (C) A faixa etária mais comum de início da Enurese Secundária é entre 5 e 8 anos, mas ela pode ocorrer em qualquer idade.
- (D) O subtipo exclusivamente noturno da Enurese é o mais comum.
- (E) A maioria das crianças com esse transtorno se torna continente até a adolescência.

41

**Sobre o Transtorno Psicótico Breve, assinale a alternativa correta, de acordo com as diretrizes do DSM-5.**

- (A) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa apresentar, pelo menos, um dos sintomas a seguir: delírios, alucinações ou comportamento grosseiramente desorganizado.
- (B) Para o diagnóstico desse transtorno, a duração de um episódio da perturbação deve ser de, pelo menos, 3 dias.
- (C) Esse transtorno tem idade média de início situando-se abaixo de 20 anos.
- (D) Para o diagnóstico desse transtorno, a duração de um episódio da perturbação deve ser inferior a 3 meses.
- (E) Esse transtorno é mais comum no sexo feminino do que no masculino.

42

**Em relação à predominância de gênero na Tricotilomania, no Transtorno de Escoriação e na Piromania, assinale a alternativa correta, segundo os dados do DSM-5.**

- (A) Todos esses transtornos são mais comuns no sexo feminino do que no sexo masculino.
- (B) A Piromania é mais comum no sexo masculino e a Tricotilomania e o Transtorno de Escoriação são mais comuns no sexo feminino.
- (C) O Transtorno de Escoriação e a Piromania são mais comuns no sexo masculino e a Tricotilomania é mais comum no sexo feminino.
- (D) A Tricotilomania é mais comum no sexo masculino e a Piromania e o Transtorno de Escoriação são mais comuns no sexo feminino.
- (E) Todos esses transtornos são mais comuns no sexo masculino do que no sexo feminino.

43

**Uma jovem, de 17 anos, preencheu todos os critérios para o diagnóstico de Bulimia Nervosa, na sua primeira consulta com o Médico Psiquiatra. Além disso, na anamnese, o Psiquiatra constatou que essa jovem tinha uma média de 7 episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana. Com base na especificação de gravidade do DSM-5 para esse transtorno, é possível considerar que a jovem apresenta um quadro de Bulimia Nervosa**

- (A) Leve.
- (B) Extrema.
- (C) Mínima.
- (D) Grave.
- (E) Moderada.

44

**No Transtorno de Escoriação, o indivíduo acometido belisca a pele de forma recorrente, resultando em lesões. Sobre esse transtorno, qual alternativa apresenta uma ideia correta, segundo o DSM-5?**

- (A) Os locais mais comumente beliscados são pernas e pés.
- (B) Esse transtorno é mais comum em membros da família de primeiro grau de indivíduos com TOC do que na população em geral.
- (C) O sexo masculino é mais afetado por esse transtorno do que o sexo feminino.
- (D) Pessoas acometidas por esse transtorno não tentam reduzir ou parar o comportamento de beliscar a pele.
- (E) O curso desse transtorno, em geral, é agudo e autolimitado, com remissão habitual em algumas semanas.

45

**Segundo o DSM-5, no Transtorno de Adaptação, uma vez que o estressor ou suas consequências tenham cedido, os sintomas não persistem por mais de**

- (A) seis meses.
- (B) três meses.
- (C) um mês.
- (D) um ano.
- (E) dois meses

46

Qual das seguintes alternativas apresenta dois psicofármacos que NÃO pertencem à classe medicamentosa dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina?

- (A) Clorpromazina e Sertralina.
- (B) Olanzapina e Fluvoxamina.
- (C) Asenapina e Bupropiona.
- (D) Venlafaxina e Citalopram.
- (E) Oxcarbazepina e Paroxetina.

47

A respeito do Transtorno Explosivo Intermitente, segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa ter, pelo menos, 4 anos de idade (ou nível de desenvolvimento equivalente).
- ( ) Esse transtorno é muito mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino.
- ( ) O início de comportamentos agressivos impulsivos problemáticos recorrentes, característicos desse transtorno, é mais comum na fase inicial da infância.

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – V.

48

Para o diagnóstico de Transtorno de Insônia, segundo o DSM-5, as dificuldades relacionadas ao sono precisam ocorrer em pelo menos

- (A) cinco noites por semana.
- (B) três noites por semana.
- (C) quatro noites por semana.
- (D) duas noites por semana.
- (E) uma noite por semana.

49

No pronto-atendimento de um hospital geral, um rapaz de 32 anos recebeu o diagnóstico de Abstinência de Cafeína, devido ao quadro clínico e à anamnese realizada. Diante desse diagnóstico, é possível esperar, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5, que o rapaz NÃO apresenta

- (A) cefaleia.
- (B) insônia.
- (C) humor deprimido.
- (D) dificuldade de concentração.
- (E) sintomas gripais.

50

O Modelo de Kübler-Ross organiza, de forma abrangente e útil, as reações dos indivíduos à morte iminente. Esse modelo, muito usado para a devida compreensão de casos de interconsulta psiquiátrica, em hospital geral, propõe uma descrição de cinco estágios pelos quais as pessoas passam ao lidar com o luto. Além de Raiva, Negação e Barganha, quais são os outros estágios desse modelo?

- (A) Fuga e Antecipação.
- (B) Antecipação e Finalização.
- (C) Depressão e Resignação.
- (D) Espera e Finalização.
- (E) Aceitação e Depressão.

**51**

**Um paciente de 36 anos foi diagnosticado, por seu Psiquiatra, com Transtorno Depressivo Maior, após relatar uma série de sintomas que estavam ocorrendo nas últimas semanas, na maior parte do dia, quase todos os dias. São sintomas apresentados por esse paciente que estão entre os critérios diagnósticos do DSM-5 para o transtorno diagnosticado:**

- (A) acentuada diminuição do interesse em quase todas as atividades, indecisão, fadiga.
- (B) humor deprimido, cefaleia e aumento do apetite.
- (C) insônia, agitação, irritabilidade.
- (D) capacidade diminuída para se concentrar, sensações de asfixia, hipersonia.
- (E) culpa excessiva, acentuada diminuição do prazer em quase todas as atividades, despersonalização.

**52**

**Segundo a especificação do DSM-5, o Transtorno Depressivo Persistente (Distímia) com início precoce é aquele em que o início ocorre antes dos**

- (A) 15 anos de idade.
- (B) 18 anos de idade.
- (C) 21 anos de idade.
- (D) 30 anos de idade.
- (E) 45 anos de idade.

**53**

**Uma das novidades do DSM-5 foi a criação de um capítulo próprio contendo o Transtorno Obsessivo-Compulsivo e transtornos relacionados.**

**Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente dois transtornos que estão contidos nesse capítulo do DSM-5.**

- (A) Transtorno de Acumulação e Pica.
- (B) Disforia de Gênero e Tricotilomania.
- (C) Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva e Transtorno de Acumulação.
- (D) Tricotilomania e Transtorno de Escoriação.
- (E) Pica e Transtorno Dismórfico Corporal.

**54**

**Sobre o Transtorno Factício, assinale a alternativa correta, segundo o DSM-5.**

- (A) No Transtorno Factício, há a especificação de episódios recorrentes, quando ocorrem pelo menos três eventos de falsificação de doença e/ou indução de lesão.
- (B) No Transtorno Factício Imposto a Outro, o agente, não a vítima, é quem recebe o diagnóstico.
- (C) O curso do transtorno factício geralmente envolve episódio único de falsificação de doença e/ou indução de lesão.
- (D) No Transtorno Factício Imposto a Outro, o comportamento fraudulento sempre envolve recompensas externas óbvias.
- (E) No Transtorno Factício, a manifestação inicial costuma ocorrer no início da adolescência.

**55**

**Na consulta com um Psiquiatra, uma mulher de 30 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno de Compulsão Alimentar. Dois fatores importantes para o correto diagnóstico desse transtorno são a frequência e a duração dos episódios de compulsão alimentar. Segundo o DSM-5, para se fazer o diagnóstico do transtorno em questão, os episódios de compulsão alimentar devem ocorrer, em média, ao menos**

- (A) três vezes por semana durante três meses.
- (B) duas vezes por semana durante três meses.
- (C) uma vez por semana durante três meses.
- (D) duas vezes por semana durante um mês.
- (E) três vezes por semana durante um mês.

56

**Qual das alternativas apresenta dois transtornos parafilicos, segundo o DSM-5?**

- (A) Transtorno Fetichista e Transtorno do Orgasmo Feminino.
- (B) Transtorno do Masoquismo Sexual e Disforia de Gênero.
- (C) Transtorno Pedofílico e Transtorno do Interesse Sexual Feminino.
- (D) Transtorno Dismórfico Corporal e Transtorno do Sadismo Sexual.
- (E) Transtorno Transvêstico e Transtorno Frotteurista.

57

**Um paciente de 40 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno Delirante, após uma consulta com Psiquiatra. O profissional disse que o paciente preenchia todos os critérios do DSM-5 para esse transtorno, incluindo o tempo de presença do delírio manifestado por ele. Sabendo-se que esse delírio no paciente, estava presente há dois meses, é correto afirmar, segundo as informações mencionadas, que**

- (A) o diagnóstico está correto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de um mês ou mais.
- (B) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de três meses ou mais.
- (C) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de seis meses ou mais.
- (D) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de um ano ou mais.
- (E) o diagnóstico está correto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de dois meses ou mais.

58

**A fuga de ideias é considerada uma alteração do processo de pensamento, muitas vezes, observada no Exame do Estado Mental. Assinale a alternativa que define melhor essa alteração.**

- (A) Invenção de novas palavras ou expressões ou uso de palavras convencionais de maneiras idiossincráticas.
- (B) Inclusão exagerada de detalhes triviais ou irrelevantes que impedem de se chegar à questão.
- (C) Repetição de palavras, expressões e ideias fora do contexto.
- (D) Uma interrupção repentina do pensamento ou uma quebra no fluxo de ideias.
- (E) Uma sucessão de associações múltiplas, de maneira que os pensamentos parecem passar de repente de uma ideia para outra.

59

**Qual das alternativas apresenta corretamente dois sinais/sintomas relacionados à abstinência de opioides, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5?**

- (A) Dores musculares e sonolência.
- (B) Piloereção e bocejos.
- (C) Sudorese e constipação intestinal.
- (D) Miose e lacrimejamento.
- (E) Arritmia cardíaca e febre.

60

**Assinale a alternativa que apresenta uma medicação considerada um Antipsicótico de Primeira Geração.**

- (A) Clozapina.
- (B) Ziprasidona.
- (C) Aripiprazol.
- (D) Clorpromazina.
- (E) Paliperidona.



Realização



**instituto aocp**



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T2447065N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

## MÉDICO (PSIQUIATRIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**SUPERIOR**

Turno

**TARDE**

**PROVA**

**02**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

### Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

### Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

### Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

### Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico [www.institutoaacp.org.br](http://www.institutoaacp.org.br)

## Língua Portuguesa

### **Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas**

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "border" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.

Acesso em: 04 jan. 2021.

1

**Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.**

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

2

**Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.**

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

3

**Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.**

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém ‘pisou na bola’.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

4

Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]"

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] se o paciente se engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

5

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

6

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

7

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- ( ) Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- ( ) No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- ( ) O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- ( ) As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- ( ) O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

8

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepam, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

9

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

10

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

## Matemática

11

Cinco pessoas, identificadas como  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  e  $P_5$ , estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que  $P_3$  e  $P_4$  irão fazer o mesmo tipo de exame,  $P_2$  e  $P_5$  irão fazer exames de tipos diferentes e  $P_2$  e  $P_5$  irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A)  $P_1$  irá fazer o exame de Glicemia.
- (B)  $P_5$  irá fazer o exame de Hemograma.
- (C)  $P_3$  irá fazer o exame de Hemograma.
- (D)  $P_2$  irá fazer o exame de Glicemia.
- (E)  $P_4$  irá fazer o exame de Glicemia.

12

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

13

Se  $p = \frac{7}{10}$ ,  $q = \frac{1}{50}$  e  $r = \frac{6}{7}$ , então o valor de  $\frac{2.p.r}{6.q}$  é igual a

- (A) 10
- (B)  $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D)  $\frac{1}{5}$
- (E) 5

14

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, \_\_\_).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

15

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que  $\frac{3}{4}$  da

dosagem total é da solução H,  $\frac{1}{5}$  da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A)  $\frac{1}{4}$
- (B)  $\frac{15}{4}$
- (C)  $\frac{1}{15}$
- (D)  $\frac{4}{5}$
- (E)  $\frac{4}{15}$

## Informática

16

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

17

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

18

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR



19

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

20

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

## **Conhecimentos Específicos**

21

Uma mulher de 32 anos está em tratamento psiquiátrico e, na sua prescrição, há psicofármacos de 3 classes medicamentosas: um Benzodiazepínico, um Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina e Norepinefrina e um Antipsicótico Atípico. Qual das alternativas a seguir corresponde à prescrição dessa paciente?

- (A) Clonazepam, Desvenlafaxina e Flufenazina.
- (B) Alprazolam, Agomelatina e Risperidona.
- (C) Lorazepam, Duloxetine e Lurasidona.
- (D) Piracetam, Venlafaxina e Olanzapina.
- (E) Diazepam, Fluvoxamina e Quetiapina.

22

O DSM-5 reúne os Transtornos da Personalidade em três grupos, com base em aspectos que eles têm em comum. Um desses grupos é formado por Transtorno da Personalidade Esquizoide, Transtorno da Personalidade Esquizotípica e

- (A) Transtorno da Personalidade Paranoide.
- (B) Transtorno da Personalidade Antissocial.
- (C) Transtorno da Personalidade Histriônica.
- (D) Transtorno da Personalidade Dependente.
- (E) Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva.

23

De acordo com a definição do DSM-5, um Episódio Hipomaníaco deve ter a duração de, pelo menos,

- (A) dois dias consecutivos.
- (B) três dias consecutivos.
- (C) quatro dias consecutivos.
- (D) cinco dias consecutivos.
- (E) seis dias consecutivos.

24

O Exame do Estado Mental (EEM) é um elemento essencial para uma boa consulta psiquiátrica. Em relação a isso, assinale a alternativa que apresenta corretamente três alterações da sensopercepção possíveis de serem observadas no EEM.

- (A) Despersonalização, alucinação visual e perseveração.
- (B) Alucinação tátil, desrealização e descarrilamento.
- (C) Associações por assonância, despersonalização e delírio erotomaníaco.
- (D) Alucinação gustativa, ilusão e alucinação olfativa.
- (E) Alucinação auditiva, alucinação visual e circunstancialidade.

25

Um homem de 63 anos diz que passou por tratamentos psiquiátricos em dois momentos da sua vida, por episódios depressivos, quando era mais jovem e morava fora do Brasil. Relata que, em ambos os tratamentos, usou medicações antidepressivas pertencentes à classe medicamentosa dos Inibidores da Monoaminoxidase. Qual das seguintes alternativas apresenta as medicações usadas por esse homem nos seus tratamentos psiquiátricos?

- (A) Tranilcipromina e Rivastigmina.
- (B) Vortioxetina e Rasagilina.
- (C) Isocarboxazida e Donepezila.
- (D) Selegilina e Fenelzina.
- (E) Moclobemida e Tacrina.

26

Dentre as seguintes alternativas, são sintomas relacionados ao Transtorno de Ansiedade Generalizada, segundo os critérios diagnósticos do DSM-5, EXCETO

- (A) sensação de estar com os nervos à flor da pele.
- (B) taquicardia.
- (C) sensações de “branco” na mente.
- (D) tensão muscular.
- (E) irritabilidade.

27

No Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor, ocorrem explosões de raiva recorrentes e graves manifestadas pela linguagem e/ou pelo comportamento que são consideravelmente desproporcionais em intensidade ou em duração à situação ou provocação. Para o correto diagnóstico desse transtorno, segundo o DSM-5, as explosões de raiva devem ocorrer, em média,

- (A) duas ou mais vezes por semana.
- (B) três ou mais vezes por mês.
- (C) cinco ou mais vezes por mês.
- (D) cinco ou mais vezes por semana.
- (E) três ou mais vezes por semana.

28

Sobre os Transtornos de Tique, assinale a alternativa correta, segundo o DSM-5.

- (A) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Motor ou Vocal Persistente, o início dos tiques deve ocorrer após os 6 anos de idade.
- (B) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tourette, o início dos tiques deve ocorrer antes dos 12 anos de idade.
- (C) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Transitório, o início dos tiques deve ocorrer após os 5 anos de idade.
- (D) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Motor ou Vocal Persistente, o início dos tiques deve ocorrer antes dos 18 anos de idade.
- (E) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tourette, o início dos tiques deve ocorrer após os 12 anos de idade.

29

Segundo o DSM-5, quais dos seguintes transtornos são mais prevalentes no sexo masculino do que no sexo feminino?

- (A) Transtorno de Estresse Agudo e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
- (B) Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtorno de Estresse.
- (C) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e Transtorno do Espectro Autista.
- (D) Transtorno de Estresse Agudo e Transtorno do Espectro Autista.
- (E) Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtorno do Espectro Autista.

30

Em relação à idade mínima que um indivíduo precisa ter para receber o diagnóstico de Transtorno da Personalidade Antissocial, segundo o DSM-5, assinale a alternativa correta.

- (A) A idade mínima é 12 anos.
- (B) A idade mínima é 15 anos.
- (C) A idade mínima é 18 anos.
- (D) A idade mínima é 21 anos.
- (E) Não há restrição de idade para o diagnóstico desse transtorno.

31

**Sobre a Amnésia Dissociativa, segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) O início desse transtorno costuma ser súbito.
- ( ) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa ter, pelo menos, 12 anos de idade.
- ( ) Nesse transtorno, a duração dos eventos esquecidos pode ir desde minutos até décadas.

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – V
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – V.

32

**Na primeira consulta com um novo Psiquiatra, uma mulher de 52 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno Conversivo Persistente, de acordo com os sintomas apresentados. Levando em consideração que o Psiquiatra tomou como base as diretrizes do DSM-5 para especificar o quadro da paciente como “Persistente”, é correto afirmar que os sintomas estão ocorrendo há, pelo menos,**

- (A) um ano.
- (B) três meses.
- (C) um mês.
- (D) seis meses.
- (E) dois anos.

33

**Sobre o Transtorno do Espectro Autista, assinale a alternativa INCORRETA, segundo o DSM-5.**

- (A) Segundo o DSM-5, há 4 níveis de gravidade para esse transtorno ser especificado.
- (B) Os sintomas costumam ser reconhecidos durante o segundo ano de vida (12 a 24 meses).
- (C) Uma pequena proporção de indivíduos apresenta deterioração comportamental na adolescência, enquanto a maioria dos outros melhora.
- (D) Esse transtorno é diagnosticado mais frequentemente em homens do que em mulheres
- (E) O Transtorno do Espectro Autista engloba transtornos antes chamados de Autismo Infantil Precoce, Autismo Infantil, Autismo de Kanner, Autismo de Alto Funcionamento, Autismo Atípico, Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação, Transtorno Desintegrativo da Infância e Transtorno de Asperger.

34

**Qual das alternativas a seguir apresenta uma informação INCORRETA sobre o Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve com Corpos de Lewy, conforme o DSM-5?**

- (A) Esse transtorno é mais prevalente no sexo masculino, em comparação ao sexo feminino.
- (B) Esse transtorno tem surgimento insidioso.
- (C) É uma das características diagnósticas centrais desse transtorno a presença de alucinações auditivas recorrentes, bem formadas e detalhadas.
- (D) O aparecimento de sintomas costuma ser observado a partir da sexta até a nona década de vida, com a maior parte dos casos surgindo quando as pessoas afetadas estão na metade da sétima década de vida.
- (E) Esse transtorno tem progressão gradual.

**35**

Um rapaz de 20 anos busca ajuda psiquiátrica pela primeira vez. Relata que tem tido um comportamento, há mais de 1 ano, de observar repetidamente sua prima, de 18 anos, pela fechadura da porta, enquanto ela troca de roupa no seu quarto. Esse comportamento traz muita excitação ao rapaz e ele diz que não consegue parar de fazê-lo, mesmo sofrendo por saber que não é algo adequado. Diante desse quadro, qual é o diagnóstico mais provável para o caso desse rapaz?

- (A) Transtorno Exibicionista.
- (B) Transtorno Frotteurista.
- (C) Transtorno Pedofílico.
- (D) Transtorno Voyeurista.
- (E) Transtorno do Masoquismo Sexual.

**36**

Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Uma pessoa que começou a apresentar vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade, com 14 anos, pode receber o diagnóstico de TDAH, segundo o DSM-5.
- ( ) Quando vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em um ambiente (por exemplo: em casa), o diagnóstico já pode ser realizado.
- ( ) O TDAH é cerca de 3 vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens, tanto na infância quanto na idade adulta.

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – F.

**37**

Dentre as alternativas a seguir, são sintomas relacionados a Ataques de Pânico, EXCETO

- (A) medo de “enlouquecer”.
- (B) náusea.
- (C) parestesias.
- (D) irritabilidade.
- (E) tremores.

**38**

Referente ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O sexo feminino é mais afetado, tanto na infância quanto na idade adulta.
- ( ) As mulheres têm idade mais precoce de início do que os homens.
- ( ) O início dos sintomas nesse transtorno é, geralmente, gradual.

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – V.

**39**

Sobre a Enurese, assinale a alternativa INCORRETA, segundo o DSM-5.

- (A) O subtipo exclusivamente noturno da Enurese envolve incontinência apenas durante o sono noturno, geralmente durante o último terço da noite.
- (B) A idade cronológica mínima para o diagnóstico de Enurese é de 5 anos (ou nível de desenvolvimento equivalente).
- (C) A faixa etária mais comum de início da Enurese Secundária é entre 5 e 8 anos, mas ela pode ocorrer em qualquer idade.
- (D) O subtipo exclusivamente noturno da Enurese é o mais comum.
- (E) A maioria das crianças com esse transtorno se torna continente até a adolescência.

**40**

**Sobre o Transtorno Psicótico Breve, assinale a alternativa correta, de acordo com as diretrizes do DSM-5.**

- (A) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa apresentar, pelo menos, um dos sintomas a seguir: delírios, alucinações ou comportamento grosseiramente desorganizado.
- (B) Para o diagnóstico desse transtorno, a duração de um episódio da perturbação deve ser de, pelo menos, 3 dias.
- (C) Esse transtorno tem idade média de início situando-se abaixo de 20 anos.
- (D) Para o diagnóstico desse transtorno, a duração de um episódio da perturbação deve ser inferior a 3 meses.
- (E) Esse transtorno é mais comum no sexo feminino do que no masculino.

**41**

**Em relação à predominância de gênero na Tricotilomania, no Transtorno de Escoriação e na Piromania, assinale a alternativa correta, segundo os dados do DSM-5.**

- (A) Todos esses transtornos são mais comuns no sexo feminino do que no sexo masculino.
- (B) A Piromania é mais comum no sexo masculino e a Tricotilomania e o Transtorno de Escoriação são mais comuns no sexo feminino.
- (C) O Transtorno de Escoriação e a Piromania são mais comuns no sexo masculino e a Tricotilomania é mais comum no sexo feminino.
- (D) A Tricotilomania é mais comum no sexo masculino e a Piromania e o Transtorno de Escoriação são mais comuns no sexo feminino.
- (E) Todos esses transtornos são mais comuns no sexo masculino do que no sexo feminino.

**42**

**Uma jovem, de 17 anos, preencheu todos os critérios para o diagnóstico de Bulimia Nervosa, na sua primeira consulta com o Médico Psiquiatra. Além disso, na anamnese, o Psiquiatra constatou que essa jovem tinha uma média de 7 episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana. Com base na especificação de gravidade do DSM-5 para esse transtorno, é possível considerar que a jovem apresenta um quadro de Bulimia Nervosa**

- (A) Leve.
- (B) Extrema.
- (C) Mínima.
- (D) Grave.
- (E) Moderada.

**43**

**No Transtorno de Escoriação, o indivíduo acometido belisca a pele de forma recorrente, resultando em lesões. Sobre esse transtorno, qual alternativa apresenta uma ideia correta, segundo o DSM-5?**

- (A) Os locais mais comumente beliscados são pernas e pés.
- (B) Esse transtorno é mais comum em membros da família de primeiro grau de indivíduos com TOC do que na população em geral.
- (C) O sexo masculino é mais afetado por esse transtorno do que o sexo feminino.
- (D) Pessoas acometidas por esse transtorno não tentam reduzir ou parar o comportamento de beliscar a pele.
- (E) O curso desse transtorno, em geral, é agudo e autolimitado, com remissão habitual em algumas semanas.

**44**

**Segundo o DSM-5, no Transtorno de Adaptação, uma vez que o estressor ou suas consequências tenham cedido, os sintomas não persistem por mais de**

- (A) seis meses.
- (B) três meses.
- (C) um mês.
- (D) um ano.
- (E) dois meses

**45**

**Qual das seguintes alternativas apresenta dois psicofármacos que NÃO pertencem à classe medicamentosa dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina?**

- (A) Clorpromazina e Sertralina.
- (B) Olanzapina e Fluvoxamina.
- (C) Asenapina e Bupropiona.
- (D) Venlafaxina e Citalopram.
- (E) Oxcarbazepina e Paroxetina.

**46**

**A respeito do Transtorno Explosivo Intermitente, segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa ter, pelo menos, 4 anos de idade (ou nível de desenvolvimento equivalente).
- ( ) Esse transtorno é muito mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino.
- ( ) O início de comportamentos agressivos impulsivos problemáticos recorrentes, característicos desse transtorno, é mais comum na fase inicial da infância.

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – V.

**47**

**Para o diagnóstico de Transtorno de Insônia, segundo o DSM-5, as dificuldades relacionadas ao sono precisam ocorrer em pelo menos**

- (A) cinco noites por semana.
- (B) três noites por semana.
- (C) quatro noites por semana.
- (D) duas noites por semana.
- (E) uma noite por semana.

**48**

**No pronto-atendimento de um hospital geral, um rapaz de 32 anos recebeu o diagnóstico de Abstinência de Cafeína, devido ao quadro clínico e à anamnese realizada. Diante desse diagnóstico, é possível esperar, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5, que o rapaz NÃO apresenta**

- (A) cefaleia.
- (B) insônia.
- (C) humor deprimido.
- (D) dificuldade de concentração.
- (E) sintomas gripais.

**49**

**O Modelo de Kübler-Ross organiza, de forma abrangente e útil, as reações dos indivíduos à morte iminente. Esse modelo, muito usado para a devida compreensão de casos de interconsulta psiquiátrica, em hospital geral, propõe uma descrição de cinco estágios pelos quais as pessoas passam ao lidar com o luto. Além de Raiva, Negação e Barganha, quais são os outros estágios desse modelo?**

- (A) Fuga e Antecipação.
- (B) Antecipação e Finalização.
- (C) Depressão e Resignação.
- (D) Espera e Finalização.
- (E) Aceitação e Depressão.

**50**

**De acordo com as diretrizes do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª Edição (DSM-5), assinale a alternativa correta a respeito do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).**

- (A) Se o indivíduo testemunha pessoalmente um evento traumático ocorrido com outra pessoa, ele pode receber o diagnóstico de TEPT, caso preencha os critérios diagnósticos devidos.
- (B) É considerado TEPT de expressão tardia se todos os critérios diagnósticos não forem atendidos até, pelo menos, um ano depois do evento.
- (C) Para receber esse diagnóstico, a pessoa deve ter, pelo menos, 12 anos de idade completos.
- (D) O diagnóstico em homens corresponde a cerca de 60% de todos os casos de TEPT.
- (E) *Status* socioeconômico mais baixo é um fator protetor contra TEPT, devido à habituação a situações mais desfavoráveis.

**51**

**Segundo a especificação do DSM-5, o Transtorno Depressivo Persistente (Distímia) com início precoce é aquele em que o início ocorre antes dos**

- (A) 15 anos de idade.
- (B) 18 anos de idade.
- (C) 21 anos de idade.
- (D) 30 anos de idade.
- (E) 45 anos de idade.

**52**

**Uma das novidades do DSM-5 foi a criação de um capítulo próprio contendo o Transtorno Obsessivo-Compulsivo e transtornos relacionados.**

**Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente dois transtornos que estão contidos nesse capítulo do DSM-5.**

- (A) Transtorno de Acumulação e Pica.
- (B) Disforia de Gênero e Tricotilomania.
- (C) Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva e Transtorno de Acumulação.
- (D) Tricotilomania e Transtorno de Escoriação.
- (E) Pica e Transtorno Dismórfico Corporal.

53

**Sobre o Transtorno Factício, assinale a alternativa correta, segundo o DSM-5.**

- (A) No Transtorno Factício, há a especificação de episódios recorrentes, quando ocorrem pelo menos três eventos de falsificação de doença e/ou indução de lesão.
- (B) No Transtorno Factício Imposto a Outro, o agente, não a vítima, é quem recebe o diagnóstico.
- (C) O curso do transtorno factício geralmente envolve episódio único de falsificação de doença e/ou indução de lesão.
- (D) No Transtorno Factício Imposto a Outro, o comportamento fraudulento sempre envolve recompensas externas óbvias.
- (E) No Transtorno Factício, a manifestação inicial costuma ocorrer no início da adolescência.

54

**Na consulta com um Psiquiatra, uma mulher de 30 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno de Compulsão Alimentar. Dois fatores importantes para o correto diagnóstico desse transtorno são a frequência e a duração dos episódios de compulsão alimentar. Segundo o DSM-5, para se fazer o diagnóstico do transtorno em questão, os episódios de compulsão alimentar devem ocorrer, em média, ao menos**

- (A) três vezes por semana durante três meses.
- (B) duas vezes por semana durante três meses.
- (C) uma vez por semana durante três meses.
- (D) duas vezes por semana durante um mês.
- (E) três vezes por semana durante um mês.

55

**Qual das alternativas apresenta dois transtornos parafilicos, segundo o DSM-5?**

- (A) Transtorno Fetichista e Transtorno do Orgasmo Feminino.
- (B) Transtorno do Masoquismo Sexual e Disforia de Gênero.
- (C) Transtorno Pedofílico e Transtorno do Interesse Sexual Feminino.
- (D) Transtorno Dismórfico Corporal e Transtorno do Sadismo Sexual.
- (E) Transtorno Transvêstico e Transtorno Frotteurista.

56

**Um paciente de 40 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno Delirante, após uma consulta com Psiquiatra. O profissional disse que o paciente preenchia todos os critérios do DSM-5 para esse transtorno, incluindo o tempo de presença do delírio manifestado por ele. Sabendo-se que esse delírio no paciente, estava presente há dois meses, é correto afirmar, segundo as informações mencionadas, que**

- (A) o diagnóstico está correto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de um mês ou mais.
- (B) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de três meses ou mais.
- (C) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de seis meses ou mais.
- (D) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de um ano ou mais.
- (E) o diagnóstico está correto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de dois meses ou mais.



**57**

**A fuga de ideias é considerada uma alteração do processo de pensamento, muitas vezes, observada no Exame do Estado Mental. Assinale a alternativa que define melhor essa alteração.**

- (A) Invenção de novas palavras ou expressões ou uso de palavras convencionais de maneiras idiossincráticas.
- (B) Inclusão exagerada de detalhes triviais ou irrelevantes que impedem de se chegar à questão.
- (C) Repetição de palavras, expressões e ideias fora do contexto.
- (D) Uma interrupção repentina do pensamento ou uma quebra no fluxo de ideias.
- (E) Uma sucessão de associações múltiplas, de maneira que os pensamentos parecem passar de repente de uma ideia para outra.

**58**

**Qual das alternativas apresenta corretamente dois sinais/sintomas relacionados à abstinência de opioides, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5?**

- (A) Dores musculares e sonolência.
- (B) Piloereção e bocejos.
- (C) Sudorese e constipação intestinal.
- (D) Miose e lacrimejamento.
- (E) Arritmia cardíaca e febre.

**59**

**Assinale a alternativa que apresenta uma medicação considerada um Antipsicótico de Primeira Geração.**

- (A) Clozapina.
- (B) Ziprasidona.
- (C) Aripiprazol.
- (D) Clorpromazina.
- (E) Paliperidona.

**60**

**Um paciente de 36 anos foi diagnosticado, por seu Psiquiatra, com Transtorno Depressivo Maior, após relatar uma série de sintomas que estavam ocorrendo nas últimas semanas, na maior parte do dia, quase todos os dias. São sintomas apresentados por esse paciente que estão entre os critérios diagnósticos do DSM-5 para o transtorno diagnosticado:**

- (A) acentuada diminuição do interesse em quase todas as atividades, indecisão, fadiga.
- (B) humor deprimido, cefaleia e aumento do apetite.
- (C) insônia, agitação, irritabilidade.
- (D) capacidade diminuída para se concentrar, sensações de asfixia, hipersonia.
- (E) culpa excessiva, acentuada diminuição do prazer em quase todas as atividades, despersonalização.

Realização



**instituto aacp**



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T3447065N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

## MÉDICO (PSIQUIATRIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**SUPERIOR**

Turno

**TARDE**

**PROVA**

**03**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

### Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

### Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

### Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

### Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

## Língua Portuguesa

### **Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas**

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:  
<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.  
 Acesso em: 04 jan. 2021.

1

**Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.**

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”

2

**Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.**

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”

3

**Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.**

**“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”**

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

4

Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

5

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

6

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- ( ) Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- ( ) No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- ( ) O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- ( ) As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- ( ) O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

7

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

8

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referência nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

9

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

10

Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

## Matemática

11

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.



12

Se  $p = \frac{7}{10}$ ,  $q = \frac{1}{50}$  e  $r = \frac{6}{7}$ , então o valor de  $\frac{2.p.r}{6.q}$  é igual a

- (A) 10
- (B)  $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D)  $\frac{1}{5}$
- (E) 5

13

Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:

(- 8, - 7, - 3, 4, 14, \_\_\_).

Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

14

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que  $\frac{3}{4}$  da dosagem total é da solução H,  $\frac{1}{5}$  da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A)  $\frac{1}{4}$
- (B)  $\frac{15}{4}$
- (C)  $\frac{1}{15}$
- (D)  $\frac{4}{5}$
- (E)  $\frac{4}{15}$

15

Cinco pessoas, identificadas como P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub> e P<sub>5</sub>, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P<sub>3</sub> e P<sub>4</sub> irão fazer o mesmo tipo de exame, P<sub>2</sub> e P<sub>4</sub> irão fazer exames de tipos diferentes e P<sub>2</sub> e P<sub>5</sub> irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P<sub>1</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P<sub>5</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P<sub>3</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P<sub>2</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P<sub>4</sub> irá fazer o exame de Glicemia.

## Informática

---

16

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

17

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

18

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

19

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

20

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

## Conhecimentos Específicos

---

21

O DSM-5 reúne os Transtornos da Personalidade em três grupos, com base em aspectos que eles têm em comum. Um desses grupos é formado por Transtorno da Personalidade Esquizoide, Transtorno da Personalidade Esquizotípica e

- (A) Transtorno da Personalidade Paranoide.
- (B) Transtorno da Personalidade Antissocial.
- (C) Transtorno da Personalidade Histriônica.
- (D) Transtorno da Personalidade Dependente.
- (E) Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva.

22

De acordo com a definição do DSM-5, um Episódio Hipomaniaco deve ter a duração de, pelo menos,

- (A) dois dias consecutivos.
- (B) três dias consecutivos.
- (C) quatro dias consecutivos.
- (D) cinco dias consecutivos.
- (E) seis dias consecutivos.

**23**

O Exame do Estado Mental (EEM) é um elemento essencial para uma boa consulta psiquiátrica. Em relação a isso, assinale a alternativa que apresenta corretamente três alterações da sensopercepção possíveis de serem observadas no EEM.

- (A) Despersonalização, alucinação visual e perseveração.
- (B) Alucinação tátil, desrealização e descarrilamento.
- (C) Associações por assonância, despersonalização e delírio erotomaníaco.
- (D) Alucinação gustativa, ilusão e alucinação olfativa.
- (E) Alucinação auditiva, alucinação visual e circunstancialidade.

**24**

Um homem de 63 anos diz que passou por tratamentos psiquiátricos em dois momentos da sua vida, por episódios depressivos, quando era mais jovem e morava fora do Brasil. Relata que, em ambos os tratamentos, usou medicações antidepressivas pertencentes à classe medicamentosa dos Inibidores da Monoaminoxidase. Qual das seguintes alternativas apresenta as medicações usadas por esse homem nos seus tratamentos psiquiátricos?

- (A) Tranilcipromina e Rivastigmina.
- (B) Vortioxetina e Rasagilina.
- (C) Isocarboxazida e Donepezila.
- (D) Selegilina e Fenelzina.
- (E) Moclobemida e Tacrina.

**25**

Dentre as seguintes alternativas, são sintomas relacionados ao Transtorno de Ansiedade Generalizada, segundo os critérios diagnósticos do DSM-5, EXCETO

- (A) sensação de estar com os nervos à flor da pele.
- (B) taquicardia.
- (C) sensações de “branco” na mente.
- (D) tensão muscular.
- (E) irritabilidade.

**26**

No Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor, ocorrem explosões de raiva recorrentes e graves manifestadas pela linguagem e/ou pelo comportamento que são consideravelmente desproporcionais em intensidade ou em duração à situação ou provocação. Para o correto diagnóstico desse transtorno, segundo o DSM-5, as explosões de raiva devem ocorrer, em média,

- (A) duas ou mais vezes por semana.
- (B) três ou mais vezes por mês.
- (C) cinco ou mais vezes por mês.
- (D) cinco ou mais vezes por semana.
- (E) três ou mais vezes por semana.

**27**

Sobre os Transtornos de Tique, assinale a alternativa correta, segundo o DSM-5.

- (A) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Motor ou Vocal Persistente, o início dos tiques deve ocorrer após os 6 anos de idade.
- (B) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tourette, o início dos tiques deve ocorrer antes dos 12 anos de idade.
- (C) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Transitório, o início dos tiques deve ocorrer após os 5 anos de idade.
- (D) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Motor ou Vocal Persistente, o início dos tiques deve ocorrer antes dos 18 anos de idade.
- (E) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tourette, o início dos tiques deve ocorrer após os 12 anos de idade.

**28**

**Segundo o DSM-5, quais dos seguintes transtornos são mais prevalentes no sexo masculino do que no sexo feminino?**

- (A) Transtorno de Estresse Agudo e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
- (B) Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtorno de Estresse.
- (C) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e Transtorno do Espectro Autista.
- (D) Transtorno de Estresse Agudo e Transtorno do Espectro Autista.
- (E) Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtorno do Espectro Autista.

**29**

**Em relação à idade mínima que um indivíduo precisa ter para receber o diagnóstico de Transtorno da Personalidade Antissocial, segundo o DSM-5, assinale a alternativa correta.**

- (A) A idade mínima é 12 anos.
- (B) A idade mínima é 15 anos.
- (C) A idade mínima é 18 anos.
- (D) A idade mínima é 21 anos.
- (E) Não há restrição de idade para o diagnóstico desse transtorno.

**30**

**Sobre a Amnésia Dissociativa, segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) O início desse transtorno costuma ser súbito.
- ( ) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa ter, pelo menos, 12 anos de idade.
- ( ) Nesse transtorno, a duração dos eventos esquecidos pode ir desde minutos até décadas.

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – V
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – V.

**31**

**Na primeira consulta com um novo Psiquiatra, uma mulher de 52 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno Conversivo Persistente, de acordo com os sintomas apresentados. Levando em consideração que o Psiquiatra tomou como base as diretrizes do DSM-5 para especificar o quadro da paciente como “Persistente”, é correto afirmar que os sintomas estão ocorrendo há, pelo menos,**

- (A) um ano.
- (B) três meses.
- (C) um mês.
- (D) seis meses.
- (E) dois anos.

**32**

**Sobre o Transtorno do Espectro Autista, assinale a alternativa INCORRETA, segundo o DSM-5.**

- (A) Segundo o DSM-5, há 4 níveis de gravidade para esse transtorno ser especificado.
- (B) Os sintomas costumam ser reconhecidos durante o segundo ano de vida (12 a 24 meses).
- (C) Uma pequena proporção de indivíduos apresenta deterioração comportamental na adolescência, enquanto a maioria dos outros melhora.
- (D) Esse transtorno é diagnosticado mais frequentemente em homens do que em mulheres
- (E) O Transtorno do Espectro Autista engloba transtornos antes chamados de Autismo Infantil Precoce, Autismo Infantil, Autismo de Kanner, Autismo de Alto Funcionamento, Autismo Atípico, Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação, Transtorno Desintegrativo da Infância e Transtorno de Asperger.

**33**

**Qual das alternativas a seguir apresenta uma informação INCORRETA sobre o Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve com Corpos de Lewy, conforme o DSM-5?**

- (A) Esse transtorno é mais prevalente no sexo masculino, em comparação ao sexo feminino.
- (B) Esse transtorno tem surgimento insidioso.
- (C) É uma das características diagnósticas centrais desse transtorno a presença de alucinações auditivas recorrentes, bem formadas e detalhadas.
- (D) O aparecimento de sintomas costuma ser observado a partir da sexta até a nona década de vida, com a maior parte dos casos surgindo quando as pessoas afetadas estão na metade da sétima década de vida.
- (E) Esse transtorno tem progressão gradual.

**34**

**Um rapaz de 20 anos busca ajuda psiquiátrica pela primeira vez. Relata que tem tido um comportamento, há mais de 1 ano, de observar repetidamente sua prima, de 18 anos, pela fechadura da porta, enquanto ela troca de roupa no seu quarto. Esse comportamento traz muita excitação ao rapaz e ele diz que não consegue parar de fazê-lo, mesmo sofrendo por saber que não é algo adequado. Diante desse quadro, qual é o diagnóstico mais provável para o caso desse rapaz?**

- (A) Transtorno Exibicionista.
- (B) Transtorno Frotteurista.
- (C) Transtorno Pedofílico.
- (D) Transtorno Voyeurista.
- (E) Transtorno do Masoquismo Sexual.

**35**

**Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) Uma pessoa que começou a apresentar vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade, com 14 anos, pode receber o diagnóstico de TDAH, segundo o DSM-5.
- ( ) Quando vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em um ambiente (por exemplo: em casa), o diagnóstico já pode ser realizado.
- ( ) O TDAH é cerca de 3 vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens, tanto na infância quanto na idade adulta.

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – F.

**36**

**Dentre as alternativas a seguir, são sintomas relacionados a Ataques de Pânico, EXCETO**

- (A) medo de “enlouquecer”.
- (B) náusea.
- (C) parestesias.
- (D) irritabilidade.
- (E) tremores.

**37**

Referente ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O sexo feminino é mais afetado, tanto na infância quanto na idade adulta.
- ( ) As mulheres têm idade mais precoce de início do que os homens.
- ( ) O início dos sintomas nesse transtorno é, geralmente, gradual.

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – V.

**38**

Sobre a Enurese, assinale a alternativa INCORRETA, segundo o DSM-5.

- (A) O subtipo exclusivamente noturno da Enurese envolve incontinência apenas durante o sono noturno, geralmente durante o último terço da noite.
- (B) A idade cronológica mínima para o diagnóstico de Enurese é de 5 anos (ou nível de desenvolvimento equivalente).
- (C) A faixa etária mais comum de início da Enurese Secundária é entre 5 e 8 anos, mas ela pode ocorrer em qualquer idade.
- (D) O subtipo exclusivamente noturno da Enurese é o mais comum.
- (E) A maioria das crianças com esse transtorno se torna continente até a adolescência.

**39**

Sobre o Transtorno Psicótico Breve, assinale a alternativa correta, de acordo com as diretrizes do DSM-5.

- (A) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa apresentar, pelo menos, um dos sintomas a seguir: delírios, alucinações ou comportamento grosseiramente desorganizado.
- (B) Para o diagnóstico desse transtorno, a duração de um episódio da perturbação deve ser de, pelo menos, 3 dias.
- (C) Esse transtorno tem idade média de início situando-se abaixo de 20 anos.
- (D) Para o diagnóstico desse transtorno, a duração de um episódio da perturbação deve ser inferior a 3 meses.
- (E) Esse transtorno é mais comum no sexo feminino do que no masculino.

**40**

Em relação à predominância de gênero na Tricotilomania, no Transtorno de Escoriação e na Piromania, assinale a alternativa correta, segundo os dados do DSM-5.

- (A) Todos esses transtornos são mais comuns no sexo feminino do que no sexo masculino.
- (B) A Piromania é mais comum no sexo masculino e a Tricotilomania e o Transtorno de Escoriação são mais comuns no sexo feminino.
- (C) O Transtorno de Escoriação e a Piromania são mais comuns no sexo masculino e a Tricotilomania é mais comum no sexo feminino.
- (D) A Tricotilomania é mais comum no sexo masculino e a Piromania e o Transtorno de Escoriação são mais comuns no sexo feminino.
- (E) Todos esses transtornos são mais comuns no sexo masculino do que no sexo feminino.

41

Uma jovem, de 17 anos, preencheu todos os critérios para o diagnóstico de Bulimia Nervosa, na sua primeira consulta com o Médico Psiquiatra. Além disso, na anamnese, o Psiquiatra constatou que essa jovem tinha uma média de 7 episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana. Com base na especificação de gravidade do DSM-5 para esse transtorno, é possível considerar que a jovem apresenta um quadro de Bulimia Nervosa

- (A) Leve.
- (B) Extrema.
- (C) Mínima.
- (D) Grave.
- (E) Moderada.

42

No Transtorno de Escoriação, o indivíduo acometido belisca a pele de forma recorrente, resultando em lesões. Sobre esse transtorno, qual alternativa apresenta uma ideia correta, segundo o DSM-5?

- (A) Os locais mais comumente beliscados são pernas e pés.
- (B) Esse transtorno é mais comum em membros da família de primeiro grau de indivíduos com TOC do que na população em geral.
- (C) O sexo masculino é mais afetado por esse transtorno do que o sexo feminino.
- (D) Pessoas acometidas por esse transtorno não tentam reduzir ou parar o comportamento de beliscar a pele.
- (E) O curso desse transtorno, em geral, é agudo e autolimitado, com remissão habitual em algumas semanas.

43

Segundo o DSM-5, no Transtorno de Adaptação, uma vez que o estressor ou suas consequências tenham cedido, os sintomas não persistem por mais de

- (A) seis meses.
- (B) três meses.
- (C) um mês.
- (D) um ano.
- (E) dois meses

44

Qual das seguintes alternativas apresenta dois psicofármacos que NÃO pertencem à classe medicamentosa dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina?

- (A) Clorpromazina e Sertralina.
- (B) Olanzapina e Fluvoxamina.
- (C) Asenapina e Bupropiona.
- (D) Venlafaxina e Citalopram.
- (E) Oxcarbazepina e Paroxetina.

45

A respeito do Transtorno Explosivo Intermitente, segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa ter, pelo menos, 4 anos de idade (ou nível de desenvolvimento equivalente).
- ( ) Esse transtorno é muito mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino.
- ( ) O início de comportamentos agressivos impulsivos problemáticos recorrentes, característicos desse transtorno, é mais comum na fase inicial da infância.

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – V.

46

Para o diagnóstico de Transtorno de Insônia, segundo o DSM-5, as dificuldades relacionadas ao sono precisam ocorrer em pelo menos

- (A) cinco noites por semana.
- (B) três noites por semana.
- (C) quatro noites por semana.
- (D) duas noites por semana.
- (E) uma noite por semana.

47

No pronto-atendimento de um hospital geral, um rapaz de 32 anos recebeu o diagnóstico de Abstinência de Cafeína, devido ao quadro clínico e à anamnese realizada. Diante desse diagnóstico, é possível esperar, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5, que o rapaz **NÃO** apresenta

- (A) cefaleia.
- (B) insônia.
- (C) humor deprimido.
- (D) dificuldade de concentração.
- (E) sintomas gripais.

48

O Modelo de Kübler-Ross organiza, de forma abrangente e útil, as reações dos indivíduos à morte iminente. Esse modelo, muito usado para a devida compreensão de casos de interconsulta psiquiátrica, em hospital geral, propõe uma descrição de cinco estágios pelos quais as pessoas passam ao lidar com o luto. Além de Raiva, Negação e Barganha, quais são os outros estágios desse modelo?

- (A) Fuga e Antecipação.
- (B) Antecipação e Finalização.
- (C) Depressão e Resignação.
- (D) Espera e Finalização.
- (E) Aceitação e Depressão.

49

De acordo com as diretrizes do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª Edição (DSM-5), assinale a alternativa correta a respeito do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).

- (A) Se o indivíduo testemunha pessoalmente um evento traumático ocorrido com outra pessoa, ele pode receber o diagnóstico de TEPT, caso preencha os critérios diagnósticos devidos.
- (B) É considerado TEPT de expressão tardia se todos os critérios diagnósticos não forem atendidos até, pelo menos, um ano depois do evento.
- (C) Para receber esse diagnóstico, a pessoa deve ter, pelo menos, 12 anos de idade completos.
- (D) O diagnóstico em homens corresponde a cerca de 60% de todos os casos de TEPT.
- (E) *Status* socioeconômico mais baixo é um fator protetor contra TEPT, devido à habituação a situações mais desfavoráveis.

50

Uma mulher de 32 anos está em tratamento psiquiátrico e, na sua prescrição, há psicofármacos de 3 classes medicamentosas: um Benzodiazepínico, um Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina e Norepinefrina e um Antipsicótico Atípico. Qual das alternativas a seguir corresponde à prescrição dessa paciente?

- (A) Clonazepam, Desvenlafaxina e Flufenazina.
- (B) Alprazolam, Agomelatina e Risperidona.
- (C) Lorazepam, Duloxetina e Lurasidona.
- (D) Piracetam, Venlafaxina e Olanzapina.
- (E) Diazepam, Fluvoxamina e Quetiapina.



**51**

**Uma das novidades do DSM-5 foi a criação de um capítulo próprio contendo o Transtorno Obsessivo-Compulsivo e transtornos relacionados.**

**Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente dois transtornos que estão contidos nesse capítulo do DSM-5.**

- (A) Transtorno de Acumulação e Pica.
- (B) Disforia de Gênero e Tricotilomania.
- (C) Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva e Transtorno de Acumulação.
- (D) Tricotilomania e Transtorno de Escoriação.
- (E) Pica e Transtorno Dismórfico Corporal.

**52**

**Sobre o Transtorno Factício, assinale a alternativa correta, segundo o DSM-5.**

- (A) No Transtorno Factício, há a especificação de episódios recorrentes, quando ocorrem pelo menos três eventos de falsificação de doença e/ou indução de lesão.
- (B) No Transtorno Factício Imposto a Outro, o agente, não a vítima, é quem recebe o diagnóstico.
- (C) O curso do transtorno factício geralmente envolve episódio único de falsificação de doença e/ou indução de lesão.
- (D) No Transtorno Factício Imposto a Outro, o comportamento fraudulento sempre envolve recompensas externas óbvias.
- (E) No Transtorno Factício, a manifestação inicial costuma ocorrer no início da adolescência.

**53**

**Na consulta com um Psiquiatra, uma mulher de 30 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno de Compulsão Alimentar. Dois fatores importantes para o correto diagnóstico desse transtorno são a frequência e a duração dos episódios de compulsão alimentar. Segundo o DSM-5, para se fazer o diagnóstico do transtorno em questão, os episódios de compulsão alimentar devem ocorrer, em média, ao menos**

- (A) três vezes por semana durante três meses.
- (B) duas vezes por semana durante três meses.
- (C) uma vez por semana durante três meses.
- (D) duas vezes por semana durante um mês.
- (E) três vezes por semana durante um mês.

54

**Qual das alternativas apresenta dois transtornos parafilicos, segundo o DSM-5?**

- (A) Transtorno Fetichista e Transtorno do Orgasmo Feminino.
- (B) Transtorno do Masoquismo Sexual e Disforia de Gênero.
- (C) Transtorno Pedofílico e Transtorno do Interesse Sexual Feminino.
- (D) Transtorno Dismórfico Corporal e Transtorno do Sadismo Sexual.
- (E) Transtorno Transvêstico e Transtorno Frotteurista.

55

**Um paciente de 40 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno Delirante, após uma consulta com Psiquiatra. O profissional disse que o paciente preenchia todos os critérios do DSM-5 para esse transtorno, incluindo o tempo de presença do delírio manifestado por ele. Sabendo-se que esse delírio no paciente, estava presente há dois meses, é correto afirmar, segundo as informações mencionadas, que**

- (A) o diagnóstico está correto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de um mês ou mais.
- (B) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de três meses ou mais.
- (C) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de seis meses ou mais.
- (D) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de um ano ou mais.
- (E) o diagnóstico está correto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de dois meses ou mais.

56

**A fuga de ideias é considerada uma alteração do processo de pensamento, muitas vezes, observada no Exame do Estado Mental. Assinale a alternativa que define melhor essa alteração.**

- (A) Invenção de novas palavras ou expressões ou uso de palavras convencionais de maneiras idiossincráticas.
- (B) Inclusão exagerada de detalhes triviais ou irrelevantes que impedem de se chegar à questão.
- (C) Repetição de palavras, expressões e ideias fora do contexto.
- (D) Uma interrupção repentina do pensamento ou uma quebra no fluxo de ideias.
- (E) Uma sucessão de associações múltiplas, de maneira que os pensamentos parecem passar de repente de uma ideia para outra.

57

**Qual das alternativas apresenta corretamente dois sinais/sintomas relacionados à abstinência de opioides, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5?**

- (A) Dores musculares e sonolência.
- (B) Piloereção e bocejos.
- (C) Sudorese e constipação intestinal.
- (D) Miose e lacrimejamento.
- (E) Arritmia cardíaca e febre.

58

**Assinale a alternativa que apresenta uma medicação considerada um Antipsicótico de Primeira Geração.**

- (A) Clozapina.
- (B) Ziprasidona.
- (C) Aripiprazol.
- (D) Clorpromazina.
- (E) Paliperidona.

**59**

**Um paciente de 36 anos foi diagnosticado, por seu Psiquiatra, com Transtorno Depressivo Maior, após relatar uma série de sintomas que estavam ocorrendo nas últimas semanas, na maior parte do dia, quase todos os dias. São sintomas apresentados por esse paciente que estão entre os critérios diagnósticos do DSM-5 para o transtorno diagnosticado:**

- (A) acentuada diminuição do interesse em quase todas as atividades, indecisão, fadiga.
- (B) humor deprimido, cefaleia e aumento do apetite.
- (C) insônia, agitação, irritabilidade.
- (D) capacidade diminuída para se concentrar, sensações de asfixia, hipersonia.
- (E) culpa excessiva, acentuada diminuição do prazer em quase todas as atividades, despersonalização.

**60**

**Segundo a especificação do DSM-5, o Transtorno Depressivo Persistente (Distímia) com início precoce é aquele em que o início ocorre antes dos**

- (A) 15 anos de idade.
- (B) 18 anos de idade.
- (C) 21 anos de idade.
- (D) 30 anos de idade.
- (E) 45 anos de idade.

Realização



**instituto aocp**



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



T4447065N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

## MÉDICO (PSIQUIATRIA)

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**SUPERIOR**

Turno

**TARDE**

**PROVA**

**04**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

### Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

### Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

### Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

### Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

## Língua Portuguesa

### **Borderline: o transtorno que faz pessoas irem do "céu ao inferno" em horas**

Tatiana Pronin

Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém "pisou na bola". O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline (ou "limítrofe").

Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Além disso, cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do "tudo ou nada", o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade e até mesmo a com o médico ou terapeuta extremamente desgastantes.

Muitos comportamentos do "border" (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções — o que os psicanalistas chamam de "ego imaturo". Em muitos casos, o transtorno fica camuflado entre outros, como o bipolar, a depressão e o uso abusivo de álcool, remédios e drogas ilícitas.

De forma resumida, um transtorno de personalidade pode ser descrito como um jeito de ser, de sentir, se perceber e se relacionar com os outros que foge do padrão considerado "normal" ou saudável. Ou seja, causa sofrimento para a própria pessoa e/ou para os outros. Enquadrar um indivíduo em uma categoria não é fácil — cada pessoa é um universo, com características próprias. [...]

O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. O que acontece é que elas tendem a pedir mais socorro, enquanto os homens são mais propensos a se meter em encrencas, ir para a cadeia ou até morrer mais precocemente por causa de comportamentos de risco. Quase sempre o transtorno é identificado em adultos jovens e os sintomas tendem a se tornar atenuados com o passar da idade.

Transtornos de personalidade são diferentes de transtornos mentais (como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose etc.), embora seja difícil para leigos e desafiante até para especialistas fazer essa distinção, já que sobreposições ou comorbidades (existência de duas ou mais condições ao mesmo tempo) são muito frequentes. Não é raro que o borderline desenvolva transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares (em especial a bulimia), estresse pós-traumático, déficit de atenção/hiperatividade e transtorno por abuso de substâncias, entre outros. [...]

O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta. Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]

A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]

Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc.), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc.), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quetiapina etc.) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepam, alprazolam etc.). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]

Disponível em:  
<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/04/16/borderline-a-doenca-que-faz-10-dos-diagnosticados-cometerem-suicidio.htm>.  
 Acesso em: 04 jan. 2021.

1

**Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão destacado(a) tenha sido usado(a) em sentido denotativo.**

- (A) “Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém **‘pisou na bola’**.”
- (B) “E, então, **bate** uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre.”
- (C) “Além da **montanha-russa** emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do ‘tudo ou nada’, [...]”.
- (D) “**Transtornos de personalidade** são diferentes de transtornos mentais [...]”.
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não **amadurece** nunca.”.

2

**Referente ao seguinte excerto, assinale a alternativa correta.**

“Há situações de crise, ou maior descontrole, que podem até resultar em internações porque o paciente coloca sua própria vida ou a dos outros em risco. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante, probabilidade que aumenta se o paciente se engaja no tratamento. [...]”

- (A) Em “Há situações de crise, ou maior descontrole, [...]”, o verbo “haver” poderia ser substituído por “existir” sem mudanças no que tange à concordância.
- (B) No trecho “Há situações de crise, ou maior descontrole, **que** podem até resultar em internações [...]”, o pronome “que” em destaque retoma a locução “de crise”.
- (C) Em “[...] a maioria dos "borders" melhora bastante, [...]”, o verbo “melhora”, segundo a norma-padrão, deveria ser empregado no plural, para concordar com “borders”.
- (D) O termos destacados em “[...] **se** o paciente **se** engaja no tratamento [...]” desempenham a mesma função gramatical.
- (E) No trecho “[...] probabilidade **que aumenta** se o paciente se engaja no tratamento.”, a oração adjetiva em destaque restringe o termo “probabilidade”.

3

**Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas.**

- (A) “[...] o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos.”
- (B) “E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado [...]”.
- (C) “Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.
- (D) “Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos "borders" melhora bastante [...]”.
- (E) “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo [...]”.

4

Considerando o trecho que segue, a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

“A personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos, por isso a melhora é possível, ainda que seja difícil de acreditar no início. Se a psicoterapia é importante para ajudar o bipolar a identificar uma virada e evitar perdas, no transtorno de personalidade ela é o carro-chefe do tratamento. [...]”.

- I. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa “não só/mas também” fosse, nesse contexto, substituída pela conjunção, igualmente aditiva, “e”.
- II. Em vez de “não só/mas também”, poder-se-ia usar, nessa situação, a locução também correlativa “tanto/quanto”, embora esta expresse valor de comparação e não de adição.
- III. A expressão “ainda que” tem valor de concessão e poderia ser substituída, nesse caso, por “embora”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

5

Considerando o seguinte excerto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos.”.

- ( ) Os termos “diagnóstico” e “incidência” são acentuados devido à mesma regra de acentuação em Língua Portuguesa.
- ( ) No termo “frequente”, há um encontro consonantal em “fr”.
- ( ) O vocábulo “mulheres” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- ( ) As palavras “frequente”, “mulheres” e “incidência” são todas paroxítonas.
- ( ) O termo “sexos” apresenta cinco letras e seis fonemas.

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.



6

Analise o trecho que segue.

“Medicamentos ajudam a aliviar os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado, e são ainda mais importantes quando existe um transtorno mental associado. Os fármacos mais utilizados são os antidepressivos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina etc), os estabilizadores de humor (lítio, lamotrigina, ácido valproico etc), os antipsicóticos (olanzapina, risperidona, quietiapina etc) e, em situações pontuais, sedativos ou remédios para dormir (clonazepan, diazepan, alprazolam etc). Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência. [...]”.

Em relação, sobretudo, aos componentes destacados nesse segmento do texto, é correto afirmar que

- (A) o verbo “são” em destaque tem como sujeito os elementos “os sintomas depressivos, a agressividade e o perfeccionismo exagerado”.
- (B) a conjunção “quando”, tradicionalmente indicadora de tempo, em certos contextos, pode também expressar valor de condição, como ocorre nesse caso.
- (C) o uso de “antidepressivos”, em destaque, exemplifica um caso de substantivo transformado em adjetivo.
- (D) a preposição “para” expressa a relação lógico-semântica de causa.
- (E) o pronome demonstrativo “esses” retoma os medicamentos “clonazepan, diazepan, alprazolam” e poderia ser substituído por “estes” sem nenhum dano gramatical.

7

Ainda em relação ao trecho “Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo, porque podem afrouxar o controle dos impulsos, assim como o álcool, além de causarem dependência.”, os verbos destacados retomam a expressão “Esses últimos” e fazem referência a ela por meio de

- (A) sujeito elíptico, em que se oculta um termo já de conhecimento do leitor.
- (B) zeugma, em que se oculta um termo, independente de ter sido mencionado antes ou não.
- (C) coesão por anáfora, em que se usa um elemento para anunciar outro, ainda não mencionado no texto.
- (D) coesão por catáfora, em que se usa um elemento para recuperar outro, já mencionado no texto.
- (E) referenciação nominal, em que se emprega um nome para recuperar um termo anterior.

8

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pessoas que sofrem do transtorno borderline vão do “céu ao inferno” em um curto período de tempo porque ora se comportam como crianças sem malícia ora se comportam como adultos responsáveis.
- (B) Alguém com a personalidade borderline (“límitrofe”), comumente, apresenta posturas resistentes a limites, regras.
- (C) Um “border”, em geral, vive a infância e a adolescência sem apresentar graves alterações geradas por tal transtorno.
- (D) Grande parte dos “borders”, além de se automutilarem e de apresentarem intensa rebeldia, acabam cometendo suicídio.
- (E) Borderline afeta, sobretudo, mulheres que apresentam esse transtorno aliado à bipolaridade e à depressão.

9

**Assinale a alternativa correta considerando o conteúdo do texto.**

- (A) Segundo o texto, as relações interpessoais e até mesmo relacionadas ao tratamento dos “borders” desgastam-se com facilidade e isso acaba provocando descontrole emocional e alterações de humor extremas em tais indivíduos.
- (B) De acordo com o texto, categorizar pessoas é uma tarefa difícil porque cada um apresenta atitudes, pensamentos, aptidões, gostos, sentimentos etc. bem particulares.
- (C) Transtornos como a bipolaridade (de personalidade) e borderline (mentais) apresentam diferenças sutis e, normalmente, esses transtornos são observados em um mesmo paciente de modo simultâneo.
- (D) Segundo o texto, quem mais sofre com a síndrome borderline é o próprio paciente acometido pela doença, sendo pouco e/ou raramente afetadas as pessoas que o rodeiam.
- (E) Tratamentos psicoterápicos são mais eficazes em casos de bipolaridade do que em quadros de borderline, uma vez que, comprovadamente, para esses pacientes, a abordagem medicamentosa costuma funcionar mais.

10

**Assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação com valor de “mudança de estado”.**

- (A) “O amor intenso vira ódio profundo, [...]”.
- (B) “[...] a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis.”
- (C) “[...] o transtorno fica camuflado [...]”.
- (D) “O paciente borderline sofre os períodos de instabilidade mais intensos no início da vida adulta.”
- (E) “[...] o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.”.

## Matemática

11

**Sendo  $p = \frac{7}{10}$ ,  $q = \frac{1}{50}$  e  $r = \frac{6}{7}$ , então o valor de  $\frac{2.p.r}{6.q}$  é igual a**

- (A) 10
- (B)  $\frac{1}{10}$
- (C) 1
- (D)  $\frac{1}{5}$
- (E) 5

12

**Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que ainda falta identificar o último termo:**

**(- 8, - 7, - 3, 4, 14, \_\_).**

**Seguindo a lógica de formação dessa sequência, então o último termo da sequência dada é igual a**

- (A) 33.
- (B) 31.
- (C) 29.
- (D) 27.
- (E) 25.

13

Uma dosagem total de 100 ml deve ser preparada para ser aplicada em um paciente a partir da mistura de três tipos de soluções, identificadas por H, J e Q, tal que  $\frac{3}{4}$  da dosagem total é da solução H,  $\frac{1}{5}$  da dosagem total é da solução J e o restante da dosagem total é da solução Q. Dessa forma, uma fração que indica a divisão entre as quantidades da solução Q e da solução H, nessa dosagem e nessa ordem, é igual a

- (A)  $\frac{1}{4}$
- (B)  $\frac{15}{4}$
- (C)  $\frac{1}{15}$
- (D)  $\frac{4}{5}$
- (E)  $\frac{4}{15}$

14

Cinco pessoas, identificadas como P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub> e P<sub>5</sub>, estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar dois tipos de exames laboratoriais. Sabe-se que duas dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de Hemograma e as outras três, também cada um na sua vez, irão fazer o exame de Glicemia. Sabe-se também que P<sub>3</sub> e P<sub>4</sub> irão fazer o mesmo tipo de exame, P<sub>2</sub> e P<sub>4</sub> irão fazer exames de tipos diferentes e P<sub>2</sub> e P<sub>5</sub> irão fazer exames de tipos diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) P<sub>1</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (B) P<sub>5</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (C) P<sub>3</sub> irá fazer o exame de Hemograma.
- (D) P<sub>2</sub> irá fazer o exame de Glicemia.
- (E) P<sub>4</sub> irá fazer o exame de Glicemia.

15

Comparando os números 500 e 100, é correto afirmar que

- (A) 500 é exatamente 300% maior que 100.
- (B) 500 é exatamente 400% maior que 100.
- (C) 100 é exatamente 180% menor que 500.
- (D) 500 é exatamente 100% maior que 100.
- (E) 100 é exatamente 60% menor que 500.

## Informática

16

No software Microsoft Excel 2013, versão em português do Brasil, qual das funções a seguir deve ser utilizada para agrupar várias cadeias de texto em uma única sequência de texto?

- (A) ARRUMAR
- (B) CARACT
- (C) BAHTTEXT
- (D) CARACTUNICODE
- (E) CONCATENAR

17

No sistema Microsoft Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons?

- (A) Mmsys.cpl
- (B) Netcpl.cpl
- (C) Sysdm.cpl
- (D) Joy.cpl
- (E) Mlcfg32.cpl

18

Considerando o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual programa deve ser utilizado para abrir um arquivo que possua a extensão “.STL”?

- (A) Windows Media Player.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Visualizador 3D.
- (D) Microsoft PowerPoint.
- (E) Gravador de Passos.

19

Qual é o caminho correto para encontrar a ferramenta que cria um disco de reparação do sistema no sistema Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 versão em Português?

- (A) Menu Iniciar, Acessórios do Windows e Backup e Restauração.
- (B) Painel de controle, Sistema e Segurança e Backup e Restauração.
- (C) Menu Iniciar, Programas e Backup do Windows.
- (D) Barra de notificações, Configurações de Inicialização e Backup e Restauração.
- (E) Painel de Controle e Backup do Windows 7.

20

Um byte é composto por quantos bits?

- (A) 64
- (B) 32
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 2

### **Conhecimentos Específicos**

21

De acordo com a definição do DSM-5, um Episódio Hipomaníaco deve ter a duração de, pelo menos,

- (A) dois dias consecutivos.
- (B) três dias consecutivos.
- (C) quatro dias consecutivos.
- (D) cinco dias consecutivos.
- (E) seis dias consecutivos.

22

O Exame do Estado Mental (EEM) é um elemento essencial para uma boa consulta psiquiátrica. Em relação a isso, assinale a alternativa que apresenta corretamente três alterações da sensopercepção possíveis de serem observadas no EEM.

- (A) Despersonalização, alucinação visual e perseveração.
- (B) Alucinação tátil, desrealização e descarrilamento.
- (C) Associações por assonância, despersonalização e delírio erotomaníaco.
- (D) Alucinação gustativa, ilusão e alucinação olfativa.
- (E) Alucinação auditiva, alucinação visual e circunstancialidade.

23

Um homem de 63 anos diz que passou por tratamentos psiquiátricos em dois momentos da sua vida, por episódios depressivos, quando era mais jovem e morava fora do Brasil. Relata que, em ambos os tratamentos, usou medicações antidepressivas pertencentes à classe medicamentosa dos Inibidores da Monoaminoxidase. Qual das seguintes alternativas apresenta as medicações usadas por esse homem nos seus tratamentos psiquiátricos?

- (A) Tranilcipromina e Rivastigmina.
- (B) Vortioxetina e Rasagilina.
- (C) Isocarboxazida e Donepezila.
- (D) Selegilina e Fenelzina.
- (E) Moclobemida e Tacrina.

24

Dentre as seguintes alternativas, são sintomas relacionados ao Transtorno de Ansiedade Generalizada, segundo os critérios diagnósticos do DSM-5, EXCETO

- (A) sensação de estar com os nervos à flor da pele.
- (B) taquicardia.
- (C) sensações de “branco” na mente.
- (D) tensão muscular.
- (E) irritabilidade.

**25**

**No Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor, ocorrem explosões de raiva recorrentes e graves manifestadas pela linguagem e/ou pelo comportamento que são consideravelmente desproporcionais em intensidade ou em duração à situação ou provocação. Para o correto diagnóstico desse transtorno, segundo o DSM-5, as explosões de raiva devem ocorrer, em média,**

- (A) duas ou mais vezes por semana.
- (B) três ou mais vezes por mês.
- (C) cinco ou mais vezes por mês.
- (D) cinco ou mais vezes por semana.
- (E) três ou mais vezes por semana.

**26**

**Sobre os Transtornos de Tique, assinale a alternativa correta, segundo o DSM-5.**

- (A) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Motor ou Vocal Persistente, o início dos tiques deve ocorrer após os 6 anos de idade.
- (B) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tourette, o início dos tiques deve ocorrer antes dos 12 anos de idade.
- (C) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Transitório, o início dos tiques deve ocorrer após os 5 anos de idade.
- (D) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tique Motor ou Vocal Persistente, o início dos tiques deve ocorrer antes dos 18 anos de idade.
- (E) Para o correto diagnóstico de Transtorno de Tourette, o início dos tiques deve ocorrer após os 12 anos de idade.

**27**

**Segundo o DSM-5, quais dos seguintes transtornos são mais prevalentes no sexo masculino do que no sexo feminino?**

- (A) Transtorno de Estresse Agudo e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
- (B) Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtorno de Estresse.
- (C) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e Transtorno do Espectro Autista.
- (D) Transtorno de Estresse Agudo e Transtorno do Espectro Autista.
- (E) Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtorno do Espectro Autista.

**28**

**Em relação à idade mínima que um indivíduo precisa ter para receber o diagnóstico de Transtorno da Personalidade Antissocial, segundo o DSM-5, assinale a alternativa correta.**

- (A) A idade mínima é 12 anos.
- (B) A idade mínima é 15 anos.
- (C) A idade mínima é 18 anos.
- (D) A idade mínima é 21 anos.
- (E) Não há restrição de idade para o diagnóstico desse transtorno.

**29**

**Sobre a Amnésia Dissociativa, segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) O início desse transtorno costuma ser súbito.
- ( ) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa ter, pelo menos, 12 anos de idade.
- ( ) Nesse transtorno, a duração dos eventos esquecidos pode ir desde minutos até décadas.

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – V
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – V.

**30**

Na primeira consulta com um novo Psiquiatra, uma mulher de 52 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno Conversivo Persistente, de acordo com os sintomas apresentados. Levando em consideração que o Psiquiatra tomou como base as diretrizes do DSM-5 para especificar o quadro da paciente como “Persistente”, é correto afirmar que os sintomas estão ocorrendo há, pelo menos,

- (A) um ano.
- (B) três meses.
- (C) um mês.
- (D) seis meses.
- (E) dois anos.

**31**

Sobre o Transtorno do Espectro Autista, assinale a alternativa INCORRETA, segundo o DSM-5.

- (A) Segundo o DSM-5, há 4 níveis de gravidade para esse transtorno ser especificado.
- (B) Os sintomas costumam ser reconhecidos durante o segundo ano de vida (12 a 24 meses).
- (C) Uma pequena proporção de indivíduos apresenta deterioração comportamental na adolescência, enquanto a maioria dos outros melhora.
- (D) Esse transtorno é diagnosticado mais frequentemente em homens do que em mulheres.
- (E) O Transtorno do Espectro Autista engloba transtornos antes chamados de Autismo Infantil Precoce, Autismo Infantil, Autismo de Kanner, Autismo de Alto Funcionamento, Autismo Atípico, Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação, Transtorno Desintegrativo da Infância e Transtorno de Asperger.

**32**

Qual das alternativas a seguir apresenta uma informação INCORRETA sobre o Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve com Corpos de Lewy, conforme o DSM-5?

- (A) Esse transtorno é mais prevalente no sexo masculino, em comparação ao sexo feminino.
- (B) Esse transtorno tem surgimento insidioso.
- (C) É uma das características diagnósticas centrais desse transtorno a presença de alucinações auditivas recorrentes, bem formadas e detalhadas.
- (D) O aparecimento de sintomas costuma ser observado a partir da sexta até a nona década de vida, com a maior parte dos casos surgindo quando as pessoas afetadas estão na metade da sétima década de vida.
- (E) Esse transtorno tem progressão gradual.

**33**

Um rapaz de 20 anos busca ajuda psiquiátrica pela primeira vez. Relata que tem tido um comportamento, há mais de 1 ano, de observar repetidamente sua prima, de 18 anos, pela fechadura da porta, enquanto ela troca de roupa no seu quarto. Esse comportamento traz muita excitação ao rapaz e ele diz que não consegue parar de fazê-lo, mesmo sofrendo por saber que não é algo adequado. Diante desse quadro, qual é o diagnóstico mais provável para o caso desse rapaz?

- (A) Transtorno Exibicionista.
- (B) Transtorno Frotteurista.
- (C) Transtorno Pedofílico.
- (D) Transtorno Voyeurista.
- (E) Transtorno do Masoquismo Sexual.

34

Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Uma pessoa que começou a apresentar vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade, com 14 anos, pode receber o diagnóstico de TDAH, segundo o DSM-5.
- ( ) Quando vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em um ambiente (por exemplo: em casa), o diagnóstico já pode ser realizado.
- ( ) O TDAH é cerca de 3 vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens, tanto na infância quanto na idade adulta.

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – F.

35

Dentre as alternativas a seguir, são sintomas relacionados a Ataques de Pânico, EXCETO

- (A) medo de “enlouquecer”.
- (B) náusea.
- (C) parestesias.
- (D) irritabilidade.
- (E) tremores.

36

Referente ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O sexo feminino é mais afetado, tanto na infância quanto na idade adulta.
- ( ) As mulheres têm idade mais precoce de início do que os homens.
- ( ) O início dos sintomas nesse transtorno é, geralmente, gradual.

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – V.

37

Sobre a Enurese, assinale a alternativa INCORRETA, segundo o DSM-5.

- (A) O subtipo exclusivamente noturno da Enurese envolve incontinência apenas durante o sono noturno, geralmente durante o último terço da noite.
- (B) A idade cronológica mínima para o diagnóstico de Enurese é de 5 anos (ou nível de desenvolvimento equivalente).
- (C) A faixa etária mais comum de início da Enurese Secundária é entre 5 e 8 anos, mas ela pode ocorrer em qualquer idade.
- (D) O subtipo exclusivamente noturno da Enurese é o mais comum.
- (E) A maioria das crianças com esse transtorno se torna continente até a adolescência.

**38**

**Sobre o Transtorno Psicótico Breve, assinale a alternativa correta, de acordo com as diretrizes do DSM-5.**

- (A) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa apresentar, pelo menos, um dos sintomas a seguir: delírios, alucinações ou comportamento grosseiramente desorganizado.
- (B) Para o diagnóstico desse transtorno, a duração de um episódio da perturbação deve ser de, pelo menos, 3 dias.
- (C) Esse transtorno tem idade média de início situando-se abaixo de 20 anos.
- (D) Para o diagnóstico desse transtorno, a duração de um episódio da perturbação deve ser inferior a 3 meses.
- (E) Esse transtorno é mais comum no sexo feminino do que no masculino.

**39**

**Em relação à predominância de gênero na Tricotilomania, no Transtorno de Escoriação e na Piromania, assinale a alternativa correta, segundo os dados do DSM-5.**

- (A) Todos esses transtornos são mais comuns no sexo feminino do que no sexo masculino.
- (B) A Piromania é mais comum no sexo masculino e a Tricotilomania e o Transtorno de Escoriação são mais comuns no sexo feminino.
- (C) O Transtorno de Escoriação e a Piromania são mais comuns no sexo masculino e a Tricotilomania é mais comum no sexo feminino.
- (D) A Tricotilomania é mais comum no sexo masculino e a Piromania e o Transtorno de Escoriação são mais comuns no sexo feminino.
- (E) Todos esses transtornos são mais comuns no sexo masculino do que no sexo feminino.

**40**

**Uma jovem, de 17 anos, preencheu todos os critérios para o diagnóstico de Bulimia Nervosa, na sua primeira consulta com o Médico Psiquiatra. Além disso, na anamnese, o Psiquiatra constatou que essa jovem tinha uma média de 7 episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana. Com base na especificação de gravidade do DSM-5 para esse transtorno, é possível considerar que a jovem apresenta um quadro de Bulimia Nervosa**

- (A) Leve.
- (B) Extrema.
- (C) Mínima.
- (D) Grave.
- (E) Moderada.

**41**

**No Transtorno de Escoriação, o indivíduo acometido belisca a pele de forma recorrente, resultando em lesões. Sobre esse transtorno, qual alternativa apresenta uma ideia correta, segundo o DSM-5?**

- (A) Os locais mais comumente beliscados são pernas e pés.
- (B) Esse transtorno é mais comum em membros da família de primeiro grau de indivíduos com TOC do que na população em geral.
- (C) O sexo masculino é mais afetado por esse transtorno do que o sexo feminino.
- (D) Pessoas acometidas por esse transtorno não tentam reduzir ou parar o comportamento de beliscar a pele.
- (E) O curso desse transtorno, em geral, é agudo e autolimitado, com remissão habitual em algumas semanas.

**42**

**Segundo o DSM-5, no Transtorno de Adaptação, uma vez que o estressor ou suas consequências tenham cedido, os sintomas não persistem por mais de**

- (A) seis meses.
- (B) três meses.
- (C) um mês.
- (D) um ano.
- (E) dois meses



43

Qual das seguintes alternativas apresenta dois psicofármacos que **NÃO** pertencem à classe medicamentosa dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina?

- (A) Clorpromazina e Sertralina.
- (B) Olanzapina e Fluvoxamina.
- (C) Asenapina e Bupropiona.
- (D) Venlafaxina e Citalopram.
- (E) Oxcarbazepina e Paroxetina.

44

A respeito do Transtorno Explosivo Intermitente, segundo o DSM-5, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Para o diagnóstico desse transtorno, a pessoa precisa ter, pelo menos, 4 anos de idade (ou nível de desenvolvimento equivalente).
- ( ) Esse transtorno é muito mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino.
- ( ) O início de comportamentos agressivos impulsivos problemáticos recorrentes, característicos desse transtorno, é mais comum na fase inicial da infância.

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – V.

45

Para o diagnóstico de Transtorno de Insônia, segundo o DSM-5, as dificuldades relacionadas ao sono precisam ocorrer em pelo menos

- (A) cinco noites por semana.
- (B) três noites por semana.
- (C) quatro noites por semana.
- (D) duas noites por semana.
- (E) uma noite por semana.

46

No pronto-atendimento de um hospital geral, um rapaz de 32 anos recebeu o diagnóstico de Abstinência de Cafeína, devido ao quadro clínico e à anamnese realizada. Diante desse diagnóstico, é possível esperar, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5, que o rapaz **NÃO** apresenta

- (A) cefaleia.
- (B) insônia.
- (C) humor deprimido.
- (D) dificuldade de concentração.
- (E) sintomas gripais.

47

O Modelo de Kübler-Ross organiza, de forma abrangente e útil, as reações dos indivíduos à morte iminente. Esse modelo, muito usado para a devida compreensão de casos de interconsulta psiquiátrica, em hospital geral, propõe uma descrição de cinco estágios pelos quais as pessoas passam ao lidar com o luto. Além de Raiva, Negação e Barganha, quais são os outros estágios desse modelo?

- (A) Fuga e Antecipação.
- (B) Antecipação e Finalização.
- (C) Depressão e Resignação.
- (D) Espera e Finalização.
- (E) Aceitação e Depressão.

**48**

**De acordo com as diretrizes do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª Edição (DSM-5), assinale a alternativa correta a respeito do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).**

- (A) Se o indivíduo testemunha pessoalmente um evento traumático ocorrido com outra pessoa, ele pode receber o diagnóstico de TEPT, caso preencha os critérios diagnósticos devidos.
- (B) É considerado TEPT de expressão tardia se todos os critérios diagnósticos não forem atendidos até, pelo menos, um ano depois do evento.
- (C) Para receber esse diagnóstico, a pessoa deve ter, pelo menos, 12 anos de idade completos.
- (D) O diagnóstico em homens corresponde a cerca de 60% de todos os casos de TEPT.
- (E) *Status* socioeconômico mais baixo é um fator protetor contra TEPT, devido à habituação a situações mais desfavoráveis.

**49**

**Uma mulher de 32 anos está em tratamento psiquiátrico e, na sua prescrição, há psicofármacos de 3 classes medicamentosas: um Benzodiazepínico, um Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina e Norepinefrina e um Antipsicótico Atípico. Qual das alternativas a seguir corresponde à prescrição dessa paciente?**

- (A) Clonazepam, Desvenlafaxina e Flufenazina.
- (B) Alprazolam, Agomelatina e Risperidona.
- (C) Lorazepam, Duloxetina e Lurasidona.
- (D) Piracetam, Venlafaxina e Olanzapina.
- (E) Diazepam, Fluvoxamina e Quetiapina.

**50**

**O DSM-5 reúne os Transtornos da Personalidade em três grupos, com base em aspectos que eles têm em comum. Um desses grupos é formado por Transtorno da Personalidade Esquizoide, Transtorno da Personalidade Esquizotípica e**

- (A) Transtorno da Personalidade Paranoide.
- (B) Transtorno da Personalidade Antissocial.
- (C) Transtorno da Personalidade Histriônica.
- (D) Transtorno da Personalidade Dependente.
- (E) Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva.

51

**Sobre o Transtorno Factício, assinale a alternativa correta, segundo o DSM-5.**

- (A) No Transtorno Factício, há a especificação de episódios recorrentes, quando ocorrem pelo menos três eventos de falsificação de doença e/ou indução de lesão.
- (B) No Transtorno Factício Imposto a Outro, o agente, não a vítima, é quem recebe o diagnóstico.
- (C) O curso do transtorno factício geralmente envolve episódio único de falsificação de doença e/ou indução de lesão.
- (D) No Transtorno Factício Imposto a Outro, o comportamento fraudulento sempre envolve recompensas externas óbvias.
- (E) No Transtorno Factício, a manifestação inicial costuma ocorrer no início da adolescência.

52

**Na consulta com um Psiquiatra, uma mulher de 30 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno de Compulsão Alimentar. Dois fatores importantes para o correto diagnóstico desse transtorno são a frequência e a duração dos episódios de compulsão alimentar. Segundo o DSM-5, para se fazer o diagnóstico do transtorno em questão, os episódios de compulsão alimentar devem ocorrer, em média, ao menos**

- (A) três vezes por semana durante três meses.
- (B) duas vezes por semana durante três meses.
- (C) uma vez por semana durante três meses.
- (D) duas vezes por semana durante um mês.
- (E) três vezes por semana durante um mês.

53

**Qual das alternativas apresenta dois transtornos parafilicos, segundo o DSM-5?**

- (A) Transtorno Fetichista e Transtorno do Orgasmo Feminino.
- (B) Transtorno do Masoquismo Sexual e Disforia de Gênero.
- (C) Transtorno Pedofílico e Transtorno do Interesse Sexual Feminino.
- (D) Transtorno Dismórfico Corporal e Transtorno do Sadismo Sexual.
- (E) Transtorno Transvêstico e Transtorno Frotteurista.

54

**Um paciente de 40 anos recebeu o diagnóstico de Transtorno Delirante, após uma consulta com Psiquiatra. O profissional disse que o paciente preenchia todos os critérios do DSM-5 para esse transtorno, incluindo o tempo de presença do delírio manifestado por ele. Sabendo-se que esse delírio no paciente, estava presente há dois meses, é correto afirmar, segundo as informações mencionadas, que**

- (A) o diagnóstico está correto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de um mês ou mais.
- (B) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de três meses ou mais.
- (C) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de seis meses ou mais.
- (D) o diagnóstico está incorreto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de um ano ou mais.
- (E) o diagnóstico está correto, pois, para o diagnóstico desse transtorno, precisa haver a presença de um delírio (ou mais) com a duração de dois meses ou mais.

**55**

**A fuga de ideias é considerada uma alteração do processo de pensamento, muitas vezes, observada no Exame do Estado Mental. Assinale a alternativa que define melhor essa alteração.**

- (A) Invenção de novas palavras ou expressões ou uso de palavras convencionais de maneiras idiossincráticas.
- (B) Inclusão exagerada de detalhes triviais ou irrelevantes que impedem de se chegar à questão.
- (C) Repetição de palavras, expressões e ideias fora do contexto.
- (D) Uma interrupção repentina do pensamento ou uma quebra no fluxo de ideias.
- (E) Uma sucessão de associações múltiplas, de maneira que os pensamentos parecem passar de repente de uma ideia para outra.

**56**

**Qual das alternativas apresenta corretamente dois sinais/sintomas relacionados à abstinência de opioides, de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5?**

- (A) Dores musculares e sonolência.
- (B) Piloereção e bocejos.
- (C) Sudorese e constipação intestinal.
- (D) Miose e lacrimejamento.
- (E) Arritmia cardíaca e febre.

**57**

**Assinale a alternativa que apresenta uma medicação considerada um Antipsicótico de Primeira Geração.**

- (A) Clozapina.
- (B) Ziprasidona.
- (C) Aripiprazol.
- (D) Clorpromazina.
- (E) Paliperidona.

**58**

**Um paciente de 36 anos foi diagnosticado, por seu Psiquiatra, com Transtorno Depressivo Maior, após relatar uma série de sintomas que estavam ocorrendo nas últimas semanas, na maior parte do dia, quase todos os dias. São sintomas apresentados por esse paciente que estão entre os critérios diagnósticos do DSM-5 para o transtorno diagnosticado:**

- (A) acentuada diminuição do interesse em quase todas as atividades, indecisão, fadiga.
- (B) humor deprimido, cefaleia e aumento do apetite.
- (C) insônia, agitação, irritabilidade.
- (D) capacidade diminuída para se concentrar, sensações de asfixia, hipersonia.
- (E) culpa excessiva, acentuada diminuição do prazer em quase todas as atividades, despersonalização.

**59**

**Segundo a especificação do DSM-5, o Transtorno Depressivo Persistente (Distímia) com início precoce é aquele em que o início ocorre antes dos**

- (A) 15 anos de idade.
- (B) 18 anos de idade.
- (C) 21 anos de idade.
- (D) 30 anos de idade.
- (E) 45 anos de idade.

**60**

**Uma das novidades do DSM-5 foi a criação de um capítulo próprio contendo o Transtorno Obsessivo-Compulsivo e transtornos relacionados.**

**Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente dois transtornos que estão contidos nesse capítulo do DSM-5.**

- (A) Transtorno de Acumulação e Pica.
- (B) Disforia de Gênero e Tricotilomania.
- (C) Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva e Transtorno de Acumulação.
- (D) Tricotilomania e Transtorno de Escoriação.
- (E) Pica e Transtorno Dismórfico Corporal.

Realização



**instituto aacp**