



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



M1422040N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

# TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_

Nível

**TÉCNICO**

Turno

**MANHÃ**

**PROVA**

**01**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

## Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

## Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

## Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

## Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico [www.institutoaacp.org.br](http://www.institutoaacp.org.br)

## Língua Portuguesa

### Saúde mental em tempos de pandemia Relações sociais, estresse e resiliência

**KELLY PEREIRA ROBIS**

O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. No entanto, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos. Vivências negativas não são totalmente deletérias: pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações interpessoais. Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência.

A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto no qual se estabelece a reciprocidade e a complementaridade que certamente podem ser um mecanismo de proteção em termos de saúde mental, em tempos de estresse e de isolamento.

Considerando o contexto atual de pandemia, essa relação, que é tão importante, para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. Dessa forma, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada. Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez que respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.

#### **Agressividade**

Como consequência, podemos imputar ao outro o resultado de uma vivência pessoal, ao sermos hostis e agressivos. Claramente, essa emoção precisa ser “colocada para fora”, mas, não de forma violenta: dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que uma comunicação agressiva.

Todavia, o estado emocional do outro também precisa ser levado em consideração, por isso a leitura do ambiente é fundamental. Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza.

#### **Diálogo**

A abordagem não empática desse sofrimento pode desgastar ainda mais as relações interpessoais, justamente quando mais precisamos delas. Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.

Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental. Afinal, saúde mental pode começar pelo olhar acolhedor daqueles que tanto amamos.

Disponível em: <https://www.otempo.com.br/opiniaio/artigos/saude-mental-em-tempos-de-pandemia-1.234535>. Acesso em: 04 dez. 2020.

**1**

**De acordo com o texto, é correto afirmar que**

- (A) os seres humanos culpabilizam seus familiares e/ou amigos próximos por seus medos e anseios.
- (B) as pessoas tornaram-se mais agressivas e mais facilmente irritáveis com a pandemia.
- (C) relações familiares calcadas, sobretudo, em diálogo e empatia podem ser grandes aliadas para fortalecimento da saúde mental.
- (D) pessoas que sofrem com a depressão costumam expor suas emoções de modo violento e agressivo.
- (E) problemas individuais, em um contexto familiar, devem ser priorizados em detrimento dos problemas coletivos.

**2**

**Para a autora, a prevenção do adoecimento mental relaciona-se também**

- (A) ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo em lidar com problemas.
- (B) aos benefícios de uma vida tranquila, sem situações de violência e/ou agressividade.
- (C) a um ambiente livre de pressões e situações adversas.
- (D) à persistência em se evitar momentos traumáticos e/ou de estresse.
- (E) à importância de vivências íntimas consigo mesmo, sem contato social.

3

Assinale a alternativa em que o conectivo “que” esteja sendo utilizado para retomar um termo antecedente.

- (A) [...] pessoas **que** estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros [...]”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para **que** a prevenção do adoecimento mental aconteça [...]”.
- (C) “Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez **que** respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.”.
- (D) “[...] dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do **que** uma comunicação agressiva.”.
- (E) “[...] entende-se **que** a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia [...]”.

4

Observe o termo destacado no período que segue: “Vivências negativas não são totalmente **deletérias**: pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações interpessoais.”. Tal termo, nesse caso, tem sentido equivalente a

- (A) inócuas.
- (B) benéficas.
- (C) indeléveis.
- (D) prejudiciais.
- (E) perduráveis.

5

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa a noção semântica de conclusão.

- (A) “O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. **No entanto**, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos.”.
- (B) “[...] essa relação [...] pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. **Dessa forma**, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada.”.
- (C) Claramente, essa emoção precisa ser “colocada para fora”, **mas**, não de forma violenta [...]”.
- (D) “(...) dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente **mais** efetivo e saudável **do que** uma comunicação agressiva.”.
- (E) “[...] a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, **todavia**, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação [...]”.

6

Analise o período que segue.

“Problemas individuais devem ser levados em consideração, **uma vez que respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.**”.

Em relação à oração anterior, a sentença destacada tem valor semântico de

- (A) consequência, por indicar o efeito que o medo e a ansiedade podem gerar em nós.
- (B) finalidade, pois indica o objetivo de problemas serem levados em conta.
- (C) proporção, por manifestar um aumento proporcional entre problemas individuais e ansiedade e medo.
- (D) condição, pois evidencia a condicionalidade existente entre a ocorrência de ansiedade e medo com a consideração de problemas individuais.
- (E) causa, por indicar o motivo de precisarmos levar em conta problemas individuais.

7

Levando em conta os usos da vírgula, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Vírgulas usadas para isolar conjunção adversativa.
2. Vírgula usada para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. Vírgula inadequada, separando sujeito e predicado.
4. Vírgulas usadas para separar termos coordenados.
5. Vírgulas usadas para isolar oração adjetiva explicativa.

- ( ) “[...] essa relação, que é tão importante, para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento.”.
- ( ) “Claramente, essa emoção precisa ser ‘colocada para fora’ [...]”.
- ( ) “Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza.”.
- ( ) “Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.”.
- ( ) “[...] relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental.”.

- (A) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.  
 (B) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.  
 (C) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.  
 (D) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.  
 (E) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.

8

Considerando as regras de acentuação dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a alternativa cujo termo destacado receba acento pelo mesmo motivo que “*antropológica*”, empregado em “A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto (...)”.

- (A) “A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto [...]”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para a prevenção do adoecimento mental, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência.”.
- (C) “Todavia, o estado emocional do outro também precisa ser levado em consideração, [...]”.
- (D) “A abordagem não empática desse sofrimento pode desgastar ainda mais as relações interpessoais, [...]”.
- (E) “Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.”.

9

Inúmeros substantivos na Língua Portuguesa formam-se por derivação regressiva, ou seja, derivam-se de verbos. Sabendo disso, assinale a alternativa cujo vocábulo em destaque fora formado por esse processo.

- (A) “O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências.”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, [...]”.
- (C) “Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, [...]”.
- (D) “[...] essa relação, que é tão importante para o ser humano, pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina [...]”.
- (E) “[...] dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que uma comunicação agressiva.”.

10

Considerando o seguinte trecho, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental.”.

- ( ) O trecho “[...] que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia [...]” funciona como objeto direto da estrutura verbal “entende-se”.
- ( ) Ainda em “[...] a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, [...]”, os termos destacados atribuem características e pertencem à mesma classe de palavras.
- ( ) A conjunção “todavia” indica oposição e poderia ser substituída por “contudo”.
- ( ) O segmento “[...] leitura emocional do outro [...]”, fora desse contexto, torna-se ambíguo.

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – F – V.

## Matemática

11

Ao final de cada mês, ao realizar o pagamento dos salários dos funcionários de uma empresa, o RH escolhe um entre os funcionários para receber uma bonificação, além do seu salário normal. A bonificação terá um valor fixo de R\$ 100,00 e, a esse valor fixo, será somada a oitava parte do salário normal recebido por esse funcionário. Dessa forma, se no final de determinado mês o funcionário escolhido para receber a bonificação possuir um salário normal igual R\$ 3.568,00, então, o valor total que ele irá receber como pagamento será igual a

- (A) R\$ 5.046,00.
- (B) R\$ 4.114,00.
- (C) R\$ 5.546,00.
- (D) R\$ 4.546,00.
- (E) R\$ 3.546,00.

12

Uma pessoa precisa realizar uma tarefa em 8 horas, no máximo. Se desde o início da tarefa já se passaram  $\frac{3}{4}$  do tempo máximo permitido, então, para finalizar sua tarefa, essa pessoa ainda dispõe de

- (A) 1 hora.
- (B) 1 hora e 30 minutos.
- (C) 2 horas.
- (D) 2 horas e 30 minutos.
- (E) 3 horas.

13

O resultado do produto  $(\sqrt{49\%}) \times (50\%)$ , na forma de taxa percentual, é igual a

- (A) 95%.
- (B) 15%.
- (C) 55%.
- (D) 75%.
- (E) 35%.

14

**A sequência numérica**

**(100, 80, 40, 20, 10, -10, -5, ...)**

**segue um padrão lógico. O termo dessa sequência imediatamente posterior ao número -5 é igual a**

- (A) -25.
- (B) 35.
- (C) -20.
- (D) 40.
- (E) -10.

15

**A seguir, é apresentada uma sequência numérica, tal que os elementos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que x e y são números inteiros:**

**(24, 13, 22, 11, 20, 9, x, y).**

**Observando essa sequência e encontrando os valores de x e de y, seguindo a lei de formação da sequência dada, é correto afirmar que**

- (A) x é um número maior que 30.
- (B) y é um número menor que 5.
- (C) a soma de x com y resulta em 25.
- (D) o produto de x por y resulta em 106.
- (E) a diferença entre y e x, nessa ordem, é um número positivo.

## **Informática**

16

**Considerando o software Microsoft Excel 2013, versão em português, assinale a alternativa que apresenta um argumento válido na sintaxe da função TEXTO.**

- (A) valor
- (B) tamanho do texto
- (C) comprimento
- (D) intervalo
- (E) condição

17

**No sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual dos seguintes aplicativos deve ser utilizado para transformar uma partição FAT em NTFS?**

- (A) Bootcfg.exe
- (B) Convert.exe
- (C) Chkdsk.exe
- (D) Drfgui.exe
- (E) Fortfiles.exe

18

**No software Microsoft Power Point 2013, versão em português, existe um botão “Organizar” que oferece opções de ordenação de objetos de um slide. Em qual guia esse item pode ser encontrado?**

- (A) INSERIR.
- (B) DESIGN.
- (C) TRANSIÇÕES.
- (D) EXIBIÇÃO.
- (E) PÁGINA INICIAL.

19

**Assinale a alternativa que apresenta um dispositivo de memória ROM.**

- (A) Cartão EDO.
- (B) Módulo DIMM.
- (C) Cartão SD.
- (D) Módulo DDR.
- (E) CACHE.

20

**Considerando as grandezas computacionais, 2 Kilobytes correspondem a quantos bytes?**

- (A) 1024
- (B) 20486
- (C) 1000
- (D) 2048
- (E) 1048

## Conhecimentos Específicos

21

**Um técnico em enfermagem da clínica médica, ao realizar anotações de enfermagem dos pacientes sob seus cuidados, registrava e assinava ações de enfermagem que não havia executado. Por esse motivo, instaurou-se processo ético e disciplinar que, após apuração dos fatos, aplicou a esse profissional a penalidade de**

- (A) censura.
- (B) cassação ao direito de exercício da profissão.
- (C) subvenção.
- (D) assinatura de termo circunstanciado.
- (E) suspensão do exercício profissional, por 120 dias.

22

**Sobre a Lei nº 7.498/1986, é correto afirmar que**

- (A) regulamenta o cumprimento de prescrição médica à distância.
- (B) prevê o quantitativo de profissionais de enfermagem de acordo com índices de segurança técnica.
- (C) afirma que cabe privativamente ao enfermeiro a prescrição da assistência de enfermagem.
- (D) destaca que a enfermagem é exercida privativamente e apenas pelo enfermeiro e pelo técnico em enfermagem.
- (E) cria o Conselho Regional de Enfermagem (COREN), constituindo uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social.

23

**Um técnico em enfermagem deve conhecer sua regulamentação profissional. Assim, de acordo com o decreto nº 94.406/1987, cabe a esse profissional executar qual das seguintes atividades?**

- (A) Prescrever assistência de enfermagem.
- (B) Realizar auditoria em serviços hospitalares de complexidade intermediária.
- (C) Chefiar serviços públicos e de unidade de enfermagem.
- (D) Assistir ao enfermeiro na supervisão de assistência de enfermagem.
- (E) Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública.

24

**Considerado uma área complexa e de acesso restrito, o centro cirúrgico é composto por uma série de dependências interligadas, sendo correto afirmar que uma das áreas que é considerada restrita ou zona estéril é**

- (A) a farmácia.
- (B) a sala de espera.
- (C) o vestiário.
- (D) a sala de operações.
- (E) a sala de guarda e preparo de anestésicos.

**25**

**A assistência de enfermagem perioperatória é considerada vital para a realização e o sucesso de um ato anestésico-cirúrgico. Assim, é uma atribuição do técnico de enfermagem do centro cirúrgico, principalmente,**

- (A) manter o controle administrativo, técnico-operacional e ético sobre as diversas atividades desenvolvidas no centro cirúrgico.
- (B) prover a sala de operações com recursos adequados às necessidades do paciente e segundo as especificidades de cada intervenção anestésico-cirúrgica.
- (C) tomar decisões administrativas e assistenciais baseadas em evidências científicas.
- (D) elaborar o plano de cuidados de enfermagem para o período transoperatório e supervisionar sua implementação.
- (E) realizar consulta de enfermagem no pré e no pós-operatório e recepcionar o paciente no centro cirúrgico.

**26**

**Durante um procedimento cirúrgico de Colectomia, ocorre**

- (A) sutura da flexura sigmoide à parede abdominal.
- (B) visualização de uma articulação.
- (C) abertura e colocação de dreno na vesícula biliar.
- (D) plástica do piloro para aumentar seu diâmetro.
- (E) extirpação do ducto colédoco.

**27**

**No período transoperatório, o posicionamento cirúrgico é uma ação importante e sua responsabilidade deve ser compartilhada por toda a equipe atuante na sala de operações. Nesse contexto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) Idade, altura e peso do paciente não estão relacionados a fatores que podem definir a posição cirúrgica.
- ( ) É adequado que membros superiores fiquem pendentes na mesa de operação.
- ( ) É necessário impedir contato direto do paciente com a superfície metálica da mesa de operação.
- ( ) Deve-se evitar hiperextensão das terminações nervosas, para prevenção de paralisias e/ou parestesias, que podem ser irreversíveis.

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – V – V – V.
- (E) V – F – F – F.

**28**

**Um técnico de enfermagem realizou aferição dos sinais vitais de um paciente da clínica médica. Os dados obtidos foram: temperatura 38°C, pulso 120 bat/min e pressão arterial 90/40 mmHg. Ao informar ao enfermeiro os dados, o técnico relata que o paciente encontra-se**

- (A) afebril – taquicárdico – normotenso.
- (B) com hiperpirexia – normocárdico – hipotenso.
- (C) febril – taquicárdico – hipotenso.
- (D) hipotérmico – bradicárdico – hipertenso.
- (E) em estado febril – taquipneico – normotenso.

**29**

**No controle de infecções hospitalares relacionadas à inserção de cateter periférico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve-se avaliar o sítio de inserção de pacientes pediátricos no mínimo uma vez ao dia.
- (B) A avaliação de necessidade de permanência do cateter deve ser semanal.
- (C) Rotineiramente, o cateter periférico não deve ser trocado em um período inferior a 12 horas.
- (D) O cateter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica asséptica deve ser trocado tão logo quanto possível.
- (E) Não é recomendado remover o cateter periférico, mesmo que não haja medicamentos endovenosos prescritos e que ele não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas.

**30**

**A posição cirúrgica de Canivete ou Jackknife, com variações de Kraske ou Depage, é uma modificação do decúbito ventral. Assim, é correto afirmar que, nesse posicionamento,**

- (A) a cabeça do paciente, o tórax e os pés precisam de suportes adicionais, para evitar complicações pós-operatórias.
- (B) eleva-se levemente os pés, e os coxins na região poplíteia propiciam repouso, evitando, também, o deslocamento caudal do tronco.
- (C) coloca-se acolchoamento nas nádegas (tuberosidade isquiática) e no dorso (proeminências ósseas da escápula e ombro).
- (D) o dorso da mesa deve ser elevado e um coxim roliço é colocado sob os ombros do paciente para hiperestender o pescoço.
- (E) existe a melhor visualização dos órgãos pélvicos durante a abertura ou a cirurgia laparoscópica no abdome inferior ou na pelve.

**31**

**Qual é a causa mais comum de obstrução das vias aéreas no POI em sala de recuperação pós-anestésica?**

- (A) Indução de broncoespasmo por relaxantes neuromusculares.
- (B) Acúmulo de secreção nas vias aéreas superiores devido à supressão do reflexo da tosse.
- (C) Laringoespasmo causado pela irritação da mucosa traqueal induzida por medicação.
- (D) Diminuição dos murmúrios vesiculares e presença de ruídos adventícios.
- (E) A “queda” da língua para trás, obstruindo a faringe, em virtude do relaxamento provocado pelos agentes anestésicos.

**32**

**Assinale a alternativa que apresenta uma recomendação importante na coleta de gasometria arterial.**

- (A) Passar por processo de hemólise.
- (B) Manter o sangue sempre em temperatura abaixo de 2°C.
- (C) Higienizar a pele com solução degermante.
- (D) Não permitir que o sangue entre em contato com o ar.
- (E) Utilizar luvas cirúrgicas estéreis.

**33**

A reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) em tempo real é uma técnica molecular altamente sensível e específica, considerada, desde o início da pandemia, a metodologia padrão-ouro para o diagnóstico da COVID-19. A coleta de amostras respiratórias só deve ser realizada por profissionais devidamente capacitados, sendo correto afirmar que

- (A) deve-se utilizar máscara cirúrgica e escudo facial durante a coleta.
- (B) é importante utilizar todos os equipamentos de proteção individual estéreis para evitar contaminação cruzada.
- (C) o swab, em algumas situações, pode ser coletado apenas na nasofaringe.
- (D) as amostras respiratórias, após a coleta, poderão ser acondicionadas em temperatura ambiente por até 72 horas.
- (E) o swab retal é uma alternativa útil ao swab nasal, uma vez que a forma ativa do vírus é encontrada nas fezes.

**34**

É considerado um desinfetante de nível intermediário com três aplicações consecutivas com fricção rigorosa e secagem natural, sendo indicado para desinfecção em metais, vidros e mármore. O enunciado se refere ao

- (A) hipoclorito de sódio a 1%.
- (B) álcool 70%.
- (C) detergente enzimático.
- (D) glutaraldeído a 2% por 30 min.
- (E) ácido acético 1%.

**35**

A oxigenoterapia deve respeitar indicações definidas e especificações da dose e sua utilização requer o conhecimento do sistema de administração pela equipe multiprofissional, assim como da duração da terapia e sua monitorização. Nesse sentido, é correto afirmar que

- (A) o uso de umidificador com água, mesmo em baixo fluxo, é essencial.
- (B) deve-se dar preferência ao soro fisiológico no umidificador.
- (C) a forma de administração mais comum nos sistemas de alto fluxo é o cateter nasal.
- (D) o cateter nasal, quando utilizado, deve ser substituído a cada 2 horas.
- (E) existe necessidade de umidificação, na utilização da máscara de venturi.

**36**

A enfermeira prescreveu a um cliente da clínica médica, como cobertura para tratamento de lesão por pressão em região sacral, hidrocoloide em placa. Como a lesão era vitalizada e não havia necrose, o técnico de enfermagem tinha ciência de que a prescrição da troca da cobertura poderia ser realizada em qual periodicidade?

- (A) Uma vez durante o turno.
- (B) A cada duas horas ou se ressecado.
- (C) A cada sete dias ou quando saturado.
- (D) A cada 24 horas.
- (E) Até o desprendimento completo da derme.

**37**

Rotineiramente, sabe-se que, para realização de curativos em lesões abertas, a limpeza da ferida deve ser realizada com

- (A) solução degermante.
- (B) iodo.
- (C) clorexidina 0.5%.
- (D) soro fisiológico 0.9%.
- (E) água oxigenada 10%.

**38**

A equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família de um município monitora os idosos de sua área de abrangência com diagnóstico ou suspeita de COVID-19 presencialmente a cada 24 horas, para saber a evolução do caso e dos sinais e sintomas que acometem os pacientes. Com base nos sinais vitais, a equipe pode atentar-se para qual dos seguintes sinais de agravamento do quadro?

- (A) Saturação em ar ambiente maior que 96%.
- (B) Temperatura 37 °C.
- (C) Glicemia capilar 110 mg/dl.
- (D) Frequência respiratória 28 irpm.
- (E) Pressão arterial entre 110/70 e 130/90 mmHg.

**39**

As responsabilidades legais relacionadas ao preparo e à administração de medicamentos são orientadas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Assim, quando um técnico em enfermagem administra um fármaco sem conhecer sua natureza e os riscos na sua administração, ele está sendo

- (A) imperito.
- (B) imprudente.
- (C) precipitado.
- (D) inseguro.
- (E) indolente.

**40**

Qual dos seguintes medicamentos é utilizado para diminuir a frequência e a força de contração da musculatura lisa, aliviando assim a dor?

- (A) Escopolamina.
- (B) Dimeticona.
- (C) Bisacodil.
- (D) Hidróxido de alumínio.
- (E) Indometacina.

**41**

Foi prescrito a um lactente com peso de 8 kg 0,2 ml de dipirona sódica por via intramuscular. Sabendo que a unidade possui frasco-ampola de 2 ml com 500 mg por ml, quantos miligramas foram prescritos?

- (A) 50 mg.
- (B) 100 mg.
- (C) 150 mg.
- (D) 200 mg.
- (E) 250 mg.

**42**

Foram prescritos 100 mg de Keflex por via oral. Sabe-se que o frasco contém suspensão de 250 mg / 5ml. Assim, é correto afirmar que, para cumprir a prescrição, deverá(ão) ser administrado(s)

- (A) 1 ml.
- (B) 1,5 ml.
- (C) 2 ml.
- (D) 2,5 ml.
- (E) 3 ml.

**43**

Uma técnica em enfermagem sabe que a administração de Penicilina G Benzatina deve ocorrer em músculos de grande extensão e maior capacidade de absorção. Seguindo a prescrição de 1 frasco-ampola 1.200.000 UI para um adulto por via intramuscular profunda, ela administra o medicamento na região ventroglútea. Nesse contexto, o volume administrado por essa técnica deve ser de

- (A) 4 ml.
- (B) 6 ml.
- (C) 8 ml.
- (D) 10 ml.
- (E) 12 ml.

**44**

Foi prescrito soro glicosado 5% 1.000 ml para correr em 8 horas. Assim, para administrar corretamente o soro, o técnico em enfermagem deverá contar e controlar o gotejamento em, aproximadamente,

- (A) 12,5 gotas por minuto.
- (B) 125 gotas por minuto.
- (C) 30 gotas por minuto.
- (D) 42 gotas por minuto.
- (E) 51 gotas por minuto.

**45**

Em um episódio testemunhado de engasgo, um paciente consciente, que não consegue falar e apresenta respiração ruidosa, foi socorrido por um profissional de saúde que se encontrava no local. Foi realizada a desobstrução da via aérea com sucesso por uma manobra denominada

- (A) leopold.
- (B) ortolani.
- (C) heimlich.
- (D) kristeller.
- (E) valsalva.

**46**

De acordo com a determinação da área queimada pela Regra dos 9, em um adulto, o tronco anterior corresponde a quantos por cento da área corporal?

- (A) 5
- (B) 10
- (C) 9
- (D) 1
- (E) 18

**47**

O profissional de saúde deve saber reconhecer uma Parada Cardiorespiratória (PCR): avaliar a responsividade; avaliar a respiração e o pulso simultaneamente por 10 segundos. Em caso de detecção de ausência de responsividade, respiração (ou gasping) e pulso, deve solicitar a outro profissional, de forma clara e objetiva, que acione a equipe médica, traga o carrinho de emergência e o desfibrilador. Assim, devem-se iniciar as compressões torácicas e a ventilação em todos os pacientes adultos com PCR, seja por causa cardíaca ou não cardíaca, a uma frequência e uma profundidade, respectivamente, de

- (A) 80 a 100 compressões/minuto – mínima 2 cm e máximo 3 cm.
- (B) 100 a 180 compressões/minuto – mínima 7 cm e máximo 8 cm.
- (C) 100 a 120 compressões/minuto – mínima 5 cm e máximo 6 cm.
- (D) 90 a 110 compressões/minuto – mínima 3 cm e máximo 4 cm.
- (E) 70 a 90 compressões/minuto – mínima 4 cm e máximo 5 cm.

**48**

Paciente feminina, 56 anos, diabética do tipo 2, faz uso de insulina NPH pela manhã e à noite. Principalmente pela manhã, costuma não se alimentar e apresenta sinais e sintomas de hipoglicemia, como tremores, sudorese, palidez, taquicardia, tonturas, cefaleia, fraqueza, parestesias e distúrbios visuais. Assim, é correto afirmar que essa paciente apresenta hipoglicemia, se os valores de glicemia capilar estiverem abaixo de

- (A) 60 mg/dl.
- (B) 65 mg/dl.
- (C) 70 mg/dl.
- (D) 75 mg/dl.
- (E) 80 mg/dl.

**49**

**O bacilo da tuberculose é transmitido por via aérea de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea que elimina bacilos no ambiente (caso fonte) a outra pessoa, por exalação de**

- (A) partículas virais.
- (B) gotículas.
- (C) aerossóis.
- (D) secreção.
- (E) contaminantes.

**50**

**Está indicado, prioritariamente, para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes,**

- (A) o teste de sensibilidade cutânea para tuberculose.
- (B) o Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB).
- (C) o raio X de tórax.
- (D) a baciloscopia indireta (BAAR).
- (E) o swab de orofaringe.

**51**

**Um lactente comparece à Unidade de Saúde aos 4 meses com calendário vacinal em dia e recebe as vacinas Pentavalente, VIP, Pneumocócica conjugada e Rotavírus. A(s) próxima(s) vacina(s) aprazada(s) pelo técnico em enfermagem da sala de vacina será(ão)**

- (A) aos cinco meses – Meningocócica C.
- (B) aos seis meses – Pentavalente, VIP e Pneumocócica conjugada.
- (C) aos sete meses – Pentavalente, VIP e Pneumocócica conjugada.
- (D) aos seis meses – Hepatite A.
- (E) aos oito meses – Tetraviral e Febre Amarela.

**52**

**Considerando a vacina tríplice viral Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR), é indicada vacinação em bloqueios de casos suspeitos de sarampo e rubéola a partir dos 6 meses. Para profissionais de saúde (de qualquer idade), recomendam-se quantas doses da vacina SCR?**

- (A) Uma dose a cada 10 anos.
- (B) Duas doses com intervalo de 30 dias.
- (C) Três doses com intervalo de 30 dias.
- (D) Uma dose anualmente.
- (E) Três doses com intervalo de 30 dias para segunda dose e seis meses para a terceira.

**53**

**Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

**De acordo com o Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, são vacinas oferecidas aos idosos:**

- I. Pneumocócica 23 valente.
- II. Meningocócica B.
- III. Influenza.
- IV. Hepatite A.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

**54**

**Qual das vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de imunização é realizada por via oral com dose de 1,5 ml?**

- (A) Rotavírus.
- (B) VOP.
- (C) Febre Amarela.
- (D) BCG.
- (E) Tetraviral.

**55**

**Na técnica correta de aferição da Pressão Arterial (PA), o técnico em enfermagem considera**

- (A) palpar o pulso radial e inflar o manguito até 50mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
- (B) que o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e abaixo do precórdio.
- (C) que a pressão sistólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos.
- (D) utilizar manguitos com câmara inflável (cuff) de tamanho padrão, independentemente do tamanho da circunferência do braço do paciente.
- (E) orientar o paciente para evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos que antecedem a verificação da PA.

**56**

**A infecção pelo vírus da dengue, quando sintomática, causa uma doença sistêmica de amplo espectro clínico, variando desde formas com poucos sintomas até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Três fases clínicas podem ocorrer: febril, crítica e de recuperação. A fase crítica pode estar presente em alguns pacientes, podendo evoluir para as formas graves, e tem como característica**

- (A) febre que tem duração de dois a sete dias, geralmente alta (39°C a 40°C), de início abrupto, associada à cefaleia.
- (B) principalmente a diarreia, que habitualmente não é volumosa.
- (C) iniciar no período da defervescência da febre, entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença.
- (D) rash cutâneo acompanhado ou não de prurido generalizado.
- (E) reabsorção gradual do conteúdo extravasado com progressiva melhora clínica.

**57**

**Qual das seguintes doenças deve ser notificada às autoridades de saúde dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do caso ou óbito?**

- (A) HIV.
- (B) Doença de Chagas Crônica.
- (C) Esquistossomose.
- (D) Hanseníase.
- (E) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus.

**58**

**Um técnico em enfermagem, durante a manipulação de material perfurocortante, deve ter o cuidado de**

- (A) utilizar os dedos como anteparo durante a realização de punção venosa.
- (B) preencher acima de 2/3 a capacidade total dos coletores para descarte de material perfurocortante.
- (C) acondicionar vidrarias e lâminas de barbear em saco de lixo branco para descarte.
- (D) se equipar com luvas de procedimento, reencapar as agulhas antes do descarte, para evitar acidentes.
- (E) desprezar todo material perfurocortante (mesmo que estéril) em recipientes resistentes à perfuração e com tampa.

**59**

**Um técnico em enfermagem sofreu uma perfuração no dedo médio com uma agulha 40x12 ao manipular, de forma incorreta, uma caixa contendo material perfurocortante. Após avaliação, não foi indicada a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) porque**

- (A) o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é maior que 72 horas.
- (B) a pessoa exposta é não reagente para o HIV no momento do atendimento.
- (C) o tipo de material biológico é de risco para transmissão do HIV.
- (D) o tipo de exposição é de risco para transmissão do HIV.
- (E) o status sorológico da pessoa-fonte não pode ser identificado.

**60****Quando um paciente com doença renal crônica é portador de shunt ou fístula arteriovenosa, é adequado**

- (A) promover curativos circunferenciais que possam garrotear o membro.
- (B) manter o membro sempre para baixo.
- (C) realizar compressão adequada para hemostasia após a punção.
- (D) dar preferência para aferição de pressão arterial no membro com shunt.
- (E) utilizar a via venosa como a preferencial para infusão de antimicrobianos.

Realização



**instituto aocp**



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



M2422040N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

# TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**TÉCNICO**

Turno

**MANHÃ**

**PROVA**

**02**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

## Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

## Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

## Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

## Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

## Língua Portuguesa

### Saúde mental em tempos de pandemia *Relações sociais, estresse e resiliência*

**KELLY PEREIRA ROBIS**

O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. No entanto, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos. Vivências negativas não são totalmente deletérias: pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações interpessoais. Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência.

A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto no qual se estabelece a reciprocidade e a complementaridade que certamente podem ser um mecanismo de proteção em termos de saúde mental, em tempos de estresse e de isolamento.

Considerando o contexto atual de pandemia, essa relação, que é tão importante, para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. Dessa forma, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada. Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez que respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.

#### **Agressividade**

Como consequência, podemos imputar ao outro o resultado de uma vivência pessoal, ao sermos hostis e agressivos. Claramente, essa emoção precisa ser “colocada para fora”, mas, não de forma violenta: dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que uma comunicação agressiva.

Todavia, o estado emocional do outro também precisa ser levado em consideração, por isso a leitura do ambiente é fundamental. Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza.

#### **Diálogo**

A abordagem não empática desse sofrimento pode desgastar ainda mais as relações interpessoais, justamente quando mais precisamos delas. Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.

Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental. Afinal, saúde mental pode começar pelo olhar acolhedor daqueles que tanto amamos.

Disponível em: <https://www.otempo.com.br/opiniaio/artigos/saude-mental-em-tempos-de-pandemia-1.234535>. Acesso em: 04 dez. 2020.

**1**

#### **Para a autora, a prevenção do adoecimento mental relaciona-se também**

- (A) ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo em lidar com problemas.
- (B) aos benefícios de uma vida tranquila, sem situações de violência e/ou agressividade.
- (C) a um ambiente livre de pressões e situações adversas.
- (D) à persistência em se evitar momentos traumáticos e/ou de estresse.
- (E) à importância de vivências íntimas consigo mesmo, sem contato social.

2

Assinale a alternativa em que o conectivo “que” esteja sendo utilizado para retomar um termo antecedente.

- (A) [...] pessoas **que** estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros [...]”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para **que** a prevenção do adoecimento mental aconteça [...]”.
- (C) “Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez **que** respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.”.
- (D) “[...] dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do **que** uma comunicação agressiva.”.
- (E) “[...] entende-se **que** a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia [...]”.

3

Observe o termo destacado no período que segue: “Vivências negativas não são totalmente **deletérias**: pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações interpessoais.”. Tal termo, nesse caso, tem sentido equivalente a

- (A) inócuas.
- (B) benéficas.
- (C) indeléveis.
- (D) prejudiciais.
- (E) perduráveis.

4

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa a noção semântica de conclusão.

- (A) “O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. **No entanto**, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos.”.
- (B) “[...] essa relação [...] pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. **Dessa forma**, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada.”.
- (C) Claramente, essa emoção precisa ser “colocada para fora”, **mas**, não de forma violenta [...]”.
- (D) “[...] dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente **mais** efetivo e saudável **do que** uma comunicação agressiva.”.
- (E) “[...] a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia,  **todavia**, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação [...]”.

5

Analise o período que segue.

“Problemas individuais devem ser levados em consideração, **uma vez que respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.**”.

Em relação à oração anterior, a sentença destacada tem valor semântico de

- (A) consequência, por indicar o efeito que o medo e a ansiedade podem gerar em nós.
- (B) finalidade, pois indica o objetivo de problemas serem levados em conta.
- (C) proporção, por manifestar um aumento proporcional entre problemas individuais e ansiedade e medo.
- (D) condição, pois evidencia a condicionalidade existente entre a ocorrência de ansiedade e medo com a consideração de problemas individuais.
- (E) causa, por indicar o motivo de precisarmos levar em conta problemas individuais.

6

Levando em conta os usos da vírgula, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Vírgulas usadas para isolar conjunção adversativa.
2. Vírgula usada para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. Vírgula inadequada, separando sujeito e predicado.
4. Vírgulas usadas para separar termos coordenados.
5. Vírgulas usadas para isolar oração adjetiva explicativa.

- ( ) “[...] essa relação, que é tão importante, para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento.”.
- ( ) “Claramente, essa emoção precisa ser ‘colocada para fora’ [...]”.
- ( ) “Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza.”.
- ( ) “Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.”.
- ( ) “[...] relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental.”.

- (A) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.  
 (B) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.  
 (C) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.  
 (D) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.  
 (E) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.

7

Considerando as regras de acentuação dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a alternativa cujo termo destacado receba acento pelo mesmo motivo que “*antropológica*”, empregado em “A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto (...)”.

- (A) “A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto [...]”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para a prevenção do adoecimento mental, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência.”.
- (C) “Todavia, o estado emocional do outro também precisa ser levado em consideração, [...]”.
- (D) “A abordagem não empática desse sofrimento pode desgastar ainda mais as relações interpessoais, [...]”.
- (E) “Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.”.

8

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) os seres humanos culpabilizam seus familiares e/ou amigos próximos por seus medos e anseios.
- (B) as pessoas tornaram-se mais agressivas e mais facilmente irritáveis com a pandemia.
- (C) relações familiares calcadas, sobretudo, em diálogo e empatia podem ser grandes aliadas para fortalecimento da saúde mental.
- (D) pessoas que sofrem com a depressão costumam expor suas emoções de modo violento e agressivo.
- (E) problemas individuais, em um contexto familiar, devem ser priorizados em detrimento dos problemas coletivos.

9

Considerando o seguinte trecho, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental.”.

- ( ) O trecho “[...] que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia [...]” funciona como objeto direto da estrutura verbal “entende-se”.
- ( ) Ainda em “[...] a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, [...]”, os termos destacados atribuem características e pertencem à mesma classe de palavras.
- ( ) A conjunção “todavia” indica oposição e poderia ser substituída por “contudo”.
- ( ) O segmento “[...] leitura emocional do outro [...]”, fora desse contexto, torna-se ambíguo.

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – F – V.

10

Inúmeros substantivos na Língua Portuguesa formam-se por derivação regressiva, ou seja, derivam-se de verbos. Sabendo disso, assinale a alternativa cujo vocábulo em destaque fora formado por esse processo.

- (A) “O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências.”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, [...]”.
- (C) “Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, [...]”.
- (D) “[...] essa relação, que é tão importante para o ser humano, pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina [...]”.
- (E) “[...] dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que uma comunicação agressiva.”.

## Matemática

11

Uma pessoa precisa realizar uma tarefa em 8 horas, no máximo. Se desde o início da tarefa já se passaram  $\frac{3}{4}$  do tempo máximo permitido, então, para finalizar sua tarefa, essa pessoa ainda dispõe de

- (A) 1 hora.
- (B) 1 hora e 30 minutos.
- (C) 2 horas.
- (D) 2 horas e 30 minutos.
- (E) 3 horas.

12

O resultado do produto  $(\sqrt{49\%}) \times (50\%)$ , na forma de taxa percentual, é igual a

- (A) 95%.
- (B) 15%.
- (C) 55%.
- (D) 75%.
- (E) 35%.

**13**

**A sequência numérica**

**(100, 80, 40, 20, 10, -10, -5, ...)**

**segue um padrão lógico. O termo dessa sequência imediatamente posterior ao número -5 é igual a**

- (A) -25.
- (B) 35.
- (C) -20.
- (D) 40.
- (E) -10.

**14**

**Ao final de cada mês, ao realizar o pagamento dos salários dos funcionários de uma empresa, o RH escolhe um entre os funcionários para receber uma bonificação, além do seu salário normal. A bonificação terá um valor fixo de R\$ 100,00 e, a esse valor fixo, será somada a oitava parte do salário normal recebido por esse funcionário. Dessa forma, se no final de determinado mês o funcionário escolhido para receber a bonificação possuir um salário normal igual R\$ 3.568,00, então, o valor total que ele irá receber como pagamento será igual a**

- (A) R\$ 5.046,00.
- (B) R\$ 4.114,00.
- (C) R\$ 5.546,00.
- (D) R\$ 4.546,00.
- (E) R\$ 3.546,00.

**15**

**A seguir, é apresentada uma sequência numérica, tal que os elementos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que x e y são números inteiros:**

**(24, 13, 22, 11, 20, 9, x, y).**

**Observando essa sequência e encontrando os valores de x e de y, seguindo a lei de formação da sequência dada, é correto afirmar que**

- (A) x é um número maior que 30.
- (B) y é um número menor que 5.
- (C) a soma de x com y resulta em 25.
- (D) o produto de x por y resulta em 106.
- (E) a diferença entre y e x, nessa ordem, é um número positivo.

## **Informática**

**16**

**No sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual dos seguintes aplicativos deve ser utilizado para transformar uma partição FAT em NTFS?**

- (A) Bootcfg.exe
- (B) Convert.exe
- (C) Chkdsk.exe
- (D) Drfgui.exe
- (E) Fortfiles.exe

**17**

**No software Microsoft Power Point 2013, versão em português, existe um botão “Organizar” que oferece opções de ordenação de objetos de um slide. Em qual guia esse item pode ser encontrado?**

- (A) INSERIR.
- (B) DESIGN.
- (C) TRANSIÇÕES.
- (D) EXIBIÇÃO.
- (E) PÁGINA INICIAL.

**18**

**Assinale a alternativa que apresenta um dispositivo de memória ROM.**

- (A) Cartão EDO.
- (B) Módulo DIMM.
- (C) Cartão SD.
- (D) Módulo DDR.
- (E) CACHE.

**19**

**Considerando as grandezas computacionais, 2 Kilobytes correspondem a quantos bytes?**

- (A) 1024
- (B) 20486
- (C) 1000
- (D) 2048
- (E) 1048

**20**

**Considerando o software Microsoft Excel 2013, versão em português, assinale a alternativa que apresenta um argumento válido na sintaxe da função TEXTO.**

- (A) valor
- (B) tamanho do texto
- (C) comprimento
- (D) intervalo
- (E) condição

## **Conhecimentos Específicos**

**21**

**Sobre a Lei nº 7.498/1986, é correto afirmar que**

- (A) regulamenta o cumprimento de prescrição médica à distância.
- (B) prevê o quantitativo de profissionais de enfermagem de acordo com índices de segurança técnica.
- (C) afirma que cabe privativamente ao enfermeiro a prescrição da assistência de enfermagem.
- (D) destaca que a enfermagem é exercida privativamente e apenas pelo enfermeiro e pelo técnico em enfermagem.
- (E) cria o Conselho Regional de Enfermagem (COREN), constituindo uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social.

**22**

**Um técnico em enfermagem deve conhecer sua regulamentação profissional. Assim, de acordo com o decreto nº 94.406/1987, cabe a esse profissional executar qual das seguintes atividades?**

- (A) Prescrever assistência de enfermagem.
- (B) Realizar auditoria em serviços hospitalares de complexidade intermediária.
- (C) Chefiar serviços públicos e de unidade de enfermagem.
- (D) Assistir ao enfermeiro na supervisão de assistência de enfermagem.
- (E) Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública.

**23**

**Considerado uma área complexa e de acesso restrito, o centro cirúrgico é composto por uma série de dependências interligadas, sendo correto afirmar que uma das áreas que é considerada restrita ou zona estéril é**

- (A) a farmácia.
- (B) a sala de espera.
- (C) o vestiário.
- (D) a sala de operações.
- (E) a sala de guarda e preparo de anestésicos.

**24**

**A assistência de enfermagem perioperatória é considerada vital para a realização e o sucesso de um ato anestésico-cirúrgico. Assim, é uma atribuição do técnico de enfermagem do centro cirúrgico, principalmente,**

- (A) manter o controle administrativo, técnico-operacional e ético sobre as diversas atividades desenvolvidas no centro cirúrgico.
- (B) prover a sala de operações com recursos adequados às necessidades do paciente e segundo as especificidades de cada intervenção anestésico-cirúrgica.
- (C) tomar decisões administrativas e assistenciais baseadas em evidências científicas.
- (D) elaborar o plano de cuidados de enfermagem para o período transoperatório e supervisionar sua implementação.
- (E) realizar consulta de enfermagem no pré e no pós-operatório e recepcionar o paciente no centro cirúrgico.

**25**

**Durante um procedimento cirúrgico de Colectomia, ocorre**

- (A) sutura da flexura sigmoide à parede abdominal.
- (B) visualização de uma articulação.
- (C) abertura e colocação de dreno na vesícula biliar.
- (D) plástica do piloro para aumentar seu diâmetro.
- (E) extirpação do ducto colédoco.

**26**

**No período transoperatório, o posicionamento cirúrgico é uma ação importante e sua responsabilidade deve ser compartilhada por toda a equipe atuante na sala de operações. Nesse contexto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) Idade, altura e peso do paciente não estão relacionados a fatores que podem definir a posição cirúrgica.
- ( ) É adequado que membros superiores fiquem pendentes na mesa de operação.
- ( ) É necessário impedir contato direto do paciente com a superfície metálica da mesa de operação.
- ( ) Deve-se evitar hiperextensão das terminações nervosas, para prevenção de paralisias e/ou parestesias, que podem ser irreversíveis.

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – V – V – V.
- (E) V – F – F – F.

**27**

**Um técnico de enfermagem realizou aferição dos sinais vitais de um paciente da clínica médica. Os dados obtidos foram: temperatura 38°C, pulso 120 bat/min e pressão arterial 90/40 mmHg. Ao informar ao enfermeiro os dados, o técnico relata que o paciente encontra-se**

- (A) afebril – taquicárdico – normotenso.
- (B) com hiperpirexia – normocárdico – hipotenso.
- (C) febril – taquicárdico – hipotenso.
- (D) hipotérmico – bradicárdico – hipertenso.
- (E) em estado febril – taquipneico – normotenso.

**28**

**No controle de infecções hospitalares relacionadas à inserção de cateter periférico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve-se avaliar o sítio de inserção de pacientes pediátricos no mínimo uma vez ao dia.
- (B) A avaliação de necessidade de permanência do cateter deve ser semanal.
- (C) Rotineiramente, o cateter periférico não deve ser trocado em um período inferior a 12 horas.
- (D) O cateter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica asséptica deve ser trocado tão logo quanto possível.
- (E) Não é recomendado remover o cateter periférico, mesmo que não haja medicamentos endovenosos prescritos e que ele não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas.

**29**

**A posição cirúrgica de Canivete ou Jackknife, com variações de Kraske ou Depage, é uma modificação do decúbito ventral. Assim, é correto afirmar que, nesse posicionamento,**

- (A) a cabeça do paciente, o tórax e os pés precisam de suportes adicionais, para evitar complicações pós-operatórias.
- (B) eleva-se levemente os pés, e os coxins na região poplíteia propiciam repouso, evitando, também, o deslocamento caudal do tronco.
- (C) coloca-se acolchoamento nas nádegas (tuberosidade isquiática) e no dorso (proeminências ósseas da escápula e ombro).
- (D) o dorso da mesa deve ser elevado e um coxim roliço é colocado sob os ombros do paciente para hiperestender o pescoço.
- (E) existe a melhor visualização dos órgãos pélvicos durante a abertura ou a cirurgia laparoscópica no abdome inferior ou na pelve.

**30**

**Qual é a causa mais comum de obstrução das vias aéreas no POI em sala de recuperação pós-anestésica?**

- (A) Indução de broncoespasmo por relaxantes neuromusculares.
- (B) Acúmulo de secreção nas vias aéreas superiores devido à supressão do reflexo da tosse.
- (C) Laringoespasmo causado pela irritação da mucosa traqueal induzida por medicação.
- (D) Diminuição dos murmúrios vesiculares e presença de ruídos adventícios.
- (E) A “queda” da língua para trás, obstruindo a faringe, em virtude do relaxamento provocado pelos agentes anestésicos.

**31**

**Assinale a alternativa que apresenta uma recomendação importante na coleta de gasometria arterial.**

- (A) Passar por processo de hemólise.
- (B) Manter o sangue sempre em temperatura abaixo de 2°C.
- (C) Higienizar a pele com solução degermante.
- (D) Não permitir que o sangue entre em contato com o ar.
- (E) Utilizar luvas cirúrgicas estéreis.

**32**

**A reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) em tempo real é uma técnica molecular altamente sensível e específica, considerada, desde o início da pandemia, a metodologia padrão-ouro para o diagnóstico da COVID-19. A coleta de amostras respiratórias só deve ser realizada por profissionais devidamente capacitados, sendo correto afirmar que**

- (A) deve-se utilizar máscara cirúrgica e escudo facial durante a coleta.
- (B) é importante utilizar todos os equipamentos de proteção individual estéreis para evitar contaminação cruzada.
- (C) o swab, em algumas situações, pode ser coletado apenas na nasofaringe.
- (D) as amostras respiratórias, após a coleta, poderão ser acondicionadas em temperatura ambiente por até 72 horas.
- (E) o swab retal é uma alternativa útil ao swab nasal, uma vez que a forma ativa do vírus é encontrada nas fezes.

**33**

**É considerado um desinfetante de nível intermediário com três aplicações consecutivas com fricção rigorosa e secagem natural, sendo indicado para desinfecção em metais, vidros e mármore. O enunciado se refere ao**

- (A) hipoclorito de sódio a 1%.
- (B) álcool 70%.
- (C) detergente enzimático.
- (D) glutaraldeído a 2% por 30 min.
- (E) ácido acético 1%.

**34**

**A oxigenoterapia deve respeitar indicações definidas e especificações da dose e sua utilização requer o conhecimento do sistema de administração pela equipe multiprofissional, assim como da duração da terapia e sua monitorização. Nesse sentido, é correto afirmar que**

- (A) o uso de umidificador com água, mesmo em baixo fluxo, é essencial.
- (B) deve-se dar preferência ao soro fisiológico no umidificador.
- (C) a forma de administração mais comum nos sistemas de alto fluxo é o cateter nasal.
- (D) o cateter nasal, quando utilizado, deve ser substituído a cada 2 horas.
- (E) existe necessidade de umidificação, na utilização da máscara de venturi.

**35**

**A enfermeira prescreveu a um cliente da clínica médica, como cobertura para tratamento de lesão por pressão em região sacral, hidrocoloide em placa. Como a lesão era vitalizada e não havia necrose, o técnico de enfermagem tinha ciência de que a prescrição da troca da cobertura poderia ser realizada em qual periodicidade?**

- (A) Uma vez durante o turno.
- (B) A cada duas horas ou se ressecado.
- (C) A cada sete dias ou quando saturado.
- (D) A cada 24 horas.
- (E) Até o desprendimento completo da derme.

**36**

**Rotineiramente, sabe-se que, para realização de curativos em lesões abertas, a limpeza da ferida deve ser realizada com**

- (A) solução degermante.
- (B) iodo.
- (C) clorexidina 0.5%.
- (D) soro fisiológico 0.9%.
- (E) água oxigenada 10%.

**37**

A equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família de um município monitora os idosos de sua área de abrangência com diagnóstico ou suspeita de COVID-19 presencialmente a cada 24 horas, para saber a evolução do caso e dos sinais e sintomas que acometem os pacientes. Com base nos sinais vitais, a equipe pode atentar-se para qual dos seguintes sinais de agravamento do quadro?

- (A) Saturação em ar ambiente maior que 96%.
- (B) Temperatura 37 °C.
- (C) Glicemia capilar 110 mg/dl.
- (D) Frequência respiratória 28 irpm.
- (E) Pressão arterial entre 110/70 e 130/90 mmHg.

**38**

As responsabilidades legais relacionadas ao preparo e à administração de medicamentos são orientadas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Assim, quando um técnico em enfermagem administra um fármaco sem conhecer sua natureza e os riscos na sua administração, ele está sendo

- (A) imperito.
- (B) imprudente.
- (C) precipitado.
- (D) inseguro.
- (E) indolente.

**39**

Qual dos seguintes medicamentos é utilizado para diminuir a frequência e a força de contração da musculatura lisa, aliviando assim a dor?

- (A) Escopolamina.
- (B) Dimeticona.
- (C) Bisacodil.
- (D) Hidróxido de alumínio.
- (E) Indometacina.

**40**

Foi prescrito a um lactente com peso de 8 kg 0,2 ml de dipirona sódica por via intramuscular. Sabendo que a unidade possui frasco-ampola de 2 ml com 500 mg por ml, quantos miligramas foram prescritos?

- (A) 50 mg.
- (B) 100 mg.
- (C) 150 mg.
- (D) 200 mg.
- (E) 250 mg.

**41**

Foram prescritos 100 mg de Keflex por via oral. Sabe-se que o frasco contém suspensão de 250 mg / 5ml. Assim, é correto afirmar que, para cumprir a prescrição, deverá(ão) ser administrado(s)

- (A) 1 ml.
- (B) 1,5 ml.
- (C) 2 ml.
- (D) 2,5 ml.
- (E) 3 ml.

**42**

Uma técnica em enfermagem sabe que a administração de Penicilina G Benzatina deve ocorrer em músculos de grande extensão e maior capacidade de absorção. Seguindo a prescrição de 1 frasco-ampola 1.200.000 UI para um adulto por via intramuscular profunda, ela administra o medicamento na região ventroglútea. Nesse contexto, o volume administrado por essa técnica deve ser de

- (A) 4 ml.
- (B) 6 ml.
- (C) 8 ml.
- (D) 10 ml.
- (E) 12 ml.

**43**

Foi prescrito soro glicosado 5% 1.000 ml para correr em 8 horas. Assim, para administrar corretamente o soro, o técnico em enfermagem deverá contar e controlar o gotejamento em, aproximadamente,

- (A) 12,5 gotas por minuto.
- (B) 125 gotas por minuto.
- (C) 30 gotas por minuto.
- (D) 42 gotas por minuto.
- (E) 51 gotas por minuto.

**44**

Em um episódio testemunhado de engasgo, um paciente consciente, que não consegue falar e apresenta respiração ruidosa, foi socorrido por um profissional de saúde que se encontrava no local. Foi realizada a desobstrução da via aérea com sucesso por uma manobra denominada

- (A) leopold.
- (B) ortolani.
- (C) heimlich.
- (D) kristeller.
- (E) valsalva.

**45**

De acordo com a determinação da área queimada pela Regra dos 9, em um adulto, o tronco anterior corresponde a quantos por cento da área corporal?

- (A) 5
- (B) 10
- (C) 9
- (D) 1
- (E) 18

**46**

O profissional de saúde deve saber reconhecer uma Parada Cardiorespiratória (PCR): avaliar a responsividade; avaliar a respiração e o pulso simultaneamente por 10 segundos. Em caso de detecção de ausência de responsividade, respiração (ou gasping) e pulso, deve solicitar a outro profissional, de forma clara e objetiva, que acione a equipe médica, traga o carrinho de emergência e o desfibrilador. Assim, devem-se iniciar as compressões torácicas e a ventilação em todos os pacientes adultos com PCR, seja por causa cardíaca ou não cardíaca, a uma frequência e uma profundidade, respectivamente, de

- (A) 80 a 100 compressões/minuto – mínima 2 cm e máximo 3 cm.
- (B) 100 a 180 compressões/minuto – mínima 7 cm e máximo 8 cm.
- (C) 100 a 120 compressões/minuto – mínima 5 cm e máximo 6 cm.
- (D) 90 a 110 compressões/minuto – mínima 3 cm e máximo 4 cm.
- (E) 70 a 90 compressões/minuto – mínima 4 cm e máximo 5 cm.

**47**

Paciente feminina, 56 anos, diabética do tipo 2, faz uso de insulina NPH pela manhã e à noite. Principalmente pela manhã, costuma não se alimentar e apresenta sinais e sintomas de hipoglicemia, como tremores, sudorese, palidez, taquicardia, tonturas, cefaleia, fraqueza, parestesias e distúrbios visuais. Assim, é correto afirmar que essa paciente apresenta hipoglicemia, se os valores de glicemia capilar estiverem abaixo de

- (A) 60 mg/dl.
- (B) 65 mg/dl.
- (C) 70 mg/dl.
- (D) 75 mg/dl.
- (E) 80 mg/dl.

**48**

**O bacilo da tuberculose é transmitido por via aérea de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea que elimina bacilos no ambiente (caso fonte) a outra pessoa, por exalação de**

- (A) partículas virais.
- (B) gotículas.
- (C) aerossóis.
- (D) secreção.
- (E) contaminantes.

**49**

**Está indicado, prioritariamente, para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes,**

- (A) o teste de sensibilidade cutânea para tuberculose.
- (B) o Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB).
- (C) o raio X de tórax.
- (D) a baciloscopia indireta (BAAR).
- (E) o swab de orofaringe.

**50**

**Um lactente comparece à Unidade de Saúde aos 4 meses com calendário vacinal em dia e recebe as vacinas Pentavalente, VIP, Pneumocócica conjugada e Rotavírus. A(s) próxima(s) vacina(s) aprazada(s) pelo técnico em enfermagem da sala de vacina será(ão)**

- (A) aos cinco meses – Meningocócica C.
- (B) aos seis meses – Pentavalente, VIP e Pneumocócica conjugada.
- (C) aos sete meses – Pentavalente, VIP e Pneumocócica conjugada.
- (D) aos seis meses – Hepatite A.
- (E) aos oito meses – Tetraviral e Febre Amarela.

**51**

**Considerando a vacina tríplice viral Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR), é indicada vacinação em bloqueios de casos suspeitos de sarampo e rubéola a partir dos 6 meses. Para profissionais de saúde (de qualquer idade), recomendam-se quantas doses da vacina SCR?**

- (A) Uma dose a cada 10 anos.
- (B) Duas doses com intervalo de 30 dias.
- (C) Três doses com intervalo de 30 dias.
- (D) Uma dose anualmente.
- (E) Três doses com intervalo de 30 dias para segunda dose e seis meses para a terceira.

**52**

**Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

**De acordo com o Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, são vacinas oferecidas aos idosos:**

- I. Pneumocócica 23 valente.
- II. Meningocócica B.
- III. Influenza.
- IV. Hepatite A.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

**53**

**Qual das vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de imunização é realizada por via oral com dose de 1,5 ml?**

- (A) Rotavírus.
- (B) VOP.
- (C) Febre Amarela.
- (D) BCG.
- (E) Tetraviral.

54

**Na técnica correta de aferição da Pressão Arterial (PA), o técnico em enfermagem considera**

- (A) palpar o pulso radial e inflar o manguito até 50mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
- (B) que o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e abaixo do precórdio.
- (C) que a pressão sistólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos.
- (D) utilizar manguitos com câmara inflável (cuff) de tamanho padrão, independentemente do tamanho da circunferência do braço do paciente.
- (E) orientar o paciente para evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos que antecedem a verificação da PA.

55

**A infecção pelo vírus da dengue, quando sintomática, causa uma doença sistêmica de amplo espectro clínico, variando desde formas com poucos sintomas até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Três fases clínicas podem ocorrer: febril, crítica e de recuperação. A fase crítica pode estar presente em alguns pacientes, podendo evoluir para as formas graves, e tem como característica**

- (A) febre que tem duração de dois a sete dias, geralmente alta (39°C a 40°C), de início abrupto, associada à cefaleia.
- (B) principalmente a diarreia, que habitualmente não é volumosa.
- (C) iniciar no período da defervescência da febre, entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença.
- (D) rash cutâneo acompanhado ou não de prurido generalizado.
- (E) reabsorção gradual do conteúdo extravasado com progressiva melhora clínica.

56

**Qual das seguintes doenças deve ser notificada às autoridades de saúde dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do caso ou óbito?**

- (A) HIV.
- (B) Doença de Chagas Crônica.
- (C) Esquistossomose.
- (D) Hanseníase.
- (E) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus.

57

**Um técnico em enfermagem, durante a manipulação de material perfurocortante, deve ter o cuidado de**

- (A) utilizar os dedos como anteparo durante a realização de punção venosa.
- (B) preencher acima de 2/3 a capacidade total dos coletores para descarte de material perfurocortante.
- (C) acondicionar vidrarias e lâminas de barbear em saco de lixo branco para descarte.
- (D) se equipar com luvas de procedimento, reencapar as agulhas antes do descarte, para evitar acidentes.
- (E) desprezar todo material perfurocortante (mesmo que estéril) em recipientes resistentes à perfuração e com tampa.

58

**Um técnico em enfermagem sofreu uma perfuração no dedo médio com uma agulha 40x12 ao manipular, de forma incorreta, uma caixa contendo material perfurocortante. Após avaliação, não foi indicada a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) porque**

- (A) o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é maior que 72 horas.
- (B) a pessoa exposta é não reagente para o HIV no momento do atendimento.
- (C) o tipo de material biológico é de risco para transmissão do HIV.
- (D) o tipo de exposição é de risco para transmissão do HIV.
- (E) o status sorológico da pessoa-fonte não pode ser identificado.

**59**

**Quando um paciente com doença renal crônica é portador de shunt ou fístula arteriovenosa, é adequado**

- (A) promover curativos circunferenciais que possam garrotear o membro.
- (B) manter o membro sempre para baixo.
- (C) realizar compressão adequada para hemostasia após a punção.
- (D) dar preferência para aferição de pressão arterial no membro com shunt.
- (E) utilizar a via venosa como a preferencial para infusão de antimicrobianos.

**60**

**Um técnico em enfermagem da clínica médica, ao realizar anotações de enfermagem dos pacientes sob seus cuidados, registrava e assinava ações de enfermagem que não havia executado. Por esse motivo, instaurou-se processo ético e disciplinar que, após apuração dos fatos, aplicou a esse profissional a penalidade de**

- (A) censura.
- (B) cassação ao direito de exercício da profissão.
- (C) subvenção.
- (D) assinatura de termo circunstanciado.
- (E) suspensão do exercício profissional, por 120 dias.

Realização



**instituto aocp**



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



M3422040N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

# TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**TÉCNICO**

Turno

**MANHÃ**

**PROVA**

**03**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

## Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

## Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

## Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

## Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

## Língua Portuguesa

### Saúde mental em tempos de pandemia Relações sociais, estresse e resiliência

KELLY PEREIRA ROBIS

O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. No entanto, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos. Vivências negativas não são totalmente deletérias: pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações interpessoais. Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência.

A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto no qual se estabelece a reciprocidade e a complementaridade que certamente podem ser um mecanismo de proteção em termos de saúde mental, em tempos de estresse e de isolamento.

Considerando o contexto atual de pandemia, essa relação, que é tão importante, para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. Dessa forma, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada. Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez que respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.

#### Agressividade

Como consequência, podemos imputar ao outro o resultado de uma vivência pessoal, ao sermos hostis e agressivos. Claramente, essa emoção precisa ser “colocada para fora”, mas, não de forma violenta: dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que uma comunicação agressiva.

Todavia, o estado emocional do outro também precisa ser levado em consideração, por isso a leitura do ambiente é fundamental. Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza.

#### Diálogo

A abordagem não empática desse sofrimento pode desgastar ainda mais as relações interpessoais, justamente quando mais precisamos delas. Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.

Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental. Afinal, saúde mental pode começar pelo olhar acolhedor daqueles que tanto amamos.

Disponível em: <https://www.otempo.com.br/opiniaio/artigos/saude-mental-em-tempos-de-pandemia-1.234535>. Acesso em: 04 dez. 2020.

1

**Assinale a alternativa em que o conectivo “que” esteja sendo utilizado para retomar um termo antecedente.**

- (A) [...] pessoas **que** estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros [...].
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para **que** a prevenção do adoecimento mental aconteça [...]”.
- (C) “Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez **que** respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.”.
- (D) “[...] dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do **que** uma comunicação agressiva.”.
- (E) “[...] entende-se **que** a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia [...]”.

2

Observe o termo destacado no período que segue: “Vivências negativas não são totalmente deletérias: pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações interpessoais.”. Tal termo, nesse caso, tem sentido equivalente a

- (A) inócuas.
- (B) benéficas.
- (C) indelévels.
- (D) prejudiciais.
- (E) perduráveis.

3

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa a noção semântica de conclusão.

- (A) “O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. No entanto, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos.”.
- (B) “[...] essa relação [...] pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. Dessa forma, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada.”.
- (C) Claramente, essa emoção precisa ser “colocada para fora”, mas, não de forma violenta [...]”.
- (D) “(...) dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que uma comunicação agressiva.”.
- (E) “[...] a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação [...]”.

4

Analise o período que segue.

“Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez que respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.”.

Em relação à oração anterior, a sentença destacada tem valor semântico de

- (A) consequência, por indicar o efeito que o medo e a ansiedade podem gerar em nós.
- (B) finalidade, pois indica o objetivo de problemas serem levados em conta.
- (C) proporção, por manifestar um aumento proporcional entre problemas individuais e ansiedade e medo.
- (D) condição, pois evidencia a condicionalidade existente entre a ocorrência de ansiedade e medo com a consideração de problemas individuais.
- (E) causa, por indicar o motivo de precisarmos levar em conta problemas individuais.

5

Levando em conta os usos da vírgula, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Vírgulas usadas para isolar conjunção adversativa.
2. Vírgula usada para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. Vírgula inadequada, separando sujeito e predicado.
4. Vírgulas usadas para separar termos coordenados.
5. Vírgulas usadas para isolar oração adjetiva explicativa.

- ( ) “[...] essa relação, que é tão importante, para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento.”.
- ( ) “Claramente, essa emoção precisa ser ‘colocada para fora’ [...]”.
- ( ) “Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza.”.
- ( ) “Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.”.
- ( ) “[...] relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental.”.

- (A) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.  
 (B) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.  
 (C) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.  
 (D) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.  
 (E) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.

6

Considerando as regras de acentuação dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a alternativa cujo termo destacado receba acento pelo mesmo motivo que “*antropológica*”, empregado em “A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto (...)”.

- (A) “A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto [...]”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para a prevenção do adoecimento mental, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência.”.
- (C) “Todavia, o estado emocional do outro também precisa ser levado em consideração, [...]”.
- (D) “A abordagem não empática desse sofrimento pode desgastar ainda mais as relações interpessoais, [...]”.
- (E) “Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.”.

7

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) os seres humanos culpabilizam seus familiares e/ou amigos próximos por seus medos e anseios.
- (B) as pessoas tornaram-se mais agressivas e mais facilmente irritáveis com a pandemia.
- (C) relações familiares calcadas, sobretudo, em diálogo e empatia podem ser grandes aliadas para fortalecimento da saúde mental.
- (D) pessoas que sofrem com a depressão costumam expor suas emoções de modo violento e agressivo.
- (E) problemas individuais, em um contexto familiar, devem ser priorizados em detrimento dos problemas coletivos.

8

**Para a autora, a prevenção do adoecimento mental relaciona-se também**

- (A) ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo em lidar com problemas.
- (B) aos benefícios de uma vida tranquila, sem situações de violência e/ou agressividade.
- (C) a um ambiente livre de pressões e situações adversas.
- (D) à persistência em se evitar momentos traumáticos e/ou de estresse.
- (E) à importância de vivências íntimas consigo mesmo, sem contato social.

9

**Inúmeros substantivos na Língua Portuguesa formam-se por derivação regressiva, ou seja, derivam-se de verbos. Sabendo disso, assinale a alternativa cujo vocábulo em destaque fora formado por esse processo.**

- (A) “O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, [...]”.
- (C) “Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, [...]”.
- (D) “[...] essa relação, que é tão importante para o ser humano, pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina [...]”.
- (E) “[...] dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que uma comunicação agressiva.”.

10

**Considerando o seguinte trecho, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

“Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental.”.

- ( ) O trecho “[...] que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia [...]” funciona como objeto direto da estrutura verbal “entende-se”.
- ( ) Ainda em “[...] a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, [...]”, os termos destacados atribuem características e pertencem à mesma classe de palavras.
- ( ) A conjunção “todavia” indica oposição e poderia ser substituída por “contudo”.
- ( ) O segmento “[...] leitura emocional do outro [...]”, fora desse contexto, torna-se ambíguo.

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – F – V.

## Matemática

11

**O resultado do produto  $(\sqrt{49\%}) \times (50\%)$ , na forma de taxa percentual, é igual a**

- (A) 95%.
- (B) 15%.
- (C) 55%.
- (D) 75%.
- (E) 35%.

12

A sequência numérica

(100, 80, 40, 20, 10, -10, -5, ...)

segue um padrão lógico. O termo dessa sequência imediatamente posterior ao número -5 é igual a

- (A) -25.
- (B) 35.
- (C) -20.
- (D) 40.
- (E) -10.

13

Ao final de cada mês, ao realizar o pagamento dos salários dos funcionários de uma empresa, o RH escolhe um entre os funcionários para receber uma bonificação, além do seu salário normal. A bonificação terá um valor fixo de R\$ 100,00 e, a esse valor fixo, será somada a oitava parte do salário normal recebido por esse funcionário. Dessa forma, se no final de determinado mês o funcionário escolhido para receber a bonificação possuir um salário normal igual R\$ 3.568,00, então, o valor total que ele irá receber como pagamento será igual a

- (A) R\$ 5.046,00.
- (B) R\$ 4.114,00.
- (C) R\$ 5.546,00.
- (D) R\$ 4.546,00.
- (E) R\$ 3.546,00.

14

Uma pessoa precisa realizar uma tarefa em 8 horas, no máximo. Se desde o início da tarefa já se passaram  $\frac{3}{4}$  do tempo máximo permitido, então, para finalizar sua tarefa, essa pessoa ainda dispõe de

- (A) 1 hora.
- (B) 1 hora e 30 minutos.
- (C) 2 horas.
- (D) 2 horas e 30 minutos.
- (E) 3 horas.

15

A seguir, é apresentada uma sequência numérica, tal que os elementos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que x e y são números inteiros:

(24, 13, 22, 11, 20, 9, x, y).

Observando essa sequência e encontrando os valores de x e de y, seguindo a lei de formação da sequência dada, é correto afirmar que

- (A) x é um número maior que 30.
- (B) y é um número menor que 5.
- (C) a soma de x com y resulta em 25.
- (D) o produto de x por y resulta em 106.
- (E) a diferença entre y e x, nessa ordem, é um número positivo.

## Informática

16

No software Microsoft Power Point 2013, versão em português, existe um botão "Organizar" que oferece opções de ordenação de objetos de um slide. Em qual guia esse item pode ser encontrado?

- (A) INSERIR.
- (B) DESIGN.
- (C) TRANSIÇÕES.
- (D) EXIBIÇÃO.
- (E) PÁGINA INICIAL.

17

Assinale a alternativa que apresenta um dispositivo de memória ROM.

- (A) Cartão EDO.
- (B) Módulo DIMM.
- (C) Cartão SD.
- (D) Módulo DDR.
- (E) CACHE.

**18**

**Considerando as grandezas computacionais, 2 Kilobytes correspondem a quantos bytes?**

- (A) 1024
- (B) 20486
- (C) 1000
- (D) 2048
- (E) 1048

**19**

**Considerando o software Microsoft Excel 2013, versão em português, assinale a alternativa que apresenta um argumento válido na sintaxe da função TEXTO.**

- (A) valor
- (B) tamanho do texto
- (C) comprimento
- (D) intervalo
- (E) condição

**20**

**No sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual dos seguintes aplicativos deve ser utilizado para transformar uma partição FAT em NTFS?**

- (A) Bootcfg.exe
- (B) Convert.exe
- (C) Chkdsk.exe
- (D) Drfgui.exe
- (E) Fortfiles.exe

## **Conhecimentos Específicos**

**21**

**Um técnico em enfermagem deve conhecer sua regulamentação profissional. Assim, de acordo com o decreto nº 94.406/1987, cabe a esse profissional executar qual das seguintes atividades?**

- (A) Prescrever assistência de enfermagem.
- (B) Realizar auditoria em serviços hospitalares de complexidade intermediária.
- (C) Chefiar serviços públicos e de unidade de enfermagem.
- (D) Assistir ao enfermeiro na supervisão de assistência de enfermagem.
- (E) Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública.

**22**

**Considerado uma área complexa e de acesso restrito, o centro cirúrgico é composto por uma série de dependências interligadas, sendo correto afirmar que uma das áreas que é considerada restrita ou zona estéril é**

- (A) a farmácia.
- (B) a sala de espera.
- (C) o vestiário.
- (D) a sala de operações.
- (E) a sala de guarda e preparo de anestésicos.

**23**

**A assistência de enfermagem perioperatória é considerada vital para a realização e o sucesso de um ato anestésico-cirúrgico. Assim, é uma atribuição do técnico de enfermagem do centro cirúrgico, principalmente,**

- (A) manter o controle administrativo, técnico-operacional e ético sobre as diversas atividades desenvolvidas no centro cirúrgico.
- (B) prover a sala de operações com recursos adequados às necessidades do paciente e segundo as especificidades de cada intervenção anestésico-cirúrgica.
- (C) tomar decisões administrativas e assistenciais baseadas em evidências científicas.
- (D) elaborar o plano de cuidados de enfermagem para o período transoperatório e supervisionar sua implementação.
- (E) realizar consulta de enfermagem no pré e no pós-operatório e recepcionar o paciente no centro cirúrgico.

**24**

**Durante um procedimento cirúrgico de Colectomia, ocorre**

- (A) sutura da flexura sigmoide à parede abdominal.
- (B) visualização de uma articulação.
- (C) abertura e colocação de dreno na vesícula biliar.
- (D) plástica do piloro para aumentar seu diâmetro.
- (E) extirpação do ducto colédoco.

**25**

**No período transoperatório, o posicionamento cirúrgico é uma ação importante e sua responsabilidade deve ser compartilhada por toda a equipe atuante na sala de operações. Nesse contexto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) Idade, altura e peso do paciente não estão relacionados a fatores que podem definir a posição cirúrgica.
- ( ) É adequado que membros superiores fiquem pendentes na mesa de operação.
- ( ) É necessário impedir contato direto do paciente com a superfície metálica da mesa de operação.
- ( ) Deve-se evitar hiperextensão das terminações nervosas, para prevenção de paralisias e/ou parestesias, que podem ser irreversíveis.

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – V – V – V.
- (E) V – F – F – F.

**26**

**Um técnico de enfermagem realizou aferição dos sinais vitais de um paciente da clínica médica. Os dados obtidos foram: temperatura 38°C, pulso 120 bat/min e pressão arterial 90/40 mmHg. Ao informar ao enfermeiro os dados, o técnico relata que o paciente encontra-se**

- (A) afebril – taquicárdico – normotenso.
- (B) com hiperpirexia – normocárdico – hipotenso.
- (C) febril – taquicárdico – hipotenso.
- (D) hipotérmico – bradicárdico – hipertenso.
- (E) em estado febril – taquipneico – normotenso.

**27**

**No controle de infecções hospitalares relacionadas à inserção de cateter periférico, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve-se avaliar o sítio de inserção de pacientes pediátricos no mínimo uma vez ao dia.
- (B) A avaliação de necessidade de permanência do cateter deve ser semanal.
- (C) Rotineiramente, o cateter periférico não deve ser trocado em um período inferior a 12 horas.
- (D) O cateter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica asséptica deve ser trocado tão logo quanto possível.
- (E) Não é recomendado remover o cateter periférico, mesmo que não haja medicamentos endovenosos prescritos e que ele não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas.

**28**

**A posição cirúrgica de Canivete ou Jackknife, com variações de Kraske ou Depage, é uma modificação do decúbito ventral. Assim, é correto afirmar que, nesse posicionamento,**

- (A) a cabeça do paciente, o tórax e os pés precisam de suportes adicionais, para evitar complicações pós-operatórias.
- (B) eleva-se levemente os pés, e os coxins na região poplíteia propiciam repouso, evitando, também, o deslocamento caudal do tronco.
- (C) coloca-se acolchoamento nas nádegas (tuberosidade isquiática) e no dorso (proeminências ósseas da escápula e ombro).
- (D) o dorso da mesa deve ser elevado e um coxim roliço é colocado sob os ombros do paciente para hiperestender o pescoço.
- (E) existe a melhor visualização dos órgãos pélvicos durante a abertura ou a cirurgia laparoscópica no abdome inferior ou na pelve.

**29**

**Qual é a causa mais comum de obstrução das vias aéreas no POI em sala de recuperação pós-anestésica?**

- (A) Indução de broncoespasmo por relaxantes neuromusculares.
- (B) Acúmulo de secreção nas vias aéreas superiores devido à supressão do reflexo da tosse.
- (C) Laringoespasmo causado pela irritação da mucosa traqueal induzida por medicação.
- (D) Diminuição dos murmúrios vesiculares e presença de ruídos adventícios.
- (E) A “queda” da língua para trás, obstruindo a faringe, em virtude do relaxamento provocado pelos agentes anestésicos.

**30**

**Assinale a alternativa que apresenta uma recomendação importante na coleta de gasometria arterial.**

- (A) Passar por processo de hemólise.
- (B) Manter o sangue sempre em temperatura abaixo de 2°C.
- (C) Higienizar a pele com solução degermante.
- (D) Não permitir que o sangue entre em contato com o ar.
- (E) Utilizar luvas cirúrgicas estéreis.

**31**

**A reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) em tempo real é uma técnica molecular altamente sensível e específica, considerada, desde o início da pandemia, a metodologia padrão-ouro para o diagnóstico da COVID-19. A coleta de amostras respiratórias só deve ser realizada por profissionais devidamente capacitados, sendo correto afirmar que**

- (A) deve-se utilizar máscara cirúrgica e escudo facial durante a coleta.
- (B) é importante utilizar todos os equipamentos de proteção individual estéreis para evitar contaminação cruzada.
- (C) o swab, em algumas situações, pode ser coletado apenas na nasofaringe.
- (D) as amostras respiratórias, após a coleta, poderão ser acondicionadas em temperatura ambiente por até 72 horas.
- (E) o swab retal é uma alternativa útil ao swab nasal, uma vez que a forma ativa do vírus é encontrada nas fezes.

**32**

**É considerado um desinfetante de nível intermediário com três aplicações consecutivas com fricção rigorosa e secagem natural, sendo indicado para desinfecção em metais, vidros e mármore. O enunciado se refere ao**

- (A) hipoclorito de sódio a 1%.
- (B) álcool 70%.
- (C) detergente enzimático.
- (D) glutaraldeído a 2% por 30 min.
- (E) ácido acético 1%.

**33**

**A oxigenoterapia deve respeitar indicações definidas e especificações da dose e sua utilização requer o conhecimento do sistema de administração pela equipe multiprofissional, assim como da duração da terapia e sua monitorização. Nesse sentido, é correto afirmar que**

- (A) o uso de umidificador com água, mesmo em baixo fluxo, é essencial.
- (B) deve-se dar preferência ao soro fisiológico no umidificador.
- (C) a forma de administração mais comum nos sistemas de alto fluxo é o cateter nasal.
- (D) o cateter nasal, quando utilizado, deve ser substituído a cada 2 horas.
- (E) existe necessidade de umidificação, na utilização da máscara de venturi.

**34**

**A enfermeira prescreveu a um cliente da clínica médica, como cobertura para tratamento de lesão por pressão em região sacral, hidrocoloide em placa. Como a lesão era vitalizada e não havia necrose, o técnico de enfermagem tinha ciência de que a prescrição da troca da cobertura poderia ser realizada em qual periodicidade?**

- (A) Uma vez durante o turno.
- (B) A cada duas horas ou se ressecado.
- (C) A cada sete dias ou quando saturado.
- (D) A cada 24 horas.
- (E) Até o desprendimento completo da derme.

**35**

**Rotineiramente, sabe-se que, para realização de curativos em lesões abertas, a limpeza da ferida deve ser realizada com**

- (A) solução degermante.
- (B) iodo.
- (C) clorexidina 0.5%.
- (D) soro fisiológico 0.9%.
- (E) água oxigenada 10%.

**36**

A equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família de um município monitora os idosos de sua área de abrangência com diagnóstico ou suspeita de COVID-19 presencialmente a cada 24 horas, para saber a evolução do caso e dos sinais e sintomas que acometem os pacientes. Com base nos sinais vitais, a equipe pode atentar-se para qual dos seguintes sinais de agravamento do quadro?

- (A) Saturação em ar ambiente maior que 96%.
- (B) Temperatura 37 °C.
- (C) Glicemia capilar 110 mg/dl.
- (D) Frequência respiratória 28 irpm.
- (E) Pressão arterial entre 110/70 e 130/90 mmHg.

**37**

As responsabilidades legais relacionadas ao preparo e à administração de medicamentos são orientadas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Assim, quando um técnico em enfermagem administra um fármaco sem conhecer sua natureza e os riscos na sua administração, ele está sendo

- (A) imperito.
- (B) imprudente.
- (C) precipitado.
- (D) inseguro.
- (E) indolente.

**38**

Qual dos seguintes medicamentos é utilizado para diminuir a frequência e a força de contração da musculatura lisa, aliviando assim a dor?

- (A) Escopolamina.
- (B) Dimeticona.
- (C) Bisacodil.
- (D) Hidróxido de alumínio.
- (E) Indometacina.

**39**

Foi prescrito a um lactente com peso de 8 kg 0,2 ml de dipirona sódica por via intramuscular. Sabendo que a unidade possui frasco-ampola de 2 ml com 500 mg por ml, quantos miligramas foram prescritos?

- (A) 50 mg.
- (B) 100 mg.
- (C) 150 mg.
- (D) 200 mg.
- (E) 250 mg.

**40**

Foram prescritos 100 mg de Keflex por via oral. Sabe-se que o frasco contém suspensão de 250 mg / 5ml. Assim, é correto afirmar que, para cumprir a prescrição, deverá(ão) ser administrado(s)

- (A) 1 ml.
- (B) 1,5 ml.
- (C) 2 ml.
- (D) 2,5 ml.
- (E) 3 ml.

**41**

Uma técnica em enfermagem sabe que a administração de Penicilina G Benzatina deve ocorrer em músculos de grande extensão e maior capacidade de absorção. Seguindo a prescrição de 1 frasco-ampola 1.200.000 UI para um adulto por via intramuscular profunda, ela administra o medicamento na região ventroglútea. Nesse contexto, o volume administrado por essa técnica deve ser de

- (A) 4 ml.
- (B) 6 ml.
- (C) 8 ml.
- (D) 10 ml.
- (E) 12 ml.

**42**

Foi prescrito soro glicosado 5% 1.000 ml para correr em 8 horas. Assim, para administrar corretamente o soro, o técnico em enfermagem deverá contar e controlar o gotejamento em, aproximadamente,

- (A) 12,5 gotas por minuto.
- (B) 125 gotas por minuto.
- (C) 30 gotas por minuto.
- (D) 42 gotas por minuto.
- (E) 51 gotas por minuto.

**43**

Em um episódio testemunhado de engasgo, um paciente consciente, que não consegue falar e apresenta respiração ruidosa, foi socorrido por um profissional de saúde que se encontrava no local. Foi realizada a desobstrução da via aérea com sucesso por uma manobra denominada

- (A) leopold.
- (B) ortolani.
- (C) heimlich.
- (D) kristeller.
- (E) valsalva.

**44**

De acordo com a determinação da área queimada pela Regra dos 9, em um adulto, o tronco anterior corresponde a quantos por cento da área corporal?

- (A) 5
- (B) 10
- (C) 9
- (D) 1
- (E) 18

**45**

O profissional de saúde deve saber reconhecer uma Parada Cardiorespiratória (PCR): avaliar a responsividade; avaliar a respiração e o pulso simultaneamente por 10 segundos. Em caso de detecção de ausência de responsividade, respiração (ou gasping) e pulso, deve solicitar a outro profissional, de forma clara e objetiva, que acione a equipe médica, traga o carrinho de emergência e o desfibrilador. Assim, devem-se iniciar as compressões torácicas e a ventilação em todos os pacientes adultos com PCR, seja por causa cardíaca ou não cardíaca, a uma frequência e uma profundidade, respectivamente, de

- (A) 80 a 100 compressões/minuto – mínima 2 cm e máximo 3 cm.
- (B) 100 a 180 compressões/minuto – mínima 7 cm e máximo 8 cm.
- (C) 100 a 120 compressões/minuto – mínima 5 cm e máximo 6 cm.
- (D) 90 a 110 compressões/minuto – mínima 3 cm e máximo 4 cm.
- (E) 70 a 90 compressões/minuto – mínima 4 cm e máximo 5 cm.

**46**

Paciente feminina, 56 anos, diabética do tipo 2, faz uso de insulina NPH pela manhã e à noite. Principalmente pela manhã, costuma não se alimentar e apresenta sinais e sintomas de hipoglicemia, como tremores, sudorese, palidez, taquicardia, tonturas, cefaleia, fraqueza, parestesias e distúrbios visuais. Assim, é correto afirmar que essa paciente apresenta hipoglicemia, se os valores de glicemia capilar estiverem abaixo de

- (A) 60 mg/dl.
- (B) 65 mg/dl.
- (C) 70 mg/dl.
- (D) 75 mg/dl.
- (E) 80 mg/dl.

**47**

**O bacilo da tuberculose é transmitido por via aérea de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea que elimina bacilos no ambiente (caso fonte) a outra pessoa, por exalação de**

- (A) partículas virais.
- (B) gotículas.
- (C) aerossóis.
- (D) secreção.
- (E) contaminantes.

**48**

**Está indicado, prioritariamente, para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes,**

- (A) o teste de sensibilidade cutânea para tuberculose.
- (B) o Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB).
- (C) o raio X de tórax.
- (D) a baciloscopia indireta (BAAR).
- (E) o swab de orofaringe.

**49**

**Um lactente comparece à Unidade de Saúde aos 4 meses com calendário vacinal em dia e recebe as vacinas Pentavalente, VIP, Pneumocócica conjugada e Rotavírus. A(s) próxima(s) vacina(s) aprazada(s) pelo técnico em enfermagem da sala de vacina será(ão)**

- (A) aos cinco meses – Meningocócica C.
- (B) aos seis meses – Pentavalente, VIP e Pneumocócica conjugada.
- (C) aos sete meses – Pentavalente, VIP e Pneumocócica conjugada.
- (D) aos seis meses – Hepatite A.
- (E) aos oito meses – Tetraviral e Febre Amarela.

**50**

**Considerando a vacina tríplice viral Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR), é indicada vacinação em bloqueios de casos suspeitos de sarampo e rubéola a partir dos 6 meses. Para profissionais de saúde (de qualquer idade), recomendam-se quantas doses da vacina SCR?**

- (A) Uma dose a cada 10 anos.
- (B) Duas doses com intervalo de 30 dias.
- (C) Três doses com intervalo de 30 dias.
- (D) Uma dose anualmente.
- (E) Três doses com intervalo de 30 dias para segunda dose e seis meses para a terceira.

**51**

**Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

**De acordo com o Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, são vacinas oferecidas aos idosos:**

- I. Pneumocócica 23 valente.
- II. Meningocócica B.
- III. Influenza.
- IV. Hepatite A.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

**52**

**Qual das vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de imunização é realizada por via oral com dose de 1,5 ml?**

- (A) Rotavírus.
- (B) VOP.
- (C) Febre Amarela.
- (D) BCG.
- (E) Tetraviral.

**53**

**Na técnica correta de aferição da Pressão Arterial (PA), o técnico em enfermagem considera**

- (A) palpar o pulso radial e inflar o manguito até 50mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
- (B) que o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e abaixo do precórdio.
- (C) que a pressão sistólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos.
- (D) utilizar manguitos com câmara inflável (cuff) de tamanho padrão, independentemente do tamanho da circunferência do braço do paciente.
- (E) orientar o paciente para evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos que antecedem a verificação da PA.

**54**

**A infecção pelo vírus da dengue, quando sintomática, causa uma doença sistêmica de amplo espectro clínico, variando desde formas com poucos sintomas até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Três fases clínicas podem ocorrer: febril, crítica e de recuperação. A fase crítica pode estar presente em alguns pacientes, podendo evoluir para as formas graves, e tem como característica**

- (A) febre que tem duração de dois a sete dias, geralmente alta (39°C a 40°C), de início abrupto, associada à cefaleia.
- (B) principalmente a diarreia, que habitualmente não é volumosa.
- (C) iniciar no período da defervescência da febre, entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença.
- (D) rash cutâneo acompanhado ou não de prurido generalizado.
- (E) reabsorção gradual do conteúdo extravasado com progressiva melhora clínica.

**55**

**Qual das seguintes doenças deve ser notificada às autoridades de saúde dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do caso ou óbito?**

- (A) HIV.
- (B) Doença de Chagas Crônica.
- (C) Esquistossomose.
- (D) Hanseníase.
- (E) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus.

**56**

**Um técnico em enfermagem, durante a manipulação de material perfurocortante, deve ter o cuidado de**

- (A) utilizar os dedos como anteparo durante a realização de punção venosa.
- (B) preencher acima de 2/3 a capacidade total dos coletores para descarte de material perfurocortante.
- (C) acondicionar vidrarias e lâminas de barbear em saco de lixo branco para descarte.
- (D) se equipar com luvas de procedimento, reencapar as agulhas antes do descarte, para evitar acidentes.
- (E) desprezar todo material perfurocortante (mesmo que estéril) em recipientes resistentes à perfuração e com tampa.

**57**

**Um técnico em enfermagem sofreu uma perfuração no dedo médio com uma agulha 40x12 ao manipular, de forma incorreta, uma caixa contendo material perfurocortante. Após avaliação, não foi indicada a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) porque**

- (A) o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é maior que 72 horas.
- (B) a pessoa exposta é não reagente para o HIV no momento do atendimento.
- (C) o tipo de material biológico é de risco para transmissão do HIV.
- (D) o tipo de exposição é de risco para transmissão do HIV.
- (E) o status sorológico da pessoa-fonte não pode ser identificado.

**58**

**Quando um paciente com doença renal crônica é portador de shunt ou fístula arteriovenosa, é adequado**

- (A) promover curativos circunferenciais que possam garrotear o membro.
- (B) manter o membro sempre para baixo.
- (C) realizar compressão adequada para hemostasia após a punção.
- (D) dar preferência para aferição de pressão arterial no membro com shunt.
- (E) utilizar a via venosa como a preferencial para infusão de antimicrobianos.

**59**

**Um técnico em enfermagem da clínica médica, ao realizar anotações de enfermagem dos pacientes sob seus cuidados, registrava e assinava ações de enfermagem que não havia executado. Por esse motivo, instaurou-se processo ético e disciplinar que, após apuração dos fatos, aplicou a esse profissional a penalidade de**

- (A) censura.
- (B) cassação ao direito de exercício da profissão.
- (C) subvenção.
- (D) assinatura de termo circunstanciado.
- (E) suspensão do exercício profissional, por 120 dias.

**60**

**Sobre a Lei nº 7.498/1986, é correto afirmar que**

- (A) regulamenta o cumprimento de prescrição médica à distância.
- (B) prevê o quantitativo de profissionais de enfermagem de acordo com índices de segurança técnica.
- (C) afirma que cabe privativamente ao enfermeiro a prescrição da assistência de enfermagem.
- (D) destaca que a enfermagem é exercida privativamente e apenas pelo enfermeiro e pelo técnico em enfermagem.
- (E) cria o Conselho Regional de Enfermagem (COREN), constituindo uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social.

Realização



**instituto aocp**



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020



M4422040N

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA SAÚDE

# TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível

**TÉCNICO**

Turno

**MANHÃ**

**PROVA**

**04**

**Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!**



**instituto  
aacp**

Fraudar ou tentar fraudar  
Concursos Públicos é Crime!  
Previsto no art. 311 - A do  
Código Penal

## Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **sessenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

## Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

## Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

## Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia posterior à aplicação da prova no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaacp.org.br**

## Língua Portuguesa

### Saúde mental em tempos de pandemia *Relações sociais, estresse e resiliência*

KELLY PEREIRA ROBIS

O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. No entanto, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos. Vivências negativas não são totalmente deletérias: pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações interpessoais. Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência.

A família, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto no qual se estabelece a reciprocidade e a complementaridade que certamente podem ser um mecanismo de proteção em termos de saúde mental, em tempos de estresse e de isolamento.

Considerando o contexto atual de pandemia, essa relação, que é tão importante, para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. Dessa forma, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada. Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez que respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.

#### **Agressividade**

Como consequência, podemos imputar ao outro o resultado de uma vivência pessoal, ao sermos hostis e agressivos. Claramente, essa emoção precisa ser “colocada para fora”, mas, não de forma violenta: dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que uma comunicação agressiva.

Todavia, o estado emocional do outro também precisa ser levado em consideração, por isso a leitura do ambiente é fundamental. Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza.

#### **Diálogo**

A abordagem não empática desse sofrimento pode desgastar ainda mais as relações interpessoais, justamente quando mais precisamos delas. Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.

Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental. Afinal, saúde mental pode começar pelo olhar acolhedor daqueles que tanto amamos.

Disponível em: <https://www.otempo.com.br/opiniaio/artigos/saude-mental-em-tempos-de-pandemia-1.234535>. Acesso em: 04 dez. 2020.

1

**Observe o termo destacado no período que segue: “Vivências negativas não são totalmente deletérias: pessoas que estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros e valorizam muito mais as relações interpessoais.”. Tal termo, nesse caso, tem sentido equivalente a**

- (A) inócuas.
- (B) benéficas.
- (C) indeléveis.
- (D) prejudiciais.
- (E) perduráveis.

2

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa a noção semântica de conclusão.

- (A) “O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências. **No entanto**, momentos ruins fazem parte da vida e precisam ser vividos.”.
- (B) “[...] essa relação [...] pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento. **Dessa forma**, a qualidade dos relacionamentos precisa ser valorizada.”.
- (C) Claramente, essa emoção precisa ser “colocada para fora”, **mas**, não de forma violenta [...]”.
- (D) “(...) dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente **mais** efetivo e saudável **do que** uma comunicação agressiva.”.
- (E) “[...] a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, **todavia**, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação [...]”.

3

Analise o período que segue.

“Problemas individuais devem ser levados em consideração, **uma vez que respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.**”.

Em relação à oração anterior, a sentença destacada tem valor semântico de

- (A) consequência, por indicar o efeito que o medo e a ansiedade podem gerar em nós.
- (B) finalidade, pois indica o objetivo de problemas serem levados em conta.
- (C) proporção, por manifestar um aumento proporcional entre problemas individuais e ansiedade e medo.
- (D) condição, pois evidencia a condicionalidade existente entre a ocorrência de ansiedade e medo com a consideração de problemas individuais.
- (E) causa, por indicar o motivo de precisarmos levar em conta problemas individuais.

4

Levando em conta os usos da vírgula, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Vírgulas usadas para isolar conjunção adversativa.
2. Vírgula usada para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. Vírgula inadequada, separando sujeito e predicado.
4. Vírgulas usadas para separar termos coordenados.
5. Vírgulas usadas para isolar oração adjetiva explicativa.

- ( ) “[...] essa relação, que é tão importante, para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina e por reações emocionais inerentes ao momento.”.
- ( ) “Claramente, essa emoção precisa ser ‘colocada para fora’ [...]”.
- ( ) “Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza.”.
- ( ) “Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação saudável.”.
- ( ) “[...] relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental.”.

- (A) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.
- (B) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.
- (C) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- (D) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
- (E) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.

5

Considerando as regras de acentuação dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a alternativa cujo termo destacado receba acento pelo mesmo motivo que “**antropológica**”, empregado em “A família, sob uma perspectiva **antropológica**, é um grupo social concreto (...)”.

- (A) “A **família**, sob uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto [...]”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para a prevenção do adoecimento mental, podendo fazer parte de um mecanismo chamado **resiliência**.”.
- (C) “Todavia, o estado emocional do outro **também** precisa ser levado em consideração, [...]”.
- (D) “A abordagem não **empática** desse sofrimento pode desgastar ainda mais as relações interpessoais, [...]”.
- (E) “Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental, pode ser um grande passo para uma relação **saudável**.”.

6

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) os seres humanos culpabilizam seus familiares e/ou amigos próximos por seus medos e anseios.
- (B) as pessoas tornaram-se mais agressivas e mais facilmente irritáveis com a pandemia.
- (C) relações familiares calcadas, sobretudo, em diálogo e empatia podem ser grandes aliadas para fortalecimento da saúde mental.
- (D) pessoas que sofrem com a depressão costumam expor suas emoções de modo violento e agressivo.
- (E) problemas individuais, em um contexto familiar, devem ser priorizados em detrimento dos problemas coletivos.

7

Para a autora, a prevenção do adoecimento mental relaciona-se também

- (A) ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo em lidar com problemas.
- (B) aos benefícios de uma vida tranquila, sem situações de violência e/ou agressividade.
- (C) a um ambiente livre de pressões e situações adversas.
- (D) à persistência em se evitar momentos traumáticos e/ou de estresse.
- (E) à importância de vivências íntimas consigo mesmo, sem contato social.

8

Assinale a alternativa em que o conectivo “que” esteja sendo utilizado para retomar um termo antecedente.

- (A) [...] pessoas **que** estão passando por momentos de estresse tendem a ajudar mais os outros [...]”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para **que** a prevenção do adoecimento mental aconteça [...]”.
- (C) “Problemas individuais devem ser levados em consideração, uma vez **que** respostas afetivas como a ansiedade e o medo podem nos tornar mais irritáveis e impulsivos.”.
- (D) “[...] dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do **que** uma comunicação agressiva.”.
- (E) “[...] entende-se **que** a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia [...]”.

9

Considerando o seguinte trecho, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

“Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, todavia, estratégias de cuidado e leitura emocional do outro e de si mesmo podem determinar a qualidade e a força dessa relação como um aspecto estrutural da saúde mental.”.

- ( ) O trecho “[...] que a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia [...]” funciona como objeto direto da estrutura verbal “entende-se”.
- ( ) Ainda em “[...] a relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia, [...]”, os termos destacados atribuem características e pertencem à mesma classe de palavras.
- ( ) A conjunção “todavia” indica oposição e poderia ser substituída por “contudo”.
- ( ) O segmento “[...] leitura emocional do outro [...]”, fora desse contexto, torna-se ambíguo.

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – F – V.

10

Inúmeros substantivos na Língua Portuguesa formam-se por derivação regressiva, ou seja, derivam-se de verbos. Sabendo disso, assinale a alternativa cujo vocábulo em destaque fora formado por esse processo.

- (A) “O ser humano tende a buscar prazer em todas as suas vivências.”.
- (B) “Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, [...]”.
- (C) “Essas relações sociais podem contribuir para que a prevenção do adoecimento mental aconteça, [...]”.
- (D) “[...] essa relação, que é tão importante para o ser humano, pode ser fragilizada pela mudança abrupta da rotina [...]”.
- (E) “[...] dividir o sofrimento e as preocupações por meio do diálogo é consideravelmente mais efetivo e saudável do que uma comunicação agressiva.”.

## Matemática

11

A sequência numérica

(100, 80, 40, 20, 10, -10, -5, ...)

segue um padrão lógico. O termo dessa sequência imediatamente posterior ao número -5 é igual a

- (A) -25.
- (B) 35.
- (C) -20.
- (D) 40.
- (E) -10.

12

Ao final de cada mês, ao realizar o pagamento dos salários dos funcionários de uma empresa, o RH escolhe um entre os funcionários para receber uma bonificação, além do seu salário normal. A bonificação terá um valor fixo de R\$ 100,00 e, a esse valor fixo, será somada a oitava parte do salário normal recebido por esse funcionário. Dessa forma, se no final de determinado mês o funcionário escolhido para receber a bonificação possuir um salário normal igual R\$ 3.568,00, então, o valor total que ele irá receber como pagamento será igual a

- (A) R\$ 5.046,00.
- (B) R\$ 4.114,00.
- (C) R\$ 5.546,00.
- (D) R\$ 4.546,00.
- (E) R\$ 3.546,00.

13

Uma pessoa precisa realizar uma tarefa em 8 horas, no máximo. Se desde o início da tarefa já se passaram  $\frac{3}{4}$  do tempo máximo permitido, então, para finalizar sua tarefa, essa pessoa ainda dispõe de

- (A) 1 hora.
- (B) 1 hora e 30 minutos.
- (C) 2 horas.
- (D) 2 horas e 30 minutos.
- (E) 3 horas.

14

O resultado do produto  $(\sqrt{49\%}) \times (50\%)$ , na forma de taxa percentual, é igual a

- (A) 95%.
- (B) 15%.
- (C) 55%.
- (D) 75%.
- (E) 35%.

15

A seguir, é apresentada uma sequência numérica, tal que os elementos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei (lógica) de formação, em que x e y são números inteiros:

(24, 13, 22, 11, 20, 9, x, y).

Observando essa sequência e encontrando os valores de x e de y, seguindo a lei de formação da sequência dada, é correto afirmar que

- (A) x é um número maior que 30.
- (B) y é um número menor que 5.
- (C) a soma de x com y resulta em 25.
- (D) o produto de x por y resulta em 106.
- (E) a diferença entre y e x, nessa ordem, é um número positivo.

## Informática

16

Assinale a alternativa que apresenta um dispositivo de memória ROM.

- (A) Cartão EDO.
- (B) Módulo DIMM.
- (C) Cartão SD.
- (D) Módulo DDR.
- (E) CACHE.

17

Considerando as grandezas computacionais, 2 Kilobytes correspondem a quantos bytes?

- (A) 1024
- (B) 20486
- (C) 1000
- (D) 2048
- (E) 1048

18

Considerando o software Microsoft Excel 2013, versão em português, assinale a alternativa que apresenta um argumento válido na sintaxe da função TEXTO.

- (A) valor
- (B) tamanho do texto
- (C) comprimento
- (D) intervalo
- (E) condição

19

No sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, qual dos seguintes aplicativos deve ser utilizado para transformar uma partição FAT em NTFS?

- (A) Bootcfg.exe
- (B) Convert.exe
- (C) Chkdsk.exe
- (D) Drfgui.exe
- (E) Fortfiles.exe

20

No software Microsoft Power Point 2013, versão em português, existe um botão "Organizar" que oferece opções de ordenação de objetos de um slide. Em qual guia esse item pode ser encontrado?

- (A) INSERIR.
- (B) DESIGN.
- (C) TRANSIÇÕES.
- (D) EXIBIÇÃO.
- (E) PÁGINA INICIAL.

## Conhecimentos Específicos

21

Considerado uma área complexa e de acesso restrito, o centro cirúrgico é composto por uma série de dependências interligadas, sendo correto afirmar que uma das áreas que é considerada restrita ou zona estéril é

- (A) a farmácia.
- (B) a sala de espera.
- (C) o vestiário.
- (D) a sala de operações.
- (E) a sala de guarda e preparo de anestésicos.

22

A assistência de enfermagem perioperatória é considerada vital para a realização e o sucesso de um ato anestésico-cirúrgico. Assim, é uma atribuição do técnico de enfermagem do centro cirúrgico, principalmente,

- (A) manter o controle administrativo, técnico-operacional e ético sobre as diversas atividades desenvolvidas no centro cirúrgico.
- (B) prover a sala de operações com recursos adequados às necessidades do paciente e segundo as especificidades de cada intervenção anestésico-cirúrgica.
- (C) tomar decisões administrativas e assistenciais baseadas em evidências científicas.
- (D) elaborar o plano de cuidados de enfermagem para o período transoperatório e supervisionar sua implementação.
- (E) realizar consulta de enfermagem no pré e no pós-operatório e recepcionar o paciente no centro cirúrgico.

23

Durante um procedimento cirúrgico de Colecistectomia, ocorre

- (A) sutura da flexura sigmoide à parede abdominal.
- (B) visualização de uma articulação.
- (C) abertura e colocação de dreno na vesícula biliar.
- (D) plástica do piloro para aumentar seu diâmetro.
- (E) extirpação do ducto colédoco.

24

No período transoperatório, o posicionamento cirúrgico é uma ação importante e sua responsabilidade deve ser compartilhada por toda a equipe atuante na sala de operações. Nesse contexto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Idade, altura e peso do paciente não estão relacionados a fatores que podem definir a posição cirúrgica.
- ( ) É adequado que membros superiores fiquem pendentes na mesa de operação.
- ( ) É necessário impedir contato direto do paciente com a superfície metálica da mesa de operação.
- ( ) Deve-se evitar hiperextensão das terminações nervosas, para prevenção de paralisias e/ou parestesias, que podem ser irreversíveis.

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – V – V – V.
- (E) V – F – F – F.

25

Um técnico de enfermagem realizou aferição dos sinais vitais de um paciente da clínica médica. Os dados obtidos foram: temperatura 38°C, pulso 120 bat/min e pressão arterial 90/40 mmHg. Ao informar ao enfermeiro os dados, o técnico relata que o paciente encontra-se

- (A) afebril – taquicárdico – normotenso.
- (B) com hiperpirexia – normocárdico – hipotenso.
- (C) febril – taquicárdico – hipotenso.
- (D) hipotérmico – bradicárdico – hipertenso.
- (E) em estado febril – taquipneico – normotenso.

26

No controle de infecções hospitalares relacionadas à inserção de cateter periférico, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se avaliar o sítio de inserção de pacientes pediátricos no mínimo uma vez ao dia.
- (B) A avaliação de necessidade de permanência do cateter deve ser semanal.
- (C) Rotineiramente, o cateter periférico não deve ser trocado em um período inferior a 12 horas.
- (D) O cateter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica asséptica deve ser trocado tão logo quanto possível.
- (E) Não é recomendado remover o cateter periférico, mesmo que não haja medicamentos endovenosos prescritos e que ele não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas.

27

A posição cirúrgica de Canivete ou Jackknife, com variações de Kraske ou Depage, é uma modificação do decúbito ventral. Assim, é correto afirmar que, nesse posicionamento,

- (A) a cabeça do paciente, o tórax e os pés precisam de suportes adicionais, para evitar complicações pós-operatórias.
- (B) eleva-se levemente os pés, e os coxins na região poplíteia propiciam repouso, evitando, também, o deslocamento caudal do tronco.
- (C) coloca-se acolchoamento nas nádegas (tuberosidade isquiática) e no dorso (proeminências ósseas da escápula e ombro).
- (D) o dorso da mesa deve ser elevado e um coxim roliço é colocado sob os ombros do paciente para hiperestender o pescoço.
- (E) existe a melhor visualização dos órgãos pélvicos durante a abertura ou a cirurgia laparoscópica no abdome inferior ou na pelve.

**28**

**Qual é a causa mais comum de obstrução das vias aéreas no POI em sala de recuperação pós-anestésica?**

- (A) Indução de broncoespasmo por relaxantes neuromusculares.
- (B) Acúmulo de secreção nas vias aéreas superiores devido à supressão do reflexo da tosse.
- (C) Laringoespasmo causado pela irritação da mucosa traqueal induzida por medicação.
- (D) Diminuição dos murmúrios vesiculares e presença de ruídos adventícios.
- (E) A “queda” da língua para trás, obstruindo a faringe, em virtude do relaxamento provocado pelos agentes anestésicos.

**29**

**Assinale a alternativa que apresenta uma recomendação importante na coleta de gasometria arterial.**

- (A) Passar por processo de hemólise.
- (B) Manter o sangue sempre em temperatura abaixo de 2°C.
- (C) Higienizar a pele com solução degermante.
- (D) Não permitir que o sangue entre em contato com o ar.
- (E) Utilizar luvas cirúrgicas estéreis.

**30**

**A reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) em tempo real é uma técnica molecular altamente sensível e específica, considerada, desde o início da pandemia, a metodologia padrão-ouro para o diagnóstico da COVID-19. A coleta de amostras respiratórias só deve ser realizada por profissionais devidamente capacitados, sendo correto afirmar que**

- (A) deve-se utilizar máscara cirúrgica e escudo facial durante a coleta.
- (B) é importante utilizar todos os equipamentos de proteção individual estéreis para evitar contaminação cruzada.
- (C) o *swab*, em algumas situações, pode ser coletado apenas na nasofaringe.
- (D) as amostras respiratórias, após a coleta, poderão ser acondicionadas em temperatura ambiente por até 72 horas.
- (E) o swab retal é uma alternativa útil ao swab nasal, uma vez que a forma ativa do vírus é encontrada nas fezes.

**31**

**É considerado um desinfetante de nível intermediário com três aplicações consecutivas com fricção rigorosa e secagem natural, sendo indicado para desinfecção em metais, vidros e mármore. O enunciado se refere ao**

- (A) hipoclorito de sódio a 1%.
- (B) álcool 70%.
- (C) detergente enzimático.
- (D) glutaraldeído a 2% por 30 min.
- (E) ácido acético 1%.

**32**

A oxigenoterapia deve respeitar indicações definidas e especificações da dose e sua utilização requer o conhecimento do sistema de administração pela equipe multiprofissional, assim como da duração da terapia e sua monitorização. Nesse sentido, é correto afirmar que

- (A) o uso de umidificador com água, mesmo em baixo fluxo, é essencial.
- (B) deve-se dar preferência ao soro fisiológico no umidificador.
- (C) a forma de administração mais comum nos sistemas de alto fluxo é o cateter nasal.
- (D) o cateter nasal, quando utilizado, deve ser substituído a cada 2 horas.
- (E) existe necessidade de umidificação, na utilização da máscara de venturi.

**33**

A enfermeira prescreveu a um cliente da clínica médica, como cobertura para tratamento de lesão por pressão em região sacral, hidrocoloide em placa. Como a lesão era vitalizada e não havia necrose, o técnico de enfermagem tinha ciência de que a prescrição da troca da cobertura poderia ser realizada em qual periodicidade?

- (A) Uma vez durante o turno.
- (B) A cada duas horas ou se ressecado.
- (C) A cada sete dias ou quando saturado.
- (D) A cada 24 horas.
- (E) Até o desprendimento completo da derme.

**34**

Rotineiramente, sabe-se que, para realização de curativos em lesões abertas, a limpeza da ferida deve ser realizada com

- (A) solução degermante.
- (B) iodo.
- (C) clorexidina 0.5%.
- (D) soro fisiológico 0.9%.
- (E) água oxigenada 10%.

**35**

A equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família de um município monitora os idosos de sua área de abrangência com diagnóstico ou suspeita de COVID-19 presencialmente a cada 24 horas, para saber a evolução do caso e dos sinais e sintomas que acometem os pacientes. Com base nos sinais vitais, a equipe pode atentar-se para qual dos seguintes sinais de agravamento do quadro?

- (A) Saturação em ar ambiente maior que 96%.
- (B) Temperatura 37 °C.
- (C) Glicemia capilar 110 mg/dl.
- (D) Frequência respiratória 28 irpm.
- (E) Pressão arterial entre 110/70 e 130/90 mmHg.

**36**

As responsabilidades legais relacionadas ao preparo e à administração de medicamentos são orientadas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Assim, quando um técnico em enfermagem administra um fármaco sem conhecer sua natureza e os riscos na sua administração, ele está sendo

- (A) imperito.
- (B) imprudente.
- (C) precipitado.
- (D) inseguro.
- (E) indolente.

**37**

Qual dos seguintes medicamentos é utilizado para diminuir a frequência e a força de contração da musculatura lisa, aliviando assim a dor?

- (A) Escopolamina.
- (B) Dimeticona.
- (C) Bisacodil.
- (D) Hidróxido de alumínio.
- (E) Indometacina.

**38**

Foi prescrito a um lactente com peso de 8 kg 0,2 ml de dipirona sódica por via intramuscular. Sabendo que a unidade possui frasco-ampola de 2 ml com 500 mg por ml, quantos miligramas foram prescritos?

- (A) 50 mg.
- (B) 100 mg.
- (C) 150 mg.
- (D) 200 mg.
- (E) 250 mg.

**39**

Foram prescritos 100 mg de Keflex por via oral. Sabe-se que o frasco contém suspensão de 250 mg / 5ml. Assim, é correto afirmar que, para cumprir a prescrição, deverá(ão) ser administrado(s)

- (A) 1 ml.
- (B) 1,5 ml.
- (C) 2 ml.
- (D) 2,5 ml.
- (E) 3 ml.

**40**

Uma técnica em enfermagem sabe que a administração de Penicilina G Benzatina deve ocorrer em músculos de grande extensão e maior capacidade de absorção. Seguindo a prescrição de 1 frasco-ampola 1.200.000 UI para um adulto por via intramuscular profunda, ela administra o medicamento na região ventroglútea. Nesse contexto, o volume administrado por essa técnica deve ser de

- (A) 4 ml.
- (B) 6 ml.
- (C) 8 ml.
- (D) 10 ml.
- (E) 12 ml.

**41**

Foi prescrito soro glicosado 5% 1.000 ml para correr em 8 horas. Assim, para administrar corretamente o soro, o técnico em enfermagem deverá contar e controlar o gotejamento em, aproximadamente,

- (A) 12,5 gotas por minuto.
- (B) 125 gotas por minuto.
- (C) 30 gotas por minuto.
- (D) 42 gotas por minuto.
- (E) 51 gotas por minuto.

**42**

Em um episódio testemunhado de engasgo, um paciente consciente, que não consegue falar e apresenta respiração ruidosa, foi socorrido por um profissional de saúde que se encontrava no local. Foi realizada a desobstrução da via aérea com sucesso por uma manobra denominada

- (A) leopold.
- (B) ortolani.
- (C) heimlich.
- (D) kristeller.
- (E) valsalva.

**43**

De acordo com a determinação da área queimada pela Regra dos 9, em um adulto, o tronco anterior corresponde a quantos por cento da área corporal?

- (A) 5
- (B) 10
- (C) 9
- (D) 1
- (E) 18

44

O profissional de saúde deve saber reconhecer uma Parada Cardiorespiratória (PCR): avaliar a responsividade; avaliar a respiração e o pulso simultaneamente por 10 segundos. Em caso de detecção de ausência de responsividade, respiração (ou gasping) e pulso, deve solicitar a outro profissional, de forma clara e objetiva, que acione a equipe médica, traga o carrinho de emergência e o desfibrilador. Assim, devem-se iniciar as compressões torácicas e a ventilação em todos os pacientes adultos com PCR, seja por causa cardíaca ou não cardíaca, a uma frequência e uma profundidade, respectivamente, de

- (A) 80 a 100 compressões/minuto – mínima 2 cm e máximo 3 cm.
- (B) 100 a 180 compressões/minuto – mínima 7 cm e máximo 8 cm.
- (C) 100 a 120 compressões/minuto – mínima 5 cm e máximo 6 cm.
- (D) 90 a 110 compressões/minuto – mínima 3 cm e máximo 4 cm.
- (E) 70 a 90 compressões/minuto – mínima 4 cm e máximo 5 cm.

45

Paciente feminina, 56 anos, diabética do tipo 2, faz uso de insulina NPH pela manhã e à noite. Principalmente pela manhã, costuma não se alimentar e apresenta sinais e sintomas de hipoglicemia, como tremores, sudorese, palidez, taquicardia, tonturas, cefaleia, fraqueza, parestesias e distúrbios visuais. Assim, é correto afirmar que essa paciente apresenta hipoglicemia, se os valores de glicemia capilar estiverem abaixo de

- (A) 60 mg/dl.
- (B) 65 mg/dl.
- (C) 70 mg/dl.
- (D) 75 mg/dl.
- (E) 80 mg/dl.

46

O bacilo da tuberculose é transmitido por via aérea de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea que elimina bacilos no ambiente (caso fonte) a outra pessoa, por exalação de

- (A) partículas virais.
- (B) gotículas.
- (C) aerossóis.
- (D) secreção.
- (E) contaminantes.

47

Está indicado, prioritariamente, para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes,

- (A) o teste de sensibilidade cutânea para tuberculose.
- (B) o Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB).
- (C) o raio X de tórax.
- (D) a baciloscopia indireta (BAAR).
- (E) o swab de orofaringe.

48

Um lactente comparece à Unidade de Saúde aos 4 meses com calendário vacinal em dia e recebe as vacinas Pentavalente, VIP, Pneumocócica conjugada e Rotavírus. A(s) próxima(s) vacina(s) aprazada(s) pelo técnico em enfermagem da sala de vacina será(ão)

- (A) aos cinco meses – Meningocócica C.
- (B) aos seis meses – Pentavalente, VIP e Pneumocócica conjugada.
- (C) aos sete meses – Pentavalente, VIP e Pneumocócica conjugada.
- (D) aos seis meses – Hepatite A.
- (E) aos oito meses – Tetraviral e Febre Amarela.

49

Considerando a vacina tríplice viral Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR), é indicada vacinação em bloqueios de casos suspeitos de sarampo e rubéola a partir dos 6 meses. Para profissionais de saúde (de qualquer idade), recomendam-se quantas doses da vacina SCR?

- (A) Uma dose a cada 10 anos.
- (B) Duas doses com intervalo de 30 dias.
- (C) Três doses com intervalo de 30 dias.
- (D) Uma dose anualmente.
- (E) Três doses com intervalo de 30 dias para segunda dose e seis meses para a terceira.

50

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

De acordo com o Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, são vacinas oferecidas aos idosos:

- I. Pneumocócica 23 valente.
- II. Meningocócica B.
- III. Influenza.
- IV. Hepatite A.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

51

Qual das vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de imunização é realizada por via oral com dose de 1,5 ml?

- (A) Rotavírus.
- (B) VOP.
- (C) Febre Amarela.
- (D) BCG.
- (E) Tetraviral.

52

Na técnica correta de aferição da Pressão Arterial (PA), o técnico em enfermagem considera

- (A) palpar o pulso radial e inflar o manguito até 50mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
- (B) que o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e abaixo do precórdio.
- (C) que a pressão sistólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos.
- (D) utilizar manguitos com câmara inflável (cuff) de tamanho padrão, independentemente do tamanho da circunferência do braço do paciente.
- (E) orientar o paciente para evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos que antecedem a verificação da PA.

53

A infecção pelo vírus da dengue, quando sintomática, causa uma doença sistêmica de amplo espectro clínico, variando desde formas com poucos sintomas até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Três fases clínicas podem ocorrer: febril, crítica e de recuperação. A fase crítica pode estar presente em alguns pacientes, podendo evoluir para as formas graves, e tem como característica

- (A) febre que tem duração de dois a sete dias, geralmente alta (39°C a 40°C), de início abrupto, associada à cefaleia.
- (B) principalmente a diarreia, que habitualmente não é volumosa.
- (C) iniciar no período da defervescência da febre, entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença.
- (D) rash cutâneo acompanhado ou não de prurido generalizado.
- (E) reabsorção gradual do conteúdo extravasado com progressiva melhora clínica.

54

**Qual das seguintes doenças deve ser notificada às autoridades de saúde dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do caso ou óbito?**

- (A) HIV.
- (B) Doença de Chagas Crônica.
- (C) Esquistossomose.
- (D) Hanseníase.
- (E) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus.

55

**Um técnico em enfermagem, durante a manipulação de material perfurocortante, deve ter o cuidado de**

- (A) utilizar os dedos como anteparo durante a realização de punção venosa.
- (B) preencher acima de 2/3 a capacidade total dos coletores para descarte de material perfurocortante.
- (C) acondicionar vidrarias e lâminas de barbear em saco de lixo branco para descarte.
- (D) se equipar com luvas de procedimento, reencapar as agulhas antes do descarte, para evitar acidentes.
- (E) desprezar todo material perfurocortante (mesmo que estéril) em recipientes resistentes à perfuração e com tampa.

56

**Um técnico em enfermagem sofreu uma perfuração no dedo médio com uma agulha 40x12 ao manipular, de forma incorreta, uma caixa contendo material perfurocortante. Após avaliação, não foi indicada a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) porque**

- (A) o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é maior que 72 horas.
- (B) a pessoa exposta é não reagente para o HIV no momento do atendimento.
- (C) o tipo de material biológico é de risco para transmissão do HIV.
- (D) o tipo de exposição é de risco para transmissão do HIV.
- (E) o status sorológico da pessoa-fonte não pode ser identificado.

57

**Quando um paciente com doença renal crônica é portador de shunt ou fístula arteriovenosa, é adequado**

- (A) promover curativos circunferenciais que possam garrotear o membro.
- (B) manter o membro sempre para baixo.
- (C) realizar compressão adequada para hemostasia após a punção.
- (D) dar preferência para aferição de pressão arterial no membro com shunt.
- (E) utilizar a via venosa como a preferencial para infusão de antimicrobianos.

58

**Um técnico em enfermagem da clínica médica, ao realizar anotações de enfermagem dos pacientes sob seus cuidados, registrava e assinava ações de enfermagem que não havia executado. Por esse motivo, instaurou-se processo ético e disciplinar que, após apuração dos fatos, aplicou a esse profissional a penalidade de**

- (A) censura.
- (B) cassação ao direito de exercício da profissão.
- (C) subvenção.
- (D) assinatura de termo circunstanciado.
- (E) suspensão do exercício profissional, por 120 dias.

59

**Sobre a Lei nº 7.498/1986, é correto afirmar que**

- (A) regulamenta o cumprimento de prescrição médica à distância.
- (B) prevê o quantitativo de profissionais de enfermagem de acordo com índices de segurança técnica.
- (C) afirma que cabe privativamente ao enfermeiro a prescrição da assistência de enfermagem.
- (D) destaca que a enfermagem é exercida privativamente e apenas pelo enfermeiro e pelo técnico em enfermagem.
- (E) cria o Conselho Regional de Enfermagem (COREN), constituindo uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social.

**60**

**Um técnico em enfermagem deve conhecer sua regulamentação profissional. Assim, de acordo com o decreto nº 94.406/1987, cabe a esse profissional executar qual das seguintes atividades?**

- (A) Prescrever assistência de enfermagem.
- (B) Realizar auditoria em serviços hospitalares de complexidade intermediária.
- (C) Chefiar serviços públicos e de unidade de enfermagem.
- (D) Assistir ao enfermeiro na supervisão de assistência de enfermagem.
- (E) Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública.

Realização



**instituto aacp**