

CONCURSO PÚBLICO

CARGO 50

MÉDICO CIRURGIA PLÁSTICA

TIPO A



INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais e verifique se o tipo de caderno de provas corresponde ao tipo indicado na sua folha de respostas. Se houver qualquer divergência, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

As provas objetivas são constituídas de questões com cinco opções (A, B, C, D e E), com **uma única resposta correta**. Caso o caderno das provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a folha de respostas, que é **o único documento válido** para a correção das provas. O candidato é o único responsável pelo preenchimento da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital de abertura ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitido que outras pessoas façam as marcações da folha de respostas.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Estas provas têm a duração de quatro horas. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar seu caderno de provas somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.movens.org.br/prefsaoluis>, no dia 16/1/2007, a partir das 16 horas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DIA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas	16/1/2007
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas – 2 dias	17 e 18/1/2007
Resultado final das provas objetivas para todos os cargos, do concurso para os cargos de Nível Médio e de Nível Fundamental e convocação para a avaliação de títulos para os cargos de Nível Superior	13/2/2007
Entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	14 e 15/2/2007
Resultado provisório da avaliação de títulos	7/3/2007
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos	8 e 9/3/2007
Resultado final na avaliação de títulos e resultado final do concurso (Nível Superior)	22/3/2007



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

Considere que uma mulher com 38 anos de idade, pesando 60 kg, portadora de epilepsia, sofreu uma queimadura de 50% da superfície corporal total durante o banho, duas horas antes da transferência para o hospital. Com base nesta informação isolada e utilizando a fórmula de Parkland, a taxa de infusão que deve ser aplicada a esta paciente na sua admissão ao hospital é

- (A) 450ml/hora.
- (B) 600ml/hora.
- (C) 750ml/hora.
- (D) 900ml/hora.
- (E) 1200ml/hora.

QUESTÃO 02

Considere que uma mulher de 34 anos teve uma lesão removida de seu braço direito e não há evidência de linfadenopatia ou metástases. A análise histológica revela uma lesão de 1,1mm de profundidade. O estadiamento da paciente com relação a esse caso é:

- (A) estágio IA.
- (B) estágio IB.
- (C) estágio IIA.
- (D) estágio IIB.
- (E) estágio IIIA.

QUESTÃO 03

Sobre o uso de anestésicos locais, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Promovem analgesia com excelente preservação do estado de alerta, *drive* respiratório e estabilidade hemodinâmica.
- (B) Em neonatos, a lidocaína é eficaz em concentrações variando entre 0,3 a 0,5%; soluções entre 1 a 2% são desnecessárias e podem predispor a toxicidade sistêmica.
- (C) A dosagem excessiva de anestésicos locais pode levar a convulsões, arritmias e depressão miocárdica.
- (D) No caso de circuncisão, o bloqueio peniano é uma alternativa anestésica eficaz em neonatos em vigília.
- (E) Para bloqueio por infiltração, a aspiração negativa através de agulha pequena demonstra que não houve injeção endovenosa, desde que a infusão e aspiração sejam realizadas em uma única posição.

QUESTÃO 04

Considere que um paciente é admitido na sala de emergência após sofrer um acidente automobilístico com trauma aparente da face. Ao exame dos pares cranianos, o paciente tem percepção da luz no olho direito mas não consegue movê-lo. Além disso, sua pupila direita está dilatada, e ele não consegue elevar a pálpebra direita. O diagnóstico provável é

- (A) Síndrome do Ápice Orbital.
- (B) Síndrome da Fissura Orbital Inferior.
- (C) Síndrome da Fissura Orbital Superior.
- (D) Síndrome do Forame Orbital.
- (E) Síndrome do Forame Estilomastóideo.

QUESTÃO 05

Para um paciente submetido a ressecção em plano total de um tumor de pálpebra inferior com um defeito entre 25 a 50% do tamanho original da pálpebra, o melhor método de reconstrução é:

- (A) aproximação direta com aproximação de todos os planos.
- (B) aproximação direta de todos os planos com uma zetaplastia dos bordos de pele.
- (C) retalho tarsoconjuntival.
- (D) aproximação direta de todos os planos combinada com cantotomia lateral.
- (E) enxerto tarsal ou condromucoso combinado com rotação de retalho cutâneo.

QUESTÃO 06

Considere a seguinte situação hipotética. Uma mulher de 20 anos é trazida à emergência após um assalto. Ela afirma ter sido atingida com um cano de ferro na face esquerda. A borda orbital não tem deformidades à palpação. O exame ocular é normal. Não há hemorragia subconjuntival. A paciente tem edema generalizado da face à esquerda e dificuldade ao abrir a boca, mas a mandíbula está estável e rígida. A abertura bucal entre os incisivos é de 15cm. O diagnóstico mais provável referente a este caso é:

- (A) fratura do corpo mandibular à esquerda.
- (B) fratura do ramo da mandíbula esquerda.
- (C) fratura do arco zigomático esquerdo.
- (D) disfunção neuromuscular dos músculos pterigóides.
- (E) paralisia do nervo facial.

QUESTÃO 07

Uma criança com fissura labiopalatina completa foi submetida à cirurgia de Millard aos 3 meses de idade, com bom resultado. O próximo procedimento a ser realizado nesse caso é:

- (A) correção da fissura labial aos 6 meses de idade.
- (B) enxertia do palato aos 12 meses de idade.
- (C) reparo do palato entre 3 a 6 meses de idade.
- (D) reparo do palato entre os 12 e 18 meses de idade.
- (E) aguardar fechamento espontâneo do palato até os 7 anos de idade.

QUESTÃO 08

Uma paciente submetida à radioterapia para tratamento complementar do câncer de mama pode apresentar todas as seqüelas a seguir, EXCETO:

- (A) osteoradionecrose.
- (B) plexite braquial.
- (C) linfedema do braço.
- (D) pneumonite actínica.
- (E) paralisia do músculo peitoral.

QUESTÃO 09

Considere que uma paciente de 38 anos de idade, obesa, tabagista e diabética, é candidata à reconstrução de mama imediata. Assinale, entre as opções abaixo, a técnica MENOS indicada para a reconstrução da mama.

- (A) retalho de grande dorsal com implante
- (B) expansor temporário
- (C) expansor definitivo
- (D) retalho músculo cutâneo transverso com reto abdominal (TRAM)
- (E) prótese subpeitoral

QUESTÃO 10

Considere que um homem de 32 anos de idade sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido à emergência com uma lesão limpa na região volar-ulnar distal do braço direito. Apresentou uma laceração simples do nervo ulnar, múltiplas lacerações de tendões flexores e uma perda segmentar do flexor profundo dos dedos (FDP) do quarto e quinto dedo. Assinale a opção INAPROPRIADA na conduta precoce do paciente.

- (A) irrigação da ferida com solução salina
- (B) neurografia do nervo ulnar
- (C) tenorrafia das lacerações dos tendões flexores
- (D) enxerto de tendão para os tendões do FDP do quarto e quinto dedos
- (E) artrodese das articulações interfalanganias distais do quarto e quinto dedos

QUESTÃO 11

Considere o seguinte caso clínico. Um jovem de 25 anos de idade, vítima de trauma cranioencefálico fechado, está sendo monitorado na unidade de terapia intensiva enquanto seu status neurológico melhora. Durante este período, ele desenvolveu uma úlcera de pressão sacral de 6x6cm grau II, de fundo limpo e em granulação. Assinale a opção que indica o tratamento MENOS apropriado para esse caso.

- (A) cicatrização por segunda intenção
- (B) excisão e síntese primária
- (C) enxerto de pele parcial
- (D) rotação de retalho fasciocutâneo
- (E) retalho miocutâneo de glúteo máximo

QUESTÃO 12

Considere o seguinte caso clínico. Paciente diabético de 68 anos foi submetido a cirurgia cardíaca para ponte de mamária bilateral devido a arterioesclerose. Evoluiu no pós-operatório com mediastinite e deiscência da ferida esternal. O melhor retalho para cobertura desta ferida esternal é:

- (A) omento.
- (B) grande dorsal.
- (C) peitoral baseado na toracoacromial.
- (D) peitoral baseado nas perfurantes mediais.
- (E) reto abdominal.

QUESTÃO 13

Considere o seguinte situação hipotética. Uma mãe leva seu filho de 5 anos ao consultório. Trata-se de uma criança com bom desenvolvimento motor e intelectual, e observam-se as seguintes alterações no exame físico da criança: deficiência nos zigomas, mandíbula hipoplástica, fissura palpebral antimongolóide, colobomas da pálpebra inferior, afundamento malar e hipoplasia das orelhas. Observa-se, ainda, que a criança se parece com a mãe. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Síndrome de Treacher Collins.
- (B) Seqüência de Pierre Robin.
- (C) Microssomia Hemifacial.
- (D) Síndrome de Carpenter.
- (E) Síndrome de Romberg.

QUESTÃO 14

Tendo em vista a qualidade da cicatrização resultante, é correto afirmar que:

- I - o enxerto de pele de espessura total tem uma integração (pega) mais difícil, porém o resultado final é superior.
- II - o enxerto de queratinócitos autólogos (cultura de pele) apresenta indicação quando a área da queimadura é profunda.
- III - o enxerto tipo *mesh graft* tem a melhor pega entre os enxertos, porém seu resultado estético é pobre.
- IV - o enxerto de pele parcial de espessura fina apresenta melhores chances de pega, sendo indicado para mãos e articulações.
- V - o enxerto de pele total deve ser preferencialmente usado em grandes queimados com superfície corporal queimada acima de 25%.
- VI - a derme de cadáver com remoção de elementos celulares e tratamento antiviral pode ser usada em conjunto com enxertos de pele parcial de espessura fina na face quando não houver área doadora de pele total.

Estão corretos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e VI.
- (C) I, III e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e V.

QUESTÃO 15

Considere o seguinte caso clínico. Um paciente de 4 anos de idade apresenta uma tumoração escurecida de 4 cm na região parotídea, que já estava presente ao nascer e não apresentou redução em seu tamanho original. Ao exame, o tumor não estava aderido à pele. O diagnóstico mais provável para esse caso é:

- (A) hemangioma.
- (B) cisto tímico.
- (C) tumor do corpo carotídeo.
- (D) adenoma pleomórfico.
- (E) malformação vascular.

QUESTÃO 16

Quanto às rinoplastias, são fatores de estenose valvular e pinçamento nasal:

- I - turbinectomia
- II - ressecção excessiva óssea
- III - colapso da fratura lateral
- IV - sinéquias na região vestibular
- V - ressecção excessiva de pele vestibular
- VI - ressecção excessiva da porção caudal superior da cartilagem lateral

Estão corretos os itens

- (A) III, IV, V e VI.
- (B) I, III, IV e V.
- (C) II, III, IV, V e VI.
- (D) II, III, IV e V.
- (E) II, IV, V e VI.

QUESTÃO 17

Assinale a opção que corresponde ao suprimento principal da mama, rota principal de drenagem linfática da mama e inervação do mamilo, respectivamente?

- (A) torácica lateral, linfonodos da mamária interna, 5º nervo intercostal
- (B) mamária interna, linfonodos da mamária interna, 4º nervo intercostal
- (C) artérias intercostais, linfonodos axilares, 3º nervo intercostal
- (D) mamária interna, linfonodos axilares, 4º nervo intercostal
- (E) artérias intercostais, linfonodos axilares, 4º nervo intercostal

QUESTÃO 18

Considere que um jovem foi atingido por uma barra de ferro no queixo, apresenta laceração de plano total no lábio inferior que se estende para a região do mento. A mandíbula anterior possui uma fratura cominutiva e está exposta na ferida. O assoalho anterior da boca também está lacerado. O exame clínico e as radiografias não revelam outras fraturas. Assinale a opção que NÃO SE APLICA ao caso.

- (A) A fratura pode ser abordada cirurgicamente através da laceração ou por uma incisão externa ou intra-oral.
- (B) Os fragmentos da fratura cominutiva com pouco tecido mole aderido não deve ser desbridado.
- (C) O músculo milohióideo exerce uma força deformante importante nos segmentos linguais da fratura.
- (D) *Splints* podem ser úteis para prevenir o desvio lingual dos segmentos fraturados.
- (E) O uso de placas e parafusos é contra-indicado devido à presença de laceração de partes moles.

CLÍNICA MÉDICA

Leia o caso clínico a seguir e responda às questões de 19 a 22.

Paciente do sexo masculino, de 53 anos, trabalhador rural, fumante há 30 anos, hipertenso, obeso, com história familiar de infarto do miocárdio em indivíduos com menos de 55 anos de idade e sem uso de qualquer medicação, apresentou exames laboratoriais com os seguintes resultados: hiperglicemia de jejum, hipercolesterolemia, HDL colesterol reduzido, LDL colesterol elevado, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, microalbuminúria elevada e dosagens de uréia e creatinina normais.

QUESTÃO 19

Segundo as evidências disponíveis, assinale a opção que apresenta tratamento anti-hipertensivo de escolha de primeira linha para esse paciente.

- (A) diuréticos tiazídicos
- (B) beta-bloqueadores
- (C) bloqueadores dos canais de cálcio
- (D) inibidores da enzima conversora de angiotensinogênio
- (E) antagonistas alfa-adrenérgicos

QUESTÃO 20

Caso esse paciente procurasse assistência médica com artrite gotosa aguda, os medicamentos que poderiam ser iniciados para tratar a inflamação articular são:

- I - alopurinol
- II - anti-inflamatórios não-esteroidais
- III - drogas uricosúricas
- IV - colchicina
- V - hormônio adenocorticotrópico sintético

Estão corretos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) II, III e IV.

QUESTÃO 21

Se esse paciente apresentasse quadro de urgência hipertensiva, as drogas orais com as quais seu tratamento poderia ser feito são:

- I - clonidina
- II - captopril
- III - nifedipina
- IV - labetalol

A seqüência correta é

- (A) F V V V.
- (B) V F V V.
- (C) V V F V.
- (D) V V V F.
- (E) V V V V.

QUESTÃO 22

Por se tratar de paciente de alto risco de desenvolvimento de doença arterial coronariana, o tratamento da dislipidemia deverá ser iniciado. Em relação à terapia com as estatinas, assinale a opção correta.

- (A) Seu uso com fibratos não aumenta o risco de miosite.
- (B) São pouco eficazes na redução do LDL colesterol.
- (C) São drogas pouco usadas pelos efeitos colaterais hepáticos.
- (D) Essas drogas não interferem nos níveis de triglicerídeos.
- (E) Não deve ser interrompido o uso de estatinas, mesmo quando os valores de colesterol normalizarem.

QUESTÃO 23

Considere que um homem, de 63 anos de idade, aposentado, hipertenso, procura o ambulatório de clínica médica para avaliação de tremores nos membros superiores que surgiram há 6 meses. O diagnóstico, com base no exame físico, foi o de Doença de Parkinson. Em relação aos possíveis achados clínicos da doença deste paciente, julgue os itens e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- I - bradicinesia
- II - rigidez
- III - seborréia
- IV - instabilidade postural
- V - tremor intencional

A seqüência correta é

- (A) V V V V F.
- (B) V F V V V.
- (C) V V F V V.
- (D) V V V F V.
- (E) F V V V V.

QUESTÃO 24

Assinale a opção que indica a única terapia capaz de alterar o curso da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

- (A) cessação do tabagismo
- (B) brometo de ipratrópio inalado
- (C) beta-agonistas inalados
- (D) xantinas
- (E) corticóides inalados

QUESTÃO 25

Em um paciente previamente vacinado para hepatite B, o marcador associado à imunidade ao vírus é:

- (A) Anti-HBc.
- (B) Anti-Hbe.
- (C) Anti-HCV.
- (D) Anti-HBs.
- (E) Anti-HDV.

QUESTÃO 26

Considere um paciente com resultado de exame de fezes mostrando ovos de *A. lumbricoides* e *T. saginata*, larvas de *S. stercoralis* e cistos de *E. coli*. Assinale, entre as opções seguintes, a medicação que NÃO é necessária no seu tratamento.

- (A) albendazol
- (B) mebendazol
- (C) praziquantel
- (D) tiabendazol
- (E) metronidazol

QUESTÃO 27

Assinale a opção que indica qual medicamento NÃO deve ser administrado para paciente com quadro de diarreia dos viajantes, por não ter efeito terapêutico.

- (A) loperamida
- (B) kaolin-pectina
- (C) ciprofloxacino
- (D) azitromicina
- (E) subsalicilato de bismuto

QUESTÃO 28

Em relação à análise de exames bioquímicos, julgue os itens a seguir.

- I – Níveis normais de creatinoquinase afastam doença muscular.
- II – As doenças musculares podem elevar as transaminases.
- III – As doenças musculares podem elevar a desidrogenase láctica.

Assinale a opção correta.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (E) Apenas o item I está correto.

QUESTÃO 29

Considere que um paciente procure o ambulatório e relate que sua urina começou a ficar vermelha depois de ter iniciado tratamento para tuberculose pulmonar. Acerca desse quadro, o medicamento a ser considerado é:

- (A) isoniazida.
- (B) rifampicina.
- (C) etambutol.
- (D) estreptomicina.
- (E) pirazinamida.

QUESTÃO 30

Considere que um paciente obeso e com intolerância à glicose procura assistência médica para saber como reduzir o risco de aparecimento de diabetes *mellitus*. Nessa situação, a conduta que permite maior redução desse risco é:

- (A) iniciar imediatamente o uso de metformina.
- (B) iniciar imediatamente o uso de troglitazona.
- (C) iniciar imediatamente o uso de sulfoniluréia.
- (D) iniciar imediatamente o uso de acarbose.
- (E) iniciar dieta e a prática de exercícios físicos para reduzir rigorosamente o peso.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 31 a 33.

Gosto de ver casulos de borboletas. Lagartas feias que adormeceram, esperando a mágica metamorfose. De fora olhamos e tudo parece imóvel e morto. Lá dentro, entretanto, longe dos olhos e invisível, a vida amadurece vagarosamente. Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém. E ele se romperá. Não lhe restará alternativa, e a borboleta voará livre, deixando sua antiga prisão... Voar livre, liberdade. [...]

Somos como as borboletas: a liberdade não é um início, mas o ponto final de um longo processo de gestação. Não é isso que acontece conosco? Quem será o tolo que pensará que a criança é gerada na hora do parto? A vida começou, em silêncio, em momento distante do passado. O nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento, a revelação daquilo que havia sido plantado e cresceu.

Não haverá parto se a semente não for plantada, muito tempo antes...

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses...

Rubem Alves. **A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.** Campinas: Papirus, 2006. p. 83.

QUESTÃO 31

A respeito do texto, assinale a opção correta.

- (A) O autor não gosta de lagartas, apenas de borboletas, conforme expresso nos dois primeiros períodos do texto.
- (B) "Lá dentro" (linha 4) situa o leitor em espaço inabitado e temporário.
- (C) A liberdade é o primeiro passo do processo de gestação.
- (D) Segundo o texto, as borboletas são resultantes de uma vida longa e silenciosa.
- (E) Ser livre, assim como nascer, é consequência de processos anteriores de amadurecimento.

QUESTÃO 32

Com relação às estruturas lingüísticas do texto, assinale a opção correta.

- (A) Nas linhas 6 e 7, os pronomes "ela" e "a" possuem o mesmo referente.
- (B) Em "Não é isso que acontece conosco?" (linha 13), o pronome "isso" é utilizado para antecipar, resumidamente, o assunto a ser tratado no período seguinte.
- (C) Na linha 14, a partícula "que", em suas duas ocorrências, pertence à mesma classe de palavras.
- (D) O uso do sinal indicativo de crase em "vir à luz" (linha 17) é facultativo.
- (E) A oração "que havia sido plantado" (linha 18) tem caráter explicativo.

QUESTÃO 33

No texto,

- (A) na primeira linha do segundo parágrafo, os dois-pontos são utilizados para introduzir uma explicação ao vocábulo "borboletas".
- (B) a supressão do ponto final que separa "Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém" (linhas 6-7) e "E ele se romperá" (linhas 7-8) com a consequente substituição de "E" por **e** não acarretariam erro gramatical.
- (C) o argumento que o embasa se resume na frase "Não lhe restará alternativa" (linha 8).
- (D) ocorre essencialmente uma estrutura narrativa, pois o autor descreve o processo de formação das borboletas.
- (E) seria gramaticalmente correto o uso da vírgula após "esperando" em "Lagartas feias que adormeceram, esperando" (linhas 1-2).

QUESTÃO 34

Na campanha antifumo que está sendo desenvolvida em uma cidade, alguns profissionais de saúde querem prever o número de casos de câncer de pulmão que ocorrerá na população dessa cidade. Sabe-se que a população total é de 6.000.000 de pessoas, que 25% dessa população desenvolverá algum tipo de câncer durante a vida e que 21% dos casos previstos serão de câncer de pulmão. Portanto, o número de casos de câncer de pulmão previstos para a população dessa cidade é de

- (A) $0,315 \times 10^5$.
- (B) $3,15 \times 10^5$.
- (C) $31,5 \times 10^5$.
- (D) $315,0 \times 10^5$.
- (E) 3.150×10^5 .

Rascunho

QUESTÃO 35

Uma casa de assistência a idosos possui uma área de jardim para os pacientes, que podem fazer exercícios ao ar livre, de forma que tenham condições de aproveitar a natureza, realizando caminhadas com o objetivo de recuperar o vigor físico. Esse jardim tem o formato circular de 32,5 metros de diâmetro. Se um paciente der 5 voltas em torno do jardim, ele terá caminhado, em metros, a seguinte distância (considere $\pi = 3$):

- (A) 287,5.
- (B) 387,5.
- (C) 487,5.
- (D) 587,5.
- (E) 687,5.

QUESTÃO 36

Em exame cardiológico realizado em um paciente pós-cirúrgico, observou-se que sua pressão arterial diastólica $d(t)$, expressa em mmHg, variou, em

horas, segundo a relação $d(t) = -\frac{1}{4}t^2 + 2t + 8$,

sendo $t \in [0, 4]$, desde o início do exame. A partir dos dados fornecidos, é correto afirmar que

- (A) a pressão diastólica máxima foi de 12 mmHg.
- (B) a pressão diastólica foi decrescente em relação ao tempo $t \in [0, 4]$.
- (C) a pressão inicial diastólica foi de 12 mmHg.
- (D) a pressão diastólica não se alterou durante todo o exame.
- (E) a pressão diastólica mínima foi de 4 mmHg no intervalo de tempo considerado.

QUESTÃO 37

Atualmente, excetuando o setor de serviços, a principal atividade econômica do estado do Maranhão e da sua capital, São Luís, está concentrada

- (A) no setor industrial de minérios.
- (B) no setor industrial de alimentos.
- (C) no extrativismo vegetal.
- (D) no setor pesqueiro.
- (E) na pecuária.

QUESTÃO 38

No hino do Maranhão, cuja letra é de Antônio Baptista Barbosa de Godois, a quarta estrofe diz:

Reprimiste o flamengo aventureiro,
e o forçaste a no mar buscar guarida;
dois séculos depois, disseste ao luso:
– A liberdade é o sol que nos dá vida.

Os dois primeiros versos do hino lembram a luta dos maranhenses pela expulsão dos holandeses e os dois últimos versos aludem à

- (A) adesão do Maranhão à independência do Brasil.
- (B) liberdade obtida com a expulsão dos franceses.
- (C) liberdade obtida com a expulsão dos holandeses.
- (D) adesão ao jugo da corte portuguesa.
- (E) liberdade que o sol propicia.

QUESTÃO 39

Visando ao melhoramento da qualidade de vida do cidadão menos privilegiado, especificamente nas áreas de qualificação profissional, construção e melhoria de habitações e solidariedade, o governo maranhense executa políticas públicas por intermédio

- (A) do programa Fome Zero.
- (B) da Gerência de Desenvolvimento Social (GDS).
- (C) do combate a endemias.
- (D) da reforma agrária.
- (E) do programa Bolsa Família.

QUESTÃO 40

São atribuições comuns a todas as esferas de governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), definidas na Lei n.º 8.080/1990, EXCETO:

- (A) organização e coordenação do sistema de informação em saúde.
- (B) realização de pesquisas e estudos na área de saúde.
- (C) elaboração da proposta orçamentária do SUS, em conformidade com o plano de saúde.
- (D) definição das instâncias e dos mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
- (E) definição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Rascunho