

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – QUESTÃO SOCIAL

Folha de São Paulo, 25/02/01

Apesar da urgência da organização da sociedade para exigir segurança de fato das autoridades, a redução da violência exige mudança profunda no enfoque da administração dos problemas sociais pelos governos federal, estadual e municipal.

Uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas, no ano passado, pelo pesquisador Ib Teixeira, constatou que a violência no país nos últimos dez anos matou 350 mil pessoas no período, mais do que as guerras do Timor Leste e de Kosovo juntas, e em menos tempo.

O custo dessa violência, segundo o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), é de US\$ 84 bilhões ao ano, ou 10,5% do PIB (Produto Interno Bruto).

Em São Paulo, cujo PIB nominal foi de US\$ 241,58 bilhões em 1997, os custos da violência levantados em 1998 representam cerca de 3% do PIB, segundo dados da tese do sociólogo Rogério Sérgio de Lima.

1 - Segundo o texto, a redução da violência:

- a) depende tão-somente da mudança profunda no enfoque administrativo governamental;
- b) é de grande importância para o progresso econômico do país;
- c) exige organização social e mudanças governamentais;
- d) derivará exclusivamente da cobrança feita às autoridades;
- e) é de extrema importância no momento econômico do país.

2 - “Apesar da urgência da organização...”; nesse segmento do texto, a locução *apesar de* pode ser perfeitamente substituída por:

- a) não obstante;
- b) entretanto;
- c) visto que;
- d) já que;
- e) após.

3. “... pelos governos federal, estadual e municipal.”; o item abaixo que exemplifica o mesmo tipo de concordância nominal do segmento retirado do texto é:

- a) Vivia em tranquilos bosques e montanhas;
- b) A professora estava com um vestido e um chapéu escuro;
- c) Passou quarta, quinta e sexta trabalhosas no Rio;
- d) Viu as bandeiras brasileira e francesa;
- e) Era novo o livro e a caneta.

4 - Os argumentos em que se apóia o artigo do jornal para mostrar a necessidade da redução da violência são de cunho:

- a) social e religioso;
- b) educativo e econômico;
- c) social e econômico;
- d) religioso e educativo;
- e) moral e social.

5 - O fato de as siglas presentes no texto estarem “traduzidas” entre parênteses mostra que:

- a) é regra de clareza que todas as siglas sejam explicitadas para o leitor;
- b) algumas siglas do texto, segundo o seu redator, necessitam de “tradução”;
- c) os leitores de jornais pertencem à classe popular, menos informada;
- d) o Brasil é país de muitas siglas;
- e) o texto informativo “traduz” todas as siglas nele incluídas.

6 - “...constatou que a violência no país nos últimos dez anos matou 350 mil pessoas no período, mais do que as guerras do Timor Leste e de Kosovo juntas, e em menos tempo.”; segundo o texto, o segmento *e em menos tempo*:

- a) indica que as guerras citadas levaram menos de dez anos;
- b) contraria a argumentação básica do texto;
- c) mostra a intensidade exagerada da violência no país;
- d) demonstra que as guerras modernas são rápidas e extremamente cruéis;
- e) é uma informação dispensável à argumentação do texto.

7 - Segundo o texto, em São Paulo:

- a) a violência ultrapassa a média estatística nacional de custos em relação ao PIB;
- b) é sensivelmente menor o número de atos de violência, comparado com outros estados brasileiros;
- c) a violência é a mais intensa entre os estados desenvolvidos;
- d) a violência apresenta sinais de crescimento contínuo;
- e) a violência colabora para que nossos índices, nessa área, sejam altos.

8 - "Uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas, no ano passado, pelo pesquisador Ib Teixeira..."; uma melhor maneira de redigir o mesmo segmento do texto é:

- a) Uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas, pelo pesquisador Ib Teixeira, no ano passado...
- b) No ano passado, uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas, pelo pesquisador Ib Teixeira...
- c) Uma pesquisa desenvolvida no ano passado pelo pesquisador Ib Teixeira pela Fundação Getúlio Vargas...
- d) Uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas, no ano passado, de responsabilidade do pesquisador Ib Teixeira...
- e) Uma pesquisa, no ano passado desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas, de autoria do pesquisador Ib Teixeira...

9 - *Pesquisa* é vocábulo grafado com S, como se pode ver no texto; o item em que há um vocábulo erradamente grafado com essa letra é:

- a) paralisia / análise / atraso;
- b) gasoso / baronesa / arrasar;
- c) besouro / adeusinho / bis;
- d) brasão / freguês / guloseima;
- e) marquês / pesadelo / anõesinhos.

10 - "...exige mudança profunda no enfoque da administração dos problemas sociais pelos governos federal, estadual e municipal."; o comentário correto a respeito desse segmento do texto é:

- a) o termo *da administração* corresponde a um adjunto adnominal;
- b) o termo *dos problemas sociais* corresponde a um objeto indireto;
- c) *federal, estadual e municipal* são apresentados numa ordem crescente de importância;
- d) o substantivo *governos* se prende aos adjetivos *federal, estadual e municipal*;
- e) o adjetivo *profunda* se refere aos substantivos *mudança e administração*.

ENFERMAGEM

Caso I

Em um quarto de hospital há dois pacientes com os primeiros nomes iguais: um é Armando Costa da Silva, que ocupa o leito 01 e o outro Armando Carvalho de Souza, que ocupa o leito 02.

Nas prescrições médicas de ambos há hidratação venosa com soro fisiológico a 0,9% e soro glicosado a 5%.

A prescrição, para 24 horas, do Armando Costa da Silva (leito 01) inclui 3 frascos de 500ml de soro glicosado a 5% e 2 frascos de 500ml de soro fisiológico a 0,9%. Nestes está indicada adição de 3 ampolas de 10ml de cloreto de potássio a 20%, em cada soro. A prescrição, para 24 horas, do Armando Carvalho de Souza (leito 2) inclui 2 frascos de 500ml de soro glicosado a 5% e 2 frascos de 500ml de soro fisiológico a 0,9% sem aditivos.

A rotina estabelece as 15 horas como ponto de início das medicações do dia. Portanto, as prescrições são aprazadas no período de 15h a 15h do dia seguinte.

Às 8h da manhã o médico do paciente Armando Carvalho de Souza solicita a interrupção da infusão do soro, alegando que há um erro no soro prescrito para o seu paciente. Imediatamente a enfermeira interrompe o soro instalado, uma vez que constata que a auxiliar de enfermagem do período noturno trocou os soros dos pacientes do quarto.

11- Ao manter os dois pacientes com os primeiros nomes iguais em um mesmo quarto (considerando o caso I), a enfermeira responsável pela unidade está sujeita ao seguinte tipo de infração ética:

- a) imperícia;
- b) imprudência;
- c) injúria;
- d) negligência;
- e) omissão.

12 - A Auxiliar de Enfermagem do período noturno, que instalou o soro trocado no paciente Armando Carvalho de Souza (considerando o caso I), cometeu uma infração ética caracterizada como:

- a) tentativa de homicídio;
- b) negligência;
- c) imperícia;
- d) imprudência;
- e) injúria.

13 - Uma das penas previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que somente pode ser imposta pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), é:

- a) censura;
- b) suspensão do exercício profissional;
- c) advertência escrita;
- d) cassação do exercício profissional;
- e) prisão preventiva.

14 - As resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) que estabelecem os parâmetros para dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas instituições de saúde e que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem são, respectivamente:

- a) 161/92 e 189/93
- b) 164/90 e 180/94
- c) 189/96 e 240/00
- d) 173/94 e 188/95
- e) 201/98 e 208/99

15 - A legislação relativa ao exercício profissional de enfermagem (Decreto 94.406/87) estabelece que cabe ao auxiliar de enfermagem exercer atividades de nível médio em processos de tratamento atribuídos a equipe de enfermagem. Dentre eles **não** se incluem:

- a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas de uma doença;
- b) realizar testes e proceder a leitura, para subsídio e diagnóstico;
- c) efetuar controle de pacientes e comunicantes em doenças transmissíveis;
- d) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
- e) executar atividades de desinfecção e esterilização.

16 - Na prescrição do paciente Armando Carvalho de Souza (leito 02) foram adicionadas 2 ampolas de 10ml de NaCl a 10% no primeiro soro fisiológico a 0,9% (considerando o caso I). Para administrar a hidratação prescrita para as 24h, a bomba infusora deverá ser regulada para o seguinte número de gotas:

- a) 28
- b) 30
- c) 32
- d) 34
- e) 36

17 - Quando for feita uma aferição da hidratação venosa prescrita às 11 horas da manhã (considerando o caso I), o volume aproximado de soro infundido no paciente Armando Costa da Silva (leito 01) terá sido de:

- a) 2 082ml
- b) 2 133ml
- c) 2 180ml
- d) 2 246ml
- e) 2 302ml

18 - A hidratação venosa do paciente Armando Carvalho de Souza (leito 02) transcorria dentro do ritmo dos soros prescritos (considerando o caso I). Até a interrupção do soro às 8 horas da manhã, foi infundida a seguinte quantidade de KCl:

- a) 4,75 mg
- b) 4,90 mg
- c) 5,10 mg
- d) 5,12mg
- e) 5,15 mg

19 - A postectomia é uma cirurgia realizada pela seguinte especialidade médica:

- a) urologia;
- b) cardiologia;
- c) nefrologia;
- d) ortopedia;
- e) otorrinolaringologia.

20 - O nome técnico para o termo popularmente conhecido como "soluços" é:

- a) tenesmos;
- b) peristase;
- c) singultus;
- d) meteorismo;
- e) sialose.

21 - Um paciente que apresenta hipocalemia está com desequilíbrio do sistema:

- a) respiratório;
- b) digestivo;
- c) neurológico;
- d) eletrolítico;
- e) cárdio-vascular.

22 - Quando se comparam as medidas palpatória e auscultatória para aferir a pressão arterial, verifica-se que:

- a) a auscultatória tende a ser um pouco mais alta;
- b) elas são idênticas;
- c) a auscultatória tende a ser inaudível;
- d) elas não se correlacionam;
- e) a palpatória tende a ser um pouco mais alta.

23 - No preparo pré-operatório, um paciente foi colocado deitado sobre o seu lado esquerdo, com o joelho direito mais flexionado que o esquerdo. Essa posição é conhecida como:

- a) de conforto;
- b) de Trendelenburg;
- c) genito peitoral;
- d) de Jakknif;
- e) de Sims.

24 - O produto de escolha a ser usado para embalagem do material que será submetido a esterilização pelo óxido de etileno é:

- a) kraft;
- b) pardo;
- c) grau cirúrgico;
- d) poliamida;
- e) manilha.

25 - Na primeira consulta pré-natal de enfermagem, uma gestante relata que já teve dois abortos e um parto vivo. A relação gravidez / paridade desta mulher é:

- a) gesta 4, para 1;
- b) gesta 3, para 2;
- c) gesta 3, para 1;
- d) gesta 2, para 2;
- e) gesta 2, para 1.

26 - Um homem de 42 anos foi vítima de um incêndio. Ele sofreu queimaduras no tórax posterior e todo o membro superior e inferior esquerdos. De acordo com a "regra dos nove", o percentual da superfície corporal atingida é de aproximadamente:

- a) 36
- b) 45
- c) 54
- d) 63
- e) 72

27 - O instrumental cirúrgico é classificado por grupos. A tesoura pertence ao seguinte grupo:

- a) redução;
- b) superfície;
- c) diérese;
- d) síntese;
- e) densidade.

28 - A hemorragia gastrointestinal baixa com saída de sangue vivo pelo reto é denominada:

- a) hematoquesia;
- b) hematêmese;
- c) hemoptise;
- d) melanêmese;
- e) melena.

29 - Os sinais e sintomas dos clientes são classificados em objetivos e subjetivos. Constitui um exemplo de sintoma subjetivo:

- a) pressão arterial;
- b) febre;
- c) bradicardia;
- d) bigeminismo;
- e) tonteira.

30 - Em relação à vacina BCG, **não** é correto afirmar que:

- a) deve ser administrada por via subcutânea;
- b) provoca reações ganglionares limitadas à região axilar;
- c) gera cicatriz no local da aplicação;
- d) deve ser aplicada no membro superior direito (MSD);
- e) a aplicação deve ser na inserção inferior do músculo deltóide.

31 - As vias indicadas para aplicação de heparina e de insulina são, respectivamente:

- a) intramuscular e subcutânea;
- b) subcutânea e intramuscular;
- c) intramuscular e intramuscular;
- d) subcutânea e subcutânea;
- e) intradérmica e intradérmica.

32 - O paciente hipertenso, em uso prolongado de diuréticos tiazídicos, pode apresentar fadiga muscular, diminuição da libido e câimbras. Em razão disso, sua alimentação deve ser rica em:

- a) cálcio;
- b) carboidratos;
- c) gorduras;
- d) sódio;
- e) potássio.

33 - O processo indicado para esterilização de um recipiente com vaselina líquida é:

- a) autoclavação com óxido de etileno;
- b) autoclavação com calor úmido;
- c) esterilização química com glutaraldeído;
- d) esterilização pelo calor seco (estufa);
- e) esterilização pelo ácido paracético.

34 - Em um acidente de moto, um indivíduo adulto sofreu vários traumatismos. Entre as seqüelas apresentam-se perda da sensibilidade, da motilidade e da atividade muscular dos membros inferiores. Isso caracteriza uma:

- a) hemiparesia;
- b) parestesia;
- c) semiplegia;
- d) hemiplegia;
- e) paraplegia.

35 - A sífilis é causada por um:

- a) *mycobacterium sp*;
- b) enterovírus;
- c) *cândida albicans*;
- d) *treponema pallidum*;
- e) *staphylococcus aureus*.

36 - Quando estão prescritos para um paciente 1,2 milhões de UI, a quantidade de heparina que deve ser administrada é (considerar que a unidade dispõe de 5 milhões de UI em frascos de 2 cm³):

- a) 0,24
- b) 0,32
- c) 0,40
- d) 0,48
- e) 0,56

37 - A soma de um grama de proteína com três gramas de gordura apresenta o seguinte número de calorias:

- a) 9
- b) 13
- c) 19
- d) 24
- e) 31

38 - O paciente com meningite requer da enfermagem um conjunto de procedimentos. O procedimento que se realiza com muita freqüência é:

- a) punção lombar;
- b) aferição da temperatura;
- c) higiene oral;
- d) aferição de pressão arterial;
- e) mobilização no leito.

39 - O diabético não controlado está sujeito a uma série de complicações agudas e crônicas. Dentre as agudas, as que causam maior risco de vida são os comas hipoglicêmico e hiperglicêmico. Os sinais e sintomas que caracterizam o coma hiperglicêmico **não** incluem:

- a) sede intensa e poliúria;
- b) perda de peso e sede intensa;
- c) fraqueza e tontura;
- d) tremores e sudorese;
- e) desidratação e respiração acelerada.

40 - Se houver necessidade de administrar 20 UI de insulina regular de 80 UI, o volume a ser aspirado será de (considerar que só há na unidade seringas calibradas em 40 UI):

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 18
- e) 20

41 - Entre os casos a seguir, o único em que se recomenda a vacina BCG é:

- a) RN com peso inferior a 2 500g;
- b) crianças com doenças de pele no tórax e membros inferiores;
- c) crianças em estado febril;
- d) crianças em uso de corticóides;
- e) crianças em uso de imunossupressores.

42 - Quanto à vacina BCG, é **incorreto** afirmar que:

- a) a dose vacinante de 0,1ml contém entre 400 e 800 mil bacilos mortos;
- b) a vacina induz alergia tuberculínica, mensurável com PPD;
- c) a vacina se deteriora rapidamente, perdendo sua potência quando exposta à luz solar direta ou difusa;
- d) quando liofilizada, deverá ser conservada em temperatura entre 4° e 8°C;
- e) é prioritariamente indicada para crianças na faixa etária de 0 a 4 anos.

43 - A alternativa que **não** apresenta um fator de risco coronário é:

- a) sedentarismo;
- b) tabagismo;
- c) úlcera péptica;
- d) hipertensão arterial;
- e) hipercolesterolemia.

44 - A pressão arterial diastólica deve ser registrada no seguinte som (fase) de Korotkoff:

- a) primeiro (fase I);
- b) terceiro (fase III);
- c) quinto (fase V);
- d) sétimo (fase VII);
- e) nono (fase IX).

45 - O processo empregado com o objetivo de limitar os microorganismos fora de determinada área que não os contenha é:

- a) esterilização;
- b) desinfecção;
- c) anti-sepsia;
- d) assepsia médica;
- e) assepsia cirúrgica.

46 - O índice de APGAR, em referência à médica Virginia Apgar, é utilizado para avaliar:

- a) as condições das feridas;
- b) a curva pressórica;
- c) a curva glicêmica;
- d) o desenvolvimento gestacional;
- e) a vitalidade do RN.

47 - É no eritrócito, glóbulo vermelho do sangue, que se encontra a hemoglobina. Ela tem como principal função:

- a) combater a anemia;
- b) favorecer a classificação sanguínea;
- c) proteção imunológica;
- d) dar a cor ao sangue;
- e) transportar o oxigênio para os tecidos.

48 - O aumento de sódio no sangue acima dos padrões de normalidade constitui:

- a) hipersodemia;
- b) hipernatremia;
- c) hipertalemia;
- d) hiperglicemia;
- e) hipercalcemia.

49 - A predição do provável desfecho de uma doença, lesão ou anomalia do desenvolvimento em um paciente constitui:

- a) a história natural da doença;
- b) o prognóstico;
- c) o diagnóstico;
- d) o curso da doença;
- e) a evolução da doença.

50 - O *Mycobacterium leprae*, agente causador da hanseníase, tem tropismo por:

- a) vasos sanguíneos e brônquios;
- b) microvilosidades e nervos;
- c) pele e nervos;
- d) baço e pele;
- e) fígado e vasos sanguíneos.