

Médico ESF

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.

• Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Conhecimentos Específicos	
Conhecimentos da Área	60
Total de questões	60

- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 4h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após **três horas** contadas do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de três horas contadas do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.
- Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂ Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	☐	02	☐	03	☐	04	☐	05	☐	06	☐	07	☐	08	☐	09	☐	10	☐
11	☐	12	☐	13	☐	14	☐	15	☐	16	☐	17	☐	18	☐	19	☐	20	☐
21	☐	22	☐	23	☐	24	☐	25	☐	26	☐	27	☐	28	☐	29	☐	30	☐
31	☐	32	☐	33	☐	34	☐	35	☐	36	☐	37	☐	38	☐	39	☐	40	☐
41	☐	42	☐	43	☐	44	☐	45	☐	46	☐	47	☐	48	☐	49	☐	50	☐
51	☐	52	☐	53	☐	54	☐	55	☐	56	☐	57	☐	58	☐	59	☐	60	☐

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conhecimentos da Área

1) Segundo o Decreto nº 7.508/2011, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA:

- () Ao usuário será restringida a continuidade do cuidado em saúde aos hospitais e outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
- () As Comissões Intergestores pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.

- a) E - C.
- b) C - E.
- c) E - E.
- d) C - C.

2) Segundo o Decreto nº 7.508/2011, são algumas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de:

- I. Atenção psicossocial.
- II. Atenção de urgência e emergência.
- III. Especiais de acesso aberto.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

3) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, os estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

- I. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- II. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

4) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA:

- () O Estado tem o dever de prover as condições indispensáveis para o pleno exercício do direito fundamental à saúde que o ser humano possui.
- () O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- () O estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação é uma das formas de garantir a saúde, dever do Estado.

- a) E - C - E.
- b) C - E - C.
- c) E - E - C.
- d) C - C - E.

5) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, analisar os itens abaixo:

- I. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- II. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- III. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

6) Segundo a Lei nº 11.340/2006, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção,

- a) exceto emergencialmente
- b) preventivamente apenas
- c) mediante solicitação por escrito
- d) e emergencialmente quando for o caso

7) Segundo a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, o empregador deve:

- I. Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
- II. Providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

8) Com base na NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo:

Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha de pano reutilizável e lixeira provida de sistema de abertura manual (1ª parte). O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

9) Com base no Ministério da Saúde, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades.
- () A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde.
- () Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação.

- a) E - E - E.
- b) C - C - C.
- c) E - C - C.
- d) C - E - E.

10) Com base na Atenção Básica, são algumas responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família (ESF) como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica.
- II. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.
- III. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

11) Sobre a vigilância em saúde, analisar a sentença abaixo:

A vigilância em saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira (1ª parte). A vigilância em saúde passa a ser entendida como um processo descontínuo e assistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

12) Considerando-se os direitos dos usuários da saúde, assinalar a alternativa que apresenta uma informação INCORRETA:

- a) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- b) Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- c) Todo cidadão tem direito ao acesso desordenado e desorganizado aos sistemas de saúde.
- d) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.

13) Com base na Portaria de Consolidação nº 2/2017, e em relação à temática da Atenção Básica, analisar a sentença abaixo:

A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersectorialidade (1ª parte). Regionalização e hierarquização são diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizadas na Atenção Básica (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

14) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 2/2017, na Atenção Básica:

- I. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
- II. Serão adotadas estratégias que permitam minimizar desigualdades/iniquidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

15) Com base na Portaria de Consolidação nº 4/2017, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Periodicidade de notificação semanal.
- (2) Periodicidade de notificação imediata.

- () Hantavirose.
- () Toxoplasmose gestacional e congênita.
- () Poliomielite por poliovírus selvagem.

- a) 1 - 2 - 2.
- b) 2 - 1 - 2.
- c) 1 - 2 - 1.
- d) 2 - 1 - 1.

16) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 4/2017, analisar os itens abaixo:

- I. Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde e deve ser realizada exclusivamente pelos médicos.
- II. A notificação compulsória imediata é a notificação compulsória realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

17) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 5/2017, sobre a vacina BCG, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A vacina deverá ser administrada em dose única, o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após o nascimento.
- () A via de administração é intradérmica.
- () Não se deve adiar a vacinação mesmo para os casos de crianças nascidas com peso inferior a 2Kg.

- a) C - E - E.
- b) E - C - C.
- c) C - C - E.
- d) E - C - E.

18) Segundo a Portaria de Consolidação nº 5/2017, a vacina DTP é contraindicada para crianças a partir de:

- a) Dois anos de idade.
- b) Quatro anos de idade.
- c) Cinco anos de idade.
- d) Sete anos de idade.

19) Com base no Código de Ética Profissional, analisar a sentença abaixo:

A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. O alvo de toda a atenção do Médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional (1ª parte). O Médico pode, em algumas circunstâncias ou sob alguns pretextos, renunciar à sua liberdade profissional (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

20) Com base no Ministério da Saúde, sobre a tuberculose, analisar os itens abaixo:

- I. A doença é causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* ou bacilo de Koch.
- II. Embora existam vacinas, no Brasil, ainda não há cura para essa doença.
- III. A forma pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, principalmente a positiva à baciloscopia, pois é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. A forma extrapulmonar, que acomete outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas que vivem com o HIV, especialmente entre aquelas com comprometimento imunológico.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

21) Com base no Ministério da Saúde, de uma forma simplificada, em relação ao diabetes, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O diabetes é uma doença crônica _____ que ocorre quando o _____ não produz insulina suficiente ou quando o corpo não consegue mais utilizar de maneira eficaz a insulina que produz. A insulina é o hormônio que regula a glicose no sangue e é fundamental para manutenção do bem-estar do organismo, que precisa da energia dela para funcionar. No entanto, as altas taxas de glicose podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte.

- a) transmissível - pâncreas
- b) não transmissível - fígado
- c) transmissível - fígado
- d) não transmissível - pâncreas

22) Com base nas informações do Ministério da Saúde sobre as doenças transmitidas por alimentos (DTA), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () DTA são aquelas causadas exclusivamente pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados.
- () É considerado surto de DTA quando duas ou mais pessoas apresentam doença ou sintomas semelhantes após ingerirem alimentos e/ou água da mesma origem, normalmente em um mesmo local. Para doenças de alta gravidade, como botulismo e cólera, apenas um caso já é considerado surto.
- () A ocorrência de DTA relaciona-se com diversos fatores, como: condições de saneamento e qualidade da água para consumo humano impróprios; práticas inadequadas de higiene pessoal e consumo de alimentos contaminados.

- a) E - E - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) E - C - E.

23) Segundo informações do Ministério da Saúde, praticar hábitos saudáveis e adotar um estilo de vida de qualidade ajuda a desenvolver uma boa saúde mental e a mantê-la em dia. Para isso, o cidadão precisa, entre outras coisas:

- a) Consultar o Médico a cada cinco anos.
- b) Isolar-se.
- c) Fazer o tratamento terapêutico adequado.
- d) Manter o físico e o intelectual inativo.

24) Segundo STEFANI e BARROS, considerando-se a hepatite por vírus C, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O período de incubação é de 14 a 160 dias.
 - () Sua transmissão ocorre através de sangue e derivados, contato sexual, transmissão vertical e por seringas contaminadas.
 - () O teste ISIS é recomendado para rastreamento por ser simples, barato e sensível na maioria dos imunocompetentes.
- a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.

25) De acordo com STEFANI e BARROS, considerando-se a síndrome de cushing, analisar os itens abaixo:

- I. Trata-se de uma produção reduzida de glicocorticoide pelo córtex adrenal.
- II. Uma de suas manifestações é a obesidade centrípeta.
- III. Os testes com altas doses de dexametasona e do DDAVP são utilizados para diferenciar Doença de Cushing da síndrome do ACTH ectópico.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.

26) De acordo com DUNCAN et al., em relação aos tipos de notificações e receitas para medicamentos controlados, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A receita de controle especial em duas vias, cuja notificação é de cor branca, é utilizada para prescrição de medicamentos do tipo _____.

- a) entorpecentes
- b) antirretrovirais
- c) psicotrópicos
- d) anorexígenos

27) De acordo com STEFANI e BARROS, em relação ao Diabetes Melito, analisar os itens abaixo:

- I. O Diabetes Melito é caracterizado por hiperglicemia persistente associada ao desenvolvimento de complicações agudas e crônicas (lesões micro e macrovasculares).
- II. Em adultos assintomáticos, o rastreamento deve ser realizado naqueles com IMC ≥ 25 kg/m² + fatores de risco, como sedentarismo, história familiar de diabetes (1º grau), história pessoal de diabetes gestacional, HAS, HDL < 35 mg/dL, triglicerídeos > 250 mg/dL.
- III. Em adultos assintomáticos que não apresentem nenhum dos fatores de risco para o Diabetes Melito, deve-se iniciar o rastreamento aos 45 anos. Se a primeira avaliação for normal, repetir em intervalos de 3 anos.

Estão CORRETOS:

- a) Todos os itens.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

28) Segundo STEFANI e BARROS, considerando-se a encefalite, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () É uma infecção difusa do parênquima cerebral com disfunção focal ou difusa do encéfalo, geralmente com alteração do nível de consciência.
- () Na maioria dos casos, leva a sequelas graves e até a morte.
- () O liquor mostra as mesmas alterações da meningite viral (geralmente na encefalite herpética tem grande quantidade de hemácias).

- a) C - C - C.
- b) C - E - C.
- c) C - C - E.
- d) E - C - E.

29) De acordo com STEFANI e BARROS, sobre a ansiedade, analisar os itens abaixo:

- I. É uma resposta emocional, física, cognitiva e comportamental transitória e esperada em situações de estresse.
- II. O uso de benzodiazepínico deve ser por um período definido quando o manejo ambiental não aliviou os sintomas ou até a resposta a tratamento específico, sendo constantemente reavaliado.
- III. É sempre considerado um quadro patológico.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.

30) Em relação à psoríase, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O estresse ou algum problema emocional pode precipitar episódios da doença.
- () A fototerapia é um tratamento indicado para psoríase moderada ou severa, que não responde ao tratamento tópico sozinho.
- () O pontilhado hemorrágico típico que surge quando uma placa psoriática é destacada denomina-se Fenômeno Isomórfico de Koebner.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.

31) Em relação à fibromialgia, analisar os itens abaixo:

- I. Os antidepressivos como amitriptilina e olanzapina são opções de tratamento com melhores desfechos.
- II. Há uma forte evidência que os tricíclicos têm benefício no tratamento da fibromialgia, entretanto devem ser evitados caso o paciente também possua glaucoma de ângulo estreito, prostatismo ou distúrbios de condução cardíaca.
- III. O padrão-ouro para o tratamento da fibromialgia é o uso crônico de corticoides.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

32) Sobre diabetes e gestação, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A hiperglicemia associa-se à gestação em duas situações: a primeira, quando a mulher com diabetes engravida (diabetes pré-gestacional); a segunda, quando a mulher apresenta alterações da tolerância à glicose, diagnosticadas após a gravidez.
- b) Diabetes gestacional é uma síndrome associada à hiperlipidemia, detectada pela primeira vez na gestação, é habitualmente diagnosticado no início do primeiro trimestre de gestação.
- c) São fatores de risco para desenvolvimento do diabetes gestacional: Idade < 25 anos; obesidade ou ganho excessivo de peso na gestação atual; alta estatura, dentre vários.
- d) O exame ecocardiograma fetal é solicitado para todas as gestantes com diabetes. Realiza-se em torno da 26ª semana, para diagnóstico específico de malformações cardíacas, as mais frequentes na gestação diabética.

33) De acordo com FREITAS, as malformações uterinas congênitas relativas aos defeitos de desenvolvimento do sistema mülleriano são: defeitos de fusão lateral, defeitos de fusão vertical e agenésia. Em relação aos defeitos de fusão lateral mais comuns, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Útero septado/arqueado.
- (2) Útero Unicornio.
- (3) Útero Didelfo.

- () Uma cavidade é normal, com tuba uterina e colo do útero, enquanto o ducto de Müller afetado pode não se desenvolver ou vir como um corno rudimentar (que se comunica ou não com o útero). Pode estar associado com um ovário ectópico e, em torno de 40% dos casos, com alterações renais.
- () É o útero duplo, sendo que a duplicação geralmente limita-se ao útero e ao colo uterino, embora possa ocorrer com a vulva, a vagina, a bexiga, a uretra e o ânus.
- () Tem uma superfície externa normal, mas duas cavidades endometriais; o grau de septação varia de um pequeno septo na linha média até um útero totalmente septado alcançando o orifício cervical interno, podendo haver também septo vaginal longitudinal.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.

34) Em concordância com GUSSO e LOPES, a vacinação é a aplicação de um ou mais agentes (bactérias, vírus ou toxinas) com finalidade de estimular o sistema imune na defesa contra esses. Sobre o tema, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A via intramuscular é utilizada para a administração de substâncias irritantes que necessitam ser absorvidas rapidamente, como as das vacinas DTP, dupla infantil e adulto (DT e dT- difteria e tétano), Hib, hepatite B, raiva, VIP.
- b) Em esquemas vacinais com múltiplas doses, quando ultrapassado o intervalo recomendado, independentemente do tempo decorrido, é necessário recomençar o esquema.
- c) Boa resposta à vacinação depende de múltiplos fatores, como idade, tipo de vacina e estado imunológico da pessoa. Indivíduos com imunidade gravemente comprometida devem receber vacinas com agentes vivos atenuados.
- d) A vacina contra poliomielite contém cinco tipos de poliovírus atenuados. É administrada por via intramuscular, tendo no esquema vacinal de rotina: 2 doses com o intervalo de 120 dias entre elas.

35) LONGO et al. pontua que a inflamação das pálpebras aparece comumente associada à acne rosácea ou à dermatite seborreica. Quando em geral, as bordas das pálpebras são intensamente colonizadas por estafilococos e mostram-se gordurosas, ulceradas e crostosas, com restos de escamas presos aos cílios. Está referindo-se à:

- a) Conjuntivite.
- b) Dacriocistite.
- c) Ceratite.
- d) Blefarite.

36) Sobre ácido úrico, analisar os itens abaixo:

- I. É usado para diagnóstico e tratamento de Gota, e também para investigação de nefropatias.
- II. Os valores da uricosúria podem estar aumentados frente a uma obstrução urinária ou a um envenenamento por chumbo, e podem estar diminuídos frente a leucemias e dieta rica em purinas.
- III. Cristais de ácido úrico e urato amorfo são achados normais no sedimento urinário.
- IV. A uricosúria de 24h é importante para orientar a terapêutica em pacientes com hepatopatias, diferenciando pacientes hiper e hipoexcretadores.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.

37) Em relação às convulsões febris, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Os riscos com tratamento com valproato incluem principalmente desenvolvimento de hiperatividade, irritabilidade, letargia, distúrbios do sono e hipersensibilidade.
- b) Os riscos com tratamento com fenobarbital incluem principalmente desenvolvimento de hepatotoxicidade, trombocitopenia, alterações ponderais, distúrbios gastrintestinais e pancreatite.
- c) Os riscos com tratamento com diazepam intermitente incluem principalmente desenvolvimento de cardiopatias, vasculopatias e afasia.
- d) Apesar de antitérmicos melhorarem o conforto de crianças com convulsão febril, a terapia antipirética não previne a recorrência desses episódios.

38) Sobre as características clínicas, diagnóstico diferencial e diagnóstico laboratorial da febre amarela, é CORRETO afirmar que:

- a) Púrpura trombocitopênica idiopática, envenenamentos exógenos e acidentes por animais peçonhentos como serpentes e larvas de mariposas devem ser considerados no diagnóstico diferencial de febre amarela, face à icterícia que costuma acompanhar esses quadros ainda mais quando acompanhada de febre e outros sintomas gerais.
- b) Os métodos virológicos, como a reação em cadeia em polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) são os mais precisos para a detecção do agente etiológico da febre amarela. Essa metodologia apresenta excelente sensibilidade, sobretudo quando não há viremia.
- c) Nas formas graves, com quadro clínico clássico ou fulminante, todas as doenças febris infecciosas com icterícia e hemorragia devem ser consideradas no diagnóstico diferencial. Malária, hepatites virais (hepatite fulminante e superinfecção pelo vírus B e D), leptospirose e dengue hemorrágica são importantes infecções que devem ser consideradas no diagnóstico diferencial de febre amarela.
- d) Na fase inicial da febre amarela, ocorre leucocitose com linfocitose. À medida que o quadro evolui, há tendência de que ocorra também neutrofilia em função de infecção bacteriana secundária.

39) Dentre os sopros inocentes descritos a seguir, considerando-se aquele que apresenta como característica ser contínuo e cuja intensidade se acentua na posição supina e com a extensão do pescoço, e quase desaparece com sua flexão, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Sopro de Still.
- b) Sopro pulmonar inocente.
- c) Sopro pulmonar periférico.
- d) Zumbido venoso.

40) Sobre o alojamento conjunto da mãe e do bebê, analisar os itens abaixo:

- I. Idealmente, mãe e bebê devem permanecer juntos desde o nascimento.
- II. Recomenda-se que o binômio permaneça no alojamento conjunto por no mínimo 24 horas.
- III. Como vantagens, estão incluídas maior interação entre a mãe e o pediatra, que deve fazer o atendimento ao recém-nascido na presença da mãe.
- IV. Durante o repouso da mãe, o bebê pode ser levado ao berçário para ficar sob cuidados da enfermagem.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, II e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.

41) Conforme STEFANI e BARROS, a descrição abaixo se refere à:

Máculas hipopigmentadas ou levemente pigmentadas com escamação fina e localizadas no tronco, especialmente no tórax superior e no dorso.

- a) Candidíase.
- b) Dermatofitose.
- c) Pitíriase Versicolor.
- d) Onicomicose.

42) Em relação à epilepsia, analisar os itens abaixo:

- I. As crises parciais simples são as que ocorrem com perturbação da consciência e, dependendo da localização do foco, podem causar sintomas motores, sensoriais, autonômicos ou psíquicos.
- II. *Déjà-vu* pode ser um exemplo de uma manifestação de uma crise parcial com sintomas psíquicos.
- III. As crises de ausência quase sempre têm início entre os 4 e 6 anos de idade, mas pode iniciar-se durante a adolescência e persistir ao longo de toda a vida.
- IV. Os tumores cerebrais benignos de longa evolução têm maior tendência a apresentar epilepsia como única manifestação.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.

43) Sobre o trabalho de parto, analisar os itens abaixo:

- I. O segundo estágio do trabalho de parto vai da dilatação cervical completa até a expulsão do feto.
- II. O diagnóstico de trabalho de parto ativo é uma indicação para a admissão à maternidade para manejo e monitoramento.
- III. A presença de acelerações em um traçado cardíaco fetal confere mau prognóstico ao feto.
- IV. Em um monitoramento da frequência cardíaca fetal, a presença de variabilidade normal aumenta a probabilidade de acidemia fetal.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.

44) Sobre as características ultrassonográficas sugestivas de malignidade em nódulos tireóideos, marcar C para as Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Contornos regulares; macrocalcificações ou em formato anelar; padrão intranodular.
- () Hipoecoico; cístico com componente sólido em sua parede; microcalcificações.
- () Contornos irregulares; isoecoico/hiperecoico; padrão periférico.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.

45) A diarreia do viajante, assim chamada por acometer indivíduos que estão em deslocamento, tanto nacional quanto internacionalmente, é a principal causa de doença infecciosa em viajantes. Pode-se definir a diarreia do viajante como uma diarreia aguda, de origem infecciosa, que acomete viajantes provenientes de áreas com melhor saneamento básico, que visitam locais com baixa qualidade de higiene e saneamento básico, mais evidente em países tropicais em desenvolvimento. Analisar os itens abaixo:

- I. O risco e a etiologia da diarreia do viajante variam quanto à região geográfica do planeta.
- II. Há evidências de que os mais jovens adoecem mais por diarreia do viajante do que os mais idosos.
- III. Em geral, a diarreia do viajante pode ser considerada como uma doença de evolução autolimitada e benigna.
- IV. Dados clínicos que apontam para complicações são: presença de sangue e/ou muco nas fezes, febre alta, ou persistente (acima de dois dias).

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Todos os itens.

46) Uma paciente, 14 anos, vai à consulta médica com sua mãe porque sente-se feia e os colegas fazem piadas sobre o aspecto de seu rosto, por estar cheio de espinhas. Isso se iniciou há 6 meses, quando a paciente começou a apresentar a pele mais oleosa e percebeu o surgimento de diversas espinhas em sua face e dorso. Ao exame físico, percebem-se acnes compostas por comedões e lesões inflamatórias, incluindo pápulas e algumas pústulas. Com base nisso, qual a classificação de acne?

- a) Leve.
- b) Leve a moderada.
- c) Moderada.
- d) Moderada a severa.

47) Em conformidade com LONGO et al., assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O(a) _____ ocorre primariamente em crianças pequenas durante as primeiras horas de sono no estágio N3 do sono NREM (não REM). A criança costuma sentar durante o sono, exibindo despertar autônomo com sudorese, taquicardia, pupilas dilatadas e hiperventilação.

- a) narcolepsia
- b) bruxismo noturno
- c) terror noturno
- d) enurese noturna

48) Considerando-se os sinais e sintomas relacionados à tireotoxicose, analisar os itens abaixo:

- I. Fibrilação atrial.
- II. Intolerância ao calor.
- III. Sinal de Pemberton.
- IV. Acropaquia.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e III.
- b) Somente os itens II e IV.
- c) Somente os itens I, II e III.
- d) Todos os itens.

49) Assinalar a alternativa que apresenta a vitamina que se encontra deficitária na patologia conhecida como raquitismo:

- a) Vitamina A.
- b) Vitaminas do Complexo B.
- c) Vitamina E.
- d) Vitamina D.

50) De acordo com DUNCAN et al., os fatores que podem estar relacionados com o grau de lesão produzida pelo ruído, podendo acarretar na surdez profissional, são:

- a) Sexo do trabalhador, período de exposição, tipo de ruído e intensidade.
- b) Frequência, duração do trabalho, idade do trabalhador e intensidade.
- c) Intensidade, tipo de ruído, período de exposição e duração do trabalho.
- d) Histórico familiar, frequência, estresse e lesões anteriores.

51) De acordo com FREITAS, um agente teratogênico é definido como qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, produz alteração na estrutura ou na função da descendência. Entretanto, a decisão de usar ou não um medicamento na gravidez deve estar equacionada com o risco da doença materna que pode, em muitos casos, ser de maior risco para o conceito quando não tratada adequadamente. Conforme o exposto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Os antifúngicos de uso tópico mais antigo, como a nistatina, não apresentam risco na gestação. Por outro lado, o uso sistêmico de antifúngicos deve ser restrito a infecções maternas disseminadas, especialmente no primeiro trimestre.
- () Os inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA) constituem um grupo de substâncias que representaram grande avanço no tratamento da hipertensão. Entretanto, são atualmente consideradas teratogênicos do segundo ao terceiro trimestre de gravidez, pois seu efeito sobre o conceito é observado apenas nesse período.
- () Os aminoglicosídeos (amicacina, gentamicina e estreptomicina) apresentam grande afinidade com cartilagens e tecidos. Estudos disponíveis em gestação humana não mostram risco teratogênico comprovado após a exposição na gestação, especialmente no primeiro trimestre.

- a) E - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) C - C - E.

52) De acordo com TOY, BRISCOE e BRITTON, quando se faz o diagnóstico de hipertensão, deve-se fazer uma avaliação consistindo de anamnese, exame físico e estudos diagnósticos focalizados, visando avaliar os riscos cardiovasculares globais, identificar possíveis causas secundárias de hipertensão e determinar a presença de qualquer dano a órgãos finais. Considerando-se o exposto, analisar os itens abaixo:

- I. Os exames iniciais, após a descoberta de hipertensão, devem incluir níveis séricos de potássio, creatinina (com cálculo da taxa de filtração glomerular) e cálcio, glicemia e hematócrito.
- II. Causas secundárias para a hipertensão, que devem ser consideradas, incluem: coarctação da aorta, doença renovascular e nefropatia, doença de Cushing, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

53) De acordo com TOY, BRISCOE e BRITTON, os AVEs permanecem a terceira principal causa de óbito na América do Norte e são uma importante causa de incapacidade. Presume-se que ocorreu um AVE se os sintomas persistirem por mais de 24 horas. Considerando-se algumas definições, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Acidente Isquêmico Transitório (AIT).
- (2) Sintomas Transitórios com Infarto (STI).
- (3) AVE Isquêmico.

- () Episódio transitório de disfunção neurológica associada à lesão isquêmica cerebral irreversível.
- () Episódio transitório de disfunção neurológica, causado por isquemia focal do cérebro, medula espinal ou retina, sem infarto agudo.
- () Infarto do tecido do sistema nervoso central.

- a) 2 - 3 - 1.
- b) 3 - 1 - 2.
- c) 1 - 3 - 2.
- d) 2 - 1 - 3.

54) O exame do estado mental é dividido em funções do ego. As alucinações são consideradas uma alteração de qual das funções do ego?

- a) Atenção.
- b) Sensopercepção.
- c) Pensamento.
- d) Conduta.

55) Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, é CORRETO afirmar que:

- a) A sífilis primária é caracterizada pela presença de uma úlcera única, extremamente dolorosa, endurecida e circular.
- b) A gonorreia é causada pela *Neisseria gonorrhoeae*, um diplococo Gram-positivo.
- c) O cancro mole é causado pela *Chlamydia trachomatis* e uma combinação de úlceras genitais e linfadenopatia dolorosa sugere esse diagnóstico.
- d) Um dos possíveis tratamentos para o molusco contagioso é a curetagem.

56) Sobre distúrbios da marcha e do equilíbrio, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Usa-se a expressão “marcha cautelosa” para descrever o paciente que deambula com passos curtos e abaixando o centro de massa, como se caminhasse sobre uma superfície escorregadia.
- () O equilíbrio na posição ortostática depende de informações motoras de boa qualidade sobre a posição do centro corporal com relação ao ambiente. As informações sensoriais para o controle postural são geradas primariamente pelo sistema vestibular e pelos receptores proprioceptivos nos fusos musculares e articulações.
- () Os distúrbios vestibulares têm sinais e sintomas que caem em três categorias: (1) vertigem (percepção subjetiva inadequada ou ilusão de movimento); (2) nistagmo (movimentos oculares involuntários); e (3) prejuízo do equilíbrio na posição ereta.

- a) C - C - E.
- b) C - E - C.
- c) E - C - C.
- d) E - E - E.

57) Conforme LONGO et al., a maioria das causas da diarreia crônica não é de origem infecciosa. A classificação da diarreia crônica por um mecanismo fisiopatológico facilita a abordagem racional ao manejo, embora muitas doenças causem diarreia por mais de um mecanismo. As diarreias secretoras são provocadas por distúrbios no transporte hidreletrolítico por meio da mucosa enterocolônica. São causas secretoras de diarreia:

- a) Ingestão crônica de álcool, colecistectomia e colite linfocítica e colagenosa.
- b) Defeitos congênitos de absorção de eletrólitos, hipertireoidismo e lesão por radiação.
- c) Laxantes estimulantes exógenos; ressecção, doença ou fístula intestinal.
- d) Cirurgia bariátrica, síndrome do intestino irritável e doença de mucosa imunorrelacionada.

58) De acordo com STEFANI e BARROS, considerando-se o cancro mole, analisar os itens abaixo:

- I. Seu agente é *Haemophilus ducrey*.
- II. A incubação dura de 15 a 30 dias.
- III. Apresenta lesão erosada única ou múltipla, dolorosa, autoinoculável com fundo purulento e bordas escavadas.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens I e III.

59) Considerando-se STEFANI e BARROS, qual a definição do *delirium tremens*?

- a) Ocorre em alcoolistas de longa data em consequência da deficiência de tiamina.
- b) Amnésia relacionada a dependência alcoólica grave.
- c) Complicação grave da abstinência alcoólica que ocorre em pacientes clinicamente comprometidos, podendo levar à morte em até 20% dos casos.
- d) Ingestão sistemática e abusiva do álcool.

60) O transplante de órgãos em crianças continua a progredir, na medida em que mais órgãos tornam-se disponíveis, e a experiência no atendimento aos pacientes, tanto do ponto de vista clínico como cirúrgico, torna-se mais universal. Captar órgãos de doadores mortos exige a determinação de morte cerebral e que os órgãos vitais continuem perfundidos e oxigenados. Assinalar a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta à doação de fígado:

- a) Hipertensão em tratamento.
- b) Diabetes mellitus.
- c) Peritonite.
- d) Disproteínemias.