

Odontólogo

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.

• Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Conhecimentos Específicos Conhecimentos da Área	60
Total de questões	60

- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 4h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após **três horas** contadas do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de três horas contadas do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.
- Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂ ----- Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>
51	<input type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conhecimentos da Área

1) Segundo o Decreto nº 7.508/2011, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA:

- () Ao usuário será restringida a continuidade do cuidado em saúde aos hospitais e outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
- () As Comissões Intergestores pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.

- a) E - C.
- b) C - E.
- c) E - E.
- d) C - C.

2) Segundo o Decreto nº 7.508/2011, são algumas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de:

- I. Atenção psicossocial.
- II. Atenção de urgência e emergência.
- III. Especiais de acesso aberto.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

3) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, os estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

- I. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- II. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

4) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA:

- () O Estado tem o dever de prover as condições indispensáveis para o pleno exercício do direito fundamental à saúde que o ser humano possui.
- () O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- () O estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação é uma das formas de garantir a saúde, dever do Estado.

- a) E - C - E.
- b) C - E - C.
- c) E - E - C.
- d) C - C - E.

5) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, analisar os itens abaixo:

- I. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- II. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- III. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

6) Segundo a Lei nº 11.340/2006, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção,

- a) exceto emergencialmente
- b) preventivamente apenas
- c) mediante solicitação por escrito
- d) e emergencialmente quando for o caso

7) Segundo a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, o empregador deve:

- I. Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
- II. Providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

8) Com base na NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo:

Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha de pano reutilizável e lixeira provida de sistema de abertura manual (1ª parte). O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

9) Com base no Ministério da Saúde, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades.
- () A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde.
- () Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação.

- a) E - E - E.
- b) C - C - C.
- c) E - C - C.
- d) C - E - E.

10) Com base na Atenção Básica, são algumas responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família (ESF) como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica.
- II. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.
- III. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

11) Sobre a vigilância em saúde, analisar a sentença abaixo:

A vigilância em saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira (1ª parte). A vigilância em saúde passa a ser entendida como um processo descontínuo e assistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

12) Considerando-se os direitos dos usuários da saúde, assinalar a alternativa que apresenta uma informação INCORRETA:

- a) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- b) Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- c) Todo cidadão tem direito ao acesso desordenado e desorganizado aos sistemas de saúde.
- d) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.

13) Com base na Portaria de Consolidação nº 2/2017, e em relação à temática da Atenção Básica, analisar a sentença abaixo:

A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersectorialidade (1ª parte). Regionalização e hierarquização são diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizadas na Atenção Básica (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

14) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 2/2017, na Atenção Básica:

- I. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
- II. Serão adotadas estratégias que permitam minimizar desigualdades/iniquidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

15) De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa CORRETA:

- () É dever de todos tolerar a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
- () Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.
- () A observância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei.

- a) E - C - E.
- b) C - E - E.
- c) E - E - C.
- d) C - C - C.

16) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 17 - Saúde Bucal, as lesões dentárias traumáticas são agravos que têm um grande impacto na qualidade de vida da criança e do adolescente: limitações ao morder ou falar, comprometimento da estética e problemas psicológicos no convívio social a ponto da criança/adolescente evitar sorrir e conversar. Com base nisso, os serviços de saúde devem organizar, programar e manter diversas ações de vigilância do traumatismo dentário, tais como:

- I. Realizar vigilância epidemiológica dos traumatismos.
- II. Propor ações de promoção da saúde.
- III. Os profissionais de saúde bucal devem integrar-se ao restante da equipe de saúde na abordagem de fatores de risco comuns do traumatismo dentário e de outras lesões traumáticas.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

17) Com base em Controle de Infecções e a Prática Odontológica em Tempos de AIDS: Manual de Condutas, sobre as medidas de precaução-padrão, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () São um conjunto de medidas de controle de infecção a serem adotadas universalmente, como forma eficaz de redução do risco ocupacional e de transmissão de agentes infecciosos nos serviços de saúde.
- () As precauções foram criadas para reduzir o risco de transmissão de patógenos através do sangue e fluidos corporais. São indicadas para todos os pacientes, independentemente do diagnóstico, em todas as situações de tratamento.
- () As precauções-padrão auxiliam os profissionais nas condutas técnicas adequadas, por enfatizarem a necessidade de tratar todos os pacientes em condições biologicamente seguras; ao mesmo tempo que indicam, de forma precisa, o uso do equipamento de proteção individual (EPI), gerando a melhoria da qualidade da assistência e redução de custos.

- a) E - E - E.
- b) C - C - C.
- c) E - C - C.
- d) C - E - E.

18) Com base no Guia de Recomendação para o uso de Fluoretos no Brasil, sobre a fluorose dentária, analisar a sentença abaixo:

Os aspectos clínicos da fluorose dentária são caracterizados por um espectro de mudanças que vão desde linhas opacas brancas finas cruzando transversalmente o longo eixo da coroa do dente até quadros onde áreas do esmalte gravemente hipomineralizadas se rompem, e, geralmente, o esmalte restante fica pigmentado (1ª parte). A fluorose dentária leve causa apenas alterações estéticas, caracterizadas por pigmentação branca no esmalte dentário. A fluorose moderada e severa, caracterizada por manchas amarelas ou marrons, além de defeitos estruturais no esmalte, apresenta repercussões estéticas, morfológicas e funcionais (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

19) De acordo com o Código de Ética Profissional, constituem alguns direitos fundamentais dos Profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas, EXCETO:

- a) Renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional. Nestes casos tem o profissional o dever de comunicar previamente, por escrito, ao paciente ou seu responsável legal, fornecendo ao Cirurgião Dentista que lhe suceder todas as informações necessárias para a continuidade do tratamento.
- b) Recusar qualquer disposição estatutária, regimental, de instituição pública ou privada, que limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, bem como recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
- c) Exercer a profissão mantendo comportamento digno.
- d) Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado, evitando que o acúmulo de encargos, consultas, perícias ou outras avaliações venham prejudicar o exercício pleno da Odontologia.

20) Segundo o Código de Ética Profissional, quanto ao relacionamento com o paciente, constituem algumas infrações éticas:

- I. Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.
- II. Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual não esteja capacitado.
- III. Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro Cirurgião Dentista em condições de fazê-lo.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

21) Sob a perspectiva de FEJERKOV e THYLSTRUP, nos túbulos dentinários correspondentes à área desmineralizada, uma esclerose tubular é esperada. Essa reação dá origem ao(à) chamado(a):

- a) Corpo da lesão.
- b) Zona de superfície.
- c) Zona escura.
- d) Zona translúcida.

22) De acordo com REGEZI e SCIUBA, sobre a penfigoide das membras mucosas (PMM), analisar os itens abaixo:

- I. O PMM é uma doença bolhosa ou vesiculobolhosa que afeta de forma predominante as mucosas ocular e bucal.
- II. Quando a PMM afeta apenas a gengiva, é clinicamente denominado gengivose ou gengivite descamativa.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

23) De acordo com BOYD, sobre alguns instrumentos exploradores, assinalar a alternativa que apresenta os nomes dos instrumentos 1, 2 e 3, abaixo, respectivamente:



- a) Rabo de porco, gancho e Orban.
- b) Orban, rabo de porco e gancho.
- c) Rabo de porco, Orban e gancho.
- d) Orban, gancho, rabo de porco.

24) Paciente portador de doença sistêmica severa, que limita suas atividades (ASA III), chega ao consultório para avaliação inicial. Neste caso, o tratamento odontológico eletivo não está contraindicado, embora este paciente represente um maior risco durante o atendimento. Assinalar a alternativa que apresenta exemplo de condições para que o paciente seja incluído na categoria de ASA III:

- a) Paciente nos primeiros dois trimestres da gestação.
- b) Paciente portador de distúrbios convulsivos, controlados com medicação.
- c) Paciente com história de infarto do miocárdio há mais de 6 meses, sem apresentar sintomas.
- d) Diabético tipo I (que faz uso de insulina), com a doença controlada.

25) Em relação à sedação mínima com benzodiazepínicos, analisar os itens abaixo:

- I. Os benzodiazepínicos têm ação ansiolítica pela potencialização dos efeitos inibitórios de um neurotransmissor (GABA).
- II. Os benzodiazepínicos podem ser indicados para todos os pacientes que têm dificuldade de colaboração, exceto hipertensos, pois os benzodiazepínicos costumam desregular a pressão arterial durante o seu efeito.
- III. A amnésia anterógrada é um efeito colateral dos benzodiazepínicos apenas quando empregados em mais de uma dose.

Está CORRETO:

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Nenhum dos itens.

26) Sobre a anatomia do periodonto, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A gengiva interdental ocupa a ameia gengival e independe do ponto de contato entre dois dentes adjacentes.
- b) A gengiva inserida é contínua com a gengiva marginal. Ela é firme, resiliente e fortemente ligada ao periosteio do osso alveolar subjacente.
- c) O ponto mais apical do arco côncavo da gengiva marginal é chamado de nadir gengival.
- d) A mucosa alveolar é a porção terminal ou borda da gengiva ao redor dos dentes em forma de colar.

27) Sobre os determinantes de risco da doença periodontal, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Tanto a prevalência quanto a gravidade da doença periodontal aumentam com a idade.
- () Homens têm uma higiene oral mais pobre do que mulheres e, por este motivo, observa-se uma diferença de gênero que afeta a prevalência e gravidade da periodontite.
- () O diabetes é um dos fatores sistêmicos que diminui o risco de destruição periodontal devido à diminuição da glicemia causada pelo uso de insulina. Além disso, estudos recentes mostram que a insulina afeta o metabolismo bacteriano, diminuindo a proliferação oral.

- a) C - C - C.
- b) E - E - C.
- c) E - C - C.
- d) C - C - E.

28) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O _____ é uma condição caracterizada pelo(a) _____ dos níveis do hormônio da tireoide. As características mais comuns do _____ incluem sinais e sintomas como letargia, pele seca e áspera, edema da face, fadiga, entre outros. Em relação aos achados orais, os lábios e a língua podem parecer espessados devido ao acúmulo de glicosaminoglicanos. Se a condição se desenvolver durante a infância, pode não haver a erupção dos dentes, apesar de sua formação não ser prejudicada.

- a) hipertireoidismo - aumento - hipertireoidismo
- b) hipotireoidismo - diminuição - hipotireoidismo
- c) hipoparatiroidismo - diminuição - hipoparatiroidismo
- d) hiperparatiroidismo - aumento - hiperparatiroidismo

29) Sobre o granuloma piogênico, analisar os itens abaixo:

- I. Embora originalmente se acreditasse que a lesão fosse causada por organismos piogênicos, atualmente acredita-se que não esteja relacionada à infecção.
- II. O granuloma piogênico representa uma resposta tecidual a um irritante local ou a um trauma.
- III. Apesar de seu nome, o granuloma piogênico não é um granuloma verdadeiro.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

30) Paciente de 2 anos, pesando 13kg, necessita de procedimento sob anestesia local no consultório. O anestésico disponível é lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000. A dose máxima recomendada (DMR) de lidocaína é 7mg/kg. Qual a quantidade máxima de tubetes anestésicos que podem ser utilizados considerando a DMR?

- a) 2 tubetes.
- b) 3 tubetes.
- c) 4 tubetes.
- d) 5 tubetes.

31) Os antidepressivos tricíclicos (ATCs) comumente são prescritos para o tratamento da depressão maior. Os ATCs podem potencializar as ações cardiovasculares de vasoconstritores administrados exogenamente. A interação com vasoconstritores de alguns anestésicos odontológicos potencializam de 5 a 10 vezes as ações cardiovasculares, podendo levar a uma crise hipertensiva. Sobre o uso de vasoconstritores em pacientes que usam ATCs, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O uso de adrenalina e noradrenalina é mais seguro do que o uso de levonordefrina e fenilefrina.
- b) O uso de levonordrefina e fenilefrina é mais seguro do que o uso de adrenalina e noradrenalina.
- c) O uso de adrenalina e fenilefrina é mais seguro do que o uso de noradrenalina e levonordrefina.
- d) O uso de noradrenalina e levonordefrina é mais seguro do que o uso de adrenalina e fenilefrina.

32) Sobre os antissépticos tópicos mais utilizados em estabelecimentos de saúde, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Os alcoóis são efetivos para bactérias Gram-positivas e negativas, bacilo da tuberculose, fungos e vírus.
- b) A clorexidina é tão efetiva quanto os alcoóis, além de ter boa atividade contra vírus lipofílicos.
- c) Os alcoóis têm ação lenta e menor eficácia em comparação a outros antissépticos.
- d) A clorexidina tem baixa ação residual, provoca ressecamento de pele e é volátil e inflamável.

33) Sobre o atendimento odontológico em pacientes idosos, analisar os itens abaixo:

- I. São considerados fatores de risco para o câncer oral e faríngeo: idade, uso de tabaco, uso frequente de álcool e exposição à luz solar (lábio).
- II. Ciclosporinas, bloqueadores de canal de cálcio e anticonvulsivantes podem induzir hiperplasia gengival na presença de uma higiene oral insatisfatória.
- III. Prevenção, conforto, função, estética e facilidade de manutenção são os critérios para o gerenciamento satisfatório de um idoso, sobretudo de um paciente idoso debilitado ou funcionalmente dependente.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

34) Sobre os critérios para optar por tratamento restaurador, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Deve-se restaurar cárie secundária que se acredita estar inativada, independentemente do envolvimento de dentina ou não, pois é foco infeccioso em região sensível de bordo de restauração.
- b) Deve-se restaurar lesões de cárie de fissura que se julgue envolver esmalte ou dentina superficial.
- c) Deve-se restaurar casos em que o paciente tem impacção alimentar associada a um defeito no contorno de um dente ou restauração, e em que uma higiene bucal melhorada, por si só, não resolveria o problema.
- d) Deve-se restaurar lesões de mancha branca na vestibular de dente posterior.

35) Sobre as regras gerais para utilização de pinos intrarradiculares, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Pelo menos metade da porção radicular deve permanecer com material obturador.
- b) Uma relação de 1:1,25 entre altura da coroa e comprimento radicular do pino deve ser respeitada.
- c) O pino deve se estender ao menos por metade do comprimento da raiz suportada por tecido ósseo.
- d) As paredes circundantes do canal (dentina) não podem ser desgastadas durante o preparo para a colocação do pino.

36) Sobre as diretrizes para uma oclusão adequada, analisar os itens abaixo:

- I. Quando a mandíbula se desloca da oclusão cêntrica, alguma forma de guia canina ou anterior é desejável, sem contatos nos dentes posteriores. Esta combinação de guia anterior e desocclusão posterior reduz a capacidade de contração dos músculos elevadores, distribuindo a força do movimento para os dentes anteriores, que recebem menos força em virtude do sistema de alavanca Classe III que é utilizado nessa situação.
- II. Os contatos em todos os dentes devem ser simultâneos e uniformes durante o fechamento em oclusão cêntrica. Isso distribui a força do fechamento sobre todos os dentes.
- III. A oclusão deve ser criada em uma dimensão vertical que seja estável ao paciente. Costuma-se aceitar que a dimensão vertical existente do paciente seja um equilíbrio entre as forças de erupção dos seus dentes e a extensão da contração repetitiva dos seus músculos elevadores.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

37) Sobre os materiais utilizados para extração dentária, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O fórceps atua no processo de luxação por meio da expansão óssea e ruptura do limatendo periodontal.
- b) A pinça de Crille é usada com o objetivo de remoção dentária.
- c) As alavancas podem aplicar cinco movimentos principais para luxar os dentes: para dentro, para a distal, para a mesial, para a vestibular e para a palatina.
- d) A principal diferença entre o porta agulha e a pinça hemostática é a curvatura da ponta, sendo o porta agulha reto e a pinça curva.

38) Anormalidade dentária que tem sido referida como “dentes sem raízes”, porque a perda de organização da dentina radicular leva ao encurtamento do tamanho da raiz. O esmalte e a dentina coronária são clinicamente normais e bem formados, mas a dentina radicular perde toda a organização e, portanto, é fortemente diminuída. Em razão das rizomicrias, os sinais clínicos iniciais são a extrema mobilidade e esfoliação prematura, espontânea ou secundariamente ao menor trauma. A resistência da dentina radicular é reduzida, com os dentes afetados ficando predispostos a fraturas durante extrações. A descrição se refere a que tipo de anormalidade:

- a) Amelogênese imperfeita hipomaturada.
- b) Odontodisplasia regional.
- c) Dentinogênese imperfeita.
- d) Displasia dentinária tipo I.

39) Segundo LINDHE, em relação aos tumores e cistos do periodonto, em que apresenta um neoplasma benigno de tecidos duros do periodonto, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Displasia cementária periapical.
- b) Sarcoma de Kaposi.
- c) Ameloblastoma.
- d) Osteossarcoma.

40) A biotransformação dos anestésicos locais do tipo amida é mais complexa que a dos ésteres. Sobre o local primário da biotransformação dos anestésicos locais do tipo amida, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Plasma sanguíneo.
- b) Sistema gastrointestinal.
- c) Baço.
- d) Fígado.

41) Em relação às ações sistêmicas dos anestésicos locais no sistema cardiovascular, pode-se dizer que os anestésicos locais têm ação direta no miocárdio e na vasculatura periférica. Entretanto, em geral, o sistema cardiovascular parece ser mais resistente aos efeitos de substâncias anestésicas locais do que o SNC. Diante disso, analisar os itens abaixo:

- I. Os anestésicos locais modificam os eventos eletrofisiológicos que ocorrem no miocárdio de maneira semelhante às suas ações nos nervos periféricos. À medida que aumenta o nível sanguíneo de anestésico local, a velocidade de elevação de várias fases da despolarização miocárdica diminui. Não há alterações significativas no potencial de membrana em repouso e não há prolongamento significativo das fases de repolarização.
- II. As ações cardíacas diretas dos anestésicos locais em níveis sanguíneos acima do nível terapêutico (antiarrítmico) incluem redução da contratilidade do miocárdio e diminuição do débito cardíaco, ambas levando a colapso circulatório.
- III. Os anestésicos locais produzem excitação do miocárdio que está relacionada com o nível sanguíneo do anestésico local. Os anestésicos locais aumentam a excitabilidade elétrica do miocárdio, a velocidade de condução e a força de contração.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

42) O melhor tratamento de uma exposição sinusal em potencial é evitar o problema por meio de uma análise e planejamento adequados. A avaliação de radiografias de alta qualidade antes da cirurgia geralmente revela a presença ou a ausência de um seio excessivamente pneumatizado, além de raízes divergentes ou dilaceradas, que têm o potencial de causar comunicação com o seio ou fratura em seu assoalho durante a extração. Diante disso, ao ocorrer a exposição e perfuração do seio durante um procedimento cirúrgico em que a abertura é pequena e ele encontra-se saudável, sobre o tratamento a ser realizado, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Sutura simples. Orientação ao paciente quanto às preocupações nasais. Acompanhamento por métodos radiográficos.
- b) Estabelecer o coágulo no local da extração e estabilizá-lo. Não é necessária rotação de retalho adicional. Realizar suturas para a reposição de tecidos moles e colocar uma compressa de gaze em cima do local da extração por uma ou duas horas. O paciente é instruído quanto às precauções nasais.
- c) É necessário cobrir o local da extração com algum tipo de avanço de retalho para prover fechamento primário na tentativa de cobrir a abertura do seio. A cirurgia de retalho mais comumente utilizada envolve a elevação de retalho bucal, relaxamento de periósteo e avanço do retalho para cobrir o local da extração. Após o fechamento, o paciente é instruído a seguir as precauções para o seio.
- d) Os métodos de fechamento incluem avanço de retalho bucal, avanço de retalho palatino, e avanço de retalhos palatino e bucal sobre uma membrana de material aloplástico. O paciente é instruído quanto às precauções nasais.

43) Em relação ao odontoma, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) É o tipo mais comum de tumor não-odontogênico.
- b) É uma neoplasia verdadeira.
- c) Nos estágios mais precoces do desenvolvimento, estão presentes quantidades variáveis de epitélio odontogênico em proliferação e mesênquima.
- d) Quando totalmente desenvolvidos, os odontomas consistem principalmente em esmalte, polpa e cimento.

44) Síndrome na qual o osso occipital é achatado e a frente apresenta uma aparência alta. O crânio apresenta-se em forma de torre (acrobraquicefalia). A proptose ocular é um achado característico. A sindactilia do segundo, terceiro e quarto dedos das mãos e dos pés é sempre observada. O terço médio de face mostra-se acentuadamente retraído e hipoplásico, resultando em um prognatismo mandibular relativo. Aspecto trapezoidal dos lábios em repouso, como consequência da hipoplasia da maxila e da respiração bucal. A hipoplasia da maxila produz uma forma em V do arco superior e apinhamento dentário. Tipicamente, a má oclusão tipo classe III ocorre e pode estar associada à mordida aberta anterior e mordida cruzada posterior. O espessamento da gengiva pode estar associado à erupção retardada dos dentes. Sobre essa síndrome, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Síndrome de Crouzon.
- b) Síndrome de Apert.
- c) Síndrome de Proteus.
- d) Síndrome de Stevens-Johnson.

45) Uma das classificações do cimento de ionômero de vidro é quanto às indicações. Sobre o ionômero de vidro indicado para proteção pulpar ou base e secundariamente para selamento de fôssulas e fissuras, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Tipo I.
- b) Tipo II.
- c) Tipo III.
- d) Tipo IV.

46) Língua em morango/framboesa é característica de uma lesão branca e/ou vermelha. Sobre a lesão que está associada com essa alteração, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Sífilis.
- b) Sarampo.
- c) Escarlatina.
- d) Difteria.

47) As alavancas dentárias são usadas, primariamente, como elevadores. Uma alavanca é um mecanismo para transmitir uma força modesta - com as vantagens mecânicas de um longo braço de ação e um curto braço de resistência - para um pequeno movimento contra grande resistência. Em relação à alavanca reta, sobre o tipo de princípio mecânico utilizado para luxar um dente em seu alvéolo, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Princípio da cunha.
- b) Princípio de rotação.
- c) Princípio de tração.
- d) Princípio da pressão apical.

48) Sobre a anormalidade dentária que tem por característica clínica a união de dois dentes adjacentes apenas por cimento sem confluência da dentina subjacente, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Fusão.
- b) Geminação.
- c) Concrecência.
- d) Hipercementose.

49) Segundo PEREIRA, o crescente número de pessoas acometidas pela chamada insuficiência renal crônica (IRC) tem despertado, cada vez mais, o interesse dos profissionais de saúde. Entretanto, para que se ofereçam condições de tratamento nos vários níveis de saúde, em que se inclui a odontologia, é necessário conhecer os aspectos relacionados a essa síndrome. Diante disso, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Os sinais/sintomas apresentados por esse grupo de pacientes incluem hálito cetônico, estomatite, gengivite, decréscimo de fluxo salivar, xerostomia, parotidite e alto índice de cáries.
- () Devido à ingesta líquida restrita, o sinal clínico mais comum é a xerostomia.
- () Antibióticos como a amoxicilina e clindamicina e os anestésicos locais (lidocaína, mepivacaína) não são seguros por serem metabolizados pelos rins.

- a) E - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) C - C - E.

50) O sarampo é uma infecção causada por um vírus da família dos paramixovírus, gênero *Morbillivirus*. O período de incubação é de 10 a 12 dias e os indivíduos afetados são infectantes 2 dias antes de se tornarem sintomáticos e até 4 dias após o aparecimento da erupção associada. A infecção apresenta três estágios, cada um com duração de 3 dias. Os 3 primeiros dias são caracterizados por corrimento nasal, tosse caracteristicamente alta/seca e desconfortável, e conjuntivite. Tipicamente, a febre acompanha esses sintomas. Durante esse estágio inicial, a manifestação oral mais distinta observada é o sinal de Koplik. Em relação a esta manifestação oral, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) São erupções exantematosas que formam discretas máculas rosadas que evoluem para pápulas e, finalmente, desaparecem com descamação em flocos.
- b) São grupos de vesículas dispostas em uma base eritematosa que dentro de 3 a 4 dias, começam a pustular e ulcerar, e formar crostas após 7 a 10 dias.
- c) São vesículas puntiformes, que rapidamente se rompem e formam inúmeras lesões pequenas, avermelhadas. Essas lesões iniciais aumentam um pouco de tamanho e desenvolvem áreas centrais de ulceração, recobertas por uma fibrina amarela.
- d) São múltiplas áreas de eritema onde estão presentes numerosas máculas pequenas branco-azuladas. Estas áreas constituem focos de necrose epitelial e têm sido descritas como "grãos de sal" em um fundo vermelho.

51) Segundo ANDRADE, em relação ao controle da ansiedade do paciente odontológico, os benzodiazepínicos (BDZ) são os ansiolíticos mais empregados para se obter a sedação mínima por via oral, pela eficácia, boa margem de segurança clínica e facilidade posológica. Diante disso, sobre os efeitos colaterais dos BDZ, particularmente quando empregados em dose única ou por tempo restrito, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Sonolência, efeitos paradoxais, amnésia anterógrada e efeitos cardiovasculares.
- b) Amnésia anterógrada, alucinações, confusão mental, visão dupla e falta de coordenação motora.
- c) Dependência química, dor de cabeça, aumento ou diminuição da libido e fantasias de caráter sexual.
- d) Confusão mental, efeitos paradoxais e efeitos no sistema nervoso central e sistema respiratório.

52) Considerando-se que a dose máxima de lidocaína 2% é 4,4mg/kg de peso corporal e que o tubete contém 1,8mL, assinalar a alternativa que apresenta, respectivamente, a dose máxima absoluta e o número máximo de tubetes a serem empregados em uma sessão de atendimento para um paciente adulto com 100kg:

- a) 440mg e 12,2 tubetes.
- b) 440mg e 10 tubetes.
- c) 300mg e 8,3 tubetes.
- d) 300mg e 7,4 tubetes.

53) Em relação aos princípios da exodontia, analisar os itens abaixo:

- I. Os dentes molares da mandíbula têm um osso vestibular menos espesso e, geralmente, necessitam de uma pressão vestibular mais forte do que lingual.
- II. A remoção de dentes do processo alveolar demanda a utilização dos seguintes princípios mecânicos e de máquinas simples: a alavanca, a cunha, a roda e o eixo.
- III. O fórceps pode aplicar cinco movimentos principais para luxar os dentes e expandir o alvéolo ósseo: pressão apical, força vestibular, pressão palatina ou lingual, pressão rotacional e, finalmente, forças de tração.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

54) Um método para classificar terceiros molares impactados está baseado na quantidade de dente impactado que está coberta com osso no ramo mandibular. Essa classificação é conhecida como a classificação de Pell e Gregory. Diante disso, sobre a posição dentária que mais oferece dificuldade cirúrgica, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Impacção distoangular, classe III-C.
- b) Impacção mesioangular, classe I-A.
- c) Impacção horizontal, classe III-C.
- d) Impacção distoangular, classe I-A.

55) Lesões dentoalveolares e dos tecidos moles são frequentes e são causadas por diversos tipos de traumatismo. As causas mais comuns são quedas, acidentes automobilísticos, acidentes desportivos, brigas, abuso contra crianças e acidentes ocorridos em parques de recreação. De acordo com a classificação das lesões dentoalveolares, sobre a denominação para uma lesão da estrutura de suporte do dente, resultando em mobilidade do dente, mas sem luxação, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Subluxação.
- b) Concussão.
- c) Avulsão.
- d) Intrusão.

56) Segundo LINDHE, o uso de antissépticos na terapia periodontal é eficaz. Diante disso, em relação à clorexidina, analisar os itens abaixo:

- I. Alguns dos efeitos colaterais locais que podem ocorrer incluem: manchas acastanhadas nos dentes, em alguns materiais de restauração e no dorso da língua; perturbação do paladar, em que o sabor do sal parece estar preferencialmente afetado; erosão da mucosa oral, tumefação unilateral ou bilateral da parótida e estímulo da formação de cálculo supragengival.
- II. O antisséptico tem uma importante ação antimicrobiana, incluindo uma ampla variedade de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.
- III. Vários veículos de administração da clorexidina encontram-se disponíveis: colutórios bucais, gel, *sprays*, pasta de dente, vernizes, mas os enxaguatórios bucais são os mais comumente recomendados.
- IV. A clorexidina está livre de um sistema de toxicidade no uso oral, e a resistência microbiana e a supra-infecção não ocorrem.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I, II e III.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Todos os itens.

57) São feixes orientados de fibras gengivais que estão embutidas no cimento da porção supra-alveolar da raiz, de onde se projetam a partir do cimento, em forma de leque, em direção ao tecido gengival livre das superfícies vestibular, lingual e interproximal. Assinalar a alternativa CORRETA que indica a denominação dessa fibra:

- a) Fibras circulares.
- b) Fibras dentogengivais.
- c) Fibras dentoperiosteas.
- d) Fibras transeptais.

58) As secreções salivares são protetoras por natureza, pois mantêm os tecidos orais em um estado fisiológico. Sendo assim, é CORRETO afirmar que:

- a) A saliva contém numerosos fatores inorgânicos e orgânicos que influenciam as bactérias e seus produtos no ambiente oral. Os fatores inorgânicos incluem lisozima, lactoferrina, mieloperoxidase, mucinas e anticorpos. Os fatores orgânicos incluem íons e gases, bicarbonato, sódio, potássio, fosfatos, cálcio, fluoretos, amônio e dióxido de carbono.
- b) O aumento da doença inflamatória gengival, da cárie dental e da rápida destruição dentária associada a cáries cervicais e cementárias, é parcialmente uma consequência da diminuição na secreção das glândulas salivares, a chamada sialoadenite.
- c) A saliva contém todas as formas de leucócitos, dentre os quais as células principais são os PMNs. O número de PMNs varia de pessoa para pessoa e em diferentes momentos do dia e está aumentado na gengivite.
- d) A parotidite endêmica pode resultar de sialolitíase, sarcoidose, síndrome de Sjögren, doença de Mikulicz, irradiação, remoção cirúrgica das glândulas salivares e outros fatores.

59) Os bisfosfonados proporcionam grandes benefícios a pacientes em risco de metástases ósseas, na prevenção e no tratamento da osteoporose. O risco de um paciente vir a apresentar osteonecrose do maxilar ao receber bisfosfonados orais parece ser baixo, mas há fatores que aumentam reconhecidamente o risco de osteonecrose associada aos bisfosfonados (OAB). Em relação aos achados médicos rotineiros que podem influenciar no planejamento do tratamento endodôntico, assinalar a alternativa que apresenta algum(ns) desses fatores:

- a) Pacientes com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), história de câncer e pacientes em diálise.
- b) História de diabetes, tabagismo e uso crônico de corticosteroides.
- c) Uso de bisfosfonados por menos de 2 anos, especialmente por via oral.
- d) História de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), doença renal crônica e pacientes masculinos com mais de 45 anos.

60) A metemoglobinemia é uma condição na qual há o desenvolvimento de um estado semelhante a cianose na ausência de anormalidades cardíacas ou respiratórias. Pode ocorrer por erros inatos do metabolismo ou pode ser adquirida pela administração de drogas ou substâncias químicas que aumentam a formação da metemoglobina. Diante disso, sobre o tratamento definitivo a ser realizado caso seja feito o diagnóstico de metemoglobinemia após a administração de altas doses de prilocaína em um paciente saudável, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Administração de oxigênio a 100%.
- b) Administração IV lenta de azul de metileno a 1% (1,5 mg/kg ou 0,7 mg/lb).
- c) Administração IV ou IM de ácido ascórbico (250 a 400 mg/dia).
- d) Administração IV ou IM de corticosteroide.