

# Médico Especialista Ginecologista/Obstetra

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.

• Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Saúde Pública	04
Legislação Geral	04
Noções de Segurança do Trabalho	02
Conhecimentos Específicos	30

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

• O tempo de duração da prova objetiva será de **até três horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

• Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

**Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.**

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>

**Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.**

---

**SAÚDE PÚBLICA**

---

**1)** Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A \_\_\_\_\_ é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde.

- a) rede de atenção à produção
- b) atenção às doenças transmissíveis
- c) vigilância em saúde do trabalhador
- d) vigilância epidemiológica
- e) vigilância sanitária

---

**2)** Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo:

*A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de centralização e dependência dos demais componentes da rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde (2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

---

**3)** Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde é conhecida como:

- a) Consultório na rua.
- b) Equipe especializada de rua.
- c) Unidades Básicas de Saúde.
- d) Centros de Atenção Psicossocial.
- e) Centro de Referência de Assistência Social.

**4)** Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO afirmar que:

- a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma desigual.
- c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário às crianças vulneráveis.
- d) Haverá utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar duplicidade de ações para fins idênticos.

---

**LEGISLAÇÃO GERAL**

---

**5)** Em conformidade com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à imagem.
- b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
- c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

**6)** De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, analisar a sentença abaixo:

*As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos (1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo tipo de comercialização (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

**7)** De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida licença ao servidor:

- I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo.
- II. Por motivo de doença em pessoa da família.
- III. Para tratar de interesse particular.
- IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

**8)** Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é CORRETO afirmar que:

- a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 5% sobre o vencimento.
- b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da manhã, cada hora será remunerada como duas horas.
- c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre o valor das horas diurnas.
- d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre o valor das horas formais.
- e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 40% sobre o vencimento.

## NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

**9)** Em conformidade com a NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, sobre os graus de insalubridade, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Grau máximo.
- (2) Grau médio.
- ( ) Trabalho ou operações em contato permanente com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose).
- ( ) Trabalho ou operações em contato permanente com esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e industrialização).
- ( ) Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagante em resíduos de animais deteriorados.

- a) 1 - 1 - 2.
- b) 1 - 2 - 2.
- c) 1 - 2 - 1.
- d) 2 - 1 - 1.
- e) 2 - 2 - 1.

**10)** Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo:

*Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto (1ª parte). Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais para facilitar a sua identificação e higienização domiciliar (2ª parte). Deverá ser vedado o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

---

**11)** Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo:

*As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda (1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). Considera-se violência contra o idoso somente a ação praticada em local público que lhe cause morte ou sofrimento físico ou psicológico (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

---

**12)** Em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação ao atendimento, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento ao público.
- ( ) O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência, para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, é dispensável em todos os casos, devido à condição de saúde.
- ( ) As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre a condição de saúde dessa pessoa.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) E - C - E.
- e) C - C - C.

**13)** Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos, analisar os itens abaixo:

- I. A notificação compulsória é facultativa para Médicos, sendo realizada por outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços privados de saúde.
- II. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa.
- III. A notificação compulsória imediata é realizada em até 3 dias, diante da confirmação de doença ou agravo que tenha grande letalidade e que seja um problema de saúde pública.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Nenhum dos itens.

---

**14)** Sobre o Código de Ética Médica, analisar os itens abaixo:

- I. É vedado ao Médico deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, com exceção de quando vários médicos tenham assistido o paciente.
- II. É vedado ao Médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
- III. É permitido ao Médico assinar em branco as folhas de receituários, os atestados, os laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Todos os itens.

---

**15)** Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, é considerado o princípio do(a):

- a) Integralidade da assistência.
- b) Universalidade de acesso.
- c) Preservação da autonomia.
- d) Integração em nível executivo das ações de saúde.
- e) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

**16)** A obesidade infantil é uma questão crescente no Brasil e no mundo, preocupando não somente os pais e responsáveis, mas também as organizações de saúde. Sobre a obesidade infantil, analisar os itens abaixo:

- I. Crianças com obesidade têm mais risco de desenvolver doenças em articulações e ossos, diabetes e problemas cardíacos na vida adulta.
- II. Caracteriza-se por uma disfunção ocasionada pelo excesso de peso em crianças de 12 a 18 anos.
- III. O tratamento para a obesidade infantil deve passar por alguns campos importantes. A mudança no estilo de vida consiste em um deles. Na verdade, trata-se do pilar fundamental para reduzir peso e melhorar a saúde.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Nenhum dos itens.
- e) Todos os itens.

**17)** Em relação aos conhecimentos farmacológicos, sobre a bromocriptina, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*O alcaloide do mesilato de bromocriptina é de ação rápida, \_\_\_\_\_ do receptor da dopamina, sendo que esta suprime a secreção de prolactina. Quando se deseja a gravidez, esse medicamento é \_\_\_\_\_.*

- a) agonista | retirado
- b) agonista | preferível
- c) antagonista | de escolha
- d) antagonista | suspenso
- e) sinergista | suspenso

**18)** O exame físico começa com a anamnese, seguida da observação do paciente e passando-se para o diagnóstico diferencial. A execução do exame físico é focalizada nos sistemas sugeridos pelo diagnóstico diferencial, fazendo-se testes ou manobras com o foco em questões específicas. Em relação ao exposto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) No caso de suspeita de hipovolemia, o pulso e a pressão arterial devem ser tomados com o paciente em pé e deitado, para observação de hipotensão postural.
- ( ) O baqueteamento digital pode indicar doenças pulmonares, como câncer ou cardiopatia cianótica crônica.
- ( ) A percussão dos campos pulmonares pode ser útil na identificação de hipertimpanismo por pneumotórax hipertensivo ou de macicez por pneumonia consolidada ou derrame pleural.

- a) C - C - E.
- b) C - C - C.
- c) E - E - E.
- d) E - C - E.
- e) C - E - E.

**19)** Em relação à manutenção da saúde na mulher adulta, são indicados, na prevenção da osteoporose:

- I. Evitar álcool e tabaco.
- II. Uso de baclofeno.
- III. Fazer atividade física regularmente.
- IV. Repor cálcio e vitamina D.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II, III e IV.
- d) Somente os itens I, III e IV.
- e) Nenhum dos itens.

**20)** No laboratório clínico, os termos sensibilidade e especificidade têm significados alternativos que se aplicam aos exames, e os diferentes usos desses termos podem causar confusão. Sobre esse assunto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A especificidade analítica pode se referir à menor concentração detectável do analito, que pode ser medida com alguma certeza definida.
- ( ) A métrica comumente usada para um exame laboratorial segue especificamente a sensibilidade, sendo a especificidade duvidosa quanto a sua versão de certeza.
- ( ) A especificidade analítica se refere à extensão em que outras substâncias, no sistema do exame, interferem com a medida do analito de interesse.

- a) C - C - E.
- b) E - E - E.
- c) E - E - C.
- d) E - C - C.
- e) C - E - E.

**21)** Sobre a vacina BCG, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Protege contra formas graves de tuberculose.
- ( ) Pode ser aplicada em gestantes e pessoas imunodeprimidas, sem contraindicação.
- ( ) A criança exposta ao HIV, que chega ao serviço ainda não vacinada, poderá receber a vacina se assintomática e sem sinais de imunodepressão.
- ( ) A partir dos 5 anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem receber a vacina.

- a) C - C - E - E.
- b) E - E - C - E.
- c) C - E - C - C.
- d) E - C - E - C.
- e) E - E - E - E.

**22)** Em relação à abordagem da hematúria, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A presença de eosinófilos na urina são sugestivos de nefrite intersticial.
- ( ) A presença de cilindros hemáticos é sugestiva de patologia glomerular renal.
- ( ) Não existe nefrite intersticial causada por medicamentos.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.
- e) E - E - E.

**23)** Em conformidade com o Ministério da Saúde, sobre a assistência aos casos de sangramento genital anormal, analisar a sentença abaixo:

*Toda mulher em idade reprodutiva que se apresenta com sangramento uterino deve ser avaliada para gravidez (1ª parte). Sangramentos genitais anormais podem ocorrer por complicações da gravidez, como abortamento, gestação ectópica, sangramento do primeiro trimestre da gravidez e doença trofoblástica gestacional (2ª parte). Na avaliação, também se pode descartar infecções genitais, pois essas não costumam ser causa comum de sangramento genital (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

**24)** De acordo com o Ministério da Saúde, sobre a importância do rastreamento do câncer de mama, analisar os itens abaixo:

- I. Recomenda-se o rastreamento de câncer de mama bianual, por meio de mamografia, para mulheres entre 50 e 69 anos.
- II. A decisão de começar o rastreamento bianual com mamografia antes dos 50 anos deve ser uma decisão individualizada, levando em consideração o contexto da paciente, os benefícios e os malefícios.
- III. O câncer de mama, quando identificado em estágios iniciais, apresenta prognóstico mais favorável e a cura pode chegar a 100%.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.
- e) Nenhum dos itens.

**25)** De acordo com o Ministério da Saúde, sobre as intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Abortamento.
- (2) Gravidez ectópica.
- (3) Hiperemese gravídica.
- (4) Mola hidatiforme.

- ( ) Caracteriza-se pela degeneração trofoblástica ocorrida após uma gestação tópica ou ectópica.
- ( ) É a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou quando o conceito pesa menos de 500g. Pode ser espontâneo ou provocado.
- ( ) Caracteriza-se por vômitos contínuos e intensos que impedem a alimentação da gestante, ocasionando desidratação, oligúria, perda de peso e transtornos metabólicos, com alcalose (pela perda maior de cloro, acarretando hipocloremia, perda de potássio e alterações no metabolismo das gorduras e dos carboidratos).
- ( ) Corresponde à nidação do ovo fora da cavidade uterina, sendo mais frequente a prenhez tubária na sua porção ampular.

- a) 1 - 3 - 2 - 4.
- b) 4 - 1 - 3 - 2.
- c) 2 - 1 - 4 - 3.
- d) 1 - 2 - 3 - 4.
- e) 3 - 2 - 4 - 1.

**26)** Frequentemente, durante a consulta médica, os pacientes queixam-se de dor abdominal. O principal desafio é realizar uma avaliação clínica que permita distinguir os quadros abdominais agudos que requerem cirurgia daqueles que podem ser tratados clinicamente em regime ambulatorial. Sendo assim, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A distensão abdominal é determinada pela contração das fibras musculares lisas intestinais e pelo aumento do conteúdo intraluminal por exsudação ou acúmulo de gases e secreções digestivas.
- b) Quando existe anorexia, descarta-se de imediato a possibilidade de diagnóstico inflamatório e/ou infecção abdominal.
- c) A dor de parede abdominal, muitas vezes esquecida, deve ser suspeitada quando a dor se altera com a alimentação ou evacuação, acompanhada de náuseas, vômitos ou diarreia.
- d) A dor abdominal recorrente ou constante se relaciona, frequentemente, com hérnias da parede abdominal, hematomas de parede abdominal, aprisionamento do nervo do reto ou cutâneo lateral torácico, herpes-zoster ou dor miofascial.
- e) A dor abdominal cólica com pirose, logo após a ingestão de alimentos, sugere úlcera gástrica, desde que o paciente refere fazer uso prolongado de ácido acetilsalicílico.

**27)** Sobre as três principais causas de vulvovaginites assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Salpingite, tricomoníase e *Gardnerella vaginalis*.
- b) Vaginite, candidíase e *Gardnerella vaginalis*.
- c) Salpingite, candidíase e *Staphylococcus pyógenes*.
- d) Vaginite bacteriana, *Staphylococcus agalactiae* e candidíase.
- e) Vaginose bacteriana (VB), candidíase e tricomoníase.

**28)** A incontinência urinária (IU) é a queixa de perda involuntária de urina. Com etiologia multifatorial, é elemento gerador de exclusão social, interferindo na saúde física e mental da paciente e comprometendo sua qualidade de vida. Em relação ao exposto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A IU é a soma de fatores de um processo natural que vão danificando e enfraquecendo o assoalho pélvico ao longo dos anos.
- ( ) A IU é mais comum em mulheres, por apresentarem menor comprimento uretral e maior chance de dano musculofascial durante a gestação e o parto.
- ( ) A obesidade é o mais importante fator de risco; obesas têm três vezes mais risco de IU do que as não obesas, particularmente na IU de esforço.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) C - C - C.
- e) E - E - E.

**29)** A partir da publicação do protocolo 076, pelo Ministério da Saúde, tornou-se fundamental o oferecimento do teste de anti-HIV para todas as gestantes, a fim de possibilitar a diminuição da transmissão materno-fetal do HIV. Em relação ao manejo da equipe de saúde com a gestante HIV-soropositiva, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O uso de zidovudina (ZDV) durante a gestação, durante o parto e para o recém-nascido (RN) por 6 semanas reduz significativamente a taxa de transmissão materno-fetal do vírus da imunodeficiência humana (HIV).
- ( ) As gestantes cujos resultados forem reagentes para o HIV devem ser encaminhadas para o pré-natal em serviços especializados em acompanhamento de gestantes HIV-soropositivas.
- ( ) A notificação da sorologia positiva para HIV em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV é obrigatória.

- a) C - C - E.
- b) C - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.
- e) E - E - E.

**30)** Em relação à sífilis congênita, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O \_\_\_\_\_ é o exame de escolha para o rastreamento e acompanhamento do tratamento e das recidivas ou reinfeções da sífilis. A(O) \_\_\_\_\_ é o medicamento que previne a sífilis congênita.

- a) hemograma | Glibenclamida
- b) FSH | Budesonida
- c) estradiol | Captopril
- d) SHGB | Sertralina
- e) VDRL | Penicilina

**31)** Em relação aos marcadores de hepatite B, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A presença de \_\_\_\_\_ por mais de seis meses é indicativa de hepatite B crônica.

- a) Anti-HCV
- b) HBsAg
- c) Anti-HAV
- d) Anti-HBs
- e) Anti-HDV IgM

**32)** A pesquisa sorológica de anticorpos das classes imunoglobulina G (IgG) e imunoglobulina M (IgM), específica para toxoplasmose, é a chave para o diagnóstico, devendo ser solicitada na primeira consulta de pré-natal. Em relação ao diagnóstico da toxoplasmose na gestação, analisar os itens abaixo:

- I. A presença de IgM reagente, com ou sem valores crescentes de IgG, sugere infecção recente e requer investigação adicional.
- II. A presença de IgG reagente e IgM não reagente, durante o primeiro ou o segundo trimestres da gestação, não indica infecção crônica, com contaminação prévia à gestação.
- III. Se ambos os testes, IgG e IgM, são não reagentes, significa que não há infecção, e o exame deve ser repetido trimestralmente.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Nenhum dos itens.

**33)** Sobre o climatério, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) No climatério pré-menopáusicos, os folículos, apesar de se manterem em número reduzido, respondem bem aos estímulos hipofisários.
- b) Existem evidências de que as mulheres vegetarianas e subnutridas podem apresentar um atraso na menopausa em relação à população em geral.
- c) Após a menopausa, a hipófise, estimulada pelo GnRH, libera maiores quantidades de FSH e LH na tentativa de induzir os ovários a uma adequada produção de estradiol.
- d) O climatério se manifesta de forma tangencial, desde que a perda da função reprodutora modifique a excreção de estrógenos e estradiol, porém, mantém a funcionalidade integral e constante de diferentes órgãos e sistemas.
- e) Os níveis de progesterona na mulher menopáusicas provêm, em sua maior parte, da conversão de estrógenos em estrona nos tecidos gorduroso, hepático e muscular.

**34)** Sobre a sífilis (LUES), analisar os itens abaixo:

- I. Na fase primária, surge a pápula no local da inoculação, evoluindo à úlcera superficial (cancro duro), indolor, com bordos endurecidos e fundo limpo, geralmente com linfadenopatia local, indolor e não supurativa (bubão sífilítico).
- II. Queda de pelos, alopecia difusa ou em clareiras e madarose são também características da fase primária. Manifestações mais comuns incluem irite, uveíte anterior, artrite, hepatite, glomerulonefrite, síndrome nefrótica e alterações neurológicas (inclusive meningite).
- III. A identificação direta do *Treponema* em lesões de pele, por meio de microscopia de campo escuro, é o método mais rápido e fácil de detectar as formas primária e secundária (sensibilidade de 75%). Os testes não treponêmicos apresentam elevadas sensibilidade e especificidade, sendo o VDRL o mais usado.
- IV. Todos os pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV devem ser testados para sífilis; porém, nem todo paciente recentemente diagnosticado com sífilis deve ser testado para infecção pelo HIV.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, II e IV.
- d) Somente os itens I, III e IV.
- e) Todos os itens.

**35)** O tratamento da bacteriúria assintomática está indicado após remoção de cateter vesical presente por:

- a) Menos de 5 dias e gestação.
- b) Mais de 5 dias e lactação.
- c) Menos de 7 dias e gestação.
- d) Mais de 7 dias e lactação.
- e) Menos de 7 dias e lactação.

**36)** No Brasil, já existem alguns milhares de alvarás de autorização judicial para a interrupção da gravidez, os quais são concedidos em casos de lesões fetais incompatíveis com a vida extrauterina. Nesse sentido, existem métodos terapêuticos fetais para evitar más formações. Sobre a terapêutica fetal, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Cianocobalamina para alcalose metilmalônica, a partir de 12 semanas.
- b) Ácido fólico para tratar e evitar infecções do tubo neural, periconcepcional.
- c) Prednisona, ácido acetilsalicílico e heparina para perdas gestacionais de repetição por presença de anticorpo lúpus anticoagulante, a partir do diagnóstico.
- d) Evitar amniocentese e o uso de tiroxina no bócio congênito (ultrassonografia).
- e) Dexametasona para hiperplasia congênita da suprarrenal, a partir da 30ª semana.

**37)** Sobre o pós-operatório da cistoscopia, é CORRETO afirmar que:

- a) A cistoscopia em consultório não requer cuidados pós-operatórios específicos, exceto antibioticoterapia profilática.
- b) Na cistoscopia operatória, o paciente não corre risco de sofrer hematúria, porém, pode haver distúrbios hematológicos como a anemia sintomática.
- c) Nos casos com cateter ureteral em longo prazo, as possíveis complicações são oligúria e hematúria seguida de provável sepse.
- d) A cistoscopia em consultório requer cuidados pós-operatórios específicos e antibioticoterapia profilática.
- e) Na cistoscopia operatória, quando ocorre hematúria, geralmente permanece tal episódio por uns 30 dias, já que o antibiótico deve surtir efeito nesse período de tempo, com possível resolução sintomática.

**38)** A indução do parto tem por objetivo o término da gestação via vaginal, através da estimulação das contrações uterinas antes do início espontâneo de trabalho de parto (TP). Está indicada em situações nas quais aguardar o trabalho de parto espontâneo resultaria em riscos maternos ou fetais. Sobre essas situações, analisar os itens abaixo:

- I. Gestação com 41 semanas ou mais.
- II. Ruptura prematura de membranas.
- III. Diabetes melito/gestacional.
- IV. Morte fetal.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e III.
- b) Somente os itens II e IV.
- c) Somente os itens I, II e III.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

**39)** Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*Endometriose é definida como a presença de glândulas endometriais e estroma \_\_\_\_\_ da cavidade uterina, em um meio caracterizado por dependência estrogênica e \_\_\_\_\_. Atinge, aproximadamente, 10% das mulheres em idade reprodutiva, sendo causadora de \_\_\_\_\_ e dor pélvica crônica (DPC).*

- a) dentro | inflamação | fertilidade
- b) fora | inflamação | infertilidade
- c) fora | infecção | infertilidade
- d) fora | inflamação | fertilidade
- e) dentro | infecção | infertilidade

**40)** Em relação ao distúrbio menstrual na adolescência, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

\_\_\_\_\_ caracteriza-se por sangramento com duração superior a 7 dias, fluxo superior a 80mL/ciclo (mais de 6 absorventes ou tampões cheios/dia), com intervalo inferior a 24 dias ou superior a 45 dias, sangramento intermenstrual ou pós-relação sexual.

- a) Coqueluche
- b) Endometriose
- c) Sangramento Uterino Anormal (SUA)
- d) Sarcoidose
- e) Neoplasma