

REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 2023

# Enfermagem

Caderno de questões • Instruções Gerais

- Confira o material recebido (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal da sala.
- Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS, assine no local indicado.
- Este caderno contém **80 questões** com quatro alternativas (A, B, C e D).

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Conhecimentos Básicos	30
Conhecimentos Específicos	50

- Preencha o CARTÃO DE RESPOSTAS, único documento válido para a correção, com bastante atenção, à caneta esferográfica de tinta azul ou preta, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique, no CARTÃO DE RESPOSTAS, as instruções para preenchimento. Não serão aceitas rasuras, emendas ou marcação em campo inapropriado para as respostas. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a realização da prova, estão vedados o empréstimo de materiais, a comunicação entre candidatos ou terceiros, a utilização de quaisquer dispositivos ou aparelhos eletrônicos, como máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 4 horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de questões **após 1 hora** contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

**Boa Prova!**

**Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.**

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂ Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>
51	<input type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>
61	<input type="checkbox"/>	62	<input type="checkbox"/>	63	<input type="checkbox"/>	64	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	66	<input type="checkbox"/>	67	<input type="checkbox"/>	68	<input type="checkbox"/>	69	<input type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/>
71	<input type="checkbox"/>	72	<input type="checkbox"/>	73	<input type="checkbox"/>	74	<input type="checkbox"/>	75	<input type="checkbox"/>	76	<input type="checkbox"/>	77	<input type="checkbox"/>	78	<input type="checkbox"/>	79	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>

---

**CONHECIMENTOS BÁSICOS**

---

**1)** Conforme a Constituição Federal, ao Sistema Único de Saúde, compete, entre outras atribuições:

- I. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- III. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

---

**2)** O conjunto de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, oferecido pelo SUS à população, para atender à integralidade da assistência à saúde, compreende o que o Decreto nº 7.508/2011 define como:

- a) Mapa da Saúde.
- b) RENAME.
- c) RENASES.
- d) Contrato Organizativo.

---

**3)** Após a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990, que instituíram o SUS e o controle social, o designado “modelo biomédico” tem influenciado a formação profissional, a organização dos serviços e a produção de conhecimentos em saúde. Sobre esse modelo, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Infelizmente, esse modelo foi negado pelos serviços de saúde, já que seus benefícios não garantiam o alívio da dor e o tratamento de diversas doenças que afligiam a humanidade, em geral.
- b) A emergência desse modelo está associada à publicação do Relatório de Chagas, em 1910, na Suécia, que criticava a situação das escolas médicas no Sul do Canadá.
- c) A hegemonia do modelo biomédico passa, também, a gerar um movimento de críticas que assume relevância internacional a partir dos anos de 1970, as quais também se expressam no Brasil.
- d) Esse modelo lidera a ênfase em análise do processo saúde-doença, orientação para a demanda espontânea, a proximidade dos aspectos culturais, implicados nas escolhas e vivências dos sujeitos e a possibilidade única desse, de compreender a multidimensionalidade do ser humano.

**4)** Com a Constituição da República Federativa de 1988, a saúde, no Brasil, passou a ser reconhecida como um direito social. Assim, a proposta do Sistema Único de Saúde (SUS) está vinculada a uma ideia central, a de que:

- a) A saúde é uma questão de polícia sanitária.
- b) Todas as pessoas têm direito à saúde.
- c) O direito à saúde não está vinculado à condição de saúde.
- d) Decisões sobre o SUS devem ser centralizadas em Brasília.

---

**5)** Considerando-se a Política Nacional de Atenção Básica - Ministério da Saúde, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo, EXCETO:

- a) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família pelos serviços estaduais de saúde como tática secundária de expansão, consolidação e qualificação da atenção básica à saúde.
- b) Divulgar as informações e os resultados alcançados pela atenção básica.
- c) Contribuir com o financiamento tripartite da atenção básica.
- d) Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a atenção básica.

---

**6)** Considerando-se a Portaria nº 825/2016, o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) tem como objetivos, entre outros:

- I. Aumento da demanda por atendimento hospitalar.
- II. Aumento do período de permanência de usuários internados.
- III. Humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**7)** A atenção primária à saúde passou por profundas transformações. Nos anos 1980, previamente à implantação do SUS, não existia uma política nacional de atenção primária com segmentação de coberturas e fragmentação da assistência do seguro social. Nesse sentido, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Os trabalhadores bancários eram atendidos pelo FUNTB, onde se priorizava a assistência curativa e ambulatorial.
- b) Em áreas urbanas e centrais das regiões norte e nordeste, pequenas unidades mistas da Fundação SESP ofertavam alguns serviços para o controle de endemias.
- c) Muitos municípios prestavam serviços de saúde, em geral, serviços de prevenção, que seguiam protocolos de controle de danos e de urgência. Existiam médicos generalistas em medicina de família e comunidade.
- d) Os trabalhadores rurais eram parcialmente cobertos pelo FUNRURAL, por meio da contratação de terceiros, geralmente hospitais filantrópicos.

**8)** Quanto às Redes de Atenção à Saúde (RAS), assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*As RAS são sistematizadas para responder a condições específicas de saúde, por meio de um ciclo completo de atendimentos, que implica a continuidade e a integralidade da atenção à saúde nos níveis Atenção Primária, Secundária e Terciária. Devem ter foco na \_\_\_\_\_, de forma integral, por meio de serviço contínuo de cuidados que visem prioritariamente à \_\_\_\_\_ da saúde.*

- a) doença | recuperação
- b) redução dos riscos | reabilitação
- c) população | promoção
- d) quimioprofilaxia | proteção

**9)** Devido a diversos fatores, como a dificuldade de acesso às unidades de saúde, o tratamento da Leishmaniose Tegumentar Americana muitas vezes é descontinuado. Sendo assim, o tratamento irregular por abandono se considera quando:

- a) O paciente não compareceu à unidade de saúde em até 30 dias após o 3º agendamento para avaliação. O 3º agendamento refere-se ao 3º mês após o término do esquema terapêutico.
- b) O paciente recebeu dois esquemas terapêuticos regulares sem apresentar remissão clínica.
- c) O indivíduo utilizou 20mg de antimoniato de N-metil glucamina entre 30 e 40 dias, não ocorrendo intervalo superior a 72 horas entre as doses.
- d) Se ultrapassa o tempo previsto para um tratamento regular ou para o qual tenha ocorrido um intervalo superior a 72 horas entre as doses.

**10)** Sobre a Vigilância em Saúde, é CORRETO afirmar que:

- a) As ações de vigilância epidemiológica estão relacionadas com o controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza e medicamentos.
- b) A vigilância ambiental se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde.
- c) As ações de vigilância epidemiológica estão relacionadas com o reconhecimento das doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos.
- d) As ações da vigilância do trabalho estão relacionadas com a realização de estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

**11)** A análise dos riscos/benefícios diante a administração de vacinas vivas é muito importante. Nesse sentido, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A vacina antitetânica é, provavelmente, a vacina que induz a mais completa resposta imunológica entre as vacinas atuais.
- b) Uma vez que a vacina oral contra poliomielite promove infecção semelhante à provocada pelo poliovírus selvagem, há desenvolvimento restrito à imunidade humoral.
- c) A necessidade da administração de imunoglobulinas (imunização passiva) é, muitas vezes, decorrente de falhas no acompanhamento do calendário vacinal, tais como no caso de diarreias sanguinolentas (enterocolite) ou acidentes com material biológico (HIV).
- d) Especificamente no caso de pessoas com infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), são administradas vacinas contra febre amarela, tríplice viral e contra varicela, quando necessário, após avaliação do perfil imunológico (CD4/CD8).

**12)** Tendo em vista as diretrizes operacionais da Estratégia Saúde da Família, analisar os itens abaixo:

- I. Percebe-se que o processo de trabalho presente nessa dinâmica requer uma flexibilização das atuações de todos os profissionais de saúde, os quais necessitam desenvolver habilidades e instrumentos gerenciais que agilizem as decisões a serem tomadas.
- II. Novos conceitos e formas de abordagem são discutidos a partir da organização do processo de trabalho das equipes de saúde da família, devendo se estender aos demais trabalhadores de saúde, o que pressupõe a realização de um trabalho integrado entre eles e a comunidade, passível de flexibilização.
- III. Corroborando com a lei do exercício profissional, nos serviços de saúde, preconiza-se que todo usuário deve ser acolhido pelo enfermeiro durante todo o cuidado/assistência na unidade de saúde. Essa diretriz revela que o acolhimento é uma ação específica da Enfermagem.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Todos os itens.

**13)** A respeito da priorização da importância do rastreamento da obesidade na prática e controle de saúde, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O rastreamento é importante porque a obesidade está relacionada a Alzheimer, hipertensão arterial, diabetes gestacional, alguns tipos de câncer e apneia do sono.
- b) O rastreamento se faz por meio de um questionário livre e esclarecido e laboratório/exame de sangue, buscando sinalizar e acompanhar por seis meses os valores de colesterol total e triglicérides.
- c) O rastreamento da obesidade se faz por meio do cálculo do índice de massa corpórea (IMC), que corresponde ao peso (kg) dividido sobre a altura (metros) ao quadrado.
- d) O valor do IMC é dividido nas seguintes categorias: IMC 18-25 é classificado como sobrepeso; IMC > 25 é classificado como obesidade. Esse item é subclassificado em: grau I (IMC 25-34,9), grau II (IMC: 35-39,9) e grau III > 40.

**14)** Ao analisar as taxas de mortalidade por câncer na população brasileira, observa-se que o câncer do cólon e reto se encontra entre as cinco localizações primárias mais frequentes. Sendo assim, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A maioria deles evolui a partir de lesões malignas, como os pólipos adenomatosos.
- b) A probabilidade de um pólipo adenomatoso se transformar em um câncer está correlacionada ao seu tamanho. Pólipos com menos de 1cm dificilmente evoluem para câncer. Logo, aqueles com 1cm ou mais são o alvo do rastreamento para esse câncer.
- c) Até o momento, a principal estratégia de rastreamento para o câncer de cólon e reto é a utilização da pesquisa de sangue oculto nas fezes em indivíduos de 25 a 55 anos.
- d) O estudo de sangue oculto nas fezes é um exame invasivo, de alta complexidade, fácil realização e baixo custo, cuja sensibilidade varia dependendo do método utilizado (guáico ou imunológico).

**15)** A respeito dos dispositivos para os serviços de saúde, segundo a Política Nacional de Humanização, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Ambiência.
- (2) Grupo de trabalho de humanização.
- (3) Gestão e formação no processo de trabalho.

- ( ) Compreender situações no cotidiano do serviço de trabalho para propor ações de mudança.
- ( ) Adequar o ambiente à cultura local, respeitando a privacidade de maneira acolhedora e confortável.
- ( ) Constitui-se por pessoas interessadas em discutir os serviços prestados, a dinâmica das equipes de trabalho e as relações entre usuários e profissionais.

- a) 3 - 1 - 2.
- b) 2 - 1 - 3.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 1 - 2 - 3.

**16)** De acordo com a Portaria GM/MS nº 4.279/2010, que institui as Redes de Atenção à Saúde no SUS, é possível identificar seis características importantes e inerentes à sua matriz conceitual. Quando se discute que ações, serviços e programações em saúde devem basear-se no diagnóstico da população adscrita à equipe de saúde, estamos nos referindo a(à):

- a) Formar relações horizontais.
- b) Atenção Primária entre os diferentes pontos de atenção.
- c) Ofertar atenção contínua e integral.
- d) Planejar e organizar as ações segundo as necessidades de saúde de uma população específica.

**17)** A bioética discute e critica publicamente os saberes éticos na área da medicina e saúde. Sendo assim, a chamada Trindade Bioética é composta por:

- a) Autonomia, simplicidade e segurança.
- b) Beneficência, autonomia e justiça.
- c) Justiça, caráter e poder.
- d) Justiça, fé e segurança.

**18)** Índices, coeficientes, taxas e indicadores são medidas em saúde que têm o objetivo de mensurar a ocorrência de doenças na população. Considerando-se o assunto, assinalar a alternativa que define o termo “taxas”:

- a) Termo genérico apropriado para referir-se a todos os descritores da vida e da saúde e inclui todos os termos numéricos existentes e incidentes que trazem a noção de grandeza.
- b) Medidas secundárias que, ao serem geradas pelos quocientes entre medidas primárias de variáveis independentes, deixam de sofrer influência dessas variáveis para expressar somente a intensidade dos riscos de ocorrência.
- c) São medidas de risco aplicadas para cálculos de estimativas e projeções de incidências e prevalências em populações de interesse.
- d) São os índices críticos capazes de orientar a tomada de decisão em prol das evidências ou providências.

**19)** Sobre o direito ao sigilo da pessoa que vive com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), é CORRETO afirmar que:

- a) O atendimento nos serviços de saúde, públicos ou privados, será organizado de forma a não permitir a identificação, pelo público em geral, da condição de pessoa que vive com infecção pelo HIV.
- b) O sigilo é de extrema importância. Mesmo quando o indivíduo pretende casar, o médico deve respeitar esse silêncio do portador, já que não há risco de perigo eminente. A legislação protege e se mostra em legítima defesa do profissional.
- c) Uma vez detectado o HIV em um doador de sangue, é necessário levantar suas possíveis doações anteriores. Porém, nem toda doação pode ser revista retrospectivamente, já que o indivíduo pode optar pelo sigilo e assim não se pode investigar antecedentes. Esse sigilo garante que se mantenha a privacidade do portador de HIV prevista na legislação.
- d) A obrigatoriedade de preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelo HIV, usuária dos serviços de saúde, é relativa e não recai sobre todos os profissionais de saúde.

**20)** A epidemiologia congrega métodos e técnicas de três áreas principais de conhecimento: estatística, ciências biológicas e ciências sociais. Conhecer os conceitos inerentes a ela é fundamental para compreender o processo saúde-doença. Nesse sentido, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

*A taxa de \_\_\_\_\_ é mais utilizada para doenças crônicas de longa duração, como hanseníase, tuberculose, AIDS e diabetes. Faz referência ao número total de casos de uma doença, novos e antigos, existentes em um determinado local e período.*

- a) prevalência
- b) morbidade
- c) cronicidade
- d) incidência

**21)** A respeito do tratamento para hanseníase, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Apesar de não ter cura, o tratamento estará concluído com quatro doses de dapsona 50mg supervisionadas em até 12 meses; na 4ª dose, os pacientes deverão ser submetidos ao exame dermatológico e à avaliação neurológica simplificada e do grau de incapacidade física, antes de receber alta.
- b) No tratamento de crianças com hanseníase, deve-se considerar a idade como fator mais importante do que o peso corporal.
- c) Em crianças com peso superior a 30kg, deve-se utilizar o mesmo tratamento prescrito para adultos.
- d) Os pacientes deverão ser orientados para retorno imediato à unidade de saúde em caso de aparecimento de lesões de pele e/ou de dores nos trajetos dos nervos periféricos e/ou piora da função sensitiva e/ou motora, mesmo após a alta por cura.

**22)** Sobre a diferença entre pandemia, epidemia e endemia, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*\_\_\_\_\_ é a elevação brusca, inesperada e temporária da incidência de determinada doença, ultrapassando os valores esperados para a população no período em questão. \_\_\_\_\_ refere-se a uma doença habitualmente presente entre os membros de um determinado grupo, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período de tempo ilimitado.*

- a) Epidemia | Endemia
- b) Endemia | Pandemia
- c) Pandemia | Epidemia
- d) Endemia | Epidemia

**23)** Sobre a investigação epidemiológica, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) É um trabalho de campo, realizado a partir de casos notificados, desde que sejam clinicamente declarados.
- b) Um dos principais objetivos é a determinação das características epidemiológicas fundamentais.
- c) Confirmar o diagnóstico é um de seus objetivos.
- d) O propósito final é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos.

**24)** A Infecção Relacionada à Assistência em Saúde (IRAS) é definida como qualquer infecção adquirida enquanto a pessoa está internada no hospital, podendo se manifestar ainda durante a internação, ou após a alta, desde que seja relacionada com a internação ou com os procedimentos realizados no hospital. A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de IRAS de grande potencial preventivo, visto que a maioria é decorrente de:

- a) Colapso renal.
- b) Deambulação precoce.
- c) Cateterização vesical.
- d) Aplicação de calor na região.

**25)** O paciente que é internado tem o risco de adquirir uma infecção no hospital, também chamada infecção nosocomial. É uma medida que contribui para a prevenção da transmissão de microrganismos decorrentes da principal via de transmissão durante a assistência prestada aos pacientes:

- a) Higienização das mãos.
- b) Tratamento medicamentoso.
- c) Vacinação.
- d) Controle biológico.

**26)** No campo da vigilância sanitária, a ocorrência de um agravo acima dos índices endêmicos (esperados), decorrente de infecção ou colonização, em local delimitado e inter-relacionado (tempo/espaço), é classificada como:

- a) Surto.
- b) Pandemia.
- c) Patologia.
- d) Prevalência.

**27)** Considerando-se os marcos do desenvolvimento histórico da organização sanitária que antecedeu o SUS, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*No âmbito da medicina previdenciária, em 1977, foi criado o \_\_\_\_\_ que sucedeu o \_\_\_\_\_.*

- a) IPASE | INAMPS
- b) INAMPS | INPS
- c) INSS | INAMPS
- d) IAPS | INPS

**28)** Entre os princípios do HumanizaSUS, está(ão):

- I. Transversalidade.
- II. Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- III. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**29)** Durante o ano de 2021, um município notificou 270 casos de dengue, dos quais 250 foram confirmados após resultado do exame sorológico. Sabendo-se que o município tem um total de 2.500 habitantes, qual a incidência dessa doença para o referido ano?

- a) 10 casos/100 habitantes.
- b) 10,8 casos/100 habitantes.
- c) 15 casos/100 habitantes.
- d) 20 casos/100 habitantes.

**30)** A respeito da bioética nos serviços de saúde pública, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O profissional de saúde deve manter uma postura "paternalista", mostrando que ele é superior ao paciente por deter um conhecimento técnico especializado.
- b) Qualquer pessoa tem direito ao sigilo das informações obtidas durante um atendimento na saúde. A confidencialidade das informações é tanto um dever do profissional da saúde como um direito do paciente.
- c) O tratamento das doenças tem valor superior ao valor do doente.
- d) O profissional deve manter uma postura de distanciamento do paciente, utilizando a tecnologia para mediar as suas interações.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

---

**31)** Os anestésicos gerais inalatórios podem ser administrados na indução e na manutenção da anestesia, sob a forma de líquidos voláteis e gases. Considerando-se os fármacos anestésicos e seus efeitos sobre o organismo, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Halotano.
  - (2) Isoflurano.
  - (3) Óxido nitroso.
- ( ) Hipnótico fraco. A maior concentração possível a ser administrada é 70% em oxigênio (provoca inconsciência).
- ( ) Reduz o metabolismo cerebral e a pressão intracraniana e não é convulsivante.
- ( ) Potente hipnótico. Possibilita alteração rápida da profundidade anestésica.
- ( ) É broncodilatador, podendo ser usado em pacientes asmáticos.

- a) 1 - 2 - 3 - 2.
- b) 3 - 2 - 1 - 1.
- c) 2 - 3 - 2 - 3.
- d) 2 - 1 - 3 - 2.

---

**32)** Os fármacos do grupo dos ansiolíticos e hipnóticos são depressores do Sistema Nervoso Central (SNC), atuando na neurotransmissão sináptica inibitória, mediada pelo neurotransmissor GABA (ácido gama-amino-butírico); têm alto índice terapêutico, mas em altas doses podem causar perda da consciência, parada respiratória e cardiovascular. Sobre os cuidados de enfermagem na monitoração dos efeitos colaterais nos pacientes em uso de algum desses fármacos, analisar os itens abaixo:

- I. Monitorar frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial com maior constância: a cada 2 horas.
- II. Ficar atento à apneia e à dessaturação.
- III. Monitorar os pacientes idosos, que apresentam maior risco de intoxicação e efeitos colaterais: distúrbio de comportamento, ataxia, tontura, que aumentam o risco de quedas e fraturas.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**33)** A pressão venosa central (PVC) é uma medida hemodinâmica muito frequente na UTI, determinada pela interação entre volume intravascular, função do ventrículo, tônus vasomotor e pressão intratorácica. A respeito desta medida e de seus mecanismos de ação, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O principal propósito de mensurar a PVC é estimar a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo.
- ( ) Em pacientes com reserva cardíaca e resistência vascular pulmonar normal, ela ajuda no manuseio hemodinâmico global.
- ( ) As principais vias de acesso usadas são a braquial, a subclávia e a jugular.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

---

**34)** Glasgow Coma Scale (GCS), conhecida em português como Escala de Glasgow, é uma escala neurológica desenvolvida na década de 1970 que possibilita avaliar o nível de consciência de um indivíduo que tenha sofrido um traumatismo cranioencefálico (TCE) e em pacientes críticos com disfunção do sistema nervoso central, choque ou outros fatores que deprimam o nível de consciência. Em relação ao uso e interpretação da Escala de Glasgow, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Mede três parâmetros: a abertura ocular, a resposta motora e a resposta verbal.
- b) É utilizada somente após 72 horas do trauma.
- c) O valor mais baixo que pode se obter na Escala de Glasgow é 15.
- d) Na forma de avaliar como o paciente abre os olhos, a pontuação pode ir de 4 (se o paciente não responder) até 9 (se a abertura ocular ocorrer de forma espontânea).

**35)** Em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, é muito comum a alimentação por sonda gástrica (gavagem). Essa é uma técnica de administração de dieta usando a força da gravidade. Sobre os cuidados de enfermagem ao administrar dietas em recém-nascidos (RN) por gavagem, analisar os itens abaixo:

- I. Elevar a cabeceira, colocar o RN em posição de semi-fowler, para evitar o refluxo do conteúdo gástrico através do esôfago.
- II. Adaptar a seringa de 3ml à sonda e aspirar o conteúdo gástrico. Observar se existe resíduo no estômago. Devolver somente quando este ultrapassar 60% do volume da dieta e descontar.
- III. Adaptar a seringa à sonda e deixá-la fluir pela ação da gravidade. Lembrando que introduzir o volume da dieta pressionando o êmbolo da seringa pode provocar refluxo e promover o estímulo vagal, o que acarreta taquicardia, queda de saturação de oxigênio, queda de PaO<sub>2</sub> (pressão parcial de O<sub>2</sub>), taquipneia, apneia e alteração da perfusão.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**36)** Uma das causas mais frequentes dos elevados índices de morbidade e mortalidade nas UTIs é, indiscutivelmente, a infecção. O paciente grave hospitalizado em UTI fica constantemente exposto a diversos riscos que podem contribuir para agravar muito seu estado de saúde. A respeito dos fatores que favorecem as infecções nas UTIs, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) As más condições gerais do paciente, que desencadeiam a diminuição das defesas orgânicas, favorecem, de modo significativo, a disseminação de patógenos.
- ( ) As mudanças na constituição da flora normal do organismo, resultado da gravidade do estado do paciente, assim como a contaminação gerada pelos microrganismos encontrados no meio ambiente hospitalar, favorecem a instalação de processos infecciosos.
- ( ) As pneumonias associadas à assistência à saúde são normalmente de origem aspirativa, com mais frequência relacionadas a microaspirações silenciosas de secreções de vias aéreas superiores, material exógeno contaminado e refluxo gástrico.

- a) C - C - C.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

**37)** O sistema renal e urinário é formado por dois rins, dois ureteres, bexiga urinária e uretra. Juntas, todas essas estruturas anatômicas e funcionais auxiliam na remoção de substâncias não desejáveis ao organismo. O enfermeiro realiza a avaliação do sistema urinário e renal por meio da entrevista e do exame físico. Sobre a propedêutica dos rins e da bexiga, analisar os itens abaixo:

- I. Durante a entrevista, o enfermeiro deve investigar os dados que podem auxiliar na elucidação de possíveis queixas abdominais relacionadas à disfunção miccional, como infecção urinária, cólica nefrótica e incontinência urinária.
- II. Dentre os principais achados referentes à disfunção miccional, estão: queimação, dor, urgência ou hesitação para urinar; presença de sangue na urina (hematúria).
- III. É necessário investigar a presença de fatores capazes de desencadear a insuficiência renal, como diabetes, doença renal policística, cálculo renal e doenças cardíacas.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**38)** Um patógeno é qualquer microrganismo capaz de produzir uma doença. Os patógenos e parasitas representam uma ameaça à segurança do paciente, por isso a enfermagem deve estar atenta aos cuidados e às orientações dadas aos pacientes referentes às formas de evitar contaminações. A respeito de alguns patógenos, os meios de transmissão e como evitá-los, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O meio de transmissão mais comum dos patógenos é pelas mãos.
- ( ) O vírus da imunodeficiência humana (HIV), o patógeno que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e o vírus da hepatite B são transmitidos pelo sangue e outros fluidos corporais.
- ( ) É importante ensinar seus pacientes e os cuidadores da família a respeito da importância da higiene das mãos, que deve ser utilizada em todos os aspectos da vida, não só nas práticas de preparação de alimentos ou quando se cuida de um membro doente da família.

- a) C - C - C.
- b) E - E - E.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.



**39)** Considerando-se os distúrbios do volume de líquidos intracelular e extracelular, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

*O distúrbio do volume de líquido, ou \_\_\_\_\_, ocorre quando a perda do volume de líquido extracelular excede o aporte de líquido. Ocorre quando água e eletrólitos são perdidos na mesma proporção em que existem nos líquidos corporais normais; portanto, a razão de eletrólitos séricos-água permanece a mesma.*

- a) hiponatremia
- b) hiperpotassemia
- c) hipovolemia
- d) hipernatremia

**40)** O choque pode ser mais bem definido como uma síndrome clínica que resulta da perfusão tissular inadequada, que cria um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e nutrientes que sustentam a função celular. Os enfermeiros que cuidam de pacientes com choque e daqueles que apresentam risco para choque precisam compreender os mecanismos subjacentes dos diversos tipos de choque. A respeito da visão geral do choque que o enfermeiro deve estar ciente, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) No choque, o adequado fluxo sanguíneo para os tecidos e as células está comprometido. Sem tratamento, essa inadequação resulta em oferta insuficiente de oxigênio e nutrientes, hipoxia celular e morte celular, que progride até a disfunção de órgãos e, por fim, morte.
- ( ) Independentemente da causa inicial do choque, determinadas respostas fisiológicas são comuns a todos os tipos de choque e incluem hipoperfusão dos tecidos, hipermetabolismo e ativação da resposta inflamatória.
- ( ) Muitas das intervenções exigidas no cuidado de pacientes com choque dependem da colaboração próxima com os demais membros da equipe de saúde e da rápida implementação das terapias prescritas. Os enfermeiros estão em posições-chave para identificar os sinais iniciais do choque e prever a terapia rápida.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) C - C - C.

**41)** Um importante princípio subjacente aos cuidados de emergência é que o paciente é rapidamente avaliado, tratado e encaminhado ao ambiente apropriado para os cuidados contínuos. Sobre os princípios dos cuidados de emergência em Pronto-Socorro, analisar os itens abaixo:

- I. Visto que em um Pronto-Socorro diversos pacientes com diversos problemas de saúde - alguns potencialmente fatais, outros não - podem comparecer à instituição simultaneamente, um dos primeiros princípios dos cuidados de emergência é a triagem.
- II. Um sistema de triagem básico e amplamente utilizado durante muitos anos fazia uso de três categorias: emergente, urgente e não urgente.
- III. Os pacientes urgentes apresentavam a mais alta prioridade, os pacientes de emergência apresentavam problemas de saúde sérios, mas não problemas imediata e potencialmente fatais.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**42)** O complexo fenômeno da dor é um estressor do bem-estar físico, emocional e espiritual. Há vários tipos de classificação da dor. Um deles conta com o mecanismo fisiopatológico que causa a dor. Considerando-se os vários tipos de dor, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*A dor \_\_\_\_\_ resulta de um processamento anormal de estímulos sensoriais pelo Sistema Nervoso Central (SNC) ou Sistema Nervoso Periférico (SNP), estando associada a neuropatias diabéticas, neuralgias pós-herpes e outros insultos ao sistema nervoso.*

- a) nociceptiva
- b) neuropática
- c) somática
- d) visceral

**43)** Compreender as mudanças normais do envelhecimento é fundamental para a garantia da prática competente da enfermagem gerontológica. Considerando-se as mudanças relativas ao envelhecimento e às ações de enfermagem, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Redução do líquido intracelular.
  - (2) Motilidade esofágica e gástrica menor, menos ácido gástrico.
  - (3) Débito cardíaco e volume sistólico menores; maior resistência periférica.
- ( ) Estimular entre cinco e seis refeições menores em lugar de três maiores.
- ( ) Evitar desidratação, assegurando ingestão hídrica de, no mínimo, 1.500mL ao dia, a menos que haja contraindicação.
- ( ) Possibilitar descanso entre as atividades, procedimentos; admitir a necessidade de maior tempo para que a taxa de calor volte ao normal após estresse sobre o coração, e avaliar a presença de taquicardia, se for o caso.
- ( ) Aconselhar o paciente a não se deitar durante, pelo menos, a primeira hora após as refeições.
- a) 1 - 2 - 3 - 2.  
b) 3 - 2 - 1 - 1.  
c) 2 - 3 - 2 - 3.  
d) 2 - 1 - 3 - 2.

**44)** A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é o método que direciona as ações do enfermeiro no cotidiano da prática profissional, oferecendo estrutura concordante com as necessidades individualizadas do paciente. É reconhecida, portanto, como o principal instrumento para o desempenho sistemático das condições necessárias à realização do cuidado e à documentação da prática de enfermagem. A respeito da SAE em cardiologia, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O diagnóstico de enfermagem “intolerância à atividade” tem como características definidoras as alterações no eletrocardiograma (ECG) refletindo isquemia ou arritmias, desconforto ou dispnéia aos esforços, relato de fadiga ou fraqueza, dentre outras.
- ( ) Alterações de frequência cardíaca, respiratória ou pressão sanguínea, diaforese, dilatação pupilar, gestos protetores são características de “dor aguda” como diagnóstico da SAE em cardiologia.
- ( ) O paciente com diagnóstico de débito cardíaco diminuído pode apresentar ansiedade, inquietação, dispnéia, ortopneia, tosse, taquicardia, palpitações, pulso periférico diminuído, alterações no ECG, mudanças na cor da pele, edema e fadiga.
- a) C - C - C.  
b) E - E - C.  
c) C - E - E.  
d) E - C - C.

**45)** A gasometria arterial é um exame de rotina bastante utilizado nas unidades de terapia intensiva. Uma vez que os recursos para suporte ventilatório são bem difundidos na prática clínica, é necessário fazer o monitoramento dos parâmetros fisiológicos de trocas gasosas e potencial hidrogeniônico (pH) no sangue do paciente. Sobre os dados obtidos na gasometria e as alterações gasométricas, analisar os itens abaixo:

- I. Na gasometria, é possível encontrar dados que mostram desvios do equilíbrio acidobásico, função respiratória e capacidade renal em excretar e reabsorver íons bicarbonato para manter o pH corporal.
- II. São valores de referência para gasometria arterial: pH entre 7,35 a 7,45.
- III. A acidose respiratória ocorre quando o pH for superior a 7,35 e a pressão parcial do gás carbônico (PaCO<sub>2</sub>) menor que 45 mmHg.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**46)** O balanço hídrico (BH) é contabilizado de acordo com as rotinas de cada instituição, sendo recomendável não usar intervalos maiores que 12h para contabilizar os ganhos e as perdas hídricas. Sobre o balanço hídrico, é CORRETO afirmar que:

- a) O saldo final do balanço hídrico após a contagem é positivo, significando que o volume administrado e/ou ingerido foi menor que o eliminado e/ou retirado.
- b) As medidas que serão contabilizadas no BH do paciente devem ser apenas estimadas, pois não é possível fazer um cálculo real dos ganhos e perdas.
- c) O sinal de que o corpo está hipovolêmico corresponde ao saldo total do BH negativo, ou seja, quando as perdas do volume do líquido extracelular (LEC) são maiores que a ingestão ou administração de líquidos.
- d) O saldo final do balanço hídrico após a contagem é negativo, significando que o volume administrado e/ou ingerido foi maior que o eliminado e/ou retirado.

**47)** A pressão arterial invasiva (PAI) permite a leitura dos parâmetros da pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e da pressão arterial média (PAM). Sobre a pressão arterial invasiva, analisar os itens abaixo:

- I. A indicação da PAI é feita a pacientes que recebem infusão de aminas vasoativas, vasodilatadores, vasopressores, inotrópicos ou com instabilidade hemodinâmica, pressões arteriais instáveis ou flutuantes, em casos de emergências hipertensivas e pacientes em estados de choque.
- II. As artérias de primeira escolha para a instalação da PAI são a braquial e a axilar.
- III. São critérios para a seleção da artéria a ser canulada: diâmetro arterial em relação ao diâmetro do cateter, acessibilidade do local, sítio de punção isento de contaminação por secreções corporais e fluxo sanguíneo para o membro distal ao sítio de inserção garantido pela circulação colateral.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**48)** A doença renal, aguda ou crônica, é uma entidade nosológica que pode ser resultado de um processo patológico primário ou uma complicação de doenças subjacentes como o diabetes melito. Sobre a função renal, analisar os itens abaixo:

- I. Insuficiência renal (IR) é a incapacidade de os rins executarem as principais funções de remover escórias metabólicas do corpo ou realizar funções reguladoras.
- II. Insuficiência renal crônica é uma doença de evolução prolongada, insidiosa, podendo ser assintomática, na qual ocorre perda irreversível da função glomerular.
- III. As manifestações clínicas gastrintestinais das disfunções urinária e renal incluem: náuseas, vômito, diarreia, desconforto abdominal e íleo paralítico.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**49)** Considerando-se os exames para investigação de apendicite, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

\_\_\_\_\_ é o sinal de dor à descompressão abdominal brusca do ponto de McBurney. É indicativo de peritonite, geralmente associada à apendicite.

- a) Sinal de Chutro
- b) Sinal de Blumberg
- c) Sinal de Cullen
- d) Sinal de Giordano

**50)** O cateterismo vesical é utilizado no tratamento de retenção urinária aguda ou crônica. Considerando-se o tipo de cateter utilizado e sua indicação, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Cateter de 1 via (sem balonete).
- (2) Cateter de 2 vias (Foley - com balonete).
- (3) Cateter de 3 vias (Foley threeway - com balonete).

- ( ) Cateterismo vesical de alívio.
- ( ) Cateterismo vesical de demora.
- ( ) Cateterismo vesical de demora com irrigação vesical.
- ( ) Controle rigoroso da diurese através de balanço hídrico.

- a) 1 - 2 - 3 - 2.
- b) 3 - 2 - 1 - 1.
- c) 2 - 3 - 2 - 3.
- d) 2 - 1 - 3 - 2.

**51)** A dificuldade da passagem dos alimentos pelo trato digestivo é chamada de:

- a) Disfonia.
- b) Dispneia.
- c) Disfagia.
- d) Disuria.

**52)** O método de administração de medicamentos por via intravenosa (IV) utiliza pequenos volumes (25 a 250ml) de soluções compatíveis infundidas em um intervalo de tempo desejado. É possível administrar a infusão intermitente do medicamento com qualquer um dos seguintes métodos: *piggyback*, administração com controle de volume ou minibombas infusoras. Sobre os cuidados na administração de medicamentos por IV, analisar os itens abaixo:

- I. Nunca administrar medicamentos IV por meio do equipo em uso para infusão de sangue, hemoderivados ou soluções de nutrição parenteral.
- II. Se o sítio do acesso IV do paciente tiver um cateter salinizado, limpar a entrada do cateter usando *swab* com álcool e avaliar a perviedade do dispositivo IV, irrigando com 2 a 3ml de cloreto de sódio.
- III. Avaliar os sintomas do paciente antes de iniciar a terapia medicamentosa.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**53)** O uso de opioides epidurais requer observação criteriosa e cuidados de enfermagem, por isso a maioria das instituições exige treinamento especializado de enfermeiros que aplicam analgesia epidural. Sobre as possíveis complicações da analgesia epidural e os cuidados necessários, analisar os itens abaixo:

- I. O cateter representa uma ameaça à segurança do paciente, em função de sua localização anatômica, seu potencial de migrar pela dura-máter e sua proximidade em relação aos nervos e vasos espinais.
- II. A migração do cateter para o espaço subaracnóide pode produzir altos níveis perigosos de medicação. Entre as complicações frequentes, estão: hipotensão, depressão respiratória, bloqueio motor, retenção urinária, prurido e infecção superficial ao redor do cateter.
- III. Não devem ser administrados opioides complementares nem sedativos no paciente sob anestesia epidural.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**54)** As doenças/infecções sexualmente transmissíveis (DSTs/ISTs) são doenças do sistema genital causadas por microrganismos transmitidos pela relação sexual por via vaginal, anal ou oral. Considerando-se as DSTs, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

\_\_\_\_\_ é uma infecção bacteriana séria e potencialmente muito grave. É muito contagiosa e é de notificação compulsória às autoridades de saúde. Aumenta o risco de Doença Inflamatória Pélvica (DIP), infertilidade, gravidez ectópica. Causada pelo diplococo gram-negativo intracelular aeróbio, a *N. gonorrhoeae*.

- a) Gonorreia
- b) Sífilis
- c) Candidíase
- d) Clamídia

**55)** Sífilis é uma infecção bacteriana complexa e curável, causada pelo espiroqueta *Treponema pallidum*. Sobre a sífilis, analisar os itens abaixo:

- I. É uma doença sistêmica grave que pode levar à incapacidade e morte se não for tratada.
- II. Todas as gestantes devem ser examinadas à procura de sífilis na primeira consulta pré-natal e o exame deve ser repetido no terceiro trimestre.
- III. Os espiroquetas da sífilis penetram rapidamente nas mucosas íntegras ou em lesões microscópicas na pele e, em algumas horas, penetram no sistema linfático e na corrente sanguínea e provocam infecção sistêmica muito antes do aparecimento da lesão primária.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**56)** O conceito de prevenção é parte fundamental da prática de enfermagem comunitária. A respeito da prestação de cuidados de saúde em ambientes comunitários, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Prevenção primária envolve a prevenção da doença ou condição antes que ela ocorra, por meio de atividades de promoção da saúde, proteção ambiental e proteção específica contra a doença ou lesão.
- ( ) A prevenção primária engloba uma vasta gama de áreas, incluindo nutrição, boa higiene, saneamento, imunizações, dentre outras.
- ( ) O papel do enfermeiro é ajudar as pessoas a mudarem seu estilo de vida para alcançar um estado de saúde ideal e evitar doenças.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) C - C - C.

**57)** Os modos de transmissão de uma infecção variam de acordo com o agente infeccioso, e alguns agentes podem ser transmitidos por mais de uma via. Na cadeia epidemiológica, o modo de transmissão é o elemento mais importante, por ser o elo mais suscetível de quebra ou interrupção. As medidas das precauções (padrão e específicas) visam interromper esses mecanismos de transmissão e prevenir infecções. A respeito dos modos de transmissão, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Transmissão por contato indireto ocorre quando o agente infeccioso é transferido de uma pessoa a outra sem que haja intermediação de um objeto ou pessoa contaminado.
- ( ) Transmissão por contato direto envolve a transferência de um agente infeccioso por intermediação de um objeto ou pessoa contaminado.
- ( ) Transmissão por gotículas ocorre quando as gotículas respiratórias contendo o agente infeccioso transmitem a infecção ao se deslocarem a curtas distâncias diretamente do trato respiratório do indivíduo infectado para a mucosa do hospedeiro suscetível.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

**58)** Diariamente, muitos estabelecimentos de saúde lidam com diferentes questões que envolvem Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e as diferentes maneiras de prevenção e controle. Na tentativa de elucidar essas questões, é necessário que se compreenda a variedade de conceitos epidemiológicos para a análise diagnóstica das principais causas de IRAS. Considerando-se os principais conceitos e classificação das IRAS, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Colonização.
- (2) Contaminação.
- (3) Infecção.

- ( ) Presença de agente infeccioso em uma superfície, fluido ou material.
- ( ) Multiplicação de um microrganismo em um ou vários locais anatômicos, sem evidência de infecção.
- ( ) Invasão e multiplicação de microrganismos no hospedeiro que podem causar doenças ou afecções.
- ( ) Adquirida em um intervalo de 48 a 72h após a admissão do paciente no estabelecimento de saúde.

- a) 1 - 2 - 3 - 2.
- b) 2 - 1 - 3 - 3.
- c) 2 - 3 - 2 - 3.
- d) 3 - 2 - 1 - 1.

**59)** As infecções decorrentes de procedimentos cirúrgicos que se manifestam em órgãos e tecidos manipulados até 90 dias após a cirurgia são denominadas Infecções do Sítio Cirúrgico (ISCs). Sobre os critérios diagnósticos para a identificação das ISCs, analisar os itens abaixo:

- I. Como complicações dos procedimentos cirúrgicos, as ISCs podem acometer o local de incisão ou tecidos profundos do sítio cirúrgico, chegando até órgãos ou cavidades manipuladas durante o procedimento, sendo classificadas de acordo com o tecido envolvido.
- II. A ISC incisional superficial envolve a pele e o tecido subcutâneo do local da incisão.
- III. A infecção superficial incisional primária do sítio cirúrgico é identificada na incisão primária em um paciente em que, durante uma operação, foi realizada uma ou mais incisões.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**60)** A patogênese da pneumonia hospitalar está associada ao número e à virulência de microrganismos que conseguem atingir o trato respiratório inferior e à resposta do hospedeiro, que envolve fatores mecânicos e imunológicos. Considerando-se a pneumonia associada à ventilação mecânica, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A presença de \_\_\_\_\_ aumenta o risco de aspiração de secreção da orofaringe ou de origem gastrointestinal.

- a) fístula arteriovenosa
- b) sonda foley
- c) cânula traqueal
- d) cateter central

**61)** A imunização ativa dos profissionais da área da saúde é importante não só para a sua proteção individual, mas também, indiretamente, para a proteção dos pacientes que estão sob seus cuidados. A respeito das vacinas recomendadas para os profissionais da saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) As vacinas contra difteria e tétano (dT) são recomendadas somente para indivíduos adultos.
- ( ) O esquema de vacinação completo com a vacina dupla para adulto (dT - difteria e tétano) é de três doses (com intervalo de dois meses entre cada dose) e uma dose de reforço a cada 10 anos.
- ( ) As vacinas contra hepatite B atualmente disponíveis são constituídas de antígeno de superfície do vírus da hepatite B (AgHBs) recombinante purificado. O esquema básico de vacinação para adultos consiste em três doses de 20µg da proteína AgHBs recombinante.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

**62)** A vigilância epidemiológica tem grande importância na saúde dos seres humanos. Um dos seus propósitos mais relevantes é definir normas técnicas e indicar os procedimentos mais adequados à prevenção e ao controle de doenças. A respeito do sistema de notificações de doenças, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) é o principal sistema de informação da vigilância epidemiológica.
- ( ) O SINAN é alimentado pelas notificações das doenças de notificação compulsória e, também, pela investigação da ocorrência dessas doenças.
- ( ) Somente os serviços de saúde públicos de todo o território nacional têm a responsabilidade de realizar as notificações, ficando isentos dessa responsabilidade os serviços de saúde privados.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

**63)** Os dados de maior interesse para a identificação e classificação das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são os que fornecem informação sobre as circunstâncias clínicas da hospitalização e as características dos indivíduos infectados. Sobre os métodos de vigilância das IRAS e a periodicidade com que devem ser realizados, analisar os itens abaixo:

- I. Nas unidades de risco, é recomendável a visita diária pelo enfermeiro da vigilância e/ou médico infectologista vinculado ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH).
- II. Método da busca passiva de dados inclui a obtenção dos dados sobre IRAS pela equipe médica mediante o preenchimento de formulários específicos para a liberação de antimicrobianos e/ou pela notificação indireta de IRAS com base na observação clínica dos pacientes pela equipe multiprofissional.
- III. Método retrospectivo pela revisão de prontuários é feito pela avaliação do paciente que se estende ao passado, desde a data de admissão até a data de saída, e a identificação e caracterização das IRAS são feitas com base nos dados existentes no prontuário.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**64)** Alguns problemas relacionados aos produtos sob vigilância sanitária tornam possível a ocorrência de agravos à saúde, sequelas ou mesmo a morte dos usuários ou profissionais da saúde envolvidos com a operação, manuseio ou aplicação desses produtos. Diante da possibilidade de os produtos sob vigilância sanitária causarem danos aos usuários, foi estabelecida a monitorização da produção e do uso, com o objetivo de conhecer a característica e planejar ações preventivas relacionadas à diminuição dos riscos. Estas atividades fazem parte das atribuições do(a):

- a) INSS.
- b) SEFAZ.
- c) ANVISA.
- d) IBGE.

**65)** Doença crônica granulomatosa, infectocontagiosa, de grande importância para a saúde pública em razão da sua magnitude e de seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa. Seu agente causador é *Mycobacterium leprae*, bacilo álcool-ácido resistente, intracelular obrigatório, única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, especialmente células de Schwann. Essa doença é a:

- a) Tuberculose.
- b) Hanseníase.
- c) Doença de chagas.
- d) Coqueluche.

**66)** Alguns micróbios são tão contagiosos ou epidemiologicamente significativos que, além das precauções-padrão, deve-se utilizar um segundo nível de precauções - baseadas na transmissão - quando tais microrganismos são identificados. As categorias de isolamento incluem precauções contra a transmissão pelo ar, gotículas e por contato. É CORRETO afirmar que são exemplos de doenças com transmissão por gotículas:

- a) Coqueluche e rubéola.
- b) Impetigo e pediculose.
- c) Caxumba e escabiose.
- d) Difteria cutânea e impetigo.

**67)** Desde a aprovação da vacina MMR ou tríplice viral, a rubéola endêmica foi eliminada nos EUA, e os casos de caxumba e rubéola diminuíram substancialmente. Sobre a imunização com a tríplice viral, analisar os itens abaixo:

- I. A vacina tríplice viral deve ser administrada rotineiramente em crianças de 12 a 15 meses de idade, com dose de reforço aos 4 a 6 anos.
- II. Os adultos que não receberam a vacina tríplice viral não poderão mais receber nenhuma dose.
- III. Os pacientes devem ser orientados sobre a possível ocorrência de febre, linfadenopatia transitória ou reação de hipersensibilidade após a administração da vacinação tríplice viral.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**68)** Uma ferida é uma ruptura da integridade cutaneomucosa de um tecido, podendo atingir a epiderme, a derme, a tela subcutânea, a fáscia, o tecido muscular ou ósseo. Considerando-se o processo de cicatrização de feridas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Fase inflamatória.
- (2) Fase proliferativa.
- (3) Fase de maturação.

- ( ) Pode durar de 21 dias a dois anos. Ocorre diminuição da migração de fibroblastos para o leito da ferida e início da reorganização das fibras de colágeno, diminuição do rubor tecidual e início do processo de epitelização, uma aparência da pele mais clara e rósea.
- ( ) Há epitelização, neovascularização e síntese de colágeno. Durante esta fase, observa-se no leito da ferida, no processo fisiológico, a formação do tecido de granulação, com sinais flogísticos com hiperemia e edema.
- ( ) Caracterizada pela presença de edema, eritema, dor e calor.
- ( ) Começa com a lesão e dura de três a seis dias.

- a) 1 - 2 - 3 - 2.
- b) 3 - 2 - 1 - 1.
- c) 2 - 3 - 2 - 3.
- d) 2 - 1 - 3 - 2.

**69)** Exsudato é secreção serosa resultante de processo inflamatório. Pode não apresentar odor ou ter um odor desagradável, adocicado ou pútrido. Sobre a classificação do exsudato, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Serossanguinolento: drenagem clara, de plasma aquoso.
- ( ) Sanguinolento: cor de sangue vivo.
- ( ) Seroso: plasma com hemácias.

- a) C - C - E.
- b) E - C - E.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

**70)** Ao exame físico da pele, o enfermeiro pode encontrar sinais e sintomas em indivíduos acometidos com afecções dermatológicas. As glândulas sebáceas, as unhas, os cabelos e os pelos são chamados de anexos da pele. Considerando-se as alterações encontradas nos cabelos e nos pelos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Alopecia: ausência ou diminuição de pelos ou cabelos.
- ( ) Caspa: aspecto luzidio, brilhante e sedoso da pele.
- ( ) Folliculite: inflamação da cavidade que contém pelo.
- ( ) Seborreia: placa esbranquiçada de descamação do couro cabeludo.

- a) C - E - C - E.
- b) E - E - C - C.
- c) C - E - E - C.
- d) E - C - C - E.

**71)** A medida de glicose no sangue é um fator importante para o diagnóstico de presença ou não do diabetes melito no paciente. Sobre os valores glicêmicos encontrados nos exames de sangue, analisar os itens abaixo:

- I. A concentração de glicose no sangue entre 100 e 125mg/dL, em paciente em jejum de 8 a 10 horas, caracteriza um estado denominado de pré-diabete ou intolerância aos carboidratos.
- II. Valores iguais ou superiores a 126mg/dL, em pelo menos duas ocasiões, são considerados de valor diagnóstico para diabetes.
- III. Os níveis de glicemia superiores a 200mg/dL, em amostras de sangue coletado aleatoriamente, sem jejum, são considerados como diagnósticos para diabetes melito.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**72)** A avaliação das condições emocionais e mentais do paciente tem sido um procedimento desenvolvido lentamente pelo enfermeiro ou pelo estudante de enfermagem, mas vem se mostrando cada vez mais necessária. Sobre os problemas emocionais e mentais emergentes ou recorrentes, analisar os itens abaixo:

- I. Algumas doenças físicas podem apresentar sintomas de transtornos emocionais ou psiquiátricos, como, por exemplo, a epilepsia, as alterações vasculares cerebrais, a tireotoxicose, o hipotireoidismo, a hipoglicemia, a síndrome de Cushing e as taquiarritmias, entre outras.
- II. A determinação de que o paciente esteja apresentando problemas emocionais subsidiará a identificação de diagnósticos de enfermagem acurados e, conseqüentemente, novas e diferentes intervenções.
- III. Problemas físicos, emocionais e mentais geralmente coexistem e devem ser vistos como episódios vivenciados pela pessoa e não isoladamente.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**73)** É importante realizar cuidados pré-natais contínuos para um desfecho bem-sucedido da gestação. Em cada consulta de acompanhamento, o enfermeiro deve responder a perguntas, fornecer instrução e orientação antecipatória, rever as orientações nutricionais e avaliar a paciente quanto à adequação do tratamento vitamínico pré-natal. A respeito dos sinais de perigo da gestação, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Durante o primeiro trimestre: sangramento vermelho-vivo ou em borra de café pode ser sinal de aborto; dor à micção pode indicar infecção.
- ( ) Durante o segundo trimestre: contrações uterinas regulares podem indicar trabalho de parto prematuro; ausência de movimentos fetais durante mais de 12 horas pode ser possível sofrimento ou morte fetal.
- ( ) Durante o terceiro trimestre: ganho de peso repentino; edema periorbital ou facial; intensa dor abdominal ou cefaleia associada a alterações visuais podem ser sinais de hipertensão arterial gestacional e/ou pré-eclâmpsia.

- a) C - C - C.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.



**74)** Quando uma criança nasce, a exaustão e o estresse do trabalho de parto terminam para os pais, mas o recém-nascido precisa começar o trabalho de se adaptar fisiológica e comportamentalmente ao novo ambiente. Considerando-se os períodos pelos quais passa uma criança desde a gestação até o puerpério, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O período \_\_\_\_\_ é definido como os primeiros 28 dias de vida. Este é um período das alterações fisiológicas mais notáveis e rápidas nos seres humanos.

- a) pré-natal
- b) neonatal
- c) intrauterino
- d) pré-parto

**75)** A cardiopatia congênita muitas vezes consiste em defeitos estruturais que existem por ocasião do nascimento, mas não são detectados. Até recentemente, as mulheres com cardiopatia congênita não viviam o suficiente para ter filhos. Atualmente, graças às novas técnicas cirúrgicas para corrigir esses defeitos, muitas dessas mulheres conseguem levar uma gestação a termo com um risco relativamente baixo quando é fornecido aconselhamento apropriado e ótimos cuidados. Considerando-se as cardiopatias congênitas que afetam a gestação, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

\_\_\_\_\_ é um defeito congênito envolvendo quatro anomalias estruturais: obstrução do fluxo pulmonar; defeito do septo interventricular; dextroposição da aorta e hipertrofia do ventrículo direito.

- a) Estenose aórtica
- b) Miocardiopatia periparto
- c) Tetralogia de Fallot
- d) Comunicação interatrial

**76)** O lúpus, também conhecido como lúpus eritematoso sistêmico (LES), é diagnosticado com base em valores laboratoriais, sinais e sintomas. Sobre os sintomas e consequências do Lúpus, analisar os itens abaixo:

- I. Os sinais e sintomas do lúpus podem incluir tumefação articular, fadiga extrema, úlceras orais, erupções cutâneas e sensibilidade à luz solar.
- II. Os diversos fatores desencadeadores da ativação do LES incluem o estrogênio, o tabagismo, o estresse físico ou psicológico, a exposição à luz ultravioleta e a gravidez.
- III. A gestação da portadora de lúpus é propensa a complicações, incluindo exacerbações da atividade da doença durante a gestação ou no período pós-parto, pré-eclâmpsia, aborto, aborto espontâneo, morte fetal, restrição do crescimento fetal e parto pré-termo.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**77)** O vírus da hepatite B (HBV) é responsável por uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo. Trata-se de um problema de saúde pública global sério, sobretudo na Ásia, na África, na Europa Oriental e na América Latina. A respeito da hepatite B, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) As mulheres com infecção aguda desenvolvem hepatite com anorexia, náuseas, vômitos, febre, dor abdominal e icterícia.
- ( ) O HBV pode ser transmitido por meio do sangue contaminado, uso de drogas ilícitas e contato sexual.
- ( ) Os recém-nascidos infectados com HBV provavelmente se tornarão portadores crônicos do vírus, tornando-se reservatórios para infecção continuada na população.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - C - C.
- d) E - C - C.

**78)** A comunidade é definida como um grupo específico de pessoas, muitas vezes vivendo em uma região geográfica definida, que compartilham interesses comuns, interagem entre si e funcionam coletivamente dentro de uma estrutura social definida para abordar preocupações comuns. A respeito do trabalho da enfermagem em saúde comunitária, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A enfermagem em saúde comunitária centra-se na prevenção de doenças e melhora da saúde das populações e comunidades.
- ( ) Os enfermeiros de saúde comunitária realizam investigações epidemiológicas para ajudar a analisar e a desenvolver políticas de saúde e iniciativas comunitárias de saúde.
- ( ) A ênfase do programa de saúde comunitária passou da dependência dos profissionais de saúde para o envolvimento e a responsabilidade pessoais, o que dá aos profissionais de enfermagem a oportunidade de interagir com os indivíduos em inúmeras funções de autoajuda.

- a) C - C - C.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

**79)** Paciente vítima de um trauma de tórax deve ser recomendado como prioridade máxima para o atendimento, tanto em nível pré quanto extra-hospitalar, dada a grande possibilidade de um desfecho desfavorável. Sobre traumas torácicos, analisar os itens abaixo:

- I. São considerados traumas torácicos: tamponamento cardíaco, hemotórax, contusão pulmonar, tórax instável, pneumotórax aberto e pneumotórax hipertensivo.
- II. São traumas, geralmente, provenientes de mecanismos contusos ou penetrantes, como lesão por arma de fogo, arma branca, ou de politrauma, como em um acidente de trânsito em que o tórax do condutor pode se chocar contra a direção do veículo, por exemplo.
- III. Tem-se um pneumotórax quando o ar, oriundo do pulmão, passa a invadir o espaço pleural pelo local da perfuração.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**80)** O infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre quando uma das artérias coronárias se torna totalmente ocluída. Sobre causas e sintomas do IAM, analisar os itens abaixo:

- I. Pode ser definido como uma lesão isquêmica que atinge o miocárdio (músculo cardíaco), consequente da cessação de fluxo sanguíneo em determinada área do coração.
- II. Uma das causas do IAM é consequência de complicações da aterosclerose, uma doença inflamatória crônica, relacionada com fatores de risco clássicos, como dislipidemia, diabetes, tabagismo, entre outros.
- III. Reconhecer uma parada cardíaca, buscar rapidamente auxílio médico, realizar compressões cardíacas de qualidade, ter à disposição e saber utilizar um desfibrilador externo automático (DEA) o mais rápido possível, fará toda a diferença no bom prognóstico do paciente vítima de infarto.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.