



TESTE SELETIVO – EDITAL N.º 43/2017-PRH
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA E PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

- Verifique se este caderno contém 40 questões e assine-o no local apropriado.
- Confira os dados da folha de respostas e assine-a no local apropriado.
- A folha de respostas é o único documento hábil para a correção da prova objetiva e **deverá** ser preenchida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- A marcação das letras na folha de respostas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de cor azul ou preta**, conforme o exemplo:



- Na folha de respostas, não poderá haver rasuras e não poderá haver mais de uma alternativa assinalada para cada questão; caso isso ocorra, a questão será anulada.
- Não haverá substituição da folha de respostas.
- A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após uma hora e trinta minutos do início da prova.
- O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar isso ao aplicador de prova.
- Este caderno de prova **não** poderá ser levado. O candidato poderá transcrever as respostas no rascunho abaixo e levá-lo consigo ao término da prova.

NOME DO CANDIDATO: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO: _____

Maringá, 07 de maio de 2017.

✂Corte na linha pontilhada

UEM – Edital N.º 43/2017-PRH – Teste Seletivo para a função de Técnico em Enfermagem

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS

Questões	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respostas																				
Questões	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respostas																				

CRONOGRAMA:

- Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 09-05-2017, às 17h.
- Divulgação do resultado final: 06-06-2017, às 17h, no endereço www.uem.br/concurso.
- O caderno de prova ficará disponível em www.uem.br/concurso até a divulgação do resultado final.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Questão 01

A Bioética tem como objetivo facilitar o enfrentamento de questões éticas e bioéticas que surgirão na vida profissional. Sem esses conceitos básicos, dificilmente alguém consegue enfrentar um dilema, um conflito e se posicionar diante dele de maneira ética. Assim, não é princípio da bioética

- A) justiça.
- B) autonomia.
- C) beneficência.
- D) não maleficência.
- E) jurisprudência.

Questão 02

Qual dos técnicos de enfermagem está trabalhando de acordo com o Decreto Lei N.º 94.406/97, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem?

- A) Kevin, ao participar da orientação e da supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
- B) Gru, ao realizar procedimentos diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- C) Bob, ao executar cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- D) Stuart, ao identificar as distócias obstétricas e tomar as providências até a chegada do médico.
- E) Scarlet, ao realizar a prevenção e o controle sistemáticos de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.

Questão 03

Para identificação segura do paciente, o Ministério da Saúde (2013) dispõe que a instituição deve definir um membro preferencial para a colocação de pulseiras como dispositivo de identificação e que deverá ser promovido um rodízio de membros, de acordo com as necessidades dos pacientes, levando em consideração situações como

- A) edema, amputação e presença de dispositivos vasculares.
- B) edema, fístula arteriovenosa e peritoneostomia.
- C) amputação, fístula arteriovenosa e cistostomia.
- D) amputação, presença de dispositivos vasculares e presença de bolsa de Karaya.
- E) presença de dispositivos vasculares, presença de bolsa de Karaya e presença de imobilizadores ortopédicos.

Questão 04

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem vigente, são penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem:

- I) Advertência verbal.
- II) Multa.
- III) Censura.
- IV) Suspensão do exercício profissional.
- V) Cassação do direito ao exercício profissional.

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas I, IV e V estão corretas.
- D) Apenas I, III e IV estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

Questão 05

Homem, 74 anos, acamado e totalmente dependente desde que teve Acidente Vascular Cerebral há 2 anos, está internado na Clínica Médica, com episódios recorrentes de hipoglicemia. O médico prescreveu acréscimo de 5 gramas de glicose hipertônica no soro de manutenção. Ao considerar que na Instituição só está disponível glicose hipertônica 25% com 10mL, quantas ampolas serão necessárias?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Questão 06

Mulher, 43 anos, internada na Unidade de Terapia Intensiva, irá iniciar profilaxia para tromboembolismo venoso com Heparina 5000UI, via subcutânea, a cada 8 horas. Na instituição, está disponível apenas Heparina em frasco-ampola com 25.000UI/5mL. Assinale a alternativa mais adequada para administração dessa medicação.

- A) Administrar em seringa de 5mL, com 1mL de medicação e agulha 40x1,2.
- B) Administrar em seringa de 3mL, com 0,5mL de medicação e agulha 13x0,45.
- C) Administrar em seringa de 3mL, com 1mL de medicação e agulha 25x0,7.
- D) Administrar em seringa de 100 unidades, com 100 unidades de medicação e agulha 13x0,45.
- E) Administrar em seringa de 100 unidades, com 50 unidades de medicação e agulha 13x0,45.

Questão 07

Homem, 32 anos, foi levado ao Pronto Atendimento por familiares após ter sido agredido pelo porquinho-da-índia de seu filho. É conduta de enfermagem imediata

- A) a lavagem do ferimento com água e sabão.
- B) o soro antirrábico.
- C) a vacina antirrábica.
- D) a vacina antitetânica.
- E) a vacina antidiftérica.

Questão 08

Sobre a higienização e a hidratação da pele para prevenção de lesão por pressão, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Limpar a pele sempre que estiver suja.
- B) Massagear toda superfície corporal durante a hidratação para estimular a circulação sanguínea.
- C) Utilizar água morna e sabão neutro para reduzir a irritação e o ressecamento da pele.
- D) Usar hidratante na pele seca e em áreas ressecadas pelo menos uma vez ao dia.
- E) Aplicar o hidratante com movimentos suaves e circulares.

Questão 09

Criança internada na Pediatria deve receber 2mg de Dexametasona. Na instituição, está disponível Dexametasona em frasco-ampola com 10mg/2,5mL. Quantos mL dessa medicação são necessários?

- A) 0,5
- B) 0,75
- C) 1
- D) 1,25
- E) 1,5

Questão 10

Sobre os cuidados com o cateter venoso periférico, assinale a alternativa **correta**.

- A) Deve-se utilizar luva estéril para punccionar o cateter venoso periférico.
- B) Deve-se realizar degermação com PVPI degermante seguida de antissepsia com Clorexidina alcoólica antes da punção do cateter venoso periférico.
- C) Deve-se utilizar cobertura estéril para proteger o sítio de inserção do cateter venoso periférico, podendo ser curativo semioclusivo ou membrana transparente semipermeável.
- D) Deve-se estabilizar o cateter venoso periférico com micropore ou esparadrapo não estéreis.
- E) Deve-se trocar a cobertura ou fixação com micropore do cateter venoso periférico em intervalos pré-estabelecidos.

Questão 11

Homem, 52 anos, diabético, está internado na Clínica Médica e deve receber 20UI de Insulina NPH. Na instituição, está disponível Insulina NPH em frasco-ampola com 100UI/mL, mas, tendo em vista que acabou o estoque da seringa de insulina e que deverá ser utilizada seringa de 3mL, quantos mL deverão ser administrados?

- A) 0,1
- B) 0,2
- C) 1
- D) 2
- E) 20

Questão 12

Paciente grave em ventilação mecânica, com uso de droga vasoativa, palidez cutânea, PA:60/30mmHg, FC= 136 bpm, T= 37,1°C, Hb=5,8g/dl. O médico punccionou um acesso venoso central de duplo lúmen e prescreveu 3 unidades de Concentrado de Hemácias (CH). Assinale a alternativa **correta**.

- A) Não iniciar a infusão de CH, pois o paciente está com febre.
- B) Pausar a droga para infusão do CH, pois hemocomponentes devem ser infundidos em via de administração única.
- C) Infundir CH e a droga na mesma via, pois melhora a eficiência de ambas.
- D) Infundir a medicação e CH em vias separadas, para evitar hemólise.
- E) Não infundir CH, pois o paciente está hipotenso.

Questão 13

Sobre o manuseio correto do cateter para prevenção de infecção do trato urinário relacionada ao uso de sonda vesical de demora, considera-se desnecessário

- A) fixar o cateter de modo seguro e que não permita tração ou movimentação.
- B) manter o sistema de drenagem fechado e estéril.
- C) trocar todo sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento.
- D) esvaziar a bolsa coletora regularmente, utilizando recipiente coletor individual e evitando contato do tubo de drenagem com o recipiente coletor.
- E) limpar rotineiramente o meato uretral com solução antisséptica.

Questão 14

Assinale a alternativa **incorreta** sobre as recomendações da *American Heart Association* e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) de 2015 de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em adultos para um único socorrista.

- A) 30 compressões torácicas seguidas por 2 respirações.
- B) A velocidade recomendada para as compressões torácicas é de 100 a 120 por minuto.
- C) Iniciar compressões torácicas antes de aplicar as ventilações de resgate (C-A-B), para reduzir o tempo até a primeira compressão.
- D) A profundidade das compressões torácicas em adulto é de 5 a 6 cm.
- E) 15 compressões torácicas seguidas por 1 respiração.

Questão 15

Em relação aos cuidados de enfermagem em transfusão sanguínea, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à sequência **correta**.

- () Concentrado de plaquetas deve ser infundido lentamente, devido ao risco de reação transfusional.
- () Antes de iniciar a infusão de qualquer hemocomponente, deve-se verificar os sinais vitais, para detectar possíveis alterações após o início da infusão.
- () Concentrado de plaquetas deve ser infundido lentamente em bomba de infusão para controle da velocidade de infusão.
- () Concentrado de Hemácias deve ser infundido em, no mínimo, 6 horas.
- () Se o receptor estiver com febre no momento de iniciar a infusão de Concentrado de Hemácias, deve-se comunicar o médico, administrar antitérmico e aguardar redução da febre para iniciar a transfusão.
- () Paciente O negativo pode receber CH de um doador O positivo.

- A) V, V, V, F, V, V
- B) F, V, F, F, V, F
- C) F, V, F, V, F, F
- D) V, V, V, V, F, F
- E) F, V, F, V, F, V

Questão 16

Mulher, 67 anos, foi admitida na sala de emergência apresentando FC: 89bpm, PA: 110/70 mmHg, Temp: 38°C, FR: 40bpm. Em relação à terminologia, é **correto** afirmar que a paciente encontra-se

- A) hipertensa.
- B) bradicárdica.
- C) taquipneica.
- D) afebril.
- E) hipotensa.

Questão 17

Paciente vítima de ferimento por objeto penetrante, com perfuração da artéria femoral direita, com sangramento ativo, hipotenso e taquicárdico. Diante desse caso, é adequado adotar a seguinte conduta:

- A) Retirar o objeto penetrante o mais rápido possível para evitar piora da perfuração.
- B) Realizar um torniquete em membro inferior esquerdo, para o fluxo sanguíneo ser direcionado para membro inferior direito.
- C) Realizar compressão manual com compressa estéril no local da perfuração.
- D) Abaixar as pernas, para melhora do retorno venoso.
- E) Realizar um torniquete em membro inferior direito para conter o sangramento.

Questão 18

Qual a indicação para uso de noradrenalina?

- A) Sedação.
- B) Analgesia.
- C) Hipoglicemia.
- D) Hipertensão.
- E) Hipotensão.

Questão 19

Paciente de 23 anos, vítima de acidente automobilístico, traumatismo crânio-encefálico (TCE) grave, sendo encaminhado para o Centro Cirúrgico para instalação de cateter de monitorização de pressão intracraniana (PIC) e craniectomia. Assinale a alternativa **correta** sobre os cuidados de enfermagem em pacientes neurocríticos.

- A) A cabeceira do leito deve ser mantida em 0 grau para evitar cefaleia.
- B) Pupilas isocóricas com fotoreação positiva são sinais de alterações neurológicas.
- C) A cabeceira do leito deve ser mantida acima de 30 graus para evitar aumento da PIC .
- D) Manter a PIC acima de 40 mmHg para melhora da perfusão sinovial.
- E) Pressão Arterial invasiva não é necessária, pois monitoramos a PIC.

Questão 20

Em relação aos cuidados de enfermagem em pacientes com oxigenioterapia, assinale a alternativa **correta**.

- A) No uso da Máscara de Venturi 50%, não é necessário umidificar, pois a concentração de oxigênio é muito alta.
- B) Não é necessário fluxômetro no uso de cateter nasal de oxigênio.
- C) Reanimador manual com reservatório (AMBU) não mantém 100% de oxigênio.
- D) Não é necessário frasco de umidificador aquecido nos respiradores mecânicos com filtro trocador de calor e umidade (HMEF) acoplado no tubo orotraqueal.
- E) Usar somente soro fisiológico nos frascos umidificadores.

Questão 21

As aplicações de calor e frio são alternativas que podem auxiliar no alívio da dor em casos de entorse, luxações, flebites e febre. Em relação ao exposto, preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

O calor em grau mais elevado _____ a circulação, pela _____ dos vasos sanguíneos, já o frio _____ a circulação local pela _____ dos vasos sanguíneos.

- A) diminui / constrição / facilita / dilatação
- B) facilita / dilatação / diminui / constrição
- C) facilita / constrição / facilita / constrição
- D) diminui / constrição / diminui / dilatação
- E) facilita / dilatação / facilita / constrição

Questão 22

Assinale a alternativa **correta**.

- A) A posição de trendelenburg é uma variação do decúbito dorsal em que a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados, oferecendo melhor visualização de órgãos pélvicos ou cirurgias laparoscópicas; muito utilizada em cirurgias ginecológicas.
- B) Na raquianestesia, um anestésico local é injetado no espaço subaracnoide, ocorrendo um bloqueio reversível das raízes motoras, levando à perda da atividade sensitiva, autônoma e motora. No pós-operatório, o paciente pode levantar-se imediatamente após o procedimento sem risco de cefaleia.
- C) Na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), é importante observar frequência respiratória, pressão arterial, oximetria, nível de consciência e atividade muscular.

- D) O bisturi elétrico é um aparelho capaz de transformar a corrente elétrica alternada de baixa frequência para alta frequência. Tem como finalidades: dissecação, anti-coagulação e fulguração.

E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 23

Relacione as terminologias de acordo com suas definições e assinale a alternativa que corresponde à sequência **correta**.

(1) diérese	() Realização do tratamento cirúrgico.
(2) hemostasia	() Detém ou impede o sangramento.
(3) cirurgia	() Aproximação das bordas da ferida.
(4) síntese cirúrgica	() Corte dos tecidos para abordagem de um órgão.

- A) 1, 3, 4, 2
- B) 4, 2, 3, 1
- C) 3, 2, 4, 1
- D) 2, 4, 1, 3
- E) 1, 2, 3, 4

Questão 24

No que diz respeito à Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), assinale a alternativa **correta**.

- A) A implementação da SAE é obrigatória apenas nas instituições de saúde públicas.
- B) Não é atividade privativa da enfermagem, envolvendo toda equipe multiprofissional.
- C) A implementação da SAE ocorre apenas nas instituições de saúde privadas.
- D) As ações de enfermagem da SAE contribuem para a promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo.
- E) Dentre as várias etapas da SAE, cabe ao técnico de enfermagem o diagnóstico e o relatório de enfermagem.

Questão 25

Homem, 18 anos, vítima de acidente automobilístico com trauma em região tóraco-abdominal, foi internado na clínica cirúrgica em pós-operatório imediato de laparotomia exploradora com correção de trânsito intestinal. Encontra-se com sonda nasogástrica aberta, dreno torácico à direita, sonda vesical de demora e colostomia. Em relação ao caso apresentado, indique a alternativa **incorreta**.

- A) A colostomia é uma abertura cirúrgica na parede abdominal para comunicar uma porção do intestino com o exterior, com a finalidade de eliminação de fezes.
- B) No pós-operatório, é importante o controle de sinais vitais, sondas e drenos e dor.
- C) A bolsa coletora da sonda vesical de demora deve ser mantida na altura da linha hemiaxilar para assegurar a drenagem.
- D) A sonda nasogástrica, enquanto mantida aberta, tem como objetivo descomprimir o estômago, removendo líquidos e gases.
- E) Para o registro do débito do dreno torácico, deve-se calcular a diferença entre o volume total desprezado e o volume do selo d'água.

Questão 26

Técnico de enfermagem recém-admitido em um hospital público de ensino ficou responsável pelos cuidados integrais de 5 pacientes da clínica médica. Sobre a prescrição e a execução dos cuidados de enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem, exceto:

- A) Verificar a prescrição de enfermagem antes de iniciar os cuidados.
- B) Checar a prescrição de enfermagem logo após a execução dos cuidados.
- C) Registrar no relatório de enfermagem as ações prescritas pelo enfermeiro, porém não executadas.
- D) Separar e organizar os materiais antes da execução dos cuidados prescritos.
- E) Avaliar o produto a ser utilizado em curativos mais adequado e comunicar imediatamente ao enfermeiro.

Questão 27

Consideram-se causas de traumas mamilares, exceto:

- A) Falta de hidratação dos mamilos com pomadas e cremes.
- B) Mau posicionamento e pega incorreta.
- C) Amamentação com aréola distendida e endurecida.
- D) Técnica incorreta de retirar do peito.
- E) Monilíase.

Questão 28

Sobre a atenção integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no momento do nascimento em estabelecimentos de saúde que realizam partos, é **correto**:

- I) O atendimento ao RN consiste na assistência por profissional devidamente capacitado em reanimação neonatal, médico (preferencialmente pediatra ou neonatologista) ou profissional de enfermagem (preferencialmente enfermeiro obstetra ou neonatal).
 - II) Para o RN a termo com ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido meconial, recomenda-se: assegurar o contato pele a pele imediato e contínuo, colocando o RN sobre o abdômen ou tórax da mãe de acordo com sua vontade, de braços e cobri-lo com uma coberta seca e aquecida, em temperatura ambiente de, no mínimo, 26°C.
 - III) Para o RN a termo com ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido meconial, recomenda-se: primeiramente, realizar os procedimentos de rotina do RN (exame físico, pesagem e outras medidas antropométricas, profilaxia da oftalmia neonatal e vacinação); após os procedimentos, colocar o recém-nascido em contato pele a pele com a mãe.
 - IV) Para todos os RN, proceder ao clampeamento do cordão umbilical imediatamente após o nascimento.
 - V) Para o RN pré-termo ou qualquer RN com respiração ausente ou irregular, tônus diminuído e/ou com líquido meconial, seguir o fluxograma do Programa de Reanimação da Sociedade Brasileira de Pediatria e iniciar as manobras com a oferta de oxigênio suplementar inalatório.
- A) Todas estão corretas.
 - B) I e II estão corretas.
 - C) I, II e V estão corretas.
 - D) III, IV e V estão corretas.
 - E) II, IV e V estão corretas.

Questão 29

Assinale a alternativa **correta** sobre o manejo clínico do recém-nascido (RN) exposto à transmissão vertical do HIV.

- A) Não é recomendado o alojamento conjunto em período integral, com o intuito de fortalecer o vínculo mãe-filho.
- B) Limpar com compressas macias todo o sangue e as secreções visíveis na superfície corporal do RN logo após o nascimento e encaminhá-lo para banho em água corrente após 6 horas do nascimento.
- C) Iniciar a primeira dose do AZT solução oral após a primeira mamada.
- D) Recomenda-se a não amamentação e a substituição do leite materno por fórmula infantil ou leite humano fornecido pelo banco de leite.
- E) Aspirar as vias aéreas de todos os RN, como rotina.

Questão 30

São critérios para ingresso na Unidade Canguru, exceto:

- A) Estabilidade clínica do bebê.
- B) Nutrição enteral plena – seio materno, sonda gástrica ou copo.
- C) Peso mínimo de 1.250g.
- D) Sucção exclusiva no seio materno.
- E) Mãe com conhecimento e habilidade para manejar o bebê em posição canguru.

Questão 31

Sobre o período puerperal, considere as assertivas e indique a alternativa **correta**.

- I) Para prevenção da hemorragia pós-parto, deve-se ter observação criteriosa da coloração da pele, do tônus uterino e o sangramento, verificar os sinais vitais e comunicar o médico imediatamente sobre qualquer anormalidade.
- II) Para a puérpera que recebe a administração de sulfato de magnésio para tratamento de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, os principais cuidados são controle da frequência respiratória, controle de diurese, controle do reflexo patelar e, no caso de alterações nesses controles, a administração poderá ser suspensa.
- III) Para estimular a amamentação nas mulheres que tiveram os recém-nascidos admitidos em unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva, deve-se iniciar precocemente o estímulo à lactação, realizando massagem e ordenha mamária.
- IV) Para o tratamento do ingurgitamento mamário, aplicar compressas mornas antes da ordenha manual.

- A) Apenas a IV está incorreta.
- B) Todas estão corretas.
- C) Apenas a I e a II estão corretas.
- D) Apenas a I e a IV estão corretas.
- E) Apenas a I e a III estão corretas.

Questão 32

A maneira mais eficaz de garantir uma ótima higiene das mãos é utilizar a preparação alcoólica para as mãos. As preparações alcoólicas para as mãos apresentam as seguintes vantagens imediatas, exceto:

- A) Não há necessidade de qualquer infraestrutura especial como rede de fornecimento de água limpa, lavatório, sabonete e toalha.
- B) Podem ser utilizadas concomitantemente com sabonete líquido ou em espuma.
- C) Eliminação da maioria dos microrganismos, incluindo vírus.
- D) Curto período de tempo para higienizar as mãos (20 a 30 segundos) e boa tolerabilidade da pele.
- E) Disponibilidade do produto no local onde é realizada a assistência.

Questão 33

Considere as assertivas sobre as medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde por microrganismos multirresistentes e assinale a alternativa **correta**.

- I) Utilizar Equipamento de Proteção Individual (luvas e aventais) para o manejo do paciente e suas secreções. A paramentação para lidar com o ambiente em torno do paciente, colonizado ou infectado, não é necessária em alguns casos.
 - II) Disponibilizar equipamentos e utensílios para o uso individual do paciente (estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro, talheres, copos e outros).
 - III) Enfatizar a importância da higienização das mãos e o uso de luva para todos os profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes.
 - IV) Estabelecer uma área de isolamento do paciente ou coorte exclusiva para paciente colonizados/infectados pelo mesmo microrganismo multirresistente, bem como a identificação da condição de isolamento, inclusive no prontuário e nas portas de acesso.
- A) Apenas II e IV e V estão corretas.
 - B) Apenas II e III estão corretas.
 - C) Apenas III e V estão corretas.
 - D) Apenas IV e V estão corretas.
 - E) Todas estão corretas.

Questão 34

São consideradas doenças de notificação compulsória imediata:

- A) Varíola, Febre Amarela, Dengue, Febre Maculosa.
- B) Botulismo, Cólera, Coqueluche, Difteria, Sarampo.
- C) Ebola, Rubéola, Febre Tifoide, Raiva Humana, Sífilis Congênita.
- D) Tuberculose, Febre Chikungunya, Tétano Neonatal, Leptospirose.
- E) Leishmaniose Visceral, Hepatites Virais, Poliomielite por Poliovírus Selvagem.

Questão 35

Homem, 23 anos, vítima de múltiplos ferimentos por arma branca, está internado há 3 dias e se apresenta com cateter venoso central em veia jugular esquerda, traqueostomia, deiscência de toracotomia à esquerda com secreção purulenta em média quantidade, jejunostomia, cistostomia e ferida com tecido de granulação em perna esquerda. Diante dessa situação, qual seria o primeiro e o último local de manipulação para curativo e/ou higiene?

- A) Veia jugular esquerda e hemitórax esquerdo.
- B) Flanco inferior esquerdo e perna esquerda.
- C) Hemitórax esquerdo e região cervical.
- D) Região suprapúbica e região cervical.
- E) Flanco inferior esquerdo e veia jugular esquerda.

Questão 36

Durante o atendimento a uma parada cardiorrespiratória na enfermaria da clínica cirúrgica, o técnico de enfermagem deve assistir ao enfermeiro e à equipe multidisciplinar. Dentre os materiais e/ou equipamentos necessários, são indispensáveis nesse momento:

- A) kit para intubação orotraqueal: laringoscópio, cânulas de intubação de calibres variados, otoscópio, seringa de 20 ml.
- B) desfibrilador, monitor multiparamétrico, régua antropométrica, aparelho de eletrocardiograma.
- C) desfibrilador, monitor multiparamétrico, régua antropométrica, aparelho de eletroencefalograma.
- D) kit para intubação orotraqueal: laringoscópio, cânulas de intubação de calibres variados, seringa de 20 ml.
- E) desfibrilador, monitor multiparamétrico, tábua para massagem, aparelho de eletroencefalograma.

Questão 37

Mulher, 55 anos, está internada na clínica médica com diagnóstico de acidente vascular cerebral (AVC). Durante a internação, apresenta um episódio de queixa de dor no peito e dispneia leve. O médico do plantão pede um eletrocardiograma (ECG). Em relação ao ECG, assinale a alternativa **correta**.

- A) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V5 deve ser: 5º espaço intercostal à esquerda, na linha hemiaxilar esquerda.
- B) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V4 deve ser: 5º espaço intercostal à esquerda, na linha hemiclavicular esquerda.
- C) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V1 deve ser: 4º espaço intercostal à direita, próximo ao esterno.
- D) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V2 deve ser: no ponto médio entre V1 e V3.
- E) As derivações periféricas são obtidas no plano horizontal, pela colocação de eletrodos no tórax do paciente.

Questão 38

No centro cirúrgico, não cabe ao técnico de enfermagem

- A) receber o paciente.
- B) desenvolver procedimentos técnicos conforme orientação do enfermeiro.
- C) prover a sala com materiais e equipamentos adequados, de acordo com o tipo de cirurgia.
- D) auxiliar no posicionamento correto do paciente.
- E) abrir materiais estéreis sem o uso de técnica asséptica.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Questão 39

Assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária.
- B) Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos, alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação.
- C) Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.
- D) O direito a acompanhante durante o trabalho de parto e do pós-parto é garantia exclusiva das gestantes atendidas pelo sistema de saúde suplementar.
- E) A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto.

Questão 40

Assinale a alternativa **correta** em relação à profissionalização e ao trabalho da criança e do adolescente.

- A) A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho desfigura o caráter educativo.
- B) O adolescente que se enquadra na categoria de aprendiz estará amparado apenas pelas normas do Código de Processo Civil.
- C) Ao adolescente portador de deficiência é proibida a prática de atividade laboral.
- D) A realização de atividades perigosas, insalubres ou penosas é permitida ao adolescente aprendiz que estiver em regime familiar de trabalho.
- E) Ao adolescente é vedado o trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte.