

CONCURSO PÚBLICO - MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL COODEC 12/2020
26 DE SETEMBRO DE 2021
SUPRA -ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

01. VERIFIQUE, NOS ESPAÇOS DEVIDOS DO CARTÃO-RESPOSTA, SEUS DADOS PESSOAIS. NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR SEU NOME NO LOCAL INDICADO.
02. PREENCHA AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES NO RASCUNHO DO GABARITO, A FIM DE TRANSCREVÊ-LAS COM CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA, DE PONTA GROSSA E CORPO TRANSPARENTE, POSTERIORMENTE, NO CARTÃO-RESPOSTA.
03. AO TRANSCREVER SUAS RESPOSTAS PARA O CARTÃO-RESPOSTA, PREENCHA COMPLETAMENTE O ALVÉOLO, COMO INDICADO NA FIGURA, . NUNCA ASSIM , POIS VOCÊ CORRE O RISCO DE TER SUA QUESTÃO ANULADA.
04. NÃO PERGUNTE NADA AO FISCAL, POIS TODAS AS INSTRUÇÕES ESTÃO NA PROVA. LEMBRE-SE DE QUE UMA LEITURA COMPETENTE É REQUISITO ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA.
05. NÃO RASURE, NÃO AMASSE NEM DOBRE O CARTÃO-RESPOSTA, PARA QUE ELE NÃO SEJA REJEITADO.

RASCUNHO DO GABARITO

1		06		11		16		21		26	
2		07		12		17		22		27	
3		08		13		18		23		28	
4		09		14		19		24		29	
5		10		15		20		25		30	

LEGISLAÇÃO

1

De acordo com o artigo 23 da Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012 a avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório, ocupante de cargo pertencente ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será realizada por Comissão de Avaliação de Desempenho designada no âmbito de cada Instituição Federal de Ensino. **A Comissão de Avaliação de Desempenho deverá ser composta de**

- (a) servidores técnicos, estáveis ou não, com representações da unidade acadêmica de exercício do avaliado e do Colegiado do Curso no qual o docente avaliado ministra o maior número de aulas.
- (b) docentes, preferencialmente estáveis, com representação da unidade acadêmica de exercício do avaliado.
- (c) servidores técnicos estáveis e de servidores ocupantes de cargo em comissão que exerçam função de chefia, direção ou assessoramento, vinculados ao Colegiados de um dos Cursos em que o avaliado ministre aulas.
- (d) docentes estáveis, com representações da unidade acadêmica de exercício do docente avaliado e do Colegiado do Curso no qual o docente ministra o maior número de aulas.
- (e) docentes estáveis e discentes, ambos com vinculados à unidade acadêmica de exercício do docente avaliado.

2

Acerca do Processo Disciplinar, com previsão na Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, considere as afirmativas:

- I) O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou, que tenha relação com as atribuições do cargo que esteja investido.
- II) A coleta de provas é tomada na fase do inquérito.
- III) Ainda que a infração cometida pelo servidor esteja capitulada como crime, a autoridade julgadora não é obrigada a remeter o processo

disciplinar ao Ministério Público, em decorrência da independência das instâncias.

- IV) É vedada a exoneração a pedido do servidor que estiver em cumprimento de penalidade aplicada.

Estão corretas,

- (a) III e IV, apenas.
- (b) II e III, apenas.
- (c) II e IV, apenas.
- (d) I, III e IV, apenas.
- (e) I, II e IV, apenas.

3

O parágrafo 1º do artigo 183 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 prevê que o servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, **terá direito ao seguinte benefício do Plano de Seguridade Social:**

- (a) Licença por acidente em serviço.
- (b) Licença para tratamento de saúde.
- (c) Assistência à saúde.
- (d) Aposentadoria.
- (e) Pensão vitalícia e temporária.

4

Segundo o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, **é vedado ao servidor público:**

- (a) Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.
- (b) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular.

- (c) Retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- (d) Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal.
- (e) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito.

5

A Resolução nº 29 de 13 de setembro de 2018, que dispõe sobre o regulamento do ensino da UFPEL, prevê que

- (a) os cursos de graduação deverão promover a formação de pessoas qualificadas para o exercício profissional e para o exercício pleno da cidadania. Para promover essa formação, os projetos pedagógicos dos cursos e suas estruturas curriculares devem estar alicerçados em conhecimentos cientificamente fundamentados e socialmente referenciados, integrados a princípios éticos, estéticos e de caráter político-partidários.
- (b) os projetos pedagógicos de curso deverão contemplar critérios e procedimentos que atendam discentes com deficiência da mesma forma que atendam os demais, sem qualquer adaptação necessária.

- (c) os cursos de graduação serão ofertados nas modalidades presenciais ou à distância.
- (d) para fins de matrícula e de acompanhamento acadêmico, a Universidade Federal de Pelotas admitirá somente o regime acadêmico seriado.
- (e) o discente aprovado em todos os componentes cursados no período letivo, deverá matricular-se no período subsequente em um conjunto de componentes curriculares inferior ao previsto no projeto pedagógico do curso.

6

A Resolução nº 41 de 26 de outubro de 2017, estabelece o limite mínimo e máximo de carga horária de aulas dentre as atividades docentes.

Sobre o tema, é correto afirmar que

- (a) entende-se por carga horária em aulas, somente as horas despendidas em disciplinas no ensino de graduação.
- (b) todos os docentes deverão ministrar aulas na pós-graduação semestralmente.
- (c) todos os docentes deverão ministrar aulas na graduação semestralmente.
- (d) a carga horária a ser integralizada pelos docentes deve corresponder ao mínimo de dezoito horas semanais de aulas.
- (e) é princípio da Universidade Federal de Pelotas garantir a dissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

7

Os tratamentos para miomatose uterina sintomática que promovem redução de volume do mioma:

- I) DIU medicado com levonogestrel.
- II) Análogos do GnRH(hormônio liberador de gonadotrofina).
- III) Ácido tranexâmico.

Estão corretas,

- (a) II, apenas.
- (b) I e II, apenas.
- (c) II e III, apenas.

- (d) I, apenas.
- (e) I e III, apenas.

8

Com relação à DIP (doença inflamatória pélvica), considere as afirmativas.

- I) A incidência de oclusão tubária total, não tem relação com o número de episódios de DIP.
- II) O tratamento do abscesso tubo-ovariano, independente do seu tamanho é sempre cirúrgico.
- III) Nas usuárias de DIU a sua retirada antes do início do tratamento medicamentoso acelera o tempo de melhora clínica.

Está(ão) correta(s),

- (a) II, apenas.
- (b) III, apenas.
- (c) I, apenas.
- (d) I e II, apenas.
- (e) II e III, apenas.

9

Paciente primigesta de 19 anos vem ao pronto socorro apresentando diagnóstico presuntivo ultrassonográfico de gestação molar, apresentando sangramento e níveis elevados de HCG. A situação clínica induzida pela mola hidatiforme não metastática, é:

- (a) Obstrução intestinal.
- (b) Infecção urinária.
- (c) Hipertireoidismo.
- (d) Glaucoma.
- (e) Hemoptise.

10

Das situações abaixo, a inserção de DIU T Cu (dispositivo intra-uterino de cobre) é **contraindicado**

- (a) Câncer de mama atual.
- (b) Inserção imediata pós-abortamento de primeiro ou segundo trimestre.
- (c) Lesão intra epitelial cervical de alto grau atual.
- (d) Lactação- 4 semanas pós-parto.
- (e) HIV (vírus da imunodeficiência humana) com doença controlada atual

11

São critérios utilizados para avaliar reserva ovariana em pacientes com desejo reprodutivo, **EXCETO:**

- (a) Idade.

- (b) Níveis séricos de HAM (hormônio anti-mulleriano).
- (c) Contagem de folículos antrais em ultrassom transvaginal.
- (d) Níveis séricos de prolactina.
- (e) Níveis séricos de FSH (hormônio folículo estimulante).

12

Com relação ao câncer de mama, considere as afirmativas.

- I) O tipo celular mais incidente é o carcinoma lobular invasor.
- II) O prognóstico da neoplasia de mama invasora é influenciado pelo estadiamento da doença ao diagnóstico.
- III) A terapia hormonal combinada na pós-menopausa se correlaciona ao aumento de risco quando utilizada por mais de cinco anos.

Está(ão) correta(s),

- (a) II e III, apenas.
- (b) II, apenas.
- (c) III, apenas.
- (d) I e II, apenas.
- (e) I, apenas.

13

Paciente de 38 anos GII PI vem à consulta pré-natal com 32 semanas de gestação e diagnóstico de diabetes gestacional. Apresenta mau controle glicêmico e ultrassonografia recente revelando macrossomia fetal e polidrâmnio. A provável causa do polidrâmnio, **neste caso, será:**

- (a) FSH (hormônio folículo estimulante).
- (b) LH (hormônio luteinizante).
- (c) Testosterona.
- (d) ACTH (hormônio adrenocorticotrófico).
- (e) Estrogênio.

14

A etiologia mais frequente de puberdade precoce independente de gonadotrofinas é/são

- (a) tumores produtores de andrógenos suprarrenais.

- (b) tumores hipofisários secretores de gonadotrofina.
- (c) produção ectópica de gonadotrofina.
- (d) síndrome de McCune-Albright.
- (e) cistos foliculares funcionantes de ovário.

15

A ultrassonografia mamária auxilia no diagnóstico das lesões suspeitas de malignidade encontradas nas mamografias, especialmente nos casos de massas assimétricas ou na diferenciação de massas sólidas e císticas.

Entre os critérios abaixo, pelo padrão BI-RADS, podemos considerar como sugestivo de benignidade o

- (a) padrão ecogênico hiperecótico.
- (b) formato circular.
- (c) orientação não paralela a pele.
- (d) limite impreciso.
- (e) contorno irregular.

16

A síndrome pré-menstrual (SPM) é um distúrbio crônico que ocorre na fase lútea do ciclo menstrual e desaparece logo após o início da menstruação. Sobre esse assunto, considere verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmativas.

- () Caracteriza-se por uma combinação de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais.
- () Entre 3 e 8% das mulheres os sintomas são muito intensos, interferindo em suas atividades diárias e comprometendo sua qualidade de vida.
- () A busca por assistência médica costuma acontecer após vários anos de sofrimento com os sintomas, em geral, após os 30 anos de idade.
- () Os sintomas mais frequentes costumam ser ansiedade e alterações no humor.
- () Os antidepressivos serotoninérgicos costumam ser os fármacos de primeira linha para os sintomas mais intensos.

A sequência correta, de cima para baixo, de preenchimento das lacunas, é:

- (a) F – V – F – V – V
- (b) V – V – F – V – V
- (c) V – V – V – F – F
- (d) F – V – V – F – V
- (e) V – V – V – V – V

17

Gestante com 16 semanas de idade gestacional, primigesta, apresenta exame de urina demonstrando bacteriúria assintomática (E. Coli na cultura 200.000 ufc/mL). O fármaco utilizado no tratamento da infecção urinária baixa da referida gestante, **será:**

- (a) Fosfomicina.
- (b) Tetraciclina.
- (c) Ciprofloxacina.
- (d) Gentamicina.
- (e) Levofloxacina.

18

O tratamento do sangramento uterino anormal (SUA) tem como primeira escolha os medicamentos hormonais, desde que descartadas as causas orgânicas com indicação de tratamentos cirúrgico, coagulopatias e malignidade.

São contraindicações para o tratamento hormonal estroprogestativo, para as mulheres com SUA:

- (a) Hipertensão controlada, obesidade e hipotireoidismo.
- (b) Cirurgia videolaparoscópica abdominal e diabetes melito tipo 2 sem complicações vasculares.
- (c) Enxaqueca sem aura, obesidade e idade menor que 35 anos.
- (d) Hepatite A na adolescência, acne e síndrome dos ovários policísticos.
- (e) Câncer de mama, histórico de tromboembolismo e tabagismo com idade superior a 35 anos.

19

O risco de câncer de ovário associado a presença de endometriose tem sido demonstrado em alguns estudos. O aumento do risco parece ser moderado, entre 1,34 e 1,80. A principal razão é o fato de que cerca de 90% dos carcinomas de ovário são derivados da superfície epitelial.

Ainda sobre endometriose e câncer de ovário, **é correto afirmar que**

- (a) os subtipos histológicos mais frequentes são: endometrióide, mucinoso, transicional, de células claras, seroso e misto, em ordem decrescente de frequência.
- (b) não estão estabelecidas, até o momento, medidas de prevenção ou rastreamento específicas para câncer de ovário em pacientes com endometriose.
- (c) o câncer de ovário é moderadamente prevalente e o diagnóstico precoce está acessível na maioria dos casos.
- (d) o carcinoma epitelial epidermóide do tipo clínico I é considerado o mais comum, presente nas doenças mais avançadas.
- (e) o carcinoma epitelial epidermóide do tipo clínico II consiste nos tipos de baixo grau e borderline e estão mais associados a endometriose.

20

A incontinência urinária como sintoma da fase de armazenamento da urina pode ser classificada em esforço, urgência, mista, por desvio, por transbordamento e incontinência funcional.

Considere as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A perda urinária associada a tosse, espirros e exercícios sugere incontinência de urgência.
- () A incontinência por transbordamento se caracteriza por gotejamento constante ou perda abrupta de grande quantidade de urina.
- () Perda contínua de urina sugere a presença de fístulas.
- () Pacientes que apresentam enurese noturna na infância podem vir a apresentar incontinência de esforço na vida adulta.
- () A associação de incontinência de urgência com disúria ou hematúria sugere infecção do trato urinário.

A sequência correta, de cima para baixo, de preenchimento das lacunas, é:

- (a) F – V – V – V – V
- (b) F – F – V – V – F
- (c) F – V – V – F – V
- (d) V – V – V – F – V
- (e) V – F – F – F – V

21

O aborto clinicamente diagnosticado ocorre em cerca de _____ das gestações.

A incidência de aborto aumenta com a idade das mulheres, sendo que em mulheres jovens (< 35 anos) o risco de perda espontânea fica entre _____ no primeiro trimestre da gestação, no entanto este risco aumenta para _____ em mulheres com 40 anos ou mais.

Estima-se que menos de _____ das mulheres sofre dois ou mais abortos consecutivos.

Os percentuais que preenchem corretamente as sentenças são, respectivamente:

- (a) 30 a 35% - 15 a 20% - 60% - 10%
- (b) 15 a 25% - 9 a 12% - 50% - 5%
- (c) 15 a 25% - 15 a 20% - 40% - 15%
- (d) 30 a 35% - 9 a 12% - 40% - 12%
- (e) 10 a 20% - 20 a 30% - 50% - 2%

22

A abordagem sindrômica das principais queixas genitais agudas ajuda no diagnóstico etiológico das principais infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Associe as síndromes com as etiologias mais comuns e escolha a sequência correta abaixo:

1	Corrimento vaginal	A	Gonorreia, clamídia, tricomoníase e candidíase
2	Corrimento uretral	B	Gonorreia, clamídia e anaeróbios
3	Úlcera genital	C	Gonorreia, clamídia, tricomoníase, micoplasma e ureaplasma
4	Dor pélvica	D	Sífilis, cancro mole, donovanose, herpes genital

- (a) 1A, 2C, 3D e 4B
- (b) 1C, 2D, 3A e 4B
- (c) 1B, 2D 3C e 4A
- (d) 1C, 2C, 3A e 4D
- (e) 1A, 2C, 3B e 4D

23

Considere a teratógenos comuns e seus potenciais efeitos fetotóxicos:

- I) A fenitonina pode levar a defeitos cardíacos bem como fissura do palato
- II) Os inibidores da ECA podem acarretar polidrâmnio e insuficiência cardíaca fetal
- III) A isotretinoína pode levar a malformações cardiovasculares, do SNC e retardo mental

Está(ão) correto(s),

- (a) I, apenas.
- (b) I e III, apenas.
- (c) II, apenas.
- (d) III, apenas.
- (e) II e III, apenas.

24

Mulher de 43 anos, 3 Gesta 2 Para 1 Aborto, vem para consulta de rotina. É tabagista de, pelo menos, 20 cigarros por dia há cerca de 20 anos. Usa pílula anticoncepcional combinada composta por

etinilestradiol 30 mcg e gestodeno 75 mcg por drágea contínua há cinco anos, bem adaptada e sem referir efeitos adversos. Exame físico e ginecológico normais. **A fim de orientá-la sobre anticoncepção deve-se informar que:**

- (a) A pílula anticoncepcional combinada está contraindicada devido ao tabagismo e ter mais de 35 anos e podemos recomendar o uso de outros métodos hormonais combinados, desde que administrados por via não oral.
- (b) A paciente poderá manter a pílula anticoncepcional combinada em uso, pois além de ela já estar bem adaptada e da baixa dosagem hormonal a paciente nunca teve evento adverso que a contraindique.
- (c) De que o tabagismo é contraindicação absoluta ao uso de pílula anticoncepcional combinada e esclarecer que ela nunca deveria ter utilizado este método, mesmo quando jovem.
- (d) A pílula anticoncepcional combinada está contraindicada devido ao tabagismo e a idade superior a 35 anos e pode recomendar o uso de método hormonal apenas com progestagênio, também de uso contínuo.
- (e) Poderá manter a pílula anticoncepcional combinada de baixa dose hormonal que ela já utiliza desde que se adicione ácido acetilsalicílico 100 mg dia no intuito de diminuir o risco de trombose venosa.

25

A sustentação normal das estruturas pélvicas femininas está diretamente associada com a integridade funcional dos tecidos fasciais e do conjunto de músculos do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é formado pelos músculos elevadores do ânus e coccígeo.

Fazem parte dos elevadores do ânus, os seguintes músculos:

- (a) Pubococcígeo, puborretal e ileococígeo.
- (b) Pubococcígeo, transverso superficial e transverso profundo.
- (c) Puborretal, bulboesponjoso e isquiocavernoso.
- (d) Ileococígeo, isquiopúbico e transverso profundo do períneo.
- (e) Pubovaginal, ileococígeo e transverso superficial do períneo.

26

Uma paciente de 36 anos de idade com histórico familiar de câncer em avó e mãe, resolve realizar estudo oncogenético o qual demonstrou mutações nos genes BRCA 1 e BRCA 2. Tais achados representam um maior risco para ocorrência de câncer de:

- I) Vulva.
- II) Colo uterino
- III) Ovário.
- IV) Mama.

Está(ão) correta(s),

- (a) IV, apenas.
- (b) III, apenas.
- (c) III e IV, apenas.
- (d) II, III e IV, apenas
- (e) I, III e IV apenas

27

Com relação à violência doméstica e abuso sexual, considere as seguintes afirmativas.

- I) Podem levar a depressão e ideação suicida.
- II) Estão inclusos abuso verbal, intimidação, privação de comida e de dinheiro.

III) Não se observa a ocorrência frequente de dor pélvica crônica nestas pacientes.

Está(ão) correta(s),

- (a) I e II, apenas.
- (b) I, apenas.
- (c) II, apenas.
- (d) III, apenas.
- (e) II e III, apenas.

28

Paciente diabética tipo I, 33 anos de idade, nuligesta, em uso de insulina, deseja saber detalhes sobre futura gestação planejada. É importante informar para a paciente em relação à associação diabetes e gravidez **que**

- (a) a incidência de anomalias congênitas é maior no diabetes gestacional que no diabetes pré-existente.
- (b) a insulina é considerada fármaco teratogênico.
- (c) a pré-eclâmpsia tem a mesma incidência em primigestas, com ou sem a presença de diabetes.
- (d) a hiperglicemia no período de embriogênese é fator de risco para anomalia congênita.
- (e) não é aconselhada a gestação em diabéticas do tipo I.

29

Paciente de 38 anos de idade vem a consulta pré-natal muito preocupada com a possível exposição à toxoplasmose, seus riscos e resultados de exames laboratoriais. **Com relação a tal patologia podemos afirmar que**

- (a) o agente etiológico da toxoplasmose é uma bactéria.
- (b) a suscetibilidade na toxoplasmose é identificada com sorologia com IgG e IgM positivas.
- (c) a alta avidéz para anticorpos IgG em gestações de idade gestacional inferior à dezesseis semanas indica infecção antiga, sem riscos de contaminação fetal.
- (d) deve ser solicitado o teste de avidéz quando houver resultado de sorologias IgG positiva e IgM negativa.
- (e) a pirimetamina deve ser sempre iniciada independentemente da idade gestacional.

30

Com relação à infecção pelo parvovírus B19 na gestação considere as afirmativas abaixo:

- I) A anemia fetal tem caráter benigno e resolve espontaneamente.
- II) Pode apresentar-se na gestante como eritema, manchas na pele, febre e/ou artralgia.
- III) Tem como complicação frequente a anemia fetal e a hidropsia, podendo evoluir a óbito.

Estão corretas,

- (a) I, apenas.
- (b) II e III, apenas.
- (c) II, apenas.
- (d) III, apenas.
- (e) I e II, apenas.