

CONCURSO PÚBLICO

009. PROVA OBJETIVA

ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESTATÍSTICA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **07**.

Filho

Não existe isso que chamam de reprodução. Quando duas pessoas decidem ter um bebê, elas se envolvem em um ato de “produção”, e o uso generalizado da palavra “reprodução” para essa atividade, com a implicação de que duas pessoas estão quase se trançando juntas, é na melhor das hipóteses um eufemismo para confortar os futuros pais antes que se metam em algo que não podem controlar. Nas fantasias subconscientes que fazem a concepção parecer tão sedutora, muitas vezes é nós mesmos que gostaríamos de ver viver para sempre, e não alguém com uma personalidade própria. Tendo previsto a marcha para a frente de nossos genes egoístas, muitos de nós não estamos preparados para filhos que apresentam necessidades desconhecidas. A paternidade nos joga abruptamente em uma relação permanente com um estranho, e quanto mais alheio o estranho, mais forte a sensação de negatividade. Contamos com a garantia de ver no rosto de nossos filhos que não vamos morrer. Filhos cuja característica definidora aniquila a fantasia da imortalidade são um insulto em particular: devemos amá-los por si mesmos, e não pelo melhor de nós mesmos neles, e isso é muito mais difícil de fazer. Amar nossos próprios filhos é um exercício para a imaginação.

Mas o sangue, tanto na sociedade moderna como nas antigas, fala mais alto. Pouca coisa é mais gratificante do que filhos bem-sucedidos e dedicados, e poucas situações são piores do que o fracasso ou a rejeição filial. Na medida em que nossos filhos se parecem conosco, eles são nossos admiradores mais preciosos, e, na medida em que são diferentes, podem ser os nossos detratores mais veementes. Desde o início, nós os instigamos a nos imitar e ansiamos pelo que talvez seja o elogio mais profundo da vida: o fato de eles escolherem viver de acordo com nosso sistema de valores. Embora muitos de nós sintam orgulho por ser diferentes dos pais, ficamos infinitamente tristes ao ver como nossos filhos são diferentes de nós.

(Andrew Solomon. *Longe da árvore: pais, filhos e a busca da identidade*, 2013. Adaptado)

01. Segundo o autor do texto, o emprego da palavra “reprodução” para se referir ao nascimento de um filho

- (A) esconde o desejo dos pais de que seus filhos escolham viver de acordo com seus sistemas de valores.
- (B) constitui um eufemismo, reforçando a ideia de que o novo ser possuirá uma personalidade própria.
- (C) se justifica, visto que os genes garantem a continuidade dos traços dos pais nas próximas gerações.
- (D) cria um duplo jogo em que os filhos são, ao mesmo tempo, os maiores admiradores e detratores dos pais.
- (E) estabelece uma falsa ideia de que os filhos representam a continuidade da existência dos pais.

02. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) os filhos tornam-se estranhos para os pais na medida em que os obrigam a amá-los por si mesmos.
- (B) diferentemente da maternidade, a paternidade pressupõe a relação com um estranho.
- (C) não é possível amar um filho por si mesmo, sem colocar nele projeções de nossa própria personalidade.
- (D) a fantasia da imortalidade faz com que seja extremamente difícil aceitar que um filho seja diferente de nós.
- (E) nosso sistema de valores é passado a nossos filhos com a condição de que eles se tornem admiradores.

03. Considere a seguinte frase do texto:

“Na medida em que nossos filhos se parecem conosco, eles são nossos admiradores mais preciosos, e, na medida em que são diferentes, podem ser os nossos detratores mais **veementes**”.

Um sinônimo para o vocábulo em destaque é

- (A) impetuosos.
- (B) inexpressivos.
- (C) exigentes.
- (D) extenuantes.
- (E) comoventes.

04. Assinale a alternativa em que há palavra empregada com sentido figurado.

- (A) Na medida em que nossos filhos se parecem conosco, eles são nossos admiradores mais preciosos.
- (B) A paternidade nos joga abruptamente em uma relação permanente com um estranho.
- (C) Mas o sangue, tanto na sociedade moderna como nas antigas, fala mais alto.
- (D) Quando duas pessoas decidem ter um bebê, elas se envolvem em um ato de “produção”.
- (E) Filhos cuja característica definidora aniquila a fantasia da imortalidade são um insulto em particular.

05. O trecho do texto que está reescrito corretamente, considerando as regras de emprego da vírgula é:

- (A) Desde o início, nós os instigamos a nos imitar e ansiamos, pelo que talvez seja o elogio mais profundo da vida: o fato de eles escolherem viver de acordo com nosso sistema de valores.
- (B) O uso generalizado da palavra “reprodução” para essa atividade, com a implicação de que duas pessoas estão quase se trançando juntas, é, na melhor das hipóteses, um eufemismo.
- (C) A paternidade nos joga, abruptamente em uma relação permanente com um estranho, e quanto mais alheio o estranho, mais forte a sensação de negatividade.
- (D) Tendo previsto a marcha para a frente de nossos genes egoístas, muitos de nós não estamos preparados para filhos que, apresentam necessidades desconhecidas.
- (E) Devemos amá-los por si mesmos e, não pelo melhor de nós mesmos neles, e isso é muito mais difícil de fazer.

06. Considere os dois trechos a seguir.

“**Mas** o sangue, tanto na sociedade moderna como nas antigas, fala mais alto.”

“**Embora** muitos de nós sintam orgulho por ser diferentes dos pais, ficamos infinitamente tristes ao ver como nossos filhos são diferentes de nós.”

As expressões destacadas estabelecem, respectivamente, os sentidos de:

- (A) adversidade e concessão.
- (B) proporção e concessão.
- (C) adversidade e comparação.
- (D) causa e adversidade.
- (E) proporção e condição.

07. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas nos trechos a seguir.

“Nas fantasias subconscientes _____ tornam a concepção tão sedutora...”

“... um eufemismo para confortar os futuros pais antes que se metam em uma situação _____ não podem escapar.”

- (A) às quais, de que
- (B) que, em que
- (C) as quais, que
- (D) que, de que
- (E) às quais, da qual

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 10.

A crise da saúde mental no Brasil.

Conforme aponta a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o primeiro no *ranking* internacional de países com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. O país é também o quarto com maior número de pessoas com depressão. E qual é o motivo desse alto número de pessoas com transtornos mentais? Os altos índices de violência são um motivo – de acordo com o Atlas da Violência 2018, o Brasil tem taxa de homicídio 30 vezes maior que a da Europa. Além disso, uma grande causa de sofrimento psíquico é a instabilidade financeira. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 12,5% no trimestre de fevereiro a abril, o que corresponde a mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Até mesmo o estilo de vida nas cidades, que é muito urbanizado – barulho demais, poluição demais, horas intermináveis no trânsito – tudo isso somado aumenta o risco de problemas de saúde mental.

Se a sociedade brasileira não começar a lidar seriamente com os problemas de saúde mental, vamos enxergar cada vez mais uma piora nos índices de transtornos e em tudo que a saúde mental acarreta: pioras na saúde física, aumento dos índices de suicídio, menor produtividade da força de trabalho.

(Michael Kapps. *Folha de S.Paulo*, 30 de agosto de 2019. Adaptado)

08. A partir da leitura do texto, é possível concluir que

- (A) os transtornos mentais são características intrínsecas dos brasileiros, em razão da nossa estrutura social.
- (B) a população brasileira apresenta altos índices de ansiedade, mas esta não é tão grave quanto a depressão.
- (C) a solução para os problemas dos transtornos mentais seria o êxodo urbano, levando a população a morar em áreas mais tranquilas.
- (D) o desemprego e a instabilidade financeira são responsáveis por 12,5% dos casos de transtornos mentais entre os brasileiros.
- (E) os transtornos mentais são problemas de ordem multifatorial, influenciados por fatores sociais.

09. A frase em que a concordância se dá em conformidade com a norma-padrão da língua é:

- (A) Com uma alta taxa de homicídios no país, aumentam-se os índices de depressão na população.
- (B) Nas últimas décadas, houve um aumento de pessoas que sofrem com transtornos mentais.
- (C) É necessário medidas que atenuem os problemas sociais ligados aos transtornos mentais.
- (D) A ansiedade está entre os vários transtornos mentais que pode ser decorrente de um estilo de vida urbanizado.
- (E) Surge, com o aumento das taxas de desemprego e de violência, problemas na saúde da população.

10. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir, considerando as regras de emprego da crase.

É importante criar políticas que atendam _____ necessidade da população de acesso _____ formas de vida favoráveis _____ saúde mental.

- (A) à ... a ... a
- (B) a ... à ... a
- (C) à ... a ... à
- (D) à ... à ... à
- (E) a ... à ... à

11. Considere falsidade a seguinte afirmação:

Se Carlos é advogado, então Amanda é juíza.

Com base nas informações apresentadas, é verdade que

- (A) Carlos é advogado.
- (B) se Amanda não é juíza, então Carlos não é advogado.
- (C) Amanda é juíza.
- (D) Amanda é juíza se, e somente se, Carlos é advogado.
- (E) Carlos não é advogado.

12. A negação de uma afirmação é uma ferramenta importante em várias áreas.

Vamos supor que seja necessário fazer a negação lógica da seguinte afirmação:

Todos os envolvidos são culpados e devem ser punidos.

Uma das possibilidades está contida na alternativa:

- (A) Existe envolvido inocente e que não deve ser punido.
- (B) Nenhum dos envolvidos é culpado ou deve ser punido.
- (C) Existe envolvido que não é culpado ou que não deve ser punido.
- (D) Todos os envolvidos não são culpados e não devem ser punidos.
- (E) Nenhum dos envolvidos não é culpado ou não deve ser punido.

13. Em determinado município, alguns engenheiros são professores e todo professor é concursado. Sendo assim, nesse município, é verdade que

- (A) todo concursado é engenheiro.
- (B) todo engenheiro é concursado.
- (C) todo concursado é professor.
- (D) não existe professor que é engenheiro.
- (E) existe concursado que é engenheiro.

14. João, Carlos e Paulo moram em estados distintos, sendo eles São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, não necessariamente nessa ordem. Eles se comunicaram ou com sua tia, ou com sua irmã, ou com sua mãe, utilizando apenas um meio: telefone, carta ou e-mail, também não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que: Carlos mora em Santa Catarina e se comunicou por telefone; A mãe e o pai de Paulo são filhos únicos; João não conhece a sua mãe e nunca foi adotado; Quem mora em São Paulo se comunicou com sua mãe. Sendo assim, quem se comunicou com a tia, por carta, foi

- (A) Carlos, e ele mora em Santa Catarina.
- (B) João, e ele mora em São Paulo.
- (C) João, e ele mora no Rio de Janeiro.
- (D) Paulo, e ele mora em São Paulo.
- (E) Paulo, e ele mora no Rio de Janeiro.

15. Na sequência numérica 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57, 73, ..., o próximo elemento é

- (A) 89.
- (B) 91.
- (C) 103.
- (D) 115.
- (E) 127.






R A S C U N H O

16. Um usuário do MS-Windows 7, em sua configuração padrão, está com uma janela do Windows Explorer aberta e deseja fechá-la. Para isso, ele pode usar o atalho por teclado

(A) F1
(B) Ctrl + F1
(C) Alt + F3
(D) Alt + F4
(E) Alt + F5

17. O MS-Word 2010, em sua configuração padrão, possui diversas formas de quebras de páginas, incluindo quebras de seções e colunas.

Assinale a alternativa que apresenta o ícone relacionado às quebras descritas no enunciado, cujo nome é Coluna.



18. Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.


	A	B
1	Processo	Pessoas
2		
3	P1	20
4	P2	30
5	P3	50
6	P4	15
7	P5	21
8		

Assinale a alternativa que apresenta valor exibido na célula B8, após esta ser preenchida com a seguinte fórmula:

=CONT.SE(B3:B7;20)

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

19. A imagem a seguir contém botões de ações padrão no MS-PowerPoint 2010, em sua configuração original, com alguns números associados.



O número associado ao botão de ação cujo *hiperlink* padrão aponta para "Último slide" é

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

20. Um usuário do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, cuja conta é usuario2@ufu.br, recebeu um e-mail, enviado com sucesso, em que os campos na mensagem do remetente foram preenchidos da seguinte forma:

De: usuario1@ufu.br
Para: usuario2@ufu.br
Cc: usuario3@ufu.br
Cco: usuario4@ufu.br
Assunto: usuario5@ufu.br

Quando esse usuário clicar em Responder a todos, o e-mail será enviado apenas para

(A) usuario1@ufu.br.
(B) usuario1@ufu.br e usuario3@ufu.br.
(C) usuario3@ufu.br e usuario4@ufu.br.
(D) usuario1@ufu.br, usuario2@ufu.br e usuario3@ufu.br.
(E) usuario1@ufu.br, usuario3@ufu.br e usuario4@ufu.br.

21. O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da sociedade e foi criado para promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Antes de 1988, o sistema público de saúde atendia apenas quem não contribuía para a Previdência Social.
- (B) A Constituição de 1988 garantiu a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.
- (C) O SUS, quando foi criado, tinha como principal característica ser centralizado e de responsabilidade federal, sem a participação dos usuários.
- (D) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1988, foi um marco da Reforma Sanitária, que tratou da saúde como direito, da reformulação do sistema nacional de saúde e do financiamento setorial.
- (E) O Ministério da Saúde, criado nos primórdios da história da Saúde Pública Brasileira em 1808, tinha como responsabilidade a organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados a promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros.

22. A definição dos recursos mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde deve

- (A) estar em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da Federação.
- (B) ser de responsabilidade do setor saúde e de outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos incidentes sobre as condições de saúde da população.
- (C) incluir despesas de pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores da saúde.
- (D) ser financiada com recursos movimentados em contas correntes específicas para cada programa de trabalho.
- (E) destinar recursos ao saneamento básico e obras de infraestrutura realizadas para beneficiar diretamente a rede de saúde.

23. Sobre os Conselhos de Saúde, é correto afirmar que

- (A) sua composição deve ser de 60% de entidades e movimentos representativos de usuários; 20% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 20% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (B) a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, devem ter uma renovação de 50% de suas entidades representativas.
- (C) as funções, como membro do Conselho de Saúde, são remuneradas, sendo garantido ao conselheiro a dispensa do trabalho durante a vigência do mandato.
- (D) se trata de uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (E) quando não houver Conselho constituído ou em atividade no Município, cabe à Câmara Municipal a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde.

24. Os Serviços Especiais de Acesso Aberto têm como função

- (A) realizar o atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- (B) estabelecer as regras da gestão compartilhada do SUS.
- (C) definir a distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
- (D) estabelecer critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde.
- (E) realizar o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

25. Em relação à saúde do trabalhador, é atribuição do SUS

- (A) denunciar ao órgão do Ministério do Trabalho riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho, identificados nas ações de vigilância em saúde.
- (B) propor à justiça do trabalho a elaboração de normas voltadas às condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.
- (C) prestar assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- (D) informar os empregadores sobre trabalhadores adoecidos pelo trabalho, que foram atendidos nas unidades de saúde.
- (E) garantir aos trabalhadores do setor público a redução da jornada de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde.

26. De acordo com os termos da Lei Federal nº 12.550/2011, que trata da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é correto afirmar que

- (A) a EBSEH possui personalidade jurídica de direito público, com patrimônio destinado pela União, e está vinculada ao Ministério da Saúde.
- (B) a integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- (C) no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEH observará as orientações emanadas sobre saúde pelo Ministério da Educação.
- (D) compete à EBSEH elaborar os planos de educação e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres que tenham vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade.
- (E) é indispensável a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

27. Um funcionário da EBSEH utilizou-se, indevidamente, de um conteúdo sigiloso, com o fim de beneficiar um parente, comprometendo a credibilidade de um certame que é de interesse público, e, por sua ação, causou danos à Administração Pública. Neste caso, e conforme disposto na Lei Federal nº 12.550/2011, este funcionário estará sujeito a uma pena de

- (A) detenção de 30 (trinta) dias e multa.
- (B) detenção de 01 (um) ano e multa de 02 (dois) salários mínimos.
- (C) reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos, com aumento da pena de 1/3 (um terço), e multa.
- (D) reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos e multa no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor integral de seus vencimentos.
- (E) demissão a bem do serviço público e pagamento de multa no valor de 03 (três) vezes o valor de sua remuneração.

28. De acordo com o seu Estatuto Social, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo

- (A) Conselho de Administração da Empresa.
- (B) Presidente da Empresa.
- (C) Ministério de Gestão Estratégica.
- (D) Ministério da Educação.
- (E) Ministério da Saúde.

29. Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução, segundo o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é competência

- (A) da Diretoria Executiva.
- (B) do Conselho de Administração.
- (C) do Conselho Fiscal.
- (D) do Conselho Consultivo.
- (E) do Conselho de Auditoria Interna.

30. Assinale a alternativa que está corretamente em consonância com o Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

- (A) O agente público da empresa, ao manifestar suas opiniões sobre as atividades da EBSEH, no exercício da liberdade de expressão, deve deixar claro que se trata de opinião pessoal, resguardando a reputação da empresa e de seus agentes.
- (B) O empregado não pode discordar de práticas ou políticas adotadas pela empresa nem discutir seus ideais com seu chefe imediato, em respeito ao princípio da moralidade, da fidelidade e de valores fundamentais.
- (C) A empresa não adota a política de estimular o clima de abertura como forma de impedir a estagnação e o inconformismo, propiciando, no entanto, constantes treinamentos e cursos de aperfeiçoamento como forma de encorajamento e criatividade.
- (D) Não é da competência da EBSEH a iniciativa de projetos de sustentabilidade, quando da execução de suas ações, projetos e relações de que sejam parte.
- (E) Os direitos de propriedade intelectual abarcados pelo Código de Ética e Conduta da EBSEH são exclusivamente relativos à marca da empresa, não se estendendo a possíveis parcerias, e devem estar refletidos nos relacionamentos de âmbito interno da empresa, bem como nas devidas proteções.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Um indivíduo tem à sua disposição 10 parafusos, sendo 4 deles defeituosos. Qual a probabilidade de que ele escolha ao acaso, sem reposição, 5 parafusos e nenhum seja defeituoso?

(A) $\frac{1}{21}$
(B) $\frac{1}{42}$
(C) $\frac{1}{70}$
(D) $\frac{1}{252}$
(E) $\frac{243}{3\,125}$

32. Uma doença atinge um indivíduo a cada mil. Qual é, aproximadamente, a probabilidade de que, numa comunidade de dois mil indivíduos, quatro contraiam a doença?

Dado: e (número de Euler) = 2,71828...

(A) e^{-2}
(B) $\frac{1}{24}e^{-2}$
(C) $\frac{2}{3}e^{-2}$
(D) e^{-4}
(E) $8e^{-4}$

33. Considere uma parábola definida por $y = x^2$. A equação da reta tangente à parábola no ponto (1,1) é

(A) $y = x$.
(B) $y = x + 1$.
(C) $y = 2x$.
(D) $y = 2x - 1$.
(E) $y = 2 - x$.

34. A equação do plano que passa pelos pontos (1,1,1), (1,2,3) e (2,2,1) é:

(A) $2x - 2y + z = 1$
(B) $x - 2y + z = 0$
(C) $2x - y + z = 3$
(D) $x - y + z = 1$
(E) $2x - 4y + z = -3$

35. Numa pesquisa são entrevistadas 400 pessoas e 80 delas se dizem contrárias a uma determinada proposta do governo. A “margem de erro” dessa pesquisa (entendida como a metade da amplitude do intervalo de confiança de 95%) é, em pontos percentuais, aproximadamente:

(Considere que, se z é uma variável aleatória com distribuição normal padrão, $P(z < 1,96) = 0,975$ e $P(z < 1,645) = 0,95$, sendo $P(A)$ a probabilidade do evento A).

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.

36. Considere que as pessoas têm peso médio de 70 kg com desvio padrão de 20 kg. Considere, ainda, que 100 pessoas escolhidas ao acaso vão viajar num avião. Se $P(z > a)$ é a probabilidade de que o peso dessas pessoas seja maior do que 7 500 kg, e z é uma variável com distribuição normal padrão, determine o valor de a , e, a seguir, assinale a alternativa correta.

(A) 1,0.
(B) 1,5.
(C) 2,0.
(D) 2,5.
(E) 3,0.

37. Entre as técnicas estatísticas, cuja aplicação está ligada ao uso de computadores, o *Bootstrapping* consiste em

(A) uma técnica de reamostragem, obtendo-se um “novo” conjunto de dados, retirando-se do conjunto original, com reposição.
(B) obter números pseudoaleatórios pela combinação discreta de variáveis normais.
(C) preservar um subconjunto dos dados para validar a estimação.
(D) simular um processo gerador de dados usando números aleatórios.
(E) obter valores críticos para testes cuja distribuição teórica é desconhecida.

38. Considerando as séries $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$, sendo a_n um número real qualquer, é correto afirmar:

- (A) se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente, então $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ é condicionalmente convergente.
- (B) se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente, então $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ é absolutamente convergente.
- (C) se $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ é convergente, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é absolutamente convergente.
- (D) se $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ é divergente, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é absolutamente convergente.
- (E) se $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ é divergente, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é condicionalmente convergente.

39. Com relação aos conjuntos numéricos, tem-se que

- (A) se A é um subconjunto dos naturais, mas é diferente do conjunto dos naturais, então é necessariamente um conjunto limitado.
- (B) um subconjunto dos números reais necessariamente é aberto.
- (C) o supremo de um conjunto qualquer necessariamente pertence a esse conjunto.
- (D) o conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 3\}$ é um conjunto fechado.
- (E) o conjunto dos números inteiros negativos não é um conjunto limitado.

40. Numa população, a taxa de natalidade é de 3% e a taxa de mortalidade é de 1%. Considere que não há emigração ou imigração. O valor a seguir que melhor aproxima o crescimento populacional após 10 anos é:

- (A) 20%
- (B) 22%
- (C) 30%
- (D) 34%
- (E) 40%


41. Se uma população, que inicialmente era P_0 , dobra de tamanho em x anos, a taxa de crescimento anual da população é:

- (A) $\frac{\log(2)}{x} - 1$
- (B) $10^{\frac{\log(2)}{x}} - 1$
- (C) $10^{\frac{\log(2)}{x} P_0} - 1$
- (D) $\frac{\log(2)}{x} P_0 - 1$
- (E) $\frac{\log(2)}{x P_0} - 1$

42. Suponha uma variável com distribuição de *Poisson* com média λ . Para um valor pequeno de λ , a probabilidade de a variável ser igual a 1 pode ser aproximada por

- (A) λ .
- (B) λ^2 .
- (C) $1 - \lambda$.
- (D) $1 - \lambda^2$.
- (E) $\lambda - \lambda^2$.

43. O gráfico a seguir mostra a função densidade de probabilidade da variável x .



O valor que melhor aproxima a probabilidade de x estar entre 1 e 2 é

- (A) 0,10.
- (B) 0,25.
- (C) 0,40.
- (D) 0,45.
- (E) 0,50.

44. Em uma loja de conveniência em que há um único caixa, os clientes chegam à razão de 30 clientes/hora, enquanto o caixa tem capacidade de atender 50 clientes/hora. O tempo médio gasto pelo cliente no sistema é de

- (A) 1 minuto.
- (B) 2 minutos.
- (C) 3 minutos.
- (D) 4 minutos.
- (E) 5 minutos.

45. Uma empresa produz dois tipos de chocolate: O chocolate A leva 400 g de leite e 100 g de cacau, enquanto o chocolate B leva 300 g de leite e 200 g de cacau. Estão disponíveis 10 kg de cacau e 30 kg de leite. As quantidades produzidas que fazem parte da região viável são

- (A) 60 do chocolate A e 20 do chocolate B.
- (B) 50 do chocolate A e 30 do chocolate B.
- (C) 30 do chocolate A e 40 do chocolate B.
- (D) 70 do chocolate A e 15 do chocolate B.
- (E) 80 do chocolate A e 10 do chocolate B.

46. Pretende-se fazer uma pesquisa com alunos de uma faculdade e, para isso, são escolhidos, aleatoriamente, 20 alunos de cada ano. Esse tipo de amostragem é denominado amostra

- (A) aleatória simples.
- (B) aleatória estratificada.
- (C) aleatória por agrupamento.
- (D) aleatória sistemática.
- (E) não aleatória.

Dados para responder às questões de números 47 e 48.

A variável x tem média 4 e desvio padrão 2, enquanto a variável y tem média 3 e desvio padrão 1. A covariância entre x e y é -1 .

47. O coeficiente de correlação entre x e y é

- (A) 0,5.
- (B) $-0,5$.
- (C) 1.
- (D) -1 .
- (E) $-0,25$.

48. A equação estimada da regressão linear simples de y por x é:

- (A) $\hat{y} = 2 - 0,25x$.
- (B) $\hat{y} = 3 - 0,5x$.
- (C) $\hat{y} = 3 - x$.
- (D) $\hat{y} = 4 - x$.
- (E) $\hat{y} = 4 - 0,25x$.

49. Numa regressão linear simples em que foi utilizada uma amostra com 52 observações, a soma dos quadrados totais é de 50 e a soma dos quadrados dos resíduos é de 20. O coeficiente de determinação e a estatística F dessa regressão são, respectivamente:

- (A) 0,6 e 75.
- (B) 0,6 e 12.
- (C) 0,8 e 1,5.
- (D) 0,8 e 12.
- (E) 0,8 e 75.

50. O diâmetro de uma peça deve ser de 50 mm com desvio padrão de 1 mm. No intuito de controlar a qualidade da produção dessas peças, a cada hora é retirada uma amostra de 4 peças. Os limites inferior e superior do gráfico de controle devem ser (considerando que o valor utilizado da distribuição normal seja $z_{\alpha/2} = 3$), respectivamente:

- (A) 49 mm e 51 mm.
- (B) 49,5 mm e 50,5 mm.
- (C) 48,5 mm e 51,5 mm.
- (D) 48 mm e 52 mm.
- (E) 47,5 mm e 52,5 mm.

51. Uma mensagem é transmitida apenas com os dígitos 0 e 1. A probabilidade de o dígito ser transmitido corretamente é 0,8. A alternativa que representa a matriz de transição da cadeia de Markov correspondente a esse processo é:

- (A) $\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 \begin{bmatrix} 0,2 & 0,2 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 0,2 & 0,8 \end{bmatrix} \end{matrix}$
- (B) $\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 \begin{bmatrix} 0,8 & 0,2 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 0,8 & 0,2 \end{bmatrix} \end{matrix}$
- (C) $\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 \begin{bmatrix} 0,2 & 0,8 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 0,2 & 0,8 \end{bmatrix} \end{matrix}$
- (D) $\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 \begin{bmatrix} 0,8 & 0,2 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 0,2 & 0,8 \end{bmatrix} \end{matrix}$
- (E) $\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 \begin{bmatrix} 0,2 & 0,8 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 0,8 & 0,8 \end{bmatrix} \end{matrix}$

52. Suponha que o número de patentes registradas anualmente tenha uma distribuição com parâmetro λ . Suponha ainda que, em 5 anos, foram registradas 2, 5, 3, 1, 4 patentes. O estimador para o parâmetro λ é

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

53. Pesquisados 100 indivíduos a respeito de terem, ou não, sofrido algum acidente de trânsito no último ano, chegou-se a seguinte tabela de contingência:

	COM ACIDENTE	SEM ACIDENTE
HOMENS	15	35
MULHERES	10	40

Considerando que z é uma variável aleatória com distribuição normal padrão, $P(z < 1,96) = 0,975$ e $P(z < 1,645) = 0,95$, sendo $P(A)$ a probabilidade do evento A , é correto afirmar:

- (A) a partir dos dados, que os homens têm maior probabilidade de sofrer acidentes.
- (B) a 5% de significância, rejeita-se a hipótese nula de que os homens têm a mesma probabilidade de sofrer acidentes que as mulheres.
- (C) a proporção amostral das pessoas que sofrem acidentes entre as mulheres é de 10%.
- (D) o desvio padrão amostral das pessoas que sofrem acidentes entre as mulheres é próximo de 5%.
- (E) o desvio padrão amostral das pessoas que sofrem acidentes entre os homens é superior a 10%.

54. Dado o modelo de regressão múltipla $y = \alpha + \beta x + \gamma z + \varepsilon$, onde y , x e z são variáveis, α , β e γ são constantes e ε é uma variável aleatória com média zero. Considere ainda as regressões simples $y = \alpha_1 + \beta_1 x + \varepsilon_1$ e $y = \alpha_2 + \gamma_2 z + \varepsilon_2$.

Se as três regressões forem estimadas por mínimos quadrados ordinários, têm-se os seguintes resultados:

- (A) o estimador de β_1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ_2 será igual ao estimador de γ .
- (B) o estimador de β_1 será igual ao estimador de β , mas o estimador de γ_2 não será igual ao estimador de γ .
- (C) o estimador de β_1 não será igual ao estimador de β e o estimador de γ_2 não será igual ao estimador de γ , necessariamente.
- (D) o estimador de β_1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ_2 será igual ao estimador de γ se, ε , ε_1 e ε_2 não forem correlacionadas com z e x .
- (E) o estimador de β_1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ_2 será igual ao estimador de γ se o coeficiente de correlação amostral entre z e x for zero.

55. A variável y segue um processo representado por $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$, sendo ε_t um ruído branco. Esse processo é denominado

- (A) ARMA(2,1).
- (B) ARMA(1,2).
- (C) AR(2).
- (D) ARIMA(2,1,1).
- (E) ARIMA(1,2,1).

56. O processo $y_t = \sqrt{2}y_{t-1} - y_{t-2} + \varepsilon_t$ é

- (A) um ruído branco.
- (B) não estacionário.
- (C) estacionário de 2ª ordem.
- (D) estacionário em torno da tendência.
- (E) fortemente estacionário.

57. Uma regressão entre duas variáveis não estacionárias

- (A) será necessariamente espúria.
- (B) não será espúria se a estatística F for significativa.
- (C) não será espúria se o coeficiente de determinação (R^2) for maior do que 0,9.
- (D) não será espúria se as estatísticas t forem maiores do que 2.
- (E) não será espúria se os resíduos da regressão forem estacionários.

58. Sendo $\text{var}(x)$ a variância de uma variável aleatória x e $\text{cov}(x,y)$ a covariância entre duas variáveis aleatórias x e y , tem-se que

- (A) $\text{var}(ax - by) = a \text{var}(x) - b \text{var}(y)$.
- (B) $\text{var}(ax - by) = a^2 \text{var}(x) - b^2 \text{var}(y)$.
- (C) $\text{var}(ax - by) = a^2 \text{var}(x) + b^2 \text{var}(y)$.
- (D) $\text{var}(ax - by) = a^2 \text{var}(x) + b^2 \text{var}(y) - 2ab \text{cov}(x,y)$.
- (E) $\text{var}(ax - by) = a^2 \text{var}(x) + b^2 \text{var}(y) + 2ab \text{cov}(x,y)$.

59. Com base nos dados dos intervalos das faixas etárias mostrados a seguir.

INTERVALO (IDADE)	NÚMERO DE PESSOAS
0 ———— 10	10
10 ———— 20	20
20 ———— 30	30
30 ———— 40	25
40 ———— 50	15

Os valores que melhores expressam a média e a mediana dessa população são, respectivamente:

- (A) 26,5 e 26,7.
- (B) 25 e 25.
- (C) 20 e 30.
- (D) 21,5 e 26,7.
- (E) 31,5 e 30.
60. Um aluno tirou as seguintes notas ao longo do semestre: 4, 8, 6, 1 e 6. A média, a mediana e o desvio padrão foram, respectivamente:
- (A) 5; 6 e 5,6.
- (B) 5; 5 e 5,6.
- (C) 5; 6 e 2,4.
- (D) 5; 6 e 31,6.
- (E) 6; 6 e 5,6.

